Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych półkach, zanim została troskliwie zeskanowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej.

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stała się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy.

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku – przypominając długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie.

Zasady użytkowania

Google szczeni się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów komercyjnych.

Prosimy również o:

- Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych
Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych celach prywatnych.
- Nieautomatyzowanie zapytań
Prosimy o niewysyłanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków lub innymi dziedzinami, w których przydatny jest dostęp do dużych ilości tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni.
- Zachowywanie przypisań
Źnak wodny "Google" w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowych materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać.
- Przestrzeganie prawa
W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że skoro dana książka została uznana za część powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam sposób traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność jakiegokolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe.

Informacje o usłudze Google Book Search

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst tej książki można przeszukiwać w internecie pod adresem <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

12
4
74
74

~~11969~~

LIBRARY
Michigan State

~~97877~~
12 2002

FLORA VON SCHLESIEN.

Erster Band.

FLORA

VON

SCHLESSEN

preussischen und österreichischen Theils.

Von

Friedrich Wimmer,

Director und erstem Professor des Königl. Friedrichs - Gymnasiums zu Breslau
und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Nebst

einer Uebersicht

der

fossilen Flora Schlesiens

VON

Dr. H. R. Goeppert,

ordentlichem Professor der Medicin an der Universität, praktischem
Arzte. Correspondenten der Berliner Akademie der Wissenschaften und mehrerer
anderer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Zweite, neu redigirte und bereicherte Ausgabe.

Erster Band.

BRESLAU,

Verlag von Ferdinand Hirt.

1844.

B53431

7-29-64

Botany

Vorwort

zur ersten Ausgabe.

Dass ich nach Verlauf von acht Jahren eine zweite Bearbeitung der Schlesischen Flora in deutscher Sprache folgen lasse, dazu haben mich mehrere Gründe bestimmt. Die nächste Veranlassung bot der Wunsch und die Aufforderung des Herrn Verlegers, welcher ich um so eher Gehör zu geben geneigt war, als mir selbst daran lag, an die Stelle der früheren in mehrfacher Beziehung antiquirten eine neue, vollständigere, correctere und auch ihrer Aussenseite nach gefälliger erscheinen lassen zu können. Zudem sind seitdem manche einzelne Beiträge für die Schlesische Flora ans Licht getreten; fortgesetzte Beobachtung hat mir selbst manche neue Belehrung gewährt; ein nicht unansehnlicher Zuwachs ist durch die vereinten Bemühungen der sammelnden und beobachtenden Freunde hinzu-

gekommen; anderes Verdächtige und Unächte musste ausgeschieden werden: so dass es räthlich schien, diesen neuen Erwerb in einer neuen Darstellung zu verarbeiten. Hauptsächlich war es aber die systematische Anordnung, welche ich anders wünschen musste, damit die Flora ihrem Zwecke, zur richtigen Erkennung und Bestimmung heimischer Pflanzen zu dienen und dadurch eine gründliche Einweisung in das Studium der Botanik zu gewähren, entspräche: an die Stelle der Linnéischen Classen und Ordnungen musste die Anordnung nach den natürlichen Classen und Familien treten. Das Linnéische System hat seinem Grundsatz nach nur den Werth eines alphabetischen Registers; die Bedeutung, welche es erlangt und der allgemeine Gebrauch, in dem es sich lange behauptet hat, beruht auf seiner Anwendbarkeit, und eben darauf, dass es mehr als jede andere künstliche Anordnung die Zusammenreihung der Gewächse nach ihrer Organisations-Verwandtschaft begünstigt. Die natürliche Anordnung allein führt zu einer sicheren und nachhaltigen Kenntniss: die Schwierigkeit, welche damit verbunden sein soll, kann, weil wichtigere Rücksichten obwalten, nicht in Anschlag kommen und ist zum Theil auch nur scheinbar. Für die Kundigen bedarf es keiner weiteren Begründung dieser Behauptung.

Obwohl ich weiss, dass Floren nicht zu den wichtigeren und bedeutenderen literarischen Produkten auf dem Felde der Botanik gehören: so glaubte ich es doch mit der Bearbeitung möglichst genau nehmen zu müssen. Denn ein Buch, welches für den Unterricht bestimmt ist, muss vorzugsweise den Stempel der Zuverlässigkeit an sich tragen, weil der Irrthum um so gefährlicher und nachhaltiger ist, je früher er aufgenommen

wurde. Diesen Zweck aber, den Lernenden einen Leitfaden zur Bestimmung der heimischen Gewächse darzureichen, hatte ich wenigstens als zweiten bei der Ausarbeitung vor Augen und ich hoffe, dass das Buch unter der Anleitung eines umsichtigen Lehrers mit Erfolg wird gebraucht werden können. Ausserdem aber kann eine mit Fleiss und Sorgfalt gearbeitete Provinzial-Flora, zumal wenn der Flächenraum nicht zu klein und die Lage derselben in gewissen Rücksichten, z. B. durch natürliche Begränzung, Gebirgshöhen und dergleichen, ausgezeichnet ist, auch für die Wissenschaft von einigem Belang sein. Giebt sie ein treues Bild der Vegetation eines Landstriches, so gewährt sie für grössere Arbeiten, namentlich für die pflanzengeographischen Vergleichen, ein brauchbares und unentbehrliches Material. Verfasser dieses hat sich die grösste diplomatische Treue in allen hier einschlagenden Beziehungen zur Aufgabe gemacht, namentlich in der richtigen d. h. naturgemässen Begränzung der Arten, in der Andeutung der wichtigen Abänderungen und in der Anzeichnung des eines hybriden Ursprunges Verdächtigen; ferner in der Absonderung des durch Anbau oder auf anderem erweislichem Wege Eingewanderten oder auch Eingebürgerten von dem, soweit diess gegenwärtig zu entscheiden ist, ursprünglich Einheimischen; alsdann in der sorgfältigen Angabe des Wohnplatzes im Allgemeinen, so wie der einzelnen Standorte, und der Verbreitung über das Gebiet und nach den Höhenregionen. Was die Unterscheidung der Arten anbetrifft, so habe ich in Manchem meine frühere Ansicht geändert und zurückgenommen, — vielfache Belehrung verdanke ich Koch — in Anderem habe ich dieselbe festgehalten, wie die eigene Ueberzeugung es gebot.

Die meisten der aufgenommenen Arten habe ich selbst an ihren Standorten aufgesucht und gesehen; von einer kleinen Anzahl sah ich theils frische theils getrocknete Exemplare: wenige habe ich auf die Autorität ihrer Entdecker aufgenommen ohne Exemplare gesehen zu haben, wenn mich triftige Gründe dazu bestimmten: in der Regel aber habe ich auf Tradition hin und ohne mich durch die Ansicht der Exemplare von der Richtigkeit der Bestimmung überzeugt zu haben, Nichts aufgenommen, weil ich aus Erfahrung weiss, dass diese Vorsicht unentbehrlich ist, wenn man grobe Irrthümer vermeiden will. Ausserdem habe ich einige Arten, deren Vorkommen in Schlesien ungewiss ist, durch ein vorgesetztes Fragezeichen, dann die unächtlichen oder hybriden Arten durch ein liegendes Kreuz, die durch Anbau und zufällig verbreiteten durch ein stehendes Kreuz und diejenigen welche nur angebaut angetroffen werden durch einen Stern ausgezeichnet. Die Namen der ersten Finder habe ich wenigstens bei den in den letzten zehn Jahren aufgefundenen Arten beigelegt; man wird daraus abnehmen, wie gross die Zahl derjenigen ist, durch deren vereinigte Bemühungen die Schlesische Flora so genau und vollständig bekannt geworden ist. Und an diesem Orte erlaube ich mir Allen, die mich durch Zusendung und Mittheilung ihrer Entdeckungen erfreut haben, meinen freundlichsten Dank abzustatten. In der Angabe der Standorte glaubte ich eine grössere Ausführlichkeit als früher beobachten zu müssen; ausser mehreren handschriftlichen Mittheilungen einiger Freunde sind hier Schneiders Flora von Bunzlau, Nees v. Esenbecks Verzeichniss der wildwachsenden Pflanzen um Warmbrunn in Wendts Schrift über Warmbrunn, und Rohrsers und Mayers Flora des

Mährischen Gouvernements zur Benutzung gekommen, deren Autorität überall wo es zweckdienlich schien namentlich beigefügt ist.

Die phytogeographische Uebersicht sollte richtiger eine phytotopographische heissen und mit diesem Worte habe ich auch ihren eigentlichen Inhalt bezeichnet. Für eine durchgeführte phytogeographische Betrachtung der Vegetation unseres Gebiets, die künftig einmal vielleicht von anderer Hand erscheint, ist diess nur als eine kleine Vorarbeit zu betrachten, deren Mangelhaftigkeit ich sehr wohl fühle. Dennoch, hoffe ich, wird sie nicht ganz nutzlos sein, und wenn sie die Veranlassung zu einer besseren Arbeit dieser Art werden sollte, so wird sie auch in sofern nicht zwecklos gewesen sein. Der Abschnitt über die Flora der Umgegend von Breslau ist, mit wenigen Veränderungen, nach einem handschriftlichen Aufsätze des Herrn Pharmaceuten Krause aufgenommen.

Die Profil-Darstellung des gesammten Gebirgszuges, welche der Herr Verleger dem Buche anzuschliessen sich bewogen fand, wird hoffentlich eine willkommenene Beigabe und für die das Gebirge Bereisenden eine erwünschte Ergänzung der Reise-Karten sein. Den Herren Prof. Dr. Scholtz und Premier-Lieutenant Lutz gebührt unser wärmster Dank für die Sorgfalt, womit sie die Entwerfung derselben beraten haben. Ersterer hat auch noch die Güte gehabt die nöthige Verständigung über dieselbe nebst dem Verzeichniss der Höhenangaben mit zuvorkommender Bereitwilligkeit auszuarbeiten.

Vorerinnerung

zur zweiten Ausgabe.

Gegenwärtige neue Ausgabe der Flora von Schlesien in zwei Bänden ist durch den gemeinschaftlichen Wunsch des Herrn Verlegers und den meinigen hervorgerufen, den Freunden der vaterländischen Pflanzenwelt von den Resultaten der neueren Forschung und Beobachtung, und den dadurch nöthig gewordenen Ergänzungen und Berichtigungen, Kenntniss zu geben. Da es nicht nothwendig schien, die erste Abtheilung, welche die Flora selbst enthielt, neu aufzulegen, so beschlossen wir diese in unveränderter Gestalt, mit Ausnahme einiger weniger Berichtigungen zu belassen, und alles Neue in einem Nachtrage zu versammeln, diesem aber ein Verzeichniss der Schlesischen Farnkräuter beizufügen. In den Nachträgen sind sämtliche neue Arten aufgeführt, welche seit 1840 aufgefunden worden

sind, und alle seitdem nothwendig gewordenen Abänderungen in der Unterscheidung der Arten, so wie die Angaben neuerdings bekannt gewordener Standorte seltnerer Pflanzen mitgetheilt. Die beiden Sippen *Hieracium* und *Salix* haben die meisten Ergänzungen erfahren, hauptsächlich durch Bastard-Formen, und von der ersteren ist hier eine fast durchgängig neue Bearbeitung gegeben. Ich kann hier nicht unterlassen, anzuführen, dass an der Verfolgung und Aufklärung dieser interessanten Vegetationsformen ein wesentlicher Antheil dem Herrn Pharmaceuten Krause gebührt, der mich dabei durch eifrige und aufmerksame Beobachtung zu unterstützen fortfährt. Es schien mir angemessen auch die Aufzählung der Schlesischen Farnkräuter (im Linnéischen Sinne) anzuschliessen, und damit den Anfang einer Bearbeitung der Cryptogamen zu machen. Ich hege die nicht unbegründete Hoffnung, dass wir in nicht allzulanger Frist von der Hand eines jüngeren tüchtigen Pflanzenkenners eine Uebersicht der Cryptogamen-Flora Schlesiens erhalten werden, eine Arbeit, zu der es mir jetzt sowohl an Muth als an Zeit gebricht.

Die Geographische Uebersicht der Vegetation Schlesiens hat eine durchgängige Verbesserung und Vervollständigung erfahren, und ich hoffe, dass man in dieser erneuten und bereicherten Gestalt dieses Abschnittes meine Bemühung, auch von dieser Seite die Kenntniss von der Vegetation unserer Provinz zu befördern und zu erleichtern, nicht verkennen wird. Der Wunsch des Herrn Verlegers, diese Flora möglichst gemeinnützig zu machen, bestimmte mich einige neue Theile anzuschliessen, von denen der eine eine Anweisung zur zweckmässigen Einrichtung der Excursionen, zum Sammeln und

Trocknen der Pflanzen und der zweite einen Umriss der Geschichte der die Schlesische Flora betreffenden Forschungen enthält. Das Verzeichniss der Höhenangaben, welches für die erste Ausgabe von dem leider zu früh verstorbenen Prof. Scholtz ausgearbeitet worden war, habe ich zum Theil nach den verdienstvollen Arbeiten Prudlo's ergänzt und vermehrt. Zu den beiden Namen-Registern der ersten Ausgabe ist ein drittes über die Standörter hinzugekommen, dessen Ausarbeitung Herr Pharmaceut Krause zu übernehmen die Güte hatte. Herr Professor Dr. Göppert hat unserer Bitte, einen Ueberblick über die vorweltlichen Pflanzenschätze Schlesiens anzuschliessen, mit freundlicher Bereitwilligkeit Gehör gegeben.

Breslau, im Juni 1844.

Inhalt

des ersten Bandes.

- 1. Uebersicht der Klassen und Familien der Schlesischen Flora nach dem natürlichen Systeme und der Sippen (Gattungen) nach dem Linnéischen Systeme.**
 - 2. Flora: Beschreibung, Wohnorte und Blüthezeit der phanerogamischen Arten der Schlesischen Flora.**
 - 3. Nachträge, worin die seit 1840 neu aufgefundenen Arten, neue Standörter und Berichtigungen enthalten sind.**
 - 4. Beschreibung und Wohnorte der Schlesischen Farnkräuter.**
-

ÜBERSICHT

der

Classen und Familien

der

Schlesischen Flora

nach dem natürlichen Systeme

und der

Sippen und Gattungen

nach dem Linnéischen Systeme.

Für den Gebrauch dieser Uebersicht wird bemerkt, dass die in schräger Petit (z. B. pag. XI. Zeile 7: „Polycarpicae“⁽¹⁾) gedruckten Namen solche Reihen, — oder nach Bartling, von welchem die meisten entlehnt sind, Classen — bezeichnen, die eine Anzahl von Familien unter sich begreifen, so dass der auf den Namen der Reihe in stehender Petit (z. B. pag. XI. Zeile 7: Kelch und Kronenbl. dachziegelfg. Staubgefässe in unbestimmter Anzahl Früchte zahlreich, gesondert) folgende Charakter allen diesen Familien zukommt. Wenn einzelne Familien dazwischen treten, welche nicht unter eine grössere Reihe geordnet werden konnten, so sind diese durch einen Querstrich gesondert. Die Familien sind ein wenig eingerückt, und ihre Namen (z. B. pag. XI. Zeile 9: Ranunculaceae) in durchschossener Nonpareille, der Charakter derselben aber (z. B. pag. XI. Zeile 9: Staubbeutel öffnen sich nach aussen) in Nonpareille gedruckt

Uebersicht des Systems.

Das Pflanzenreich zerfällt in zwei grosse Abtheilungen welche nach Linné *Cryptogamia* und *Phanerogamia* heissen. Die Pflanzen der ersten Abthl. haben die Haupttheile der Pflanze Stängel (Längengebilde) und Blatt (Flächengebilde) noch gar nicht oder nicht deutlich geschieden; man vermisst an ihnen äusserlich sichtbare Blüten, (daher *Cryptogamae* Linn.); sie haben gar keine oder nur unvollkommene und gleichsam Anfänge von Organen der Blüthe d. h. Staubgefässen und Stempeln (dh. *Agamae* Necker und *Esexuales* Lindley); sie haben keine Samen, sondern nur Keimkörner (*sporae, sporidia*) in denen von einem Keim *embryo* und Keimblättern oder Cotyledonarblättern *cotyledones*, noch keine Spur ist (dh. *Anembryonatae* Rich. und *Acotyledoneae* Jussieu); bei der Zerlegung findet man in ihnen nur Zellgewebe, aber keine röhrigen u. s. w. Gefässe (d. h. *Cellulares* de Candolle). Nach der verschiedenen Bildungsweise der Stängel- u. Blattgebilde, nach der Ausbildung und Lagerung der Keimkörner und dem Entwicklungsgrade des Zellengewebes werden die Classen, Ordnungen und Familien dieser Abtheilung unterschieden.

Die zweite Abtheilung hat deutlich von einander geschiedene Haupttheile, Wurzel, Stängel, Blatt; ferner sichtbare Blüten (dh. *Phanerogamae* Linné), mit zweierlei wesentlichen Organen der Blüthe, Staubgefässen und Stempeln, durch deren Thätigkeit die Vollendung des Samens bewirkt wird (dh. *Sexuales* Lindl.); Samen die einen Keim, *embryo*, d. i. die künftige Pflanze schon bis zu einem gewissen Grade entwickelt, mit Keimblatt oder Cotyledonarkörper darstellen (dh. *Cotyledonares* Juss); bei der Zerlegung findet man als Bestandtheile ihrer Masse Zellgewebe und Gefässe, *vasa spiralia* (dh. *Vasculares* De Candolle.)

Die *Phanerogamae* lassen sich nach der Beschaffenheit des Keims in zwei Kreise sondern, indem damit eine durchgreifende Verschiedenheit der ganzen Organisation zusammenhängt.

Bei den Pflanzen des ersten Kreises *Monocotyledoneae*, liegt der Keim als ein längliches oder keulenförmiges Körperchen, entweder mit oder ohne einen Eiweisskörper innerhalb der Samenschale, ohne deutliche Sonderung seiner drei Theile, des Knöspchens, *plumula*, der Keimblätter, *cotyledones*, und des Würzelchens, *radicula*; und bei der Entwicklung zeigt sich das Keimblatt als eine einfache häutige Scheide, die das Knöspchen einschliesst daher *Monocotyledoneae* Juss., und aus dem unteren hohlen Ende des Keims treten mehrere Würzelchen hervor, dh. *Endorrhizae* Richard, *Endogenae* Ce Cand. Mit diesem Grundcharakter sind folgende Merkmale der Organisation verbunden. Die Wurzel dieser Gewächse ist sehr häufig ein starker, söhlig oder senkrecht sich fortsetzender Wurzelstock, mit zwiebelartigen unterirdischen Knospen. Der Stengel ist oft nur als die senkrechte Verlängerung des Wurzelstockes zu betrachten, oft knotig-gegliedert, von den Blattscheiden theilweise umhüllt oder mit Narbeneindrücken der abgefallenen Blätter. Die Blätter stets wechselständig, an ihrem Grunde in Blattscheiden übergehend, meist mit schmaler und wenig ausgebildeter Platte, letztere von geraden parallelen Nerven (oder Ribben) durchzogen, zwischen denen nur selten einige netzförmig-verbundene Queradern befindlich sind. Die Blumenhülle und die Theile der Blume sind in der Dreizahl oder deren Verdoppelungen vorhanden. Die Blumenhülle ist einfach, zwar meist aus einem äusseren oder unteren und inneren oder oberen Kreise von Zipfeln oder Blättchen, welche aber an ihrem Grunde zu einem einzigen Körper vereinigt sind; häufig an Farbe und Gestalt nur den unteren Blättchen ähnlich, bisweilen aber auch sämmtlich schöngefärbt und kronenartig; nie aber ist ein deutlicher Unterschied von Kelch und Krone da. Die Früchte sind entweder einfache Kornfrüchte, oder dreifächerige häutige oder beerenförmige Kapseln. Bei der Zerlegung zeigt der Stängel oder Stamm, wie bei den Palmen, ein meist trockenes Zellgewebe mit darin zerstreuten Gefässbündeln, ohne gesonderte Schichten.

In diesem Kreise unterschied Jussieu nach der Stellung der Blumenhülle, der Staubgefässe und des Fruchtknotens gegen einander drei Reihen: 1) *Staminibus hypogynis*, deren Staubgefässe auf dem Fruchtboden stehen. 2) *staminibus perigynis* *germine supero*, deren Staubgefässe auf der Blumenhülle stehen und deren Fruchtknoten frei ist. 3) *germine infero*, deren Staubgefässe auf der mit dem Fruchtknoten verwachsenen Blumenhülle oder auf einem mit der Narbe verwachsenen Träger stehen*.)

Bei den Pflanzen des zweiten Kreises, *Dicotyledoneae*, sind die drei Theile des Keimes gesondert und namentlich sind zwei gegenständige Keimblättchen meist schon vor der Keimung entwickelt,

*) Auf demselben Grunde ruhen nach Jussieu's Anordnung auch die Reihen der *Dicotyledoneae*. Dieses Merkmal ist jedoch nicht durchgreifend und eine darauf gegründete Anordnung trennt häufig zusammengehörige Bildungen, wird daher von neueren Systematikern nicht durchgängig beibehalten.

welche das Federchen einschließen, daher Dicotyledoneae Jussieu, und das Wurzelende des Keims wird unmittelbar durch Verlängerung zur Wurzel; daher Exorrhizae Richard, Exogenae De Cand. Mit diesem Grundcharakter, wovon es nur sehr geringe Ausnahmen giebt, sind folgende Merkmale der Organisation verbunden. Der Stängel ist stielrund oder vierkantig, und bisweilen knotig-gegliedert. Die Blätter sehr häufig in Stiel und Platte geschieden, ersterer nie in eine wahre Blattscheide verwandelt, sondern nur am Grunde verbreitert und häufig von Stützblättern von verschiedener Gestalt und Stellung begleitet. Die Blattplatte ist von einem Adernetz durchzogen, häufig in die Breite gezogen und oft vielfach zerschlitzt. Die Blätter sind bisweilen wahrhaft zusammengesetzt, d. h. jedes auf einem besonderen Stiel, welche sämmtlich einem Hauptstiele eingelenkt sind. Die Blätter sind entweder wechsel- oder gegenständig, auch winkelständig; die gegenständigen meist vierzeilig; bisweilen unten gegen- oder wirtel- weiter oben wechselständig; ihr Emporsteigen am Stängel geschieht in zwei oder mehreren Spirallinien. In der Blumenhülle und den anderen Theilen der Blume herrschen die Zahlen Fünf und Vier und deren Verdoppelungen vor. Die Blumenhülle besteht, bei der Mehrzahl aus zwei geordneten Kreisen, einem äusseren, Kelch, welcher grün und blattartig; einem inneren, Krone, welcher gefärbt und von dünnhäutiger Beschaffenheit ist. Wenn der eine Kreis fehlt, so pflegt der vorhandene mehr kelchartig zu sein. Selten fehlt die Blumenhülle ganz. Bei der Zerlegung namentlich derjenigen mit ausdauerndem Stängel oder Stamme versehenen Pflanzen dieses Kreises zeigt ein Durchschnitt derselben drei gesonderte Schichten: 1, Rinde, cortex, aus Rindenzellekörper und Rindenzellkörper oder Bast bestehend; 2, Holz; lignum, aus ringförmig-concentrischen Lagen bestehend, wovon alljährig aussen eine neue angesetzt wird, welche aus Bündeln von Längszellen oder Fasern und Gefäßen und dazwischen liegendem Zellgewebe bestehen; letzteres unter dem Namen der Markstrahlen als Verbindung des Centrum mit der Peripherie erscheinend; 3, Mark, medulla, die innerste Röhre nur aus Zellgewebe bestehend bald vertrocknend und durch Pressung verschwindend.

Den Kreis der *Dicotyledoneae* sonderte Jussieu in drei Reihen nach der Zahl und der Zertheilung der Blumenhüllen, nämlich in: 1, *Apetalae*, entweder ganz ohne Blumenhülle oder mit einfacher Blumenhülle, welche bald grün und kelchartig, bald gefärbt und kronenartig ist, bald als eine Verschmelzung beider betrachtet werden kann; 2, *Monopetalae*, mit doppelter Blumenhülle, wovon die innere, Krone genannt, nur aus einem Blatte besteht; 3, *Polypetalae*, mit doppelter Blumenhülle, wovon die innere aus mehreren getrennten Blättern besteht.

Die Reihe der *Apetalae*, welche Jussieu nach der Anheftung der Staubgefäße oder der die Staubgefäße tragenden Blumenhülle in drei Klassen, nämlich Epistaminia, Peristaminia und Hypostaminia sonderte, bildet keine natürliche Abtheilung, da die hierher gerechneten Familien zum Theil in genauer Beziehung zu gewissen Familien der *Monopetalae* und *Polypetalae* stehen. Doch behält man

sie einstweilen noch bei; indess sind hier die *Empetreae* und *Euphorbiaceae* einerseits und die *Chenopodiaceae* *Amarantaceae* und *Scle-rantheae* andererseits ausgeschieden und jene neben die übrigen *Tri-coccae*, diese neben die ganz nahe verwandten übrigen *Caryophylla-ceae* gestellt worden.

Die Reihe der *Monopetalae* wurde von Jussieu in vier Klas-sen eingetheilt; 1, mit hypogynischer Krone; 2, mit peri-gynischer Krone; 3, mit epigynischer Krone und verwach-senen Antheren; 4, mit epigynischer Krone und getrenn-ten Antheren. Die Familien dieser Reihe lassen sich nach der Stellung der Krone zum Fruchtknoten in zwei Gruppen bringen: *Hypogynae*, deren Krone unter dem Fruchtknoten steht, und *Perigy-nae* deren Krone entweder auf der Spitze des Fruchtknotens oder auf einer den Fruchtknoten umgebenden Scheibe steht.

Die Reihe der *Polypetalae* theilte Jussieu auch nach der Stellung der Staubgefäße zum Stempel in die drei Ordnungen *Epi-petalia*, *Hypopetalia* und *Peripetalia*. Je nachdem die Krone aus dem Blumenboden oder aus dem Saume des alsdann einblättri-gen Kelches entspringt, lässt sich dieselbe in die beiden Gruppen der *Thalamiflorae* und *Calyciflorae* unterscheiden.

Diagnostische Uebersicht der natürlichen Ordnungen oder Familien.

Phanerogamae.

I. Polypetalae Thalamiflorae.

- Berberideae.* Kelch- und Kronenblätter dachziegelförmig. Steinfrüchte.
- Polycarpicae.* Kelch- und Kronenbl. dachziegelfg. Staubgefäße in unbestimmter Anzahl. Früchte zahlreich, gesondert.
- Ranunculaceae.* Staubbeutel öffnen sich nach aussen.
- Paeoniaceae.* Staubbeutel öffnen sich nach innen.
- Rhoeadeae.* Kronen- und Staubblt. unter dem Stempel. Samenhalter wandständig zwischen den Klappen.
- Cruciferae.* Kelch und Krone regelmässig, vierblättrig.
- Papaveraceae.* Kelch zweiblättrig, Krone vierblättrig, regelmässig.
- Rosedaceae.* Kronenblt. geschlitzt. Fruchtknoten offen.
- Fumariaceae.* Krone unregelmässig. Kelch zweiblättrig. Staubgefäße in zwei Bündeln.
- Polygaleae.* Krone unregelmässig. Staubgefäße verwachsen. Fruchtknoten zweifächerig.
- Cistiflorae.* Kronen und Staubgef. unter dem Stempel. Samenhalter wandständig an der Axe der Klappen.
- Cistineae.* Staubgefäße zahlreich.
- Violariae.* Fünf Staubgefäße. Kronenblt. ungleichförmig.
- Droseraceae.* Fünf Staubgef. Kronenblt. gleichförmig.
- Malpighinae.* Kronen auf einer Scheibe. Kelchblt. dachziegelfg. Fruchthülle doppelhäutig.
- Acerinae.* Zwei verbundene gefügelte Früchtchen.
- Hippocastaneae.* Frucht kugelig mit doppelter lederartiger Hülle.
- Columniferae.* Kelchzipfel mit klappiger, Kronen mit gedrehter Knospung. Blumenboden in eine Scheibe oder Säule sich erhebend, worauf die Staubgef. und Stempel stehen.
- Tiliaceae.* Kelch hinaufällig. Staubbeutel zweifächerig; Staubfäden bis an den Grund frei.

Malvaceae. Kelch dauernd. Staubbeutel einfächerig. Staubfäden verwachsen.

Hypericinae. Kelch mit dachziegelförmiger Knospung. Drei bis fünf verwachsene Fruchtblätt; Samenhalter an den eingeschlagenen Klappenrändern.

Gynobasicae. Die Fruchtblätter liegen um die aufgerichtete und hindurchgehende Axe. Kelchzipfel dachziegelförmig.

Rutaceae. Ein Griffel. Früchte kapselförmig. Fruchthülle doppelhäutig.

Geraniaceae. Krone regelmässig. Fünf Griffel und einsamige Früchte.

Oxalideae. Krone regelmässig. Fünf mehrsamige Früchte und Griffel.

Balsamineae. Kelch zweiblättrig. Krone unregelmässig gespornt.

Lineae. Kelchzipfel mit dachziegelförmiger, Kronen mit gedrehter Knospung. Drei bis fünf verwachsene Früchte mit je 2 umgekehrten Samen.

Elatiniae. Kelchzipfel mit dachziegelförmiger Knospung. Kapsel Frucht mit 3-5 mehrsamigen Fächern und mittelständigen Samenhaltern, auf dem Rücken der Klappen aufspringend.

Caryophyllinae. Kelch und Krone mit dachziegelförmiger Knospung. Der Fruchtknoten ungetheilt. Frucht kapselförmig, vielsamig mit mittelständigen Samenhaltern. Eiweiss mehlig. Keim gekrümmt.

Sileneae. Kelch röhrig, 4-5zählig. Kronenblätt. um den Stempel.

Alsineae. Kelch tief 4-5theilig. Kronenblätter unter dem Stempel. Keine Stützblätter.

II. Polypetalae Calyciflorae.

Chenopodinae. Kelch und Krone mit dachziegelförmiger Knospung. Der Fruchtknoten ungetheilt. Frucht kapselförmig mehrsamig. oder schlauchfg. einsamig. Eiweiss mehlig. Keim gekrümmt.

Paronychiae. Staubgef. um den Stempel. Schlauch- oder Kapsel Frucht. Blätter mit Stützblätter.

Portulacae. Kelch zweiblättrig.

* **Scleranthae.** Die Krone fehlt. Staubgef. um den Stempel. Die Kelchröhre verhärtet und bedeckt den einsamigen Schlauch.

* **Amarantaceae.** Die Krone fehlt. Kelch von Deckblättern umgeben, trockenhäutig. Staubgefässe unter dem Stempel.

* **Chenopodiaceae.** Die Krone fehlt. Staubgefässe um den Stempel. Fruchtknoten mit einem Fache und einem Samen. Die Frucht vom bleibenden Kelche bedeckt.

Succulentae. Kelch und Krone mit dachziegelförmiger Knospung. Zwei und mehrere trennbare und oben freie Früchte mit vielen Samen an der inneren Nath.

Crassulaceae. Die Früchte nur am Grunde zusammenhängend, zuw. mit den Kelchzipfeln wechselnd. Blätter fleischig.

Saxifrageae. Zwei nur oben freie Früchte.

Umbelliflorae. Krone mit eingerollter oder klappiger Knospung. Fruchtknoten unterständig, mit einer Scheibe am Gipfel, an

der die Kronenblätter stehen. Fächer der Frucht einsamig
Blumen in einfachen oder zusammengesetzten Schirmen.

Umbelliferae. Krone mit eingerollter Knospung. Zwei Griffel. Frucht besteht aus zwei, von einem Träger herabhängenden Spaltfrüchten.

Araliaceae. Krone mit klappiger Knospung. Ein Griffel. Frucht eine mehrsamige Steinfrucht.

Adoxeae. Fünf Blumen in kopfförmigem Schirm. Kelch 2 - 5theilig, halb mit dem Fruchtknoten verwachsen. Krone mit dachziegelförmiger Knospung. Staubfäden gespalten. Beerenfrucht mit 2 - 5 Samen.

Loranthae. (*Viscum.*) Ein- oder zweihäusig. Die Staubbeutel sitzen an den Kronenblättern. Fruchtknoten mit der Kelchröhre verwachsen. Einsamige Beerenfrucht.

Calycanthae. Kelch mit klappiger Knospung, trägt die Staubgef. und Krone. Fruchtknoten 1 - 4fächerig.

Lythriariae. Fruchtknoten frei. Kapsel frucht.

Onagrariae. Fruchtknoten unterständig mit vier vielsamigen Fächern.

Halorrhageae. Fruchtknoten unterständig mit einsamigen Fächern. Wasserpflanzen.

Tamariscineae. Kapsel dreiklappig. Samen mit Haarschopf. Halbsträucher.

Calophytae. Krone und Staubgefäße um den Stempel. Die Früchtchen meist gesondert, oft in mehrfachen Reihen. Die Samenhälter in der Mittelnahrt der Früchtchen.

Papilionaceae. Schmetterlingsblumen. Hülsenfrucht.

Pomaceae. Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen, zu einem fleischigen Fruchtlager anschwellend.

Rosaceae. Kelchröhre mit dem fleischigen Fruchtlager verwachsen, die Früchtchen bei der Reife in Gestalt einer krugförmigen Beere bedeckend.

Dryadeae. Die Kelchzipfel mit klappiger Knospung. Die Früchtchen frei, einsamig.

Spiraeaceae. Die Kelchzipfel mit dachziegelförmiger Knospung. Die Früchtchen frei, wenigsamig.

Amygdaleae. Ein freier Fruchtknoten mit zwei Samen. Steinfrucht.

Sanguisorbeae. Die Kelchzipfel mit klappiger Knospung. Ein bis drei im Kelch eingeschlossene Früchtchen.

Tricoccae. Zahl der Kronenbltt. und Staubgef. bestimmt. Meistens drei verwachsene, nicht aufspringende oder sich von einander lösende Früchtchen.

Euphorbiaceae. Blumen unvollständig, einhäusig. Kapsel dreikörnig, mit einem Samen in jedem Fache. Mit Milchsaft.

Empetreae. Zweihäusig. Drei Kronenbltt. und Staubgef. Beerenfrucht.

Rhamneae. Kelch mit klappiger Knospung. Staubgef. hinter den Kronenblättern. Sträucher.

Celastrinae. Staubgefäße zwischen den Kronenblättern. Samen mit einem Mantel. Strauch.

Staphyleaceae. Staubgefäße zwischen den Kronenblättern. Samen beinhart, ohne Mantel. Strauch.

Grossulariaceae. Kronenblitt. und Staubgefäße am Kelchsaum. Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen. Fleischige Beerenfrucht mit zwei Wandsemenhaltern.

III Monopetalae Perigynae.

Cucurbitaceae. Krone tief getheilt auf dem Kelchsaum. Lange bogige Staubbeutel.

Caprifoliaceae. Staubbeutel frei. Frucht beerenförmig aus drei bis vier verbundenen Früchtchen. Krone röhrig.

Viburneae. Staubbeutel frei. Frucht eine 1-3samige Beere. Krone radförmig.

Stellatae. Staubbeutel frei. Frucht aus zwei verwachsenen Früchtchen. Blätter quirlig.

Aggregatae. Fruchtknoten einfrüchtig. Krone auf dem Fruchtknoten.

Valerianaceae. Staubbeutel frei. Blumen gesondert. Fruchtknoten mit drei Fächern, wovon zwei leer sind.

Dipsacaceae. Staubbeutel frei. Blumen in Köpfe mit einer Deckblätterhülle vereinigt.

Compositae. Staubbeutel verwachsen. Blumen in Köpfe mit einer Deckblätterhülle vereinigt.

Cumpanulaceae. Staubbeutel in Längspalten sich öffnend. Frucht eine 2-3fächerige Kapsel mit vielen Samen.

Ericineae. Staubbeutelächer oben oder unten getrennt, in einem Loche sich öffnend. Frucht eine 3-4fächerige Kapsel mit vielen Samen.

IV. Monopetalae Hypogynae.

Oleinae. Kronen regelmässig. Zwei Staubgefäße. Zwei verwachsene Fruchtknoten mit 1-2 Samen.

Contortae. Kronen regelmässig. Staubfäden unter dem Fruchtknoten. Die Frucht aus zwei, mit der Aussenseite des Randes aneinander schliessenden Früchtchen.

Gentianeae. Kronen mit dachziegelförmiger Knospung. Früchte bedeckt.

Apocynae. Kronen mit gedrehter Knospung. Staubfäden frei.

Asclepiadeae. Staubfäden um den Griffel verwachsen.

Tubiflorae. Kronen regelmässig, meist mit gefalteter Knospung. Die Frucht aus 2-3 freien oder an den Seiten zusammengewachsenen Früchtchen.

Convulvaceae. Kapsel Frucht mit 1-2 Samen in jedem Fache.

Solaneae. Zweifächerige Frucht mit je vielen Samen.

Boragineae. Vier zu einer Gemeinfrucht verbundene Nüsschen. Blüthenstand schneckenförmig-aufgerollt.

Labiataeflorae. Krone unregelmässig, meist zweilippig. Vier oder fünf Staubgefässe von ungleicher Länge. Zwei oder vier freie oder verbundene Früchtchen.

Scrofularinae. Ein- oder zweifächerige Kapselfrucht. Vier Staubgef.

Labiatae. Eine in vier Nüsschen getheilte Gemeinfrucht.

Verbenaceae. Frucht pflaumenartig in vier Nüsse zerfallend.

Lentibulariae. Einfächerige Kapselfrucht. Nur zwei vollkommene Staubgefässe.

Primulaceae. Kronen regelmässig. Staubgef. hinter den Kronenzipfel.

Aggregatae. Blumen gehäuft. Kronen trockenhäutig.

Plumbagineae. Fünf Griffel.

Plantagineae. Ein Griffel.

V. Apetalae.

Thymeleae. Blumenhülle kronenartig. Fruchtknoten frei.

Santaleae. Blumenhülle kronenartig. Fruchtknoten mit der Blumenhülle verwachsen.

Polygoneae. Blumenhülle halb kronenartig. Frucht ein Nüsschen. Tutenförmige Stützblätter.

Urticeae. Ein- oder zweihäusig. Stempelblumen mit getheilter Blumenhülle. Frucht ein Nüsschen.

Cannabinae. Zweihäusig. Stempelblumen mit ungetheilter Blumenhülle. Frucht ein Nüsschen.

Aristolochiaeae. Blumenhülle kronenartig. Staubfäden mit dem Griffel verbunden.

Ulmaceae. Blumen in Büscheln. Blumenhülle glockig. Frucht eine einsamige gefügelte Nuss.

Amentaceae. Staubgefässblumen in Kätzchen, [walzige Aehren, mit dachziegelförmigen Deckschuppen und unscheinlichen oder mangelhaften Blumenhüllen.]

Cupuliferae. Die Stempelblumen (und Frucht) von einem Becher umschlossen.

Betulinae. Gefügelte Nüsschen in walzigen schuppigen Kätzchen. Einhäusig.

Salicinae. Zweiklappige Kapseln in Kätzchen. Zweihäusig.

Coniferae. Einhäusig. Die Nüsschen in offenen oder geschlossenen Zapfenfrüchten.

Ceratophylleae. Wasserpflanzen mit winkelständigen einhäusigen Blumen und stacheligen Nüsschen.

Nymphaeaceae. Zahlreiche Blumenhüllblätter, die äusseren grün, die inneren gefärbt. Wasserpflanzen ohne Stängel.

VI. Monocotyledoneae.

Epigynae. Staubfäden frei. Fruchtknoten unter der Blume.

Amaryllidaceae. Blumenhülle kronenartig, 6blättrig. Sechs Staubgefäße.

Iridaceae. Drei Staubgef. hinter den 3 äusseren Zipfeln der Blumenhülle.

Hydrocharidaceae. Blumenhülle kronenartig, dreiblättrig.

Gynandrae. Staubgef. und Stempel an gemeinschaftlichem Träger.

Orchidaceae. Blumenhülle kronenartig, rachenförmig.

Hypogynae. Blumenhülle gefärbt, 3 - 6theilig. Fruchtknoten über der Blume.

Colchicaceae. Sechs Blumenblätter. Griffel getrennt. Kapselfrucht; die 3 Früchtchen trennen sich bei der Reife.

Liliaceae. Sechs Blumenblätter. Griffel verwachsen.

Alliaceae. Drei grüne und drei gefärbte Blumenblätter. Früchtchen mit 1 - 2 Samen.

Burmanniaceae. Drei grüne und drei gefärbte Blumenblätter. Früchtchen mit vielen Samen.

Iuncaceae. Sechs spelsenartige Blumenblätt. Halm mit Blattscheiden.

Imperfectae. Blumenhüllen krautartig, oder unvollkommen, oder 2 - 5theilig, gefärbt. Fruchtknoten über der Blume.

Aroideae. Blumen in Kolben. Beeren- oder Kapselfrucht.

Typhaceae. Blumen in Kolben. Blumenhüllen dreitheilig, schuppen- oder borstenförmig.

Smilacaceae. Blumen in lockeren Trauben. Frucht beerenförmig.

Najadeae. Blumen einzeln in den Blattwinkeln. Blumenhülle theils deckblattartig, theils fehlend. Wassergewächse.

Potamogetonaceae. Blumen in Ähren. Blumenhülle 4theilig. Wassergewächse.

Lemnaceae. Wasserpflanzen mit platten blattartigen Stängeln, ohne Blätter, mit napfförmiger Blumenhülle.

Juncaginaceae. Blumen in Ähren. Blumenhülle sechsheilig.

Glumaceae. Die Blumenhülle besteht aus schuppenartigen Deckblätt.

Gramineae. Halm röhrig. Blattscheiden geschnitten.

Cyperaceae. Halm dicht. Blattscheiden tutenförmig.

Cryptogamae.

A. Mit Spuren von Gefässbündeln.

Equisetaceae. Gegliederter Stängel mit wirtelförmigen Aesten und scheidenförmigen Blättern. Fruchthalter in endständigen Ähren auf besonderen Stängeln, mit kreisförmigen Kapseln, worin runde Keimkörner auf je vier elastischen, an der Spitze kugelförmigen Fäden.

Filices. Farn. Einklappige Kapseln auf der Rückseite des Laubes.

Ophioglossaceae. Kapseln in Ähren, halb schlappig, ungedert.

Osmundaceae. Kapseln in Aehren, in einer Längsritze geöffnet, netzaderig.

Polypodiaceae. Kapseln mit einem gegliederten Ringe umgeben, quer aufspringend.

Lycopodinae. Zwei- oder drei-klappige Kapseln in den Blattwinkeln.

Lycopodiaceae. Beblätterte Stängel; Kapseln in den Blattwinkeln oder unter Schuppenblättern auf gestielten Aehren.

Rhizocarpaceae. Früchte am Stängel.

Salvinieae. Wurzelförmige Stängel mit dachziegelförmigen Blättern. Zweierlei Fruchtkapseln in dichten Hüllen.

B. Regelmässiges Zellgewebe; beginnende Blattbildung.

Characeae. Wasserpflanzen. Zellige Stängel mit quirlständigen blattlosen Aesten. Zweierlei eiförmige Fruchtkörper an den Aesten, von Deckschuppen gestützt.

Musci. Moose. Wurzel und Stängel gesondert. Keimkörner in wirklichen Kapseln.

Bryaceae. Beblätterte Stängel. Fruchtkapsel auf einem Stiel sich erhebend, wobei sich die Hülle am Gr. umschnitten ablöst und als Haube emporhebt, mit einem Deckel versehen.

Hepaticae. Stängel blattartig geflügelt oder wirklich beblättert. Fruchtkapseln eingesenkt oder aus dem Laube sich erhebend, indem die äussere Decke an der Spitze reiss, dann unregelmässig- oder klappig-geöffnet.

C. Unvollkommenes, unregelmässiges Zellgewebe. Keine Blattbildung.

Lichenes. Flechten. Eine laubartige oder krustenartige Unterlage mit mehreren geschiedenen Zellgewebsschichten trägt besondere Fruchtbehälter, worin die Keimkörner in einer eigenen Schicht liegen.

Endocarpeae. Die Fruchtschicht bildet einen in die Unterlage eingesenkten geschlossenen Kern.

Parmeliaceae. Die Fruchtschicht bildet eine offene, aus der Unterlage hervorgehobene Scheibe.

Algae. Tange. Röhriige, feine oder zu runden blattartigen Stängeln verbundene Fäden (Zellenschläuche). Keimkörner innerhalb der Fäden oder in besonderen Behältern.

Fucoidaeae. Blattartige Stängel ohne Glieder von lederartiger Masse und braungrüner Farbe, tragen besondere Behälter für die Keimkörner.

Florideae. Blattartige Stängel von knorpeliger Masse und röthlicher Farbe bilden an den Spitzen keimkörnerführende Kapseln.

Confervaceae. Freie oder verbundene häutige Fäden schliessen die Keimkörner ein, welche sich zuletzt zu kugeligen Keimkörpern vereinigen.

Nostochinae. Gegliederte Fäden von einer Gallertmasse umschlossen.

Fungi. Pilze. Keimkörner nackt oder auf einem Fruchtlager. Alle Organe entstehen zugleich. Leben auf faulenden organischen Substanzen.

Hymenomyces. Keimkörner auf einem offenen häutigen Fruchtlager.

Gasteromyces. Keimkörner in einem geschlossenen, dann aufspringenden Hautbalg eingeschlossen.

Hyphomyces. Keimkörner auf einem flockigen Fruchtlager.

Coniomyces. Nackte Keimkörner ohne ein besonderes Fruchtlager.

Uebersicht der Sippen (genera) der Schlesischen Flora nach Linné's System.

Nach mannigfaltigen Versuchen früherer Forscher gründete Carl von Linné (geb. 1707 in Smaland in Schweden, starb in Upsala 1778) eine neue Anordnung des Pflanzenreiches auf den Grundsatz, dass die wichtigsten Organe der Pflanze, nämlich die wesentlichen Theile der Blüthe, Staubgefäße und Stempel, die vorzüglichsten Kennzeichen zur Unterscheidung der Pflanzen und Anordnung nach Klassen und Ordnungen darbieten müssten. Demnach sonderte er das gesammte Pflanzenreich in 24 Klassen. Die vier und zwanzigste begreift diejenigen Gewächse, bei welchen diese Organe entweder wirklich fehlen oder nur durch analoge Bildungen gleichsam angedeutet sind. Die anderen 23 Klassen werden nach der Zahl, nach der Stellung der Staubgefäße zur Blumenhülle, nach ihrer gegenseitigen Länge, der Art und dem Grade der Verwachsung, endlich nach der Art der Vertheilung der Staubgefäße und Stempel; und jede dieser Klassen in mehrere Ordnungen nach der Zahl der Stempel oder der Staubgefäße oder nach der Beschaffenheit der Frucht unterschieden.

Der wesentlichste Moment, wodurch die Linnéische Systematik die seiner Vorgänger übertraf und derselben nachhaltige Dauer sichert, ist die Anwendung der Begriffe der Art (nach Oken Gattung, *species, εἶδος*) und der Sippe (nach Anderen Gattung oder Geschlecht, *genus, γένος*) auf die Anordnung und Benennung der Pflanzen. Seit Linné erhält jede Pflanze zwei Namen, wovon der erstere die Sippe bezeichnet, zu welcher diese Art gehört, der zweite aber zur Bezeichnung der Art bestimmt ist.

Das folgende Schema gewährt einen Ueberblick der Klassen dieses Systems.

Pflanzen mit	Organen.	Sichtbaren Geschlechtern.	Zwitter-Blüthen.	Staubgefäße vom Stempel getrennt.	Freie	Längenverhältniss unbestimmt.	Zahl	1. <i>Monandria.</i>
								2. <i>Diandria.</i>
Verborgenen Geschlechtern.	Eingeschlechtige Blüthen	Staubgefäße mit dem Stempel verwachsen	Verwachsene	Längenverhältniss bestimmt	Zahl und Einföngung.	an den Staubfäden	an den Staubbeutel.	3. <i>Triandria.</i>
								4. <i>Tetrandria.</i>
								5. <i>Pentandria.</i>
								6. <i>Hexandria.</i>
								7. <i>Heptandria.</i>
								8. <i>Octandria.</i>
								9. <i>Emmeandria.</i>
								10. <i>Decandria.</i>
								11. <i>Dodecandria.</i>
								12. <i>Icosandria.</i>
								13. <i>Polyandria.</i>
								14. <i>Didynamia.</i>
								15. <i>Tetradynamia.</i>
								16. <i>Monadelphica.</i>
								17. <i>Diadelphica.</i>
								18. <i>Polyadelphica.</i>
								19. <i>Syngeneia.</i>
								20. <i>Gynandria.</i>
								21. <i>Monoecia.</i>
								22. <i>Dioecia.</i>
								23. <i>Polygamia.</i>
								24. <i>Cryptogamia.</i>

Cl. I. MONANDRIA.

Ein freies Staubgefäß in einer Zwitterblume.

O. I. Monogynia. *Ein Stempel.*

Hippuris. Blumenhülle; Spur eines Kelchsaums. Quirlige Blätter.
Aphanes. Blumenhülle vierspaltig.

O. II. Digynia. *Zwei Stempel*).*

Callitriche. Blumenhülle: 2 häutige Deckblättchen. Oft einhäusig **).
Blitum. Blumenhülle 4-5 spaltig. Frucht eine Beere. (Die oberen Bl. mit 4-5 Stbgef.)

Cl. II. DIANDRIA.

Zwei freie Staubgefäße in einer Zwitterblume.

O. I. Monogynia. *Ein Stempel.*

a. *Blumenhülle einfach.*

Lemna. Blumenhülle napfförmig. Wasserpflanzen. Stängel blattartig.

b. *Blumenhülle doppelt, über dem Stempel.*

Circaea. Krone 2 blättrig.

c. *Blumenhülle doppelt, unter d. Stempel. Krone regelmässig. Frucht einzeln.*

Ligustrum. Beerenfrucht.

Syringa. Kapselfrucht.

Fraxinus. Flügelfrucht. (Fast polygamisch; die Staubfäden oft verwachsen.)

*) d. h. Fruchtknoten, oder Griffel; oder Narben.

**) Zwitterblumen, wenn eine Blumenhülle zugleich Staubgefäße und Stempel umgibt. Einhäusige, wenn die eine Blumenhülle nur Staubgefäße, die andere nur Stempel umgibt, aber beide auf demselben Individuum (Stocke) stehen. Zweihäusige eben so, aber wenn auf einem Stocke nur Staubgefäßblumen, auf einem anderen nur Stempelblumen stehen. Polygamische, wenn unter einhäusigen auch Zwitterblumen besadlich sind.

d. *Blumenhülle doppelt, unter d. Stempel. Krone unregelmässig. Frucht einzeln.*

Utricularia. Kelch 2blättrig.

Pinguicula. Krone maskirt.

Gratiola. Krone 2lippig. Narbe 2lappig. (Vier Staubgef., zwei ohne Staubbeutel.)

Veronica. Krone radförmig, mit ungleichen Zipfeln. Narbe ungetheilt.

e. *Blumenhülle doppelt, unter d. Stempel. Vier Früchtchen.*

Lycopus Staubbeutel 2fächerig.

Salvia. Staubbeutel 1fächerig.

Cl. III. TRIANDRIA.

Drei freie Staubgefässe in einer Zwitterblume.

O. I. *Monogynia. Ein Stempel.*

a. *Blumenhülle doppelt, über dem Stempel.*

Valeriana. Kelchsaum an der Frucht zu einer Federkrone entwickelt.

Valerianella. Kelchsaum zahnförmig.

b. *Blumenhülle doppelt, unter dem Stempel.*

Montia. Kelch 2blättrig

c. *Blumenhülle, einfach, kronenartig.*

Iris. Drei Blätter der Blumenhülle zurückgeschlagen.

Crocus. Blumenhülle regelmässig 6theilig.

Gladiolus. Blumenhülle 6theilig, mit ungleichen fast 2lippigen Zipfeln.

d. *Blumenhülle einfach, kelchartig.*

Polycnemum. Blumenhülle 6blättrig, mit 2-3 Deckblättchen.

e. *Blumenhülle spelzenförmig oder deckschuppenartig. Blumen in Aehrchen.*

a. *Aehrchen zweizeilig.*

Cyperus. Aehrchen in sitzenden oder gestielten Köpfen.

Blysmus. Aehrchen in einer zweizeiligen Aehre.

β. *Aehrchen ringsherum dachziegelförmig; die untersten leeren Spelzen kleiner.*

Rhynchospora.

γ. *Aehrchen ringsherum dachziegelförmig; die untersten leeren Spelzen grösser.*

Dichostylis. Keine Borsten um den Stempel. Griffel 2spaltig. Aehrchen endständig in sitzenden Köpfchen.

Holoschoenus. Keine Borsten um d. Stempel. Griffel 3spaltig. Aehrchen endständig in sitzenden und gestielten Köpfchen.

Isolepis. Keine Borsten um d. Stempel. Griffel 3spaltig. Aehrchen in einem seitlichen Köpfchen.

Scirpus. Borsten 4-6 um d. Stempel. Aehrchen gehäuft mit Deckblättern.

Heleocharis. Borsten 3-6 um d. Stempel. Ein einzelnes Aehrchen ohne Deckblatt. Auf dem Rücken bleibt der Grund des Griffels stehen.

Limnochloe. Borsten 3-6 oder keine. Ein einzelnes Aehrchen ohne Deckblatt. Auf dem Nüsschen kein besonderer Rest des Griffels.

Eriophorum. Borsten um d. Stempel, die sich bei der Fruchtreife sehr verlängern.

O. II. Digynia. Zwei Stempel. (Gräser.)

a. die Aehrchen an den Auszahnungen der Spindel sitzend.

Nardus. Die Aehrendeckblätter fehlen.

Lolium. Die Aehrchen kehren der Spindel die Flächen zu.

Hordeum. Drei einblumige Aehrchen an jedem Zahne der Spindel; die äusseren ohne Stempel.

Elymus. Zwei bis 4 mehrblumige Aehrchen an jedem Zahne der Spindel.

Triticum. Aehrchen einzeln, 3- bis mehrblumig. Aehrendeckblt. a. Gr. bauchig.

Agropyrum. Aehrchen einzeln, 3- mehrblumig. Aehrendeckblt. zugespitzt.

Secale. Aehrchen einzeln, 2 blumig, mit einem Stiel als Ansatz einer 3ten Blume.

b. die Aehrchen gestielt, einblumig, oft mit Ansatz zu einem oberen oder zu 1 oder 2 unteren Blumen.

a. die Aehrchen vom Rücken zusammengedrückt.

Panicum. Blütenstand rispig. Untere Blume ohne Stempel oder ganz leer.

Digitaria. Blütenstand fingerfg. Ein einzelnes Deckblatt als Ansatz der unteren Blume.

Setaria. Blütenstand ährig. Hülle aus Borsten um die Aehrchen.

Echinochloe. Blütenstand traubig-rispig. Das äussere Deckblatt der unteren Blume stachelspitzig oder begrannt.

Milium. Einblumig; die Blumendeckblt. knorpelartig.

β. die Aehrchen von den Seiten zusammengedrückt, ohne Aehrendeckblätter.

Leersia.

γ. die Aehrchen von den Seiten zusammengedrückt, mit Ansätzen zu unteren Blumen.

Anthoxanthum. Zwei begrannte Deckblättchen unter der Blume.

Phalaris. Zwei grannenlose Schuppen unter der Blume. Rispe ährenförmig.

Baldingera. Zwei grannenlose Schuppen unter der Blume. Rispe gelappt.

δ. die Aehrchen von den Seiten zusammengedrückt, mit oder ohne Ansatz zu einer oberen Blume.

Alopecurus. Ein schlauchförmiges Blumendeckblatt. Rispe ährenförmig.

Phleum. Zwei häutige Blumendeckbltt. Rispe ährenförmig.

Agrostis. Rispe offen. Unteres Aehrchendeckblatt grösser.

Apera. Rispe offen. Oberes Aehrchendeckblatt grösser.

Calamagrostis. Rispe offen. Lange Wollhaare unter den Blumen.

c. die Aehrchen gestielt, 2- oder mehrblumig.

α. untere Blumen ohne Stempel oder ganz leer.

Phragmites. Die Aehrchen vielblumig.

Hierochloe. Die Aehrchen dreiblumig.

Arrhenatherum. Die Aehrchen zweiblumig.

β. obere Blumen ohne Stempel oder ganz leer.

Holcus. Die obere Blume begrannt, enthält Staubgefässe.

Melica. Die obere (bald eine, bald zwei) Blume schliesst zwei un- ausgebildete Blumen ein.

γ. sämtliche Blumen zwittrig.

Corynephorus. Das untere Blumendeckblatt mit keulenförmiger Granne am Grunde.

Triodon. Das untere Blumendeckblatt an d. Spitze 3zählig.

Aira. Das untere Blumendeckblatt mit gerader oder am Gr. gedrehter Granne über dem Grunde.

Avena. Das untere Blumendeckblatt mit geknieter Granne über dem Grunde.

Koeleria. Die Aehrchen zusammengedrückt, gekielt. Rispe ährenförmig, zusammengezogen.

Dactylis. Die Blumen nach innen gebogen; das untere Blumendeckblatt mit ungleichen Seiten. Rispe gelappt.

Poa. Die Blumen eifg., kielig-zusammengedrückt, ohne Grannen.

Glyceria. Die Blumen eifg., am Rücken gerundet, ohne Grannen.

Festuca. Die Blumen lanzettlich, kielig-zusammengedrückt; die äusseren Deckbltt. stachelspitzig oder begrannt. Die Narben an der Spitze des Fruchtknotens.

Bromus. Die Blumen ei-lanzettlich. Die Narben an der Seite des Fruchtknotens.

Brachypodium. Zweizeilige Traube. Das innere Blumendeckblatt kämmig-gewimpert.

Briza. Das äussere Blumendeckblatt am Gr. herzförmig.

Molinia. Die Blumen kegelförmig aus bauchigem Grunde.

Cynosurus. Die Aehrchen von einer aus zweizeiligen Deckblättern gebildeten Hülle umgeben.

Cl. IV. TETRANDRIA.

Vier freie gleich-lange Staubgefässe in einer Zwitterblume.

O. I. Monogynia. *Ein Stempel.*a. *Blumenhülle doppelt. Krone vielblättrig.*

Trapa. Wasserpflanze mit dorniger Nuss.

Cornus. Strauch mit einer Pflaumenfrucht.

b. *Blumenhülle doppelt. Krone einblättrig. Der Kelch an jeder Blume doppelt.*

Knautia. Der Blumenboden haarig.

Dipsacus. Der Blumenboden mit Spreublättern. Der äussere Kelch 4- oder mehrzählig.

Succisa. Der Blumenboden mit Spreublättern. Der äussere Kelch 4lappig, krautig.

Scabiosa. Der Blumenboden mit Spreublättern. Der äussere Kelch glockig, trockenhäutig.

c. *Blumenhülle doppelt. Krone einblättrig unter dem Stempel. Kelch einfach.*

Plantago. Die Blumen in Köpfen; die Narben fädlich.

Centunculus. Die Blumen winkelständig; die Narben kopfig.

d. *Blumenhülle doppelt. Krone einblättrig über dem Stempel. Kelch einfach.*

Sherardia. Kelchsaum 4zählig.

Galium. Kelchsaum undeutlich. Krone radförmig. Frucht trocken.

Rubia. Kelchsaum undeutlich. Krone radförmig. Frucht saftig.

Asperula. Kelchsaum undeutlich. Krone trichterfg. oder glockig.

e. *Blumenhülle einfach.*

Smilacina. Blumenhülle kronenartig.

Alchemilla. Blumenhülle kelchartig, 8spaltig.

Sanguisorba. Blumenhülle kelchartig, gefärbt, 4spaltig. Blumen in endständigen Köpfen.

Parietaria. Blumenhülle glockig. Blumen in winkelständigen Knäueln.

O. III. Tetragynia. *Vier Stempel.*

Radiola. Blumenhülle doppelt.

Potamogeton. Blumenhülle einfach.

Cl. V. PENTANDRIA.

Fünf freie Staubgefäße in einer Zwitterblume.

O. I. Monogynia. Ein Stempel.

A. Blumenhülle doppelt; Kronen eiblätrig, unter dem Stempel.

a. Vier Nüsschen bilden eine Gemeinfrucht,
a. und hängen mit dem Rücken am bleibenden Griffel.

Asperugo. Nüsschen zusammengedrückt. Kelch a. d. Frucht flach-zusammengedrückt.

Echinosperrum. Nüsschen 3 kantig, am R. weichstachelig.

Cynoglossum. Nüsschen niedergedrückt, weichstachelig.

Omphalodes. Nüsschen niedergedrückt, mit eingeschlagenem Rande.

β. sitzen auf einer Scheibe und sind unterseits ausgehöhlt.

Borago. Krone radförmig.

Anchusa. Krone trichterförmig; Schlund von stumpfen Klappen geschlossen.

Nonnia. Krone trichterförmig; Schlund bärtig.

Symphytum. Krone walzenförmig-glockig.

γ. sitzen auf einer Scheibe und sind unterseits nicht ausgehöhlt.

Cerithe. Krone walzig-glockig. Schlund offen. Staubbeutel pfelförmig.

Echium. Krone nach oben allmählig erweitert. Schlund offen. Staubbeutel oval.

Pulmonaria. Krone trichterförmig. Schlund haarig. Kelch 5spaltig.

Lithospermum. Krone trichterförmig. Schlund haarig. Kelch 5zählig.

Myosotis. Krone trichterförmig. Schlund durch 5 glatte Klappen geschlossen.

b. Frucht eine einfächerige Kapsel mit freier Mittelsäule.

a. Kelch 5spaltig oder 5zählig.

Androsace. Kronenröhre eig., oben eingeschnürt.

Primula. Kronenröhre walzig.

β. Kelch 5theilig.

Lysimachia. Krone radförmig. Kapsel 5klappig.

Anagallis. Krone radförmig. Kapsel umschnitten-aufspringend.

Hottonia. Krone präsentirtellerförmig, mit 5klappigem Saum.

Soldanella. Krone trichterförmig, mit zerschlitztem Saum.

c. Frucht eine einfächerige Kapsel; die Samenhälter an den Klappenwänden.

Menyanthes. Krone trichterförmig.

Limnanthemum. Krone radförmig.

d. Frucht eine 2 - 5fächerige Kapsel.

Erythraea. Die Staubbeutel nach dem Verstäuben schraubenförmig gewunden.

Convulvulus. Krone trichterförmig-glockig, in 5 Winkeln gefaltet. Kapselfächer 2samig.

Datura. Krone trichterförmig, in 5 Winkeln gefaltet. Kelch fällt umschnitten ab, so dass der Gr. stehen bleibt.

Nicotiana. Krone trichterförmig, in 5 Winkeln gefaltet. Kelch dauernd. Kapselfächer vielsamig.

Hyoscyamus. Krone trichterförmig. Kapsel bauchig, oben verengert.

Scopolina. Krone röhrig-glockig. Kapsel springt umschnitten auf.

Verbascum. Krone radförmig. Staubbeutel queraufliegend.

e. Frucht besteht aus zwei Balgkapseln.

Vinca.

f. Frucht beerenförmig.

Atropa. Krone glockig.

Solanum. Krone radförmig.

B. Blumenhülle doppelt; Krone einblättrig über dem Stempel.

a. Frucht eine Kapsel.

Campanula. Krone glockig.

Adenophora. Krone glockig. Griffel von einer Röhre umgeben.

Phyteuma. Die Kronenzipfel linealisch. Staubbeutel frei.

Iasion e. Die Kronenzipfel linealisch. Staubbeutel zusammenhängend.

b. Frucht beerenförmig.

Lonicera.

C. Blumenhülle doppelt; Krone vielblättrig, unter dem Stempel.

Impatiens. Kelch 3blättrig. Krone unregelmässig.

Viola. Kelch 5blättrig. Krone unregelmässig.

onymus. Krone regelmässig; die Staubgefässe zwischen den Kronenblättern.

Rhamnus. Krone regelmässig; die Staubgefässe hinter den Kronenblättern.

D. Blumenhülle doppelt; Krone vielblättrig, über dem Stempel.

Ribes. Kronenblätter am Grunde schmal.

Hedera. Kronenbltt. am Grunde breit.

E. Blumenhülle einfach, unter dem Stempel.

a. mit 5 Staubgefässen.

Glaux. Fünffächerige Kapsel.

b. mit 10 Staubgefässen, wovon 5 ohne Staubbeutel.

Herniaria. Zipfel der Blumenhülle gleichdick.

Illecebrum. Zipfel der Blumenhülle verdickt.

F. Blumenhülle einfach, über dem Stempel.

Thesium.

O. II. Digynia. Zwei Stempel.

A. Blumenhülle einfach.

Ulmus. Frucht eine geflügelte Nuss.

Beta. Blumenhülle am Gr. in eine Röhre zusammengezogen.

Chenopodium. Blumenhülle 5theilig.

B. Blumenhülle doppelt; Krone einblättrig.

Cynanchum. Mit einer Staubfädenkrone.

Sweertia. Zwei Honiggruben an jedem Kronenzipfel.

Gentiana. Kronen ohne Honiggruben.

Cuscuta. Kapsel springt umschnitten auf.

C. Blumenhülle doppelt. Kronen 5blättrig, auf dem Fruchtknoten.
(Doldenpflanzen.)

a. Blumen in Köpfen oder einfachen Schirmen.

Hydrocotyle. Stängel kriechend und wurzelnd.

Eryngium. Früchte schuppig-körnig.

Astrantia. Frucht mit 5 gezähnten Riefen.

Hacquetia. Frucht mit 5 fädlichen Riefen.

b. Blumen in zusammengesetzten Schirmen (oder Dolden.)

a. das Eiweiss vorn flach oder erhaben. Fünf fädliche Haupt-, keine Nebenriefen. Frucht von den Seiten zusammengedrückt.

a. Kronenblätter ganzrandig.

Bupleurum. Kronenblätter an der Spitze gestutzt, eingerollt.

Apium. Kronenblätter rundlich. Stempelpolster flach.

b. Kronenbltt. verkehrt-herzfg. Kelchsaum undeutlich.

Aegopodium. Die Striemen fehlen.

Carum. Thälchen 1 - 3striemig. Griffel zurückgeschlagen.

Pimpinella. Thälchen 3striemig. Griffel abstehend.

b. Kronenbltt. verkehrt-herzfg. Kelchsaum 5zählig.

aa. Thälchen einstriemig.

Cicuta. Eiweiss im Querschnitt kreisrund.

Falcaria. Eiweiss vorn flach.

bb. Thälchen dreistriemig.

Berula. Die Striemen bedeckt.

Sium. Die Striemen oberflächlich.

β. das Eiweiss vorn flach oder erhaben. Fünf fädliche oder geflügelte Haupt-, keine Nebenriefen. Frucht stielrund, oder vom Rücken zusammengedrückt.

a. der Same liegt locker in der Samenschale.

Archangelica.

b. der Same mit der Samenschale verwachsen. Kronenbltt. ungetheilt.

Meum. Die Riefen gleichförmig, scharf.

Angelica. Die seitlichen Riefen breiter geflügelt.
Foeniculum. Die Riefen gleichförmig, stumpf-gekielt.
Sanicula. Die Frucht mit hakigen Borsten besetzt.

b. *der Same mit der Samenschale verwachsen. Kronenbltt. verkehrt-herzfg.*

aa. *Thälchen einstriemig. Kelchsaum undeutlich.*

Levisticum. Die Flügel der seitlichen Riefen doppelt so breit als die Riefen am Rücken. Kronenbltt. rundlich mit eingeschlagener Spitze.

Selinum. Die Flügel der seitlichen Riefen doppelt so breit als die Riefen am Rücken. Kronenbltt. verkehrt-herzfg.

Aethusa. Die Riefen dick, scharf-gekielt.

Cnidium. Die Riefen geflügelt, gleichfg.

bb. *Thälchen einstriemig. Kelchsaum gezähnt.*

Oenanthe. Die Griffel aufrecht. Fruchthalter angewachsen.

Seseli. Die Griffel zurückgeschlagen. Fruchthalter frei.

cc. *Thälchen dreistriemig.*

Conioselinum. Die Riefen geflügelt, die am Rande breiter.

Silaus. Die Riefen gleichförmig.

γ. *das Eiweiss vorn flach oder erhaben. Hauptriefen fädlich; keine Nebenriefen. Frucht vom Rücken flach- oder linsenförmig-zusammengedrückt mit geflügeltem, scharfem, oder verdicktem Rande.*

a. *die seitlichen Riefen entfernter, dicht am Rande oder unter demselben versteckt.*

Heraclium. Die Striemen keulenförmig.

Pastinaca. Die Striemen fädlich.

b. *Sämmtliche Riefen gleichweit von einander entfernt.*

Anethum. Kronenbltt. gestutzt, eingerollt.

Imperatoria. Kronenbltt. verkehrt-herzfg. Kelchsaum undeutlich.

Peucedanum. Kronenbltt. vorn in ein Spitzchen zusammengezogen. Die Striemen der Berührungsfläche sichtbar.

Thysselinum. Kronenbltt. vorn in ein Spitzchen zusammengezogen. Die Striemen der Berührungsfläche von der Samenschale verdeckt.

δ. *das Eiweiss vorn flach. Frucht vom Rücken zusammengedrückt. Fünf Haupt- und 4 Nebenriefen.*

Laserpitium. Die Nebenriefen geflügelt.

Daucus. Die Nebenriefen stachelig.

ε. *das Eiweiss eingerollt oder vorn mit tiefer Furche.*

a. *die Früchte stachelig.*

Torilis.

- b. die Früchte ohne Stacheln; die Riefen niedrig, stumpf, ohne Kerben.

Anthriscus. Fünf Riefen am Schnabel der Frucht.

Scandix. Fünf Riefen an der Frucht, nicht am langen Schnabel.

Chaerophyllum. Frucht mit fünf Riefen, ohne Schnabel.

- b. die Früchte ohne Stacheln; die Riefen scharf und geflügelt, ohne Kerben.

Myrrhis.

- e. die Früchte ohne Stacheln; die Riefen erhaben, gekerbt.

Conium. Die Riefen innen dicht.

Pleurospermum. Die Riefen innen hohl.

- ζ. das Eiweiss am Rücken erhaben, vorn vertieft.

Coriandrum.

O. III. Trigynia. Drei Stempel.

- a. Krone unter dem Fruchtknoten.

Staphylea. Aufgeblasene Kapseln. Samen beinhart. Strauch.

Corrigiola. Kapsel einfächerig; nicht aufspringend.

Polycarpum. Kapsel 3klappig, einfächerig. Kelchzipfel gekielt.

- b. Kronen auf dem Fruchtknoten.

Viburnum. Einsamige Beere.

Sambucus. Dreisamige Beere.

O. IV. Tetragynia. Vier Stempel.

Parnassia.

O. V. Pentagynia. Fünf Stempel.

Linum. Kapsel zehnfächerig.

Drosera. Kapsel einfächerig.

Armeria. Frucht einsamig. Kelchsaum trockenhäutig.

Cl. VI. HEXANDRIA.

Sechs freie, gleichlange Staubgefäße in einer Zwitterblume.

O. I. Monogynia. Ein Stempel.

- a. Blumenhülle doppelt.

Berberis. Kelch sechsblättrig. Strauch.

Peplis. Kelch zwölfzählig.

- b. Blumenhülle einfach, kronenartig, auf dem Fruchtknoten.

Leucium. Blumenhülle in 6 gleichförmige Zipfel tief getheilt.

Galanthus. Blumenhülle in 3 grössere und 3 kleinere Zipfel tief getheilt.

Narcissus. Blumenhülle tellerförmig mit glockiger Nebenkronen.

c. *Blumenhülle einfach, kronenartig, 6spaltig, unter dem Fruchtknoten.*

Convallaria. Blumenhülle glockig.

Polygonatum. Blumenhülle röhrig.

Muscari. Blumenhülle walzig, vorn eingeschnürt.

d. *Blumenhülle einfach, kronenartig, 6blättrig, unter dem Fruchtknoten.*

a. *Griffel oben dreispaltig.*

Asparagus.

β. *Griffel oben ungetheilt oder fehlend.*

a. *Staubbeutel aufrecht.*

Streptopus. Die drei äusseren Bltt. der Blumenhülle am Grunde sackförmig. Beerenfrucht.

Gagea. Die Bltt. der Blumenhülle gleichförmig. Kapsel Frucht.

b. *Staubbeutel querausliegend. Blumenhüllbltt. mit Honiggefäss.*

Lilium.

b. *Staubbeutel queraufsteigend. Blumenhüllbltt. ohne Honiggefäss.*

Anthericum. Die Blumenhülle am Grunde in einen mit dem Blumenstiel durch ein Gelenk verbundenen Stiel zusammengezogen.

Allium. Blumen in einem kopfförmigem Schirm, der von einer Scheide eingeschlossen ist.

Ornithogalum. Staubgefässe auf dem Blumenboden. Griffel 3kantig.

Scilla. Staubgef. auf d. Gr. der Blumenhüllbltt. Griffel 3kantig.

Tulipa. Griffel fehlt.

e. *Blumenhülle einfach, kelchartig.*

Iuncus. Blumen in Köpfchen u. Spirren. Kapsel vielsamig. Bltt. röhrig.

Luzula. Blumen in Köpfchen und Spirren. Kapsel 3samig. Bltt. eben.

Acorus. Blumen in seitlichen Kolben.

O. III. Trigynia. Drei Stempel.

a. *Blumenhülle einblättrig, sechstheilig.*

Colchicum.

b. *Blumenhülle sechsblättrig.*

Veratrum. Staubbeutel queraufspringend. Drei am Grunde verbundene Früchtchen.

- Tofieldia.** Staubbeutel längs-aufspringend. Drei bis zur Mitte verbundene Früchtchen.
Scheuchzeria. Drei bis zur Mitte verbundene Früchtchen. Griffel fehlt.
Triglochin. Drei bis sechs von unten sich lösende Früchtchen. Narben fiederig.
Rumex. Frucht von 3 vergrößerten Zipfeln der Blumenhülle bedeckt.

O. V. Polygynia. *Viele Stempel.*

Alisma.

Cl. VII. HEPTANDRIA.

Sieben freie Staubgefäße in einer Zwitterblume.

- Trientalis.** Krone regelmässig, 7theilig.
Aesculus. Krone unregelmässig, 5blättrig.

C. VIII. OCTANDRIA.

Acht freie Staubgefäße in einer Zwitterblume.

O. I. Monogynia. *Ein Stempel.*

a. *Blumenhülle doppelt; Krone fünfblättrig.*

Acer. Bäume mit Flügelfrucht.

b. *Blumenhülle doppelt; Krone vierblättrig.*

Oenothera. Krone am Kelch. Samen kahl.

Epilobium. Krone am Kelch. Samen schopfig.

Ruta. Krone auf dem Blumenboden.

c. *Blumenhülle doppelt. Krone einblättrig unter dem Stempel.*

Calluna. Die Scheidewände der Kapsel treffen auf die Näthe.

Erica. Die Scheidewände der Kapsel treffen auf die Mitte d. Klappen.

d. *Blumenhülle doppelt. Krone einblättrig, über dem Stempel.*

Vaccinium.

e. *Blumenhülle einfach, unter dem Stempel.*

Daphne. Der Saum der Blumenhülle abfällig. Eine Narbe. Strauch.

Passerina. Der Saum der Blumenhülle dauernd. Eine Narbe.

Polygonum. Blumenhülle dauernd. Zwei bis drei Narben.

f. *Blumenhülle einfach, über dem Stempel.*

Chrysoplenium.

O. IV. *Tetragynia. Vier Stempel.*

- Paris.* Einblumig.
Adoxa. Blumen in kopfförmigem Schirm.
Elatine. Blumen winkelständig.

Cl. IX. *ENNEANDRIA.*

Neun freie Staubgefäße in einer Zwitterblume.

Butomus.

Cl. X. *DECANDRIA.*

Zehn freie Staubgefäße in einer Zwitterblume.

O. I. *Monogynia. Ein Stempel.*

a. *Krone 5- oder 4blättrig.*

- Dictamnus.* Kronenbltt. ungleich.
Monotropa. Kelch 5blättrig. Krone glockig. Ohne Blätter.
Ledum. Kelch 5zählig. Strauch.
Pyrola. Kelch 5spaltig. Staubbeutel öffnen sich in Löchern.

b. *Krone einblättrig.*

- Andromeda.* Kapsel Frucht.
Arctostaphylus. Pflaumenfrucht.

O. II. *Digynia. Zwei Stempel.*

a. *Kapsel in einem Loche sich öffnend.*

- Saxifraga.* Kapsel 2schnäblich.

b. *Kapsel vierklappig.*

- Dianthus.* Kelch am Gr. mit Schuppen umgeben.
Gypsophila. Kronenbltt. in keilförmigen Nagel verschmälert.
Saponaria. Kronenbltt. mit linealischem Nagel. Kelch stielrund.
Vaccaria. Kronenbltt. mit linealischem Nagel. Kelch gefügelt-
 5eckig.

c. *Einsamige Schlauchfrucht.*

Scleranthus.

O. III. *Trigynia. Drei Stempel.*

a. *Kelch einblättrig.*

- Cucubalus.* Einfächerige Beere.
Silene. Kapsel am Grunde 3fächerig.

b. *Kelch 5- oder 4-blättrig.*

- Alsine.* Kapsel 3klappig.
Arenaria. Kapsel 6klappig. Kronenbltt. ungetheilt.

Holosteum. Kapsel 6klappig. Kronenbltt. gezähnt.
Stellaria. Kapsel 6klappig. Kronenbltt. 2theilig.

O. IV. *Tetragynia.* *Vier Stempel*

Moenchia. Kapsel 8klappig.

O. V. *Pentagynia.* *Fünf Stempel.*

Sagina. Blumentheile zu 4 oder 5. Kronenbltt. ungetheilt. Kapsel 5klappig. Samen kantig.

Spergula. Kronenbltt. ungetheilt. Kapsel 5klappig. Samen platt, gerundet.

Malachium. Kapsel 5klappig, die Klappen 2theilig.

Cerastium. Kapsel 10klappig.

Lychnis. Kapsel 1 fächerig, 5 zählig. Kelch 5 zählig.

Agrostemma. Kapsel 1 fächerig, 5 zählig. Kelch 5 theilig, lederartig.

Viscaria. Kapsel zur Hälfte 5 fächerig, 5 zählig.

Oxalis. Staubgef. am Grunde verwachsen. Kapsel springt in den Winkeln auf.

Sedum. Fünf am Gr. verbundene Früchtchen.

Cl. XI. **DODECANDRIA.**

Zwölf, sechzehn, achtzehn freie Strubgefässe in einer Zwitterblume.

O. I. *Monogynia.* *Ein Stempel.*

Asarum. Blumenhülle einfach, dreispaltig.

Portulaca. Kelch 2spaltig.

Lythrum. Kelch 12zählig.

O. II. *Digynia.* *Zwei Stempel.*

Agrimonia. Kelchröhre mit hakigen Weichstacheln.

O. III. *Trigynia.* *Drei Stempel.*

Reseda. Kronenbltt. unregelmässig-zerschlitzt.

O. IV. *Dodecagynia.* *Zwölf Stempel.*

Sempervivum.

Cl XII. **ICOSANDRIA.**

Zwanzig und mehr freie Staubgefässe in einer Zwitterblume, aus dem Kelch entspringend.

O. I. *Monogynia.* *Ein Stempel.*

Prunus. Pflaumenfrucht.

O. II. Di-Pentagynia. Zwei bis fünf Stempel.

a. Blumenhülle doppelt. Krone über dem Fruchtknoten.

Crataegus. Frucht eine Pflaume mit 1-5 eingesenkten Kernen.

Cotoneaster. Frucht eine Pflaume mit 3-5 oben freien Kernen.

Pyrus. Apfelfrucht mit 2-5 Fächern.

Sorbus. Beerenfrucht.

b. Blumenhülle doppelt. Krone unter dem Fruchtknoten.

Spiraea. Zwei- bis 6samige Kapseln.

O. III. Polygynia. Viele Stempel.

a. Kelch mit 5-9 Zipfeln in einer Reihe.

Rosa. Die Nüsschen in der beerenförmig-angeschwollenen Kelchröhre verborgen.

Rubus. Viele vereinigte Pfläumchen auf einem kegelförmigen Fruchtlager.

b. Kelch mit 8-10 Zipfeln in zwei Reihen

Geum. Nüsschen vom bleibenden Griffel als Granne gekrönt.

Fragaria. Nüsschen einem saftigem abfälligem Fruchtlager eingesenkt.

Comarum. Nüsschen auf einem schwammigen Fruchtlager.

Potentilla. Nüsschen auf einem trocknen Fruchtlager.

Cl. XIII. POLYANDRIA.

Zwanzig und mehr freie Staubgefässe in einer Zwitterblume, aus dem Blumenboden entspringend.

O. I. Monogynia. Ein Stempel.

a. Krone vierblättrig.

Chelidonium. Kelch 2blättrig. Linealische Schotenfrucht.

Papaver. Kelch 2blättrig. Ovale oder kugelige Kapselschote.

Actaea. Kelch vierblättrig.

b. Krone 5blättrig.

Tilia. Kelchzipfel gleichförmig. Bäume.

Helianthemum. Zwei kleinere und drei grössere Kelchzipfel.

c. Krone vielblättrig.

Nymphaea. Kronenbltt. ohne Honiggefäss.

Nuphar. Kronenbltt. mit Honiggefäss.

O. II. Di-Polygynia. Zwei und mehrere Stempel.

a. Die Frucht besteht aus mehrsamigen mehr oder weniger verbundenen Kapsel Früchten.

a. Blumen unregelmässig.

Delphinium. Mit einem Sporn.

Aconitum. Ohne Sporn.

β. Kelch grün, Krone grösser als der Kelch.

Paeonia.

γ. Kelch kronenartig, Krone kleiner in Honiggefässe übergehend oder fehlend.

Aquilegia. Kronenbltt. am Gr. gespornt.

Nigella. Kronenbltt 2spaltig.

Trollius. Kronenbltt. linealisch.

Helleborus. Kronenbltt. röhrig.

Isopyrum. Kronenbltt. am Gr. kappenförmig.

Caltha. Kronenbl. fehlen.

b. Die Frucht aus einsamigen freien Früchten.

a. mit Kronenblätter.

Adonis. Kronenbltt. ohne Honiggefäss. Früchte kantig in dichter Aehre.

Ranunculus. Fünf Kelchbltt. Kronenbltt. am Gr. mit verdeckter Honiggrube.

Batrachium. Fünf Kelchbltt. Kronenbltt. am Gr. mit freier Honiggrube.

Ficaria. Drei hinfallige Kelchbltt. dicht unter der Krone.

Myosurus. Pünf Kelchbltt. mit spitzem Fortsatz.

Hepatica. Drei Kelchbltt. nahe unter der Krone.

Anemone. Drei blattartige, zerschlitzte, hüllenförmige Kelchbltt. von der Blume entfernt.

β. Ohne Kronenbltt.

Thalictrum. Früchte ungeschwänzt.

Clematis. Kelch kronenartig. Früchte geschwänzt.

Cl. XIV. DIDYNAMIA.

Vier freie Staubgefässe in einer Zwitterblume, zwei längere und zwei kürzere.

O. I. Gymnospermia. *Vier Nüsschen im Grunde des Kelches mit dem Griffel in der Mitte.*

a. Die Staubbeutel öffnen sich mit einer Klappe.

Galeopsis.

b. Die Staubbeutel öffnen sich in 1 oder 2 Längsspalten.

a. die Kronenröhre innen mit einem unterbrochenen Haarbüschel.

Marrubium.

β. Die Kronenröhre innen mit einem ringförmigen Haarbüschel.

a. Der Kelch zweilippig.

Prunella.

b. Der Kelch fünfzählig. Die Oberlippe sehr klein.

Ajuga. Oberlippe abgestutzt.

Chamaepitys. Oberlippe ausgerandet.

b. Der Kelch 5zählig. Die Oberlippe gewölbt oder hohl.

Lamium. Seitenlappen der Unterlippe sehr klein, zahnförmig, oder fehlend.

Galeobdolon. Lappen der Unterlippe spitz.

Stachys. Lappen der Unterlippe stumpf. Nüsschen oben gerundet. Staubgef. nach dem Verstäuben auswärts gekehrt.

Ballota. Lappen der Unterlippe stumpf. Nüsschen oben gerundet. Staubgef. nach dem Verstäuben gerade.

Leonurus. Lappen der Unterlippe stumpf. Nüsse oben abgestutzt und gerandet.

β. Die Kronenröhre innen ohne Haarbüschel.

a. Die Oberlippe scheinbar fehlend.

Teucrium.

b. Die Oberlippe flach, ausgerandet.

Nepeta. Die Unterlippe hohl.

Glechoma. Die Unterlippe flach. Kelch röhrig.

Melittis. Die Unterlippe flach. Kelch glockig.

b. Die Oberlippe hohl oder gewölbt. Staubgef. genähert und parallel.

Scutellaria. Kelch 2lippig.

Betonica. Kelch 5zählig. Nüsschen oben gerundet.

Chaeturus. Kelch 5zählig. Nüsschen oben abgestutzt, gerandet.

e. Die Staubgef. von einander entfernt.

Mentha. Die Krone trichterförmig, 4spaltig.

c. Die Staubbeutel sitzen beiderseits an einer dreieckigen Bindehaut.

Thymus. Der Kelch 2lippig. Die Staubgefäße oben ein wenig entfernt.

Calamintha. Der Kelch 2lippig. Die Staubgef. oben bogenförmig-zusammengeneigt.

Clinopodium. Die Blumenquirle durch borstliche Hülle gestützt.

Origanum. Kelch 5zählig. Staubgef. oben entfernt.

O. II. Angiospermia. Kapsel Frucht oder Beere.

a. Staubbeutel fächer am Gr. mit einem Dorn.

a. Frucht einfächerig.

Lathraea. Traube einseitwendig.

Orobanche. Traube walzig.

β. Frucht 2fächerig.**a. Kelch 5zählig.****Tozzia.** Oberlippe der Krone 2spaltig. Beere.**Pedicularis.** Oberlippe helmförmig, zusammengedrückt.**b. Kelch 4zählig.****Alectorolophus.** Samen flügelig-gerandet.**Bartschia.** Samen auf einer Seite flügelig-erweitert.**Euphrasia.** Samen gerippt. Oberlippe 4-6zählig.**Odontites.** Samen gerippt. Oberlippe ausgerandet.**Melampyrum.** Samen glatt.**b. Die Staubbeutel ohne Dorn.****a. Die Frucht einfächerig.****Limosella.** Krone fast gleichmässig 5spaltig. } Schlammkrauter.**Lindernia.** Krone 2lippig.**β. Die Frucht 2fächerig.****Scrophularia.** Krone 2lippig, fast kugelig. Staubfäden oben breiter.**Antirrhinum.** Krone 2lippig. Kapsel öffnet sich in Löchern.**Linaria.** Krone 2lippig. Kapsel öffnet sich in Klappen.**Digitalis.** Krone aus kurzer Röhre glockig mit schief 4spaltigem Saume.**γ. Die Frucht 3fächerig.****Linnaea.****δ. Die Frucht 4fächerig.****Verbena.****Cl. XV. TETRADYNAMIA.****Sechs frei Staubgefäße in einer Zwitterblume, vier längere und zwei kürzere.****O.I. Siliculosa.** Schoten breit und kurz.**a. Schote aufgeschwollen, nicht aufspringend.****Neslia.** Schote mit einem Fache und einem Samen.**b. Schote von der Seite zusammengedrückt, mit kahnförmigen Klappen.****a. Die Schote springt gar nicht auf, oder lässt die Samen nicht herausfallen.****Isatis.** Schote länglich flach-zusammengedrückt.**Biscutella.** Klappen schildförmig, flügelig-gerandet.**Sen ebiera.** Schote nierenförmig.

β. Die Schote springt auf und lässt die Samen herausfallen.

a. Die Staubgefäße mit schuppigen Anhängseln.

Teesdalia.

b. Die Staubgefäße ohne Anhängsel.

Lepidium. Schotenfächer einsamig.

Thlaspi. Schotenfächer 2- mehrsamig. Klappen geflügelt.

Capsella. Schotenfächer mehrsamig. Klappen ungeflügelt.

c. Schoten rundlich, vom Rücken zusammengedrückt.

α. Die Staubgef. mit einem Zahn am Grunde.

Alyssum. Schotenfächer 2samig.

Farsetia. Schotenfächer 6- mehrsamig.

β. Die Staubgef. ohne Zahn.

Camelina. Schote birnförmig.

Lunaria. Schote ellipsoidisch auf einem verlängerten Fruchträger.
Samen gerandet.

Erophila. Schote eiförmig. Samen ungerandet.

Armoracia. Schote aufgeschwollen, fast kugelig.

O. II. Siliquosa. Die Schoten lang und schmal.

a. Die Narbe besteht aus zwei aufrechten Blättchen.

Hesperis.

b. Die Narbe stumpf oder mit zwei stumpfen Lappen.

α. Die Schote springt nicht auf.

Raphanus.

β. Die Schote springt auf.

a. Die Klappen ohne durchgehende Nerven.

Dentaria. Die Samen in je einer Reihe. Keimblätter gefaltet. Wurzel schuppig.

Cardamine. Die Samen in je einer Reihe. Keimblätter eben, anliegend.

Nasturtium. Die Samen in je zwei Reihen.

Conringia. Die Samen in je einer Reihe. Keimblätter eben, aufliegend.

b. Die Klappen mit durchgehenden stärkeren oder feineren Nerven.

αα. Die Keimblätter oben anliegend.

Turritis. Die Samen in je zwei Reihen.

Barbarea. Die Samen in je einer Reihe. Schote stielrund oder 4kantig.

Arabis. Die Samen in je einer Reihe. Schote zusammengedrückt.

ββ. Die Keimblätter eben, aufliegend.

Erysimum. Die Klappen einnervig.

Sisymbrium. Die Klappen dreinervig

et. *Die Keimblätter anliegend, rinnenförmig oder gekielt.*

Brassica. Die Klappen einnervig.

Sinapis. Die Klappen 3-5 nervig.

Cl. XVI. MONADELPHIA.

Sämmtliche Staubfäden verwachsen in einer Zwitterblume.

O. I. Decandria. Zehn Staubgefässe

Myricaria. Samen schopfig. Halbstrauch.

Geranium. Die Grannen der Fruchtklappen rollen sich schneckenförmig auf.

Erodium. Die Grannen der Fruchtklappen rollen sich schraubenförmig auf.

O. II. Polyandria. Viele Staubgefässe.

Lavatera. Der äussere Kelch 3spaltig.

Malva. Der äussere Kelch 3 blättrig.

Cl. XVII. DIADELPHIA.

Die Staubfäden in zwei Bündel verwachsen, oder neun verwachsen und der zehnte frei, in einer Zwitterblume.

O. I. Hexandria. Sechs Staubgef.

Fumaria. Zwei Staubfäden mit je 3 Staubbeuteln. Einsamiges Nüsschen.

Corydalis. Zwei Staubfäden mit je 3 Staubbeuteln. Mehrsamige Kapsel.

O. II. Octandria. Acht Staubgef.

Polygala. Zwei am Grunde verwachsene Staubfäden mit je vier Staubbeuteln.

O. III. Decandria. Zehn Staubgef.

a. *Die Staubgef. in ein Bündel verwachsen.*

a. *Die Flügel der Krone am Gr. runzlich-gefaltet.*

Sarothamnus. Der Griffel schneckenförmig-gewunden.

Genista. Der Griffel aufsteigend, die Narbe nach innen abschüssig.

Cytisus. Der Griffel aufsteigend, die Narbe nach aussen abschüssig.

β. *Die Flügel der Krone ohne Falten.*

Ononis. Der Kelch dauernd bei der Fruchtreife offen.

Anthyllis. Der Kelch welkend, bei der Fruchtreife geschlossen. Staubfadenröhre vorn breiter.

Galega. Der Kelch welkend, bei der Fruchtreife offen, 5zählig. Staubfadenröhre am Gr. breiter.

b. *Die Staubgef. in zwei Bündel verwachsen.*

a. *Die Hülse ununterbrochen; der Griffel kahl.*

a. *Der Kiel geschnäbelt.*

Lotus. Die Hülse stielrund.

Tetragonolobus. Die Hülse vierflügelig.

b. *Der Kiel ohne Schnabel; die Staubfadenröhre mit der Krone zusammenhängend.*

Trifolium.

b. *Der Kiel ohne Schnabel; die Staubfadenröhre frei.*

Astragalus. Die Hülse der Länge nach zweifächerig.

Onobrychis. Die Hülse rundlich-zusammengedrückt.

Melilotus. Die Hülse eiförmig-rundlich, schwellend.

Medicago. Die Hülse ein- oder mehrmals gewunden.

β. *Die Hülse ununterbrochen; der Griffel behaart.*

a. *Der Griffel auf der inneren Seite haarig.*

Ervum. Der Griffel vorn abgeplattet und zur Seite gedreht.

Lathyrus. Der Griffel gerade oder vorn eingekrümmt.

b. *Der Griffel durchaus behaart oder an der Spitze bärtig.*

Faba. Der Griffel gekniet.

Vicia. Der Griffel gerade.

Phaseolus. Der Griffel sammt Staubfadenröhre und Kiel schraubenförmig-gewunden.

γ. *Die Hülse löst sich quer in Glieder.*

Hedysarum. Kiel schief gestutzt. Staubgefäße pfriemlich.

Ornithopus. Kiel schief gestutzt. Staubfadenröhre vorn breiter.

Coronilla. Kiel geschnäbelt.

Cl. XIX. POLYADELPHIA.

Die Staubfüden in mehrere Bündel verwachsen.

Hypericum.

Cl. XIX. SYNGENESIA.

Die Staubbeutel in eine walzige Röhre verwachsen. Die Blumen auf gemeinschaftlichem Blumenboden und in einer gemeinschaftlichen Hülle bilden eine zusammengesetzte Blume.

O. I. Polygamia. aequalis. *Sämmtliche Blümchen zwitterig.*

Semiflosculosae. *Sämmtliche Blümchen zungenförmig.*

a. *Kelchsaum fiederig. Blumenboden mit Spreu.*

Hypochoeris.

b. Kelchsaum fiederig. Blumenboden kahl oder mit feinen Franzen.

Tragopogon. Hüllbltt. in einer Reihe.

Scorzonera. Hüllblättchen dachziegelfg. Die Fiedern des Randes des Kelchsaums verwoben.

Picris. Hüllblättchen dachziegelfg. Kelchsaum abfällig mit freien Fiedern.

Leontodon. Hüllblättchen dachziegelfg. Kelchsaum dauernd mit freien Fiedern.

c. Kelchsaum nicht gefiedert.

a. aus kleinen Spreublättchen bestehend.

Cichorium.

β. aus haarigen Strahlen bestehend.

a. die Blümchen in einer Reihe, 5 in jeder Blume.

Phoenixopus. Die Nüsschen geschnäbelt.

Prenanthes. Die Nüsschen ohne Schnabel.

b. die Blümchen in mehreren Reihen.

a. die Nüsschen geschnäbelt; der Schnabel am Gr. mit einem Schuppenkranz oder Ring.

Chondrilla in zwei Reihen.

Taraxacum in mehreren Reihen.

b. die Nüsse ungeschnäbelt, oder geschnäbelt, der Schnabel ohne Ring oder Schuppenkranz.

Lactuca. Die Nüsschen flach-zusammengedrückt, geschnäbelt.

Sonchus. Die Nüsschen flach-zusammengedrückt, ohne Schnabel.

Barkhausia. Die Nüsschen stielrund, deutlich geschnäbelt.

Crepis. Die Nüsschen stielrund oder kantig, nach oben ein wenig verengert.

Hieracium. Die Nüsschen prismatisch, durchaus gleichbreit.

γ. der Kelchsaum häutig oder fehlend.

Lapsana. Die Hüllblättchen bei der Fruchtreife aufrecht.

Arnoseric. Die Hüllblättchen bei d. Fruchtreife zusammengeneigt.

Capitatae. Sämmtliche Blümchen röhrig.

a. der Griffel an der Spitze gefiedert.

α. der Blumenboden wabenartig.

Onopordon.

β. der Blumenboden mit oben gespaltenen Spreublättchen.

Carlina.

γ. der Blumenboden mit borstenartigen Spreublättchen.

Carduus. Der Kelchsaum am Gr. in einen Ring verwachsen, haarig, abfällig.

Cirsium. Der Kelchsaum am Gr. in einen Ring verwachsen, fiederig, abfällig.

Lappa. Der Kelchsaum besteht aus abfälligen Borsten.

Serratula. Der Kelchsaum haarig, dauernd.

b. der Griffel an der Spitze ungegliedert.

Adenostylium. Die Hüllblättchen in einer Reihe mit einigen kürzeren am Grunde.

Eupatorium. Die Hüllblättchen dachziegelförmig; Narben fädlich.

Chrysocoma. Die Hüllblättchen dachziegelförmig; Narben lanzettlich.

O. II. Polygamia superflua. *Die Strahlblümchen zungenförmig oder röhrig, tragen nur Stempel. Die Scheibenblümchen röhrig und zwitterig.*

a. Kelchsaum haarig. Blumenboden kahl. Strahlblümchen röhrig.

a. Hüllblättchen in einer Reihe mit einigen kürzeren am Gr.

Homogyne. Stempelblumen des Strahls in einer Reihe.

Petasites. Stempelblumen des Strahls bald in einer, bald in mehreren Reihen.

β. Hüllblättchen dachziegelförmig, krautartig oder am Rande trockenhäutig.

Filago. Die Köpfe 5kantig.

Conyza. Die Köpfe eifg.-rundlich.

γ. Hüllblättchen dachziegelförmig, durchaus trockenhäutig.

Elichrysum. Stempelblumen des Strahls in einer Reihe.

Gnaphalium. Stempelblumen des Strahls in mehreren Reihen.

Antennaria. Stempelblumen and Zwitterblumen auf verschiedenen Individuen.

b. Kelchsaum haarig. Blumenboden kahl. Strahlblümchen zungenförmig.

a. Hüllblättchen dachziegelförmig aus mehreren Reihen.

a. die Stanbbeutel mit Fortsätzen.

Inula. Kelchsaum haarig.

Pulicaria. Kelchsaum 2reihig; die äussere eine gezähnte Haut, die innere aus Haaren.

β. die Staubbeutel ohne Fortsätze.

Erigeron. Die Stempelblumen in mehreren Reihen.

Aster. Die Stempelblumen in einer Reihe; der Strahl verschieden gefärbt.

Solidago. Die Stempelblumen in einer Reihe; der Strahl gleichfarbig.

β. Hüllblättchen gleichförmig in 1 - 3 Reihen, oder am Gr. mit einigen kürzeren.

a. die Stempelblumen in einer Reihe. Hülle halbkugelig.

Doronicum.

b. die Stempelblumen in einer Reihe. Hülle walzenfg.

Arnica. Die Narben vorn verdickt mit kugelförmiger Spitze.

Senecio. Die Narben kopfförmig. Hülle mit kürzeren Blättchen am Grunde.

Cineraria. Die Narben kopfförmig. Hülle einfach.

b. die Stempelblumen in mehreren Reihen.

Tussilago.

c. Kelchsaum nicht haarig. Blumenboden kahl.

a. Hüllblättchen zweireihig.

Bellis.

β. Hüllblättchen dachziegelfg.

a. die Randblümchen fädlich oder fehlend.

Tanacetum. Die Nüsschen eckig-gestreift, oben mit einer gleichbreiten Scheibe.

Artemisia. Die Nüsschen verkehrt-eifg., oben mit einer walzigen Scheibe.

b. die Randblümchen zungenförmig oder röhrig-glockig.

Matricaria. Blumenboden kegelförmig-walzig.

Chrysanthemum. Blumenboden erhaben.

d. Kelchsaum nicht haarig. Blumenboden mit Spreublättchen.

a. Hüllblättchen in einer Reihe, mit kürzeren am Grunde.

Bidens.

β. Hüllblättchen dachziegelförmig.

Achillea. Zunge der Strahlblümchen verkehrt eifg.

Anthemis. Zunge der Strahlblümchen länglich.

O. III. Polygamia frustranea. *Die Strahlblümchen tragen Stempel aber ohne Narben; die Scheibenblümchen zwitterig.*

Centaurea. Blumenboden mit Borsten.

Helianthus. Blumenboden mit Spreublättchen.

Cl. XX. GYNANDRIA.

Die Staubgefäße an den Stempel angewachsen, in einer Zweiterblume.

O. I. Monandria. *Ein Staubgefäß.*

a. *der ganze Staubbeutel angewachsen.*

α. *die Unterlippe in einen Sporn ausgehend.*

Orchis. Die Pollenmassen an eingesenkten Drüsen befestiget.

Anacamptis. Die Pollenmassen an einer freien Drüse befestiget.

Gymnadenia. Die Pollenmassen an zwei freien Drüsen befestiget.

Lippe mit stumpfen Lappen. Blumenhülle offen.

Platanthera. Die Pollenmassen an zwei freien Drüsen befestiget.

Lippe mit langen linealischen Mittellappen. Blumenhülle offen.

Coeloglossum. Die Pollenmassen an zwei freien Drüsen befestiget.

Blumenhülle glockig-zusammenschliessend. Sporn abgekürzt.

β. *die Unterlippe ohne Sporn.*

Herminium.

b. *der Staubbeutel frei.*

α. *die Unterlippe in einen Sporn ausgehend.*

Epipogium. Der Sporn nach oben.

β. *die Unterlippe ohne Sporn, aus zwei Stücken bestehend.*

Cephalanthera. Der Fruchtknoten gedreht, sitzend.

Epipactis. Der Fruchtknoten nicht gedreht, gestielt.

γ. *die Unterlippe ohne Sporn, ungegliedert.*

Coralorrhiza. Die Unterlippe am Grunde mit 2 rinnenförmigen Vertiefungen.

Sturmia. Blumenhülle offen. Lippe schief-aufrecht. Staubbeutel endständig, abfällig.

Malaxis. Blumenhülle weit offen. Lippe schief-aufrecht. Staubbeutel endständig, dauernd.

Neottia. Blumenhülle glockig. Staubbeutel endständig, dauernd.

Listera. Blumenhülle oben helmförmig. Staubbeutel auf einem Fortsatz der Blumensäule.

Spiranthes. Blumenhülle rachenförmig. Unterlippe eingeschlossen. Staubbeutel sitzend.

Goodyera. Blumenhülle rachenförmig. Unterlippe eingeschlossen. Staubbeutel gestielt.

O. II. Diandria. *Zwei Staubgefäße.*

Cypripedium.

O. III. Hexandria. *Sechs Staubgefäße.*

Aristolochia.

Cl. XXI. MONOECIA.

Blumen mit Staubgefäßen und Blumen mit Stempeln auf einem Individuum.

O. I. Monandria. *Ein Staubgefäß.*

Euphorbia. Um eine Stempelblume in der Mitte 1 oder mehrere Quirle Staubgefäßblumen von einer 4 - 5spaltigen Hülle umschlossen.

Arum. Blumen in Kolben, die an der Spitze nackt sind. Beerenfrucht.

Calla. Blumen in Kolben. Beerenfrucht.

Najas. Blumen winkelständig. Einsamige Nüsschen. Dornige Blätter.

Callitriche. Blumen winkelständig. Trockne Pflaume, die in 4 Nüsschen zerfällt.

Zannichellia. Zahlreiche gestielte Nüsschen in den Blattwinkeln.

Wasserpflanzen.

O. II. Diandria. *Zwei Staubgefäße.*

Pinus. Zapfenschuppen an der Spitze verdickt. } Nadelhölzer.

Abies. Zapfenschuppen an der Spitze platt. }

O. III. Triandria. *Drei Staubgefäße.*

Typha. Blumen in walzigen Aehrenkolben. Die Fruchtknoten von Borsten umgeben.

Sparganium. Blumen in kugligen Aehrenkolben. Blumenhülle aus schuppigen Blättchen.

Carex. Blumen in Aehren. Blumenhülle eine Schuppenspelze. Fruchtknoten von einer napfförmigen Haut umgeben.

Zea. Die Stempelblumen-Aehren in Scheiden eingeschlossen. Gras.

O. IV. Tetrandria. *Vier Staubgefäße.*

Urtica. Stempelblume mit 2theiliger Blumenhülle. Kraut mit Brennhaaren besetzt.

Alnus. Staubgefäßblumen je 3 gestielt auf einer Deckschuppe mit 4theiliger Blumenhülle. Stempelblumen ohne Blumenhülle. Bäume.

O. V. Pentandria - Polyandria. *Fünf oder mehr Staubgefäße.*

a. *Blumenhülle doppelt. Blumen quirtständig.*

Myriophyllum. Staubfädenblumen mit vier hinfalligen, Stempelblumen mit sehr kleinen Kronenbltt.

Sagittaria. Kelch und Krone 3theilig. Früchtchen auf einem kugeligen Fruchtboden.

b. *Blumenhülle einfach. Blütenstand kein Kätzchen.*

Amarantus. Blütenstand straussig. Blumenhülle 3 - 5blättrig. Kapsel umschnitten aufspringend.

Atriplex. Staubgefässblumen mit 5blättriger, Stempelblumen mit 2theiliger Blumenhülle. Schlauchfrucht von der vergrößerten Blumenhülle bedeckt.

Ceratophyllum. Blumen winkelständig. Nüsschen an der Spitze bedornt.

Xanthium. Blumen in eiförmigen Köpfchen mit Hüllen, die an der Frucht verhärten.

c. *Blumenhülle einfach; die Staubgefässblumen in Kätzchen; die Staubgef. auf der Blumenhülle. Bäume.*

Fagus. Die Kätzchen kugelförmig.

Quercus. Die Kätzchen walzig, unterbrochen.

d. *Blumenhülle einfach; die Staubgefässblumen oder auch beiderlei Blumen in Kätzchen; die Staubgef. auf den Deckschuppen. Bäume.*

Corylus. Nuss von einer 2theiligen bleibenden Hülle umgeben.

Carpinus. Nuss von einer blattartigen halbirten Hülle umgeben.

Betula. Geflügelte Nüsschen unter 3theiligen Schuppen in Kätzchen.

O. VI. Polyadelphia. Vier paarweise verbundene und ein einzelnes Staubgefäss.

Bryonia.

CL. XXII. DIOECIA.

Staubgefässblumen und Stempelblumen auf verschiedenen Individuen derselben Art.

O. I. Diandria *Zwei Staubgefässe.*

Salix. Beiderlei Blumen in Kätzchen. Blumenhülle fehlt. Bäume.

O. III. Triandria. *Drei Staubgefässe.*

Empetrum. Kelch und Krone 3theilig. Strauch.

O. IV. Tetrandria. *Vier Staubgefässe.*

Viscum. Die Staubbeutel sitzen auf den Kronenblättern und die Narbe auf dem Fruchtknoten. Strauch.

Spinacia. Vier Griffel.

O. V. Pentandria. *Fünf Staubgefässe.*

Cannabis. Staubgefässblumen mit 5theiliger, Stempelblumen mit 1blättriger, gespaltener Blumenhülle.

Humulus. Staubgefässblumen mit 5theiliger, Stempelblumen mit schuppenförmiger Blumenhülle, letztere unter zapfenförmigen Schuppen.

Juniperus. Stempelblumen in Kätzchen. Frucht ein Beerenzapfen. Nadelholz.

Taxus. Staubgefäßblumen in Kätzchen. Frucht ein offener Beerenzapfen. Baum.

O. VII. Octandria. *Acht Staubgefäße.*

Populus. Ein Fruchtknoten in einer ungetheilten Hülle. Kätzchenblumen. Bäume.

Rhodioia. Kelch 4theilig. Krone 4blättrig, an den Stempelblumen oft fehlend. Vier Früchtchen.

O. VIII. Enneandria. *Neun Staubgefäße.*

Mercurialis. Blumenhülle einfach, 3theilig.

Hydrocharis. Kelch 3theilig. Krone 3blättrig. Wasserpflanze.

O. IX. Dodecandria. *Zwölf Staubgefäße.*

Stratiotes. Kelch und Krone 3blättrig. Wasserpflanze.

Cl. XXIII. POLYGAMIA.

Einhäusige und Zwitterblumen unter einander.

Hierher gehören nach Linné *Veratrum*, *Holcus*, *Valantia* (siehe *Galium*) *Parietaria*, *Atriplex*, *Acer* und *Fraxinus*, welche hier unter die anderen Zwitterblumen tragenden Pflanzen an ihrer Stelle eingereiht worden sind.

Die
phanerogamischen
Familien, Sippen und Arten
der
Schlesischen Flora.

PHANEROGAMAE L.

DICOTYLEDONEAE Jussieu.

Zwei gegenständige oder mehrere wirtelständige Keimblätter.

Wurzel meist rüben- oder knollenförmig oder aus büscheligen Fasern bestehend. Stängel entweder stielrund oder vierkantig. Blätter meist mit breiter Platte, welche von unregelmässigem Adernetz durchzogen ist, oft von Stützblättern begleitet; häufig gegenständig u. wirtelständig, oder wechselständig und zwar schraubenförmig in fünf, acht oder dreizehn u. m. Zeilen am Stängel aufsteigend. Blumenth. meist zu fünf, oder zu vier, zehn, acht. Blumenhüllblätter meist doppelt, in Kelch und Krone gesondert. Der Stängel besteht aus Rinde, Holzschicht, welche von Markstrahlen durchsetzt wird, und Mark. Bei Sträuchern und Bäumen, d. h. bei denen, deren Stamm mehrjährig ist, wächst alljährlich eine neue Holzschale um die inneren an.

A. DICOT. POLYPETALAE.

Die Blumenhüllblätter doppelt: Kelch und Krone. Die Krone besteht aus 5 oder 4, oder aus mehreren, freien, d. i. an ihrem Grunde nicht unter einander zusammenhängenden Blättchen.

Unter diese Abtheilung sind ausnahmsweise auch die *Chenopodiaceae*, *Amarantaceae* und *Scleranthaceae* so wie die *Euphorbiaceae* gestellt, welche zum Theil nur eine einfache Blumendecke haben. Diese Ordnungen müssen nämlich wegen ihrer nahen Beziehung zu anderen Ordnungen hierher gerechnet werden und stellen eine unvollkommnere Stufe derselben dar, indem die inneren Blüthenhüll- (oder Kronen-) Blätter fehlen.

I. DICOT. POLYPET. THALAMI-FLORAE.

Die Kronenblätter und Staubgefäße stehen auf dem Blumenboden.

Der Blumenboden ist die Spitze des gewöhnlich verdickten oder polsterförmig-schwellenden Blumenstiemes, auf deren Mitte der Stempel aufsitzt; bisweilen bildet sich daselbst eine besondere den Grund des Stempels umgebende Scheibe oder Ring.

Zu den Pflanzen dieser Abtheilung gehören die ganze fünfzehnte, die meisten aus der sechszehnten, achtzehnten, dreizehnten und zehnten Linneischen Classe.

Berberideae Ventenat.

Kelchbltt. doppelreihig. Kronenblätter hinter den Kelchblättern, mit Honiggefäßen am Grunde. Staubgef. frei hinter den Kronenbltt. Die Staubbeutel nach innen gewandt zweifächerig; jedes Fach öffnet sich durch eine elastisch von unten nach oben aufspringende Klappe. Samen mit dicklichem Eiweiß und geradem Keim.

Sträucher mit gesägten Blättern.

Berberis L. Sauerdorn. Sechs Kelchbltt. Sechs Kronenbltt. mit je zwei Honigdrüsen am Grunde. Beerenförmige Steinfrucht mit zwei Samen. VI, 1.

* **B. vulgaris L. Essigdorn, Berberitze.** Bltt. verkehrt eifg., wimperig-gesägt, büschelweise, a. Gr. mit dreitheiligen Dornen; Blüten in hängenden Aehren; Beeren elliptisch.

An Hecken. Wird häufig in Park- und Gartenanlagen bemerkt; anderwärts auch an Ackerrändern. Ist erweislich ausheimischen Ursprungs, nach Ruelli aus Mauretanien, und kann, obwohl von allen

unseren Floristen aufgeführt, bei uns nicht einmal als verwildert gelten. Mai, Juni. h .

Krbitt. gelb. Die Staubfäden mit einer Nadel gereist, springen elastisch auf die Narbe und legen sich dann langsam zurück. Die rothen Beeren sind reich an Aepfelsäure. Die gelbe Rinde der Aeste und der bitteren Wurzel enthält einen eigenthümlichen Farbestoff, der vorzüglich zu einer gelben Farbe für Saffan und Wolle benutzt wird.

Paeoniaceae De Candolle.

Kelchbltt. 3 bis 5. Kronenbltt. gleichviel oder doppelt- oder dreimal- so viele, in wechselständigen Kreisen. Staubgef. frei, von unbestimmter Anzahl, in zwei oder mehreren Kreisen; Staubbeutel nach innen gewandt. Fruchtknoten in bestimmter Anzahl und in einer Reihe, bisweilen einzeln. Früchte schlauchförmig an der innern Nath aufspringend, oder beerenförmig nicht aufspringend. Samen mit fleischigem Eiweiss und winzigem geradem Keim. — Bei Decandolle Syst. und Koch Syn. eine Abtheilung der Ranunculaceae.

Actaea L. *Christophswurzel*. Kelch hinfällig. Kronenbltt. 4 oder 5, schmal mit einer Platte an der Spitze. Frucht eine einsamige Beere. XIII, 1.

Weisse langgestielte Blüthentrauben.

A. spicata L. *Schwarzwurzel*. Blätter gedreit, fast doppeltgefiedert; Blättchen eingeschnitten-gesägt.

In Laubwäldern des Vorgebirges und hie und da in der Hügel- gegend der Ebene d. d. g. G., aber zerstreut und stets vereinzelt. Um *Br. bei Skarsine*. *Zobten-*, *Rummels-*, *Gröditzberg*. Um *Charlottenbrunn* und *Kupferberg*. Im Gebirge der *Grafchaft Gl.*, *Gesenke*. Um *Oppeln*. Mai, Juni. 2.

Dicker Wurzelstock. Stängel aufrecht, 2-3' hoch, am Gr. von häutigen Scheiden umgeben, mit einem Wurzelblatt und wenigen Stängelbltt. Beeren schwarz glänzend. — Die Wurzel enthält einen stüchtigen scharfen Stoff und kommt im Handel nicht selten für d. W. des *Helleborus niger* vor. Wurzel, Blätter und Beeren besitzen giftige Eigenschaften.

Paeonia L. *Pfingstrosen*. Kelch dauernd. Kronenbltt. 5 oder mehr, gross und rundlich. Frucht besteht aus 2 oder 3 einsamigen Kapseln. XIII, 2.

* *P. officinalis* L. Wurzelfasern knollenfg. - verdickt; die reifen Kapseln aufrecht ein wenig abstehend, an der Spitze zurückgekrümmt.

Ist im Süden, *Schweiz* und *Krain*, heimisch; wird bei uns in allen Ziergärten nebst andern Arten dieser Sippe gehalten. Mai, Juni. 2.

Kronen faustgross; Kronenbltt. purpur-blattröth. Blätter doppelt- gedreit, mit länglichen oder lanzettlichen Blättchen.

Ranunculaceae Juss.

Kelch 3-6blättrig. Kronenblätter zwischen den Kelchbltt., meist fünf; bisweilen verkümmert und in Gestalt von Honiggefässen, auch ganz fehlend. Staubgef. frei, von unbestimmter Anzahl; Staubbeutel nach aussen gewandt. Fruchtknoten mehrere mit je einem Griffel und einer nach innen gekehrten Nath: entweder in einem Kreise und nach innen zusammenhängend oder auf verlängertem Fruchtboden in mehreren Kreisen, ganz frei. Die Frucht aus zahlreichen freien einsamigen Nüsschen oder aus mehr oder weniger verbundenen mehrsamigen Schläuchen bestehend. Samen an der Nath, mit hornartigem Eiweiss und kleinem Keim.

Sämmtliche Sippen dieser Fam. stehen in der dreizehnten Klasse Linnés. — Sowohl in der Beschaffenheit der Früchte als auch der Blütenhüllen giebt sie sehr augenfällige Beweise der Metamorphose, indem die beiderlei Blütenhüllen bei Anemone auseinandertreten und die untere, indem sie Blattnatur annimmt, in eine Hülle übergeht. Die Blätter sind am Grunde scheidenförmig-erweitert, ohne vollkommene Stützblätter, oft vieltheilig. Vorherrschend gelbe und blaue Blumen. Den gemäßigten und kalten Gegenden eigen, daher auch viele Arten im Gebirge und einige diesem eigenthümlich. Sie enthalten einen scharfen Stoff, welcher in den Ranunkeln und Anemonen flüchtig, in den Helleboreen mehr fix ist, und in einigen sich bis zum Gift steigert. Viele sind Zierpflanzen.

1. *Ranunculeae*. Blumen regelmässig; die Kronenbltt. haben am Gr. eine Honiggrube mit oder ohne eine fleischige Schuppe. Einsamige Nüsschen in mehreren Reihen.

Ranunculus L. *Hahnenfuss*. Fünf Kelchbltt. Fünf Kronenbltt. mit einer die Honiggrube bedeckenden Schuppe. Früchte zusammengedrückt von der bleibenden Narbe gehörnt. XIII, 7.

Kronen gelb, bei einer Art weiss. Blumen an den Spitzen des verzweigten Stängels. Die Behaarung ist veränderlich. Mehrere Arten sind scharf, einige giftig. Krautartig mit büscheliger Wurzel. Die meisten Arten in der Ebene; zwei nur im Gebirge; drei von unten bis 4000'.

a. Früchte glatt, Blumen weiss.

R. aconitifolius L. *Wiesen-H.* Blätter handfg. - getheilt in 3 bis 7 Zipfel, diese eingeschnitten-gesägt; Stängel vielblumig, beblättert; Kelch abfällig; Früchte hakenförmig geschnäbelt.

β. *laciniatus* Fl. v. Schles. Blattzipfel sehr schmal, unterseits grauweiss-behaart.

Auf lockerem und fruchtbarem Wald- u. Wiesenboden, an den kräuterreichen Lehnen, an Bächen und auf Waldwiesen des Vor- und Hochgebirges, nicht unter 1500'. *Eulengeb., Sonnenkoppe. Berge um Charlottenbrunn. Hohe Mense und Gl. Schneeberg. Verbreitet im Riesengebirge u. Gesenke. Czantory b. Ustron. β. bei Reinerz und am langen Berge bei Donnerau. Juli, Aug. 2.*

Stängel 1-4' hoch, mit dünnen abstehenden Aesten. Wurzelbltt. lang-gestielt. Kronen klein, schneeweiss. Bisweilen mit gefüllten Blumen.

b. Früchte glatt, Blumen gelb, Blätter ungetheilt, Wurzel faserig.

R. Flammula L. Egelkraut. Blätter linienfg. - lanzettlich oder elliptisch; Stängel aufsteigend oder gestreckt, Früchte mit kleinem Spitzchen.

Auf feuchten Sandplätzen, Sumpfwiesen, an Teich- und Flussrändern durch das g. G. häufig. Juni, Aug. 2.

Stängel oft wurzelnd. Wurzelbltt. löffelförmig, mehr oder weniger kerbzaehmig. Blumen klein, doch in der Grösse veränderlich; Kronen dottergelb. Wenig verzweigt, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h. Scharf. Der Saft der Bltt. wirkt blasenziehend. Eine kleine Var. ist *R. reptans* L. Matt. u. Krock. sil.

R. Lingua L. Speerkraut. Blätter lanzettlich-langspitzig; Stängel aufrecht; Früchte mit kurzem sichelförmigem Schnabel.

An und im Wasser; an Fluss-, Teich- und Sumpfrändern zwischen Schilf und Geträuch, durch d. g. G. in der Ebene und d. niederen Vorgeb., zerstreut. Um Br. bei Marienau, Bischowitz a. W., Oswitz u. a., Ohlau, Bunzlau, Maiwaldau bei Hirschberg, Oppeln, Trop. Te. Juni, Aug. 2.

Stängel 2-4', unten meist ranhborstig, dick und mit wurzelfasertreibenden Knotenabsätzen. Kronen sehr gross, goldgelb, lakirt. Ist giftig.

c. Früchte glatt, Blumen gelb, Bltt. wenig - getheilt, Wurzel bröcklig.

R. illyricus L. Aufrecht, 1-3blumig, mit grauem Seidenhaar bekleidet; Bltt. länglich-lanzettlich dreispaltig; Kelch zurückgeschlagen.

Auf Gyps. Bisher nur auf den Hügeln an den Gypsbrüchen bei Köstling unweit Katscher von Kelch gefunden. Juni. 2.

Höhe 1'. Die ersten Wurzelbltt. lineal- oder länglich-lanzettlich ungetheilt, die späteren dreispaltig mit linealischen ganzrandigen Zipfeln.

d. Früchte glatt, Blumen gelb, Bltt. vieltheilig, Wurzel buschelig-faserig.

R. auricomus L. Waldschmigel, Butterblümchen. Fast kahl; Wurzelbltt. im Umfange kreisrund, meist dreilappig, oft auch vieltheilig, selten ungetheilt, gekerbt, auf Stielen, die am Grunde scheidenartig erweitert sind; Stängelbltt. fingerfg.-getheilt, mit linealischen oder lanzettlichen, selten gesägten Zipfeln; Früchte aufgeblasen mit hakenförmigem Schnabel.

Unter vielen Abänderungen ist hervorzuheben:

β. fallax. W. et Gr. Fl. sil. Stängel dick mit gespreizten Aesten; Wurzelbltt. gross ungetheilt; die unteren Stängelbltt. mit länglich-lanzettlichen auch rautenförmigen starkgesägten Zipfeln.

Auf etwas feuchtem und lehmigem Wiesen- und Waldboden durch das ganze Gebiet gemein und bis ans Hochgebirge. β. in lockerem Lehmboden an grasigen und buschigen Dämmen, um Br. bei Grün-eiche und Bischofswalde; Jacobine bei Ohlau. April, Mai. 2.

Diese Art ist in der Zertheilung der Blätter und Breite der Blattzipfel sehr veränderlich. H. 1'. Meist kahl, nur bei β . sind die Wurzelbltt. bisweilen unterseits dann behaart. Blumenstiele stielrund. Kronenbltt. goldgelb; bei den ersten Blumen, die sich entwickeln, fehlen meist 2, 3 auch 4 oder alle 5 Blumenblätter (daher eine var. *apetala*). Die var. β . ist der folgenden Art ähnlich und von vielen Floristen dafür gehalten worden.

R. cassubicus L., nicht Krock. sil. Fast kahl; Wurzelblätter 1-2, herz-kreisfg., ungetheilt, sehr selten dreilappig, gekerbt, gestielt; die Stiele am Gr. von einigen blattlosen Scheiden umgeben; Stängelbltt. fingerfg. getheilt mit länglichen gesägten Zipfeln; Früchte aufgeblasen mit hakenförmigem Schnabel.

In schattigen Laubwäldern der Ebene. Bisher nur um *Br. bei Arnolds-mühl* und *Lissa* zuerst von Schummel, im *Goi* bei *Kapsdorf* von Krause und im *Stadtwalde* bei *Leobschütz* von Schramm gefunden, nach Wenck auch bei *Suckowitz* und nach Koschatzky bei *Jägerndorf*, an da. Orten zahlreich. Diese Art scheint hier ihre westliche Gränze zu haben. April, Mai, etwa 10 Tage früher als der vorige. 2.

Aufrecht, 1-2' h., blaugrün, bisweilen fast graugrünlich, mit feinem graublauen Reif. Auch an diesem fehlen bei den ersten Blumen einige Kronenbltt., die von satt-goldgelber Farbe sind. Meist nur ein oder zwei Wurzelbltt., die vor der Entwicklung auf einem hakenförmig-umgebogenen Stiele stehen und mit feinem Seidenhaar bekleidet sind, das sich später verliert. Die elliptischen häutigen weissen oder röthlichen Scheiden am Gr. des Stängels sind ein sicheres Kennzeichen.

R. acris L. Scharfer H. Wiesen-Schmirgel. Feinhaarig; Wurzelbltt. handförmig-getheilt mit 2-3spaltigen eingeschnitten-gesägten, spitzen, fast rautenförmigen Zipfeln; die Stängelbltt. jenen gleichförmig; Blumenstiele stielrund; die Früchte zusammengedrückt mit sehr kurzem schwachgekrümmten Schnabel; Fruchtboden kahl.

Auf feuchten und trocknen Wiesen, in Hainen, Gebüsch und auf Waldwiesen, bis auf die Wiesen im Hochgebirge, durch d. g. G. Ist die verbreiteste und häufigste Art dieser Sippe. Mai, Aug. 2. Ziemlich 14 Tage später als *R. auricomus*.

Diese Art hat die am tiefsten zertheilten Blätter; ist nur schwach behaart, hat meistens grosse Blumen und eine Höhe von 1 - 2 $\frac{1}{2}$ '. Abänderungen: mit breiten keilförmigen Blattzipfeln, auf lockerem Boden im Herbst (β . *serotinus* Fl. sil.); und niedrig 1-3blumig mit länglichen Blattzipfeln und grösserer Blume, im Hochgebirge in den Schneegruben und im Gesenke (γ . *alpestris* Fl. sil.). — Wird vom Vieh nicht gefressen und hat giftige Eigenschaften. Der Saft ist blauschwarz und bewirkt innerlich Entzündung der Verdauungswerkzeuge.

R. polyanthemos L. Vielblumiger H. Rauhhaarig; Wurzelbltt. handförmig-getheilt mit 3-spaltigen o. 3-theiligen Zipfeln; Blumenstiele gefurcht; Früchte zusammengedrückt mit hakenförmigem Schnabel; Fruchtboden mit Borstenhaaren besetzt.

Auf etwas trocknen Wiesen, Triften, in Gebüsch und Wäldern durch d. g. G. sehr verbreitet, doch weniger zahlreich als die vorige bis auf die Kämme des Hochgebirges. Mai, Juli. 2, einige Tage später als die vorige Art.

Sieht der vorigen Art ähnlich, kräftiger. Blattabschnitte breiter, am Grunde häufig mit leberfarbenen Flecken. Meist rauchhaarig, aber auch mit fast kahlen Bltt., Stäng. u. Kelchen. H. 1/2 - 2 1/2'. Kronenbltt. gesättigter gelb, grösser, am Gr. schmaler und weiter von einander entfernt. Kelch abfällig.

R. nemorosus DC. Kurzrauhhaarig; Wurzelbltt. handfg. - getheilt mit verkehrt-eiförmigen dreispaltigen gezähnten Zipfeln; Blumenstiele gefurcht; Früchte zusammengedrückt mit hakenförmigem Schnabel; Fruchtboden mit Borstenhaaren besetzt.

In Wäldern und auf Waldwiesen des Vorgebirges und an den fruchtbaren Lehnen und in den Gründen des Hochgebirges, zahlreich, aber zerstreut. *Am Zobten- und Geiersb., Harteberge b. Frankenstein. Bei Gröditz und Warthau um Bunzlau nach Schneider. Im Riesengeb.: in der hl. Schneegrube und dem Teufelsgärtchen, und nach Nees v. E. an der Kesselkoppe und um die Schlingelbaude. Cudowa. Gesenen am Peterssteine. Baranio nach Kotschy. Babia Gora. Mai, Juli. 2.*

Stängel aufrecht, 1-2' hoch, im Gebirge bisweilen aufsteigend, kurz-rauhhaarig. Blätter dunkelgrün, dicklich, oft mit blassen Flecken. Kronenbltt. fast orangeleb.

R. lanuginosus L. Birkhahnenfuss. Mit langem Sammt-Haar; Wurzelbltt. handfg. - getheilt, mit breiten verkehrt-eiförmigen dreispaltig-ingeschnittenen, spitzgezähnten Zipfeln; Stängelbltt. jenen gleichförmig; Blumenstiele stielrund; Früchte zusammengedrückt mit ansehnlichem kakenförmigem Schnabel; Fruchtboden kahl.

In feuchten, auch sumpfigen Wäldern, im Hügelgebiet der Ebene, dem Vor- und Hochgeb., durch d. g. G. verbreitet, häufig. Um *Br. bei Bischwitz, Lissa, Kapsdorf. Trebnitz u. m.* Mai, Juni. 2.

Stängel 1 1/2 - 3', hohl. Bltt. dunkelgrün, samthaarig, meist leberfleckig. Kronenbltt. orangefarben.

R. repens L. Sumpfschmigel. Kriechende Ausläufer aus dem Wurzelhalse; kahl; Bltt. d. W. gedreit oder doppelt gedreit, Blättchen dreispaltig, eingeschnitten-gezähnt; Blumenstiele gefurcht; Kelch angedrückt; Früchte zusammengedrückt, fein-punctirt, mit geradem Schnabel.

Im feuchten und nassen, auf Wiesen, in Wäldern, in Gräben, an Fluss-Lachenrändern, nassen Aeckern, d. d. g. G., zahlreich. Mai, Jun. 2.

Stängel aufrecht, kahl, nur ausnahmsweise behaart, 1-1 1/2' h.; bisweilen tragen auch die Ausläufer blühende Stängel. Die Zertheilung der Blätter ist veränderlich. Kronen mässig-gross, goldgelb.

R. bulbosus L. Knolliger H. Stängel am Gr. zwiebförmig; kurzhaarig; Bltt. d. W. gedreit oder doppelt-gedreit, Blättchen dreispaltig eingeschnitten-gezähnt; Blumenstiele gefurcht; Kelch zurückgeschlagen; Früchte zusammengedrückt, spitz.

Auf lehmigem und etwas sandigem Boden, auf trocknen Triften, Ackerrainen und besd. an Dämmen, in trocknen Gräben. Um *Br. bei Pöpelwitz, Oswitz, Rosenthal u. m.* Um *Ohlau, Oppeln, Bunzlau, Hirschberg.* Verbreitet durch die Ebene und ziemlich häufig; scheint im Vorgebirge selten zu sein. April, Mai. 2.

Hellgrün, selten kahl. Die Blattstiele der Wurzelbltt. sind am Gr. sehr erweitert und umschliessen den verdickten Grund des Stängels, wodurch scheinbar eine Zwiebel entsteht. Kr. goldgelb.

d. Früchte körnig, runzlig, oder stachelig.

R. sardous Crantz *R. Philonotis* Ehrh. Koch Syn. Kurzhaarig; Wurzelbltt. gedreit oder doppelt gedreit; Blättchen dreispaltig eingeschnitten-gezähnt; Blumenstiele gefurcht; Kelche zusammengedrückt mit schiefer Stachelspitze, am Rande mit einer Reihe kleiner Höcker.

Auf Thon- und Kalkboden, besd. auf etwas feuchten Brachen, in trocknen Gräben an Sumpfrändern, auch bisweilen unter der Saat; zerstreut, wahrscheinl. durch die ganze Ebene, an manchen Stellen in grosser Anzahl und bisweilen ganze Brachen überziehend. Um *Br.* häufig, bei *Lilienthal, Oswitz, Schwoitsch, Wildschütz, Koberwitz, Ohlau, Oppeln, Gnadenberg bei Bunzlau, Troppau.* Mai, Juli. ☉.

Stängel 1-1½' h. Wurzelbltt. meist rosettenf., zuerst an den Boden angedrückt und kahl. Kraut blass, beinahe gelb-grün mit abstehenden steifen Haaren besetzt. Kronenbltt. blass dottergelb. Kelch abfällig.

R. sceleratus L. Gifthahnenfuss. Kahl; Bltt. handförmig-getheilt, Zipfel mit Kerbeinschnitten; Kelch zurückgeschlagen; Früchte feinrunzlig, ohne Kiel, in einem ährenförmigen Köpfchen.

Im feuchten und nassen, in Gräben, Sümpfen, an Lachen, Flussufern, auf Sandgrund und an schmutzigen Abzugsgräben der Städte und Dörfer, in der Ebene d. d. g. G. Sommer und Herbst. ☉.

Sehr veränderlich in der Grösse, von 1-3' H. Stängel dick, hohl, fettglänzend. Bltt. fettglänzend, saftig und dicklich, mit stumpfen Abschnitten. Sehr kleine hellgelbe von einander weit absteheude Kronenbltt. — Sehr giftig, besd. in den Samen; erregt heftige Nervenzufälle, Lachkrämpfe u. s. w.

R. arvensis L. Acker-H. Kahl; Wurzelbltt. keilförmig, gezähnt; die folgenden dreispaltig, die oberen vieltheilig; Früchte platt, geschnäbelt mit Höckern auf den Flächen und Stacheln am Rande.

Auf Aeckern unter der Saat, besd. auf Orten, die überschwemmt waren, durch d. g. G. bis ins Vorgebirge, aber nicht überall, stets heerdenweis. Um *Br.* bei *Oswitz, Bischwitz, Althof, Bischofswalde* u. m. Juni, Juli. ☉.

Stängel aufrecht, fast gabelig-getheilt, 1-1½' h. Kronenbltt. blass-sitrongelb. Die Früchte sind viermal grösser als die der anderen Arten; bisweilen sind die Höcker und Stacheln derselben kleiner, oder verschwinden fast ganz (*γ. inermis* Koch Syn. bei uns noch nicht gefunden).

Batrachium De Cand. Froschkraut, Haarkraut. Fünf Kelchbltt. Fünf Kronenbltt. ohne Schuppe an der Honiggrube. Früchte querrunzlig stumpf. XIII, 7.

Kronen weiss. Wasserpflanzen.

B. aquatile. Wasserfenchel. Ranunculus aquatilis. L. Auctt. R. ag. α β γ δ W. et Gr. Fl. sil. Die untergetauchten Bltt. in viele borstliche Zipfel, die nach allen Richtungen abstehen, zertheilt; die schwimmenden gelappt oder zerspalten; Stängel stumpfkantig; Kronenbltt. verkehrt-eifg.; Früchte hakrig.

In stehenden und fließenden Wässern, Teichen, Lachen und Flüssen der Ebene und des Vorgebirges d. d. g. G., meist gesellschaftlich und zur Blüthezeit grosse Wasserstrecken weiss färbend. Mai, Juni. 2.

Stängel schwimmend, vielästig. Die schwimmenden Bltt. lederartig, glänzend, meist appig-gekerbt, aber auch tief-vielspaltig und bisweilen mit haarförmig-getheilten Zipfeln, woran man den Uebergang in die haarförmig-zertheilten Blätter, die unter Wasser stehen, erkennt. Aehnliches sieht man bei *Azorella amphibia*, *Sium latifolium*, *Berula angustifolia*. Fruchtboden eig. kuglig. Narbe aufsitzend. Fruchtrtragende Stiele bogig-niedersteigend. — Früher hielt ich die beiden folgenden für Abarten; nach genauerer Beobachtung scheinen sie mir nunmehr wirkliche Arten darzustellen.

B. fluitans. *Ranunc. fluitans.* Lamarck. *R. aquatilis c. pectanifolius* W. et Gr. Fl. sil. Die untergetauchten Bltt. in viele borstliche Zipfel, welche sehr lang und parallel stehen, zertheilt; Stängel stielrund; Kronenbltt. verkehrt-eifg. a. Gr. keilfg. verschmälert; Früchte kahl.

In schnellfließenden Gebirgsbächen, im Vorgebirge, zerstreut. Um *Schweidnitz*, *Wurtha*, *Glaz*, *Neisse*, *Schreibendorf* bei *Landschut*. In der *Schwarzbach* bei *Boberröhrsdorf* n. Nees v. E. In dem *Bober* bei *Bunzlau* n. Schneider. Um *Carlsbrunn*, *Ludwigsthal*, *Einsiedel* u. *Morau* nach RuM. Juni, Juli. 2.

Auch bei dieser Art kommen, aber seltner, schwimmende Bltt. mit ähnlicher Umbildung vor wie bei der vorigen. Kronen grösser. Stängel nach dem Strome des Wassers gestreckt, oft mehrere Fuss lang.

B. divaricatum. *Ranunc. divar.* Schrank. *Ran. aquatilis. b. rigidus* W. et Gr. sil. Sämmtliche Bltt. untergetaucht, in viele kurze borstliche Zipfel zertheilt, welche eine kreisförmige Scheibe bilden; Stängel stumpfkantig; Kronenbltt. verkehrt-eiförmig; Früchte hakerig.

In stehenden und schlammigen Gewässern, den Aussümpfungen der Ebenen-Flüsse und schwarzwasserigen Lachen; wahrscheinl. durch d. g. G. in der Ebene, doch zerstreut. Um *Br.* bei *Marienau*, *Hühnern*, *Treschen*. *Königshuld* bei *Oppeln*. Um *Herlitz*, *Lodnitz*, *Johannisfeld* nach RuM. Juni, Juli. 2.

Bltt. fast sitzend mit kurzen steifen Borstenzipfeln. Kronen kleiner als bei *B. aquatile*. Fruchtboden flachkuglig. Narbe mit kurzem Griffel. Stängel und Bltt. sind wie die *Chara*-Arten meist mit einem Kalküberzuge bedeckt und daher sehr zerbrechlich.

Ficaria Dillen. *Scharbock.* Kelch hinfällig, dreiblättrig. Kronenbl. gegen zehn, am Gr. mit einer Honiggrube ohne Schuppe. Früchte zusammengedrückt, stumpf, kahl. XIII, 7.

Wurzel brüchlig.

F. ranunculoides Mönch. *Ranunculus Ficaria* L. Koch Syn. In feuchtem lehmigem Waldboden; in Wäldern, Gehölzen, an Hecken, Grabenrändern, d. d. g. G. bis ins Vorgeb., sehr häufig, im ersten Frühling noch vor der Belaubung der Bäume. März, April. 2.

Stängel am Gr. gestreckt, dann aufsteigend, meist a. Gr. purpurroth, starkglänzend, saftig. Bltt. etwas saftig, fettglänzig, fast kreisrund herzf. mit winkligem Rande.

Kronenblt. 8-14 elliptisch, goldgelb, glänzend. Die Wurzel besteht aus einem Büschel verdickter keulenförmiger Fasern, welche, wenn sie von Regen und Wind umhergestreut werden, von Unkundigen für Getraidekörner gehalten werden, woraus die Eichel von Getraideregen und Himmelsergoste entstanden ist. Vgl. auch *Veronica herderifolia*. Die jungen Bltt. können als Sallat gegessen werden. Bisweilen Brutknöllchen in den Blattwinkeln.

Myosúrus L. Mäuseschwanz. Fünf Kelchblätter mit pfriemlichem Fortsatz am Gr. Fünf Kronenbltt. mit fädigem Nagel und röhriger Honiggrube an der Platte. Früchte dreikantig. v, 6.

Einjährig mit linealischen Wurzelbltt. und verlängertem schwanzförmigem Fruchtboden. Kronenbltt. winzig.

M. minimus L.

Auf sandigem feuchten Grunde, Aeckern, Brachen, Sandplätzen, d. d. g. G. bis in das Vorgeb., zahlreich. Um Br. bei *Carlowitz, Oswitz, Bischwitz a. W., Lissa* u. m. April, Juni. ☉.

H. 1-4'. Tseibt aus der Wurzel spatelfg. linealische Bltt und blattlose einblumige Stängel. Der Fruchtboden verlängert sich in einen walzig-kegelförmigen Schwanz bis zu 1½" Länge. Kronenbltt. weiss-grünlich. Staubgef. fünf bis zwanzig.

2. Anemoneae. Blumen regelmässig. Die Kronenbltt. ohne Honiggrube. Einsamige Nüsschen in mehreren Reihen.

Adonis L. Adonis. Fünf Kelchbltt. Fünf oder mehrere Kronenbltt. Früchte: einsamige ungeschwänzte Nüsschen. XIII, 7.

Früchte in einer walrigen Aehre, eckig.

A. aestivalis L. Adonisröschen. A. aestivalis et A. autumnalis Matt. En. Krock. sil. Kelch kahl. an die ausgebreiteten Kronenbltt. angedrückt; Früchte zweizählig, mit schwachgekrümmtem Schnabel.

Auf Lehm- und Kalkboden unter der Saat und auf Brachen, in der Ebene hie und da, meist zahlreich. Um Br., besonders südlich, bei *Oltaschin, Dürrjentsch, Koberwitz, Domanze. Um Ohlau, Beuthen a. O., Wohlau, Strehlen, Gnadenfrei, Oppeln, Katscher. Trop. u. Te.* Mai, Juni. ☉.

Stängel aufrecht, 1-1½' h., einfach. Bltt. fedrig-vieltheilig mit linealisch-haarförmigen Abschneiden. Kronenbltt. 8-10, elliptisch, mennigroth oder strohgelb (*Grosstejn b. Oppeln*) mit oder ohne schwarzen Fleck am Gr. Früchte fast prismatisch.

Anmkg. Vielleicht wird auch *A. flamma* Jacquin noch in unserem Gebiete gefunden. Auch *A. vernalis*, mit grossen gelben Blumen, soll nach Matt. und anderen in Schlesien wachsen; doch haben wir noch kein Exemplar gesehen.

Anemóne L. Anemone. An der Stelle des Kelches eine dreiblätterige, mehr oder weniger blattartige von der Krone entfernte Hülle. Kronenbltt. fünf oder mehrere. Früchte: einsamige, geschwänzte oder ungeschwänzte Nüsschen auf

einem verdicktem halbkugligem oder kegelförmigem Fruchtboden. XIII, 7.

Indem sich die Krone auf einem besonderen Stiele erhebt, entfernt sie sich von dem Kelche und letzterer nimmt die Gestalt von Stängelblättern mehr oder weniger an. Indem man nun diesen so verwandelten Kelch *Hülle* benennt, nennen andere dasjenige *Kelch* (calyx petaloideus), was wir *Krone* nennen. Der Stängel ist übrigens blattlos; einzelne vieltheilige Wurzelbltt.; grosse bunte Blumen. — Zwei Arten sind nur dem Hochgeb. eigen. Sie enthalten einen narcofisch-scharfen Stoff.

a. Nüsschen geschwänzt; Hülle sitzend, handförmig-getheilt.
Pulsatilla Willd.

A. vernalis L. Walddulpe. Blätter drei- oder fünfzählig-gefiedert, Blättchen keilfg.-länglich, 2 — 3spaltig; Hülle fingerfg.-gespalten; Krone aufrecht oder überhängend, Kronenbltt. sechs, gerade, länglich-elliptisch.

Auf sandigem und moosigem Boden in grossen Kieferwäldungen der Ebene, besd. auf dem rechten Oderufer, zerstreut, nicht sehr häufig. Bei *Birnbäumel* und *Deutschhammer*. In *Ob. S. um Malapane, Königshuld, Rosenberg*. Um *Bunzlau bei N. Tillendorf, Gr. Zeche* nach Schneider. Ausnahmsweise im Hochgebirge nahe an 4000' im *Teufelsgärtchen* und im *Kessel im Gesenke*. April, Mai, im Geb. Juni, Juli. 2.

H. 2 — 5". Bltt. aus der schiefen Wurzel, entwickeln sich zugleich mit dem Blüthenschaft, zuletzt lederartig, sparsam behaart. Blüthenschaft blattlos, einblumig. Hülle starksilberfarben- oder rostgelb-zottig. Krone weiss, ausserhalb rosafarben bis ins violette, zottig 1 — 1½" lang. Die Gestalt der Blätter veränderlich; aus dreispaltigen in dreizählige und in fünfzählig-gefiederte. Abänderung mit 3 grösseren und 3 kleineren Kronenbltt., und mit strohgelben, auch mit ganz violetten Blumen.

A. patens L. Blätter gedreit; Blättchen: das mittlere 3- die seitlichen 2-theilig mit lineal-länglichen an der Spitze eingeschnitten-gezähnten Zipfeln; Blume frühzeitig; Krone aufrecht mit sechs abstehenden Blättern.

In moosigen und sandigen Kiefer- und Eichenwäldern der Ebene, meist in Gesellschaft der vorigen, aber seltner und sehr zerstreut. Bisher nur auf dem rechten Oderufer um *Birnbäumel* und *Deutschhammer, Malapane* und *Königshuld*. Bei *Kiowitz* und *Wolfsdorf* nach v. Mückusch. März, April. 2.

Schaft blattlos einblumig, 3-8" hoch, entwickelt sich früher als die Blätter. Sonst Wuchs und Gestalt der vorigen. Hülle schmutzig-violett oder grün stark weisszottig. Kronenbltt. violett, aussen weisszottig, 1-1½" lang.

A. Pulsatilla L. Kuhshelle, Küchenschelle. Blätter fiederschnittig-vieltheilig, mit linealischen spitzen Abschnitten; Krone glockenförmig, etwas nickend, aus sechs geraden abstehenden Blättern.

In sandigen Kieferwäldern. Bisher nur einmal und sehr sparsam bei *Birnbäumel* gefunden. Nach Kotschy am *Zor und Ostry bei Teschen*. April. 2.

Gleicht in der Blü. der folgenden, in der Blume der vorigen, doch kleiner. Schaft $\frac{1}{2}$ - 1' h., einblumig. — Das Kraut zerrieben reizt die Augen. Diese Art ist officinell als *Herba Pulsatillae*, und gehört zu den narcotisch-scharfen Pflanzen.

A. pratensis L. Schwarze Küchenschelle. Blätter dreifach-fiederspaltig, mit linealischen Abschnitten; Krone glockenförmig, überhängend; Kronenblätter sechs, aufrecht, mit umgeschlagener Spitze.

Auf Sandboden, auf Kiefer- und Birken-Hügeln, in hohen Haiden der Ebene zerstreut, nicht zahlreich. *Um Br. bei Schwöitsch, Lienthal, Althof, Lissa, Bunkey bei Sibyllenort. Deutschhammer. Um Oppeln bei Königshuld, Malapane u. m. Tulb. Ustron. April, Mai. 2.*

Schaft $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h. Hüllblätter fast fiederig-zerschnitten. Krone dunkelviolett, aussen weiss-zottig $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ " lang, bisweilen scharlachroth.

b. Nüsschen geschwänzt; Hüllblätter gestielt, den Wurzelblättern ähnlich.

A. alpina L. Teufelsbart. Blätter gedreit, Blättchen doppelt-zusammengesetzt mit eingeschnittenen Abschnitten; drei kurzgestielte Hüllblätter von gleicher Gestalt; sechs söhlig-abstehende Kronenblätter.

Auf den Kämmen, an den Lehnen und Koppen des Riesengebirges um 4000' z. B. *an der Koppe, dem hohen Rade, den Silberrändern, am kleinen Teiche, im Riesengrunde.* Auch auf der *Babia Gora.* Am *Hockschar* (?) nach v. Mückusch. Mai, Juli und Sept., Oct. oft zum zweitenmal. 2.

Schaft $\frac{1}{2}$ - 1' h., einblumig. Die Abschnitte der Blätter breiter und schmaler. Kronenblt. weiss oder schmutzig-weiss. Nüsschen mit graubehaarter Verlängerung des Griffels, woher der Name Teufelsbart; bei einer seltenen Abänderung sind die Haare sehr kurz, am kl. Teiche v. Letsner gefunden. Hierher: *A. apifolia* Krock. sil.

c. Nüsschen ungeschwänzt; Hülle sitzend fingerförmig-getheilt.

A. narcissiflora L. Berghähnlein. Blätter handförmig-fünftheilig, mit dreispaltigen und eingeschnittenen Zipfeln; Blüten in einem Schirm.

Auf den grasreichen Lehnen und Abhängen des Hochgebirges, um 4000' zahlreich. *Im Rieseng. in den Schnee gruben, am kl. Teiche, Aupengrunde, Teufelsgärtchen, Kesselkoppe, Krkonos. Im Gesenke am Petersteine, im Kessel und an d. Bründelhaide. Babia Gora.* Mai, Juni. 2.

Schaft vielblumig, sehr selten einblumig, 1 - 2' h., zottig. Kronen weiss.

d. Nüsschen ungeschwänzt; Hüllblätter gestielt, den Wurzelblättern ähnlich.

A. sylvestris L. Wurzelblätter 3-, 5-theilig; Blättchen dreitheilig mit 3-, 5-zähligen Zipfeln; Schaft einblumig; Kronenblt. 6 - 9 ausserhalb wollig; Früchte filzig mit kurzem kahlem Griffel.

In lichten Wäldern auf kalkhaltigem Boden. *Zwischen Tarnau u. Grosstein bei Oppeln* von Fincke gef. Nach v. Albertini *auf dem langen Berge bei Habendorf bei Reichenbach.* Juni. 2.

Schaft wollig, 1' h. Blumenstiel verlängert, fast aufrecht, unten wollig, oben seidenhaarig. Kronenbltt. weiss, $\frac{1}{2}$ " lang. Bltt. u. Hüllbltt. weichhaarig.

A. nemorosa L. Weisse Osterblume. Wurzelbltt. meist fehlend; Hüllbltt. auf einem halb so langen Stiele, gedreit, mit dreispaltigen, eingeschnitten-gesägten, spitzigen Blättchen; Kronenbltt. beiderseits kahl, weiss oder rosafarben.

Auf lockerem Waldboden, in Hainen und Gebüsch, Wäldern, auf Waldwiesen, durch das ganze Gebiet in der Ebene und dem Vorgebirge in grosser Menge und heerdenweise. März, Mai. 2.

Wurzelstock söhlig, hellbraun, von der Dicke einer Rabenfeder, a. d. Spitze knospend. Bltt. schwach behaart. Schaft einblumig $\frac{1}{2}$ - 1' h. Kronenbltt. 6 - 9 oft von aussen, selten von innen rosapurpurf. überlaufen. Seltene Missbildung: Kronenbltt. die an der Spitze blattartig, d. h. grün und geschlitzt werden.

A. ranunculoides L. Gelbe Osterblume. Wurzelbltt. meist fehlend; Hüllbltt. auf einem viel kürzeren Stiele, gedreit, mit tief dreispaltigen, stumpflichen Blättchen; Kronenbltt. ausserhalb weichhaarig, goldgelb.

In feuchten Laubwäldern besd. des Vorgebirges nicht selten. Um Br. bei Schwoitsch, Kapsdorf, Lissa, Arnoldsühle, Skarsine, Totschen. Um Oppeln. Am Gröditzberge. Zobtenberg. Charlottenbrunn, Wartha, Eulengeb. u. m. Trop. Tul bei Ustron. April, Mai, später als die vorige.

Der vorigen durchaus ähnlich. Meist 2- auch 3-blumig.

Hepatica Dillen. Leberblume. Kelch dreiblättrig, von der Krone durch einen sehr kurzen Stiel getrennt. Krone 6- bis 9-blättrig. Früchte: einsamige ungeschwänzte Nüsschen auf zelligem Fruchtboden. XIII, 7.

H. triloba Chaix. Edle Leberblume. Anemone Hepatica L. Blätter herzförmig, dreilappig, ganzrandig.

In Laubwäldern, an schattigen Hügelwänden und belaubten Lehnen in der Hügelgegend der Ebene und durch das ganze Vorgebirge. Zahlreich und gesellschaftlich. Um Br. bei Arnoldsühl und Lissa. Trebnizer Berge. Süsswinkel. Um Bunzlau bei Grödiz, Eichberg. Ohlau. Oppeln. Trop. u. Te. März, April. 2.

Aus büschelfaseriger Wurzel entspriessen mehrere 2-3' lange zottige, einblumige, blattlose Blumenstiele, und später gestielte, lederartige, dunkelgrüne, unterseits oft röthliche Blätter. Kelchbltt. grün eig. Kronenbltt. himmelblau; in Gärten rosenroth und mit gefüllten Blumen. War ehem. officinell.

Thalictrum L. Wiesenraute. Vier bis fünf blumenblattartige Kelchblätter. Krone fehlt. Frucht: einsamige Nüsschen auf scheibenförmigem Stielpolster. XIII, 7.

Zahlreiche kleine Blumen mit beweglichen Staubgef. und langen Staubbeuteln. Bltt. zusammengesetzt mit und ohne Stützblättchen, kahl. — Die Arten sind schwer zu

unterscheiden, und werden von manchen Autoren zu sehr vervielfältigt. Man beachte die Wurzeln, die reifen Früchte und die Blüthenst.

T. aquilegifolium L. Eirunde Stützblättchen am Grunde der Blattstiele; Nüsschen 3-kantig, geflügelt.

In Hainen, Wäldern, auf Waldwiesen und an fruchtbaren Berglehnen, besond. auf etwas feuchtem Grunde, in der Hügellage der Ebene, im Vorgebirge und bis auf das Hochgebirge. *Um Br. bei Mahlen, Tarnast und Riemberg. Rosenberg bei Wachowitz. Charlottenbrunn, Fürstenstein, Sonnenkoppe. Bober u. Zacken bei Hbg. Im Rieseng. Hohe Mense. Schneeberg. Im Gesenke im Kessel etc. Czantory u. Rowinka b. Ustron.* Mai, Juni, im Geb. Juli. 2.

Wurzel abgebiessen faserig. Stängel 1 - 4' h., aufrecht mit doldentraubiger Rispe. Bltt. doppelt gedreht; Blättchen mit 3 - 7 Kerbzähnen, zart und weich. Kelchblätter meist violett. — Bltt. schmecken säss. Neuerlich officinell.

T. minus L. *T. minus* 1, 3 et 4 W. et Gr. sil. Wurzel treibt kriechende Ausläufer; Blattstiele ohne Stützblättchen; Blättchen verkehrt-, ei- oder keilförmig, 3 - 7zählig; Rispenäste gespreizt und bogig.

β. hellgrün, mit sehr breiten rundlichen stumpfkerbzähni gen Blättchen und grösseren Früchten. *T. min. β. clatum* Wimm. Fl. v. Schles.

In Grasgärten, an grasigen Ackerrändern, auf Aeckern unter der Saat und auf Rainen, an Dorfzäunen, auf buschigen Hügeln, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgebirge, sparsam und zerstreut. *Um Br. bei Leuthen, Skarsine, Heydewilzen, Koberwitz. Wohlau. Looswitz bei Bunzlau nach Schneider. Grosstein bei Oppeln. Rosenberg. Br. Berg bei Striegau. Geiersberg. β. bei Lissa, Leuthen, u. Pollenschine.* Mai, Juni. 2.

Stäng. u. Blütenäste oft sehr bogig, häufig schmutzigröth, bisw. mit grauem Reif, 1 1/2 - 3' hoch. Bltt. dreifach - gefiedert. Blättchen in der Breite und Gestalt der Zähne veränderlich, unterseits blässer bis ins Graugrüne. Früchte 1''' lang bei β. bis 1 1/2'''.

T. collinum Wallroth. *T. minus* 2 W. et Gr. sil. Wurzel faserig ohne Ausläufer; Blattstiele an den untern Knoten mit kleinen häutigen Stützblättchen; Blättchen keilfg. 3 - 5zählig; Rispe gleichmässig mit abt ehenden Aesten.

An buschigen Dämmen. Bisher mit Sicherheit nur um *Br. bei Carlowitz*, sparsam. Juni etwa um 10 Tage später als die vorige. 2.

Stäng. meist gerade, gefurcht, 1 1/2 - 3'. Blättchen unterseits graugrün. Früchte 2 - 3''' lang. Sieht der vorigen Art sehr ähnlich.

T. flavum L. Stängel gefurcht; Blättchen der untern Bltt. verkehrt-ei-keilförmig, der oberen linealisch; Blattstiele an den unteren Knoten mit kleinen häutigen Stützblättchen; Wurzel kriechend.

Auf feuchten Wiesen. Bisher nur um *Krittern und Hartlieb bei Br.* Nach Schneider auch bei *Tillendorf und Rothlach um Bunzlau*, u. nath v. Mücknusch um *Gilschwitz b. Troppau.* Juni, Juli. 2.

Wurzel innen gelb. Stängel 2 - 3' h. steif aufrecht, mit einer dichten doldentraubigen Rispe. Bltt. dicklich, gelblich-grün, matt, mit breiteren Abschnitten als die

folgende Art. Die Blüthenrispe ist bei dieser und der folgenden Art durchaus gelblich und die Blüthen an den Spitzen der Aeste gedrängt.

T. angustifolium L. Stängel gefurcht; Blättchen länglichkeilförmig oder linealisch, glänzend; Blattstiele ohne Stützblättchen; Wurzel faserig.

In feuchtem Gebüsch, an buschigen Gräben, zwischen Gesträuch an den Ufern der Flüsse und Teiche, besd. in den Weidensträuchern an der Oder, häufig doch stets vereinzelt; in der Ebene, seltner im Vorgeb. Um Br. bei *Marienau*, *Treschen*, *Oswitz* u. m. Um *Ohlau*, *Wohlau*, *Bunzlau*, *Hirschberg*, *Oppeln*, *Troppau* u. *Teschen*. Juni, Juli. 4.

Wurzel innen gelb. Stäng. 2 - 5' h., aufrecht, oft bogig, mit grosser gedrängter doldentraubiger Rispe. Bltt. grösser als an d. vorigen, aber mit schmalern Abschnitten, oberseits glänzend. Die Breite der Blattabschnitte ist sehr veränderlich von 1 - 3''' ; die obersten bisweilen fadenförmig; je breiter desto stärker glänzend; die Unterseite matt und bloss. — Die Wurzeln der beiden letzten Arten sind bitter, abführend und enthalten einen gelben Farbstoff.

3. Helleboreae. Blumen meist unregelmässig. Mehrsamige Schlauch- oder Kapsel-Früchte in einem Kreise.

Caltha L. *Schmirgel*, *Schmalzblume*. Fünf gefärbte gleichförmige Kelchblätter. Krone fehlt. Fünf bis zehn Kapseln. XIII, 7.

C. palustris L. *Sumpfschmirgel*, *Dotterblume*. Blätter herz-nierenfg., gekerbt.

Auf Sumpfboden, nassen und sumpfigen Wiesen u. Wäldern, Brüchen, an Teichrändern d. d. g. G. gemein und meist heerdenweis, so dass Strecken davon gelb erscheinen. April, Mai, auch im Sept. zum zweitemale. 4.

Wurzel büschelfaserig. Stäng. meist aufsteigend, rührig und saftig, kahl wie d. g. Pfl., a. Gr. oft purpurfarben. Bltt. gestielt; der Stiel der Stängelbltt. kürzer a. Gr. mit zwei ründlichen braunhäutigen Stützblättchen. Grosse goldgelbe Blumen. — Ist eine der ersten Frühlingsblumen. Wird nicht vom Vieh berührt. Die Blumenknospen können ein Surrogat der Kapern abgeben.

Tróllius L. *Trollblume*, *Kugelranunkel*. Fünf und mehrere gefärbte gleichförmige Kelchblätter. Kronenblätter kleiner mit einem Nagel und linealischer Platte, die am Gr. eine Honiggrube hat. Viele Kapseln. XIII, 7.

Blume kugelförmig, einzeln, gelb.

T. europaeus L. *Tr. eu.* und *asiaticus* Krock. sil. Stängel aufrecht, einblumig; Bltt. fünftheilig mit rautenförmigen dreispaltigen und tiefgesägten Zipfeln.

Auf moosigen Wiesen, Wald- und Gebirgswiesen, vorzüglich im Vor- und bis auf das Hochgebirge. Um Br. bei *Lissa*, *Riemberg*,

Bruschewitz, Ohlau, Wohlau, Oppeln, Leobschütz. Geiersberg. Charlottenbrunn, Salzbrunn, Giesmannsdorf, Rohnstock. Riesengebirge: Kesselkoppe, Iserwiese, Riesengrund. Am Peterssteine im Gesenke. Wiesen an der gr. Czantory bei Ob. Lischna. Mai, Juni, auch im Herbst zum zweitenmale. 2.

Wurzel büschelfaserig, schwarzbraun. Stängel 1 - 2' h., mit wenigen Bltt., kahl w. d. g. Pfl. Kelchbltt. hellgelb, kugelförmig-zusammengeneigt. Kronenbltt., die auch Honiggefässe heissen, kleiner, goldgelb. Früchte zusammengedrückt. Eine beliebte Zierpflanze.

Helléborus L. Niesewurz. Fünf dauernde lederartige gefärbte Kelchblätter. Kronenbltt. kleiner mit Nagel und röhriger zweilippiger Platte. XIII, 7.

Winterblumen. Blätter lederartig, fussförmig.

? **H. niger L. Schwarze Niesewurz.** Blätter nur aus der Wurzel, fussförmig; Schaft 1 - 2 blumig mit 2 - 3 eiförmigen Deckblättchen.

In Bergwäldern. Von dieser Art weiss ich mit Sicherheit keinen schlesischen Standort anzugeben; denn die von v. Mückusch herrührende Notiz, dass sie im Gesenke wachse, ist mir zweifelhaft. Blüht in unseren Gärten nach der Beschaffenheit der Witterung. Novbr., Decbr. oder Febr., März. 2.

Wurzelstock vielköpfig; innen weiss mit brauner Oberhaut, walzig mit ringförmigen Abätzen und langen starken Fasern. Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' lang, aus einer häutigen Scheide. Blattzipfel 5, 7, 9 länglich-elliptisch, über der Mitte gezähnt. Kelchbltt. weiss, dann aussen rosa-überlaufen, 1" lang. Kronenbltt. gelblich-grün. Griffel gebogen. Kapseln lederartig, 2 - 3. — Die Wurzel ist ein scharfes drastisches Mittel, in grossen Gaben als Gift wirkend, schon bei den Alten, welche *Hell. orientalis* Lamarck angewandt haben sollen, ein berühmtes Arzneimittel, das neuerlich wenig in Anwendung kommt. Erregt Entzündung der Darmhaut, Erbrechen u. a. w. Verfälscht durch *Actaea spicata* und *Adonis vernalis*.

? **H. viridis L. Grüne N.** Blätter fussförmig; 2 - 4 blumig mit getheilten Blättern am Grunde der Blütenäste.

In Wäldern. Nach v. Mückusch bei *Geppersdorf* und *Palhauetz* bei *Jägerndorf*. Im *Stadtwalde* bei *Leobschütz* nach *Schramm*. Um *Hirschberg* in der *Flachseifner Ebene*, am *Molkenbache* hinter dem *Spitzberge* nach *Nees. v. E.* März, April. 2. Auch von dieser Art, die bisweilen in Graspärten angetroffen wird, habe ich noch kein wildgewachsenes Exemplar aus Schlesien gesehen.

Stängel oft gabelspaltig. Blattzipfel länglich-lanzettlich, am Gr. ungleich gesägt. Kelchbltt. grün. Griffel aufrecht. Hat dieselben, aber etwas schwächere, Kräfte als die vorige.

Isopyrum L. Doltokke, Tolldokke. Fünf gefärbte abfällige Kelchbltt. Kronenbltt. kleiner mit kurzem Nagel und zweilippiger Platte. Kapseln zusammengedrückt. XIII, 7.

I. thalictroides L. Wurzel kriechend, treibt in Absätzen dichte Faserbüschel; Kapseln 2 - 3.

Auf lockerem Waldboden, in lichten Gehölzen, waldigen Hügellehnen und an Thalwänden, in der Hügellage der Ebene und dem Vorgebirge, zerstreut. Um Br. bei *Arnoldsmühl, Lissa, Kapsdorf*. In den *Trebnitzer Bergen* bei *Skarsine, Totschen, Ohlau, Oppeln, Suckowitz* und *Leisnitz, Leobschütz, Troppauer Park, Tul, Machova u. Mönchhof* bei *Ustron*. März, April. 2.

Stets ein Stängel, oft ohne Wurzelblatt, $\frac{1}{2}$ - 1' h. kahl wie die ganze Pflanze, a. Gr. mit zarten weissen rundlichen Scheiden umgeben, oben beblättert und in 3 - 5 einblumige Blumenstiele getheilt. Bltt. zart, gedreit; Blättchen gedreit oder dreitheilig, mit buchtig-gekerbten Zipfeln. Stengelblätt. auf kurzem Stiel, der am Gr. weisshäutige Stützblättchen hat. Kelch- und Kronenbltt. weiss.

Nigella L. Schwarzkümmel. Fünf gefärbte Kelchbltt. Fünf kleinere Kronenbltt. mit einem Nagel und zweilippiger Platte, die am Gr. eine von einer Schuppe bedeckte Honigrube führt. Fünf oder mehrere theilweise verwachsene walzige Kapseln. XIII, 7.

N. arvensis L. Wilder S. Staubbeutel mit einer Granne; Kapseln zur Hälfte verwachsen; Samen feingekörnt.

Auf Thon- und Kalkboden, auf Aeckern und Brachen, hie und da in der Ebene. Um Br. bei *Sackerau* und *Bunckey*. *Ottag* bei *Ohlau, Wohlau, Oppeln, Rosenberg, Xyrowa, Herlitz, Nierodzin b. Te.* Juli, Sept. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' h., einfach oder von unten in aufsteigend-gespreizte Aeste verloren. Bltt. fiederig-vielspaltig mit borstlich-linealischen Abschnitten. Kelchbltt. mit langem Nagel und rundlicher Platte, vorn mit einer Stachelspitze, weiss-bläulich, unterseits grüngedert. Kronenbltt. scheckig. Samen schwarz, dreikantig, von scharfem Geschmack, wie die folgende.

* **N. sativa L.** Staubbeutel ohne Granne; Kapseln bis oben verwachsen; Samen quengerunzelt.

Wird angebaut und findet sich hie und da durch verstreuten Samen verbreitet. Juni, Juli. 2.

Stängel 1 - 2' h., behaart, aufrecht. Kelchbltt. bläulich-milchweiss. Die Samen schmecken scharf-stechend und werden bisweilen als Gewürz benutzt.

Anmerk. **N. damascena** mit blass himmelblauen Blumen, die von einer feinblättrigen fast gitterartigen Hülle umgeben sind, unter dem Namen *Jungfer im Grünen* eine bekannte Zierpflanze, findet man hie und da ausserhalb der Gärten.

Aquilegia L. Akelei. Fünf gefärbte Kelchblätter. Fünf trichterförmige, nach unten in einen hohlen Sporn verlängerte Kronenbltt. zwischen den Kelchbltt. Fünf walzige unverwachsene Kapseln. XIII, 5.

A. vulgaris L. Glockenblumen. Die Spornen an der Spitze nach innen hakig; Bltt. doppelt-dreizählig.

In Wäldern und Waldwiesen der Ebene und des Vorgebirges, hie und da, aber zerstreut und nicht sehr häufig. *Um Br. bei Wirrwitz, Sibyllenort, Süßwinkel, Hasenau, Hartmannsdorf bei Bunzlau, Grosstein bei Oppeln, Gleiwitz, Rosenberg, Geiersberg. Um Kynau und Charlottenbrunn, Zeiskenberg, Cudowa. Am Kynast und bei Schreibersbau, Spachendorf, Zossen, Jägerndorf bei Trop. und um Teschen.* Mai, Juni. 2.

Knotiger Wurzelstock. Stängel aufrecht, oben ästig, 1 - 3' h., weichhaarig. Wurzelblt. langgestielt; Blättchen dreilappig gekerbt, mit weichhaarigen Adern. Blumen violett-blau, selten fleischroth oder weiss. Wird in Gärten als Zierpflanze gehalten, in mannichfaltigen Spielarten, die durch Metamorphose der Kelch- und Kronenblätter und Farbenwechsel entstehen.

Delphinium L. Rittersporn. Fünf gefärbte Kelchblt.; das obere gespornt. Kronenblt. entweder vier, wovon die beiden oberen gespornt und damit in den Kelchsporn eingesenkt sind, oder in ein einziges gesporntes Blatt verwachsen. Eine bis fünf walzige unverwachsene Kapseln. XIII, 2.

D. Consolida L. Acker-R. Krone einblättrig; Blätter dreizählig-vieltheilig mit linealischen Abschnitten; Kapseln einzeln.

Unter der Saat und auf Brachen in der Ebene und dem Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Sommer. ☉.

Stängel 1 - 3' h., oben ästig. Blüthen in armbildigen Trauben, aurblan. Die Blüthen dienen den Conditoren zum Färben des Zuckers.

D. elatum L. Hoher R. Krone vierblättrig; die beiden unteren Kronenblt. härtig; Blt. handförmig-5-spaltig mit länglichen dreispaltigen Zipfeln; Kapseln zu drei.

In den Gründen und an den pflanzenreichen und waldigen Lehnen des Hochgebirges bis in die Region des Vorgebirges herabsteigend. *Im Riesengebirge selten, im Elbgrunde bei Agnetendorf, Krummhübel, an der Kesselkoppe. In der Gr. Glatz am Schneeberge, im Wölfelsgrunde, bei Reinerz. Im Gesenke sehr häufig am Altvater, im Kessel, und bis Karlsbrunn herab.* Juni, Juli. 2.

Höhe 3 - 5', bald kahl bald feinhaarig, auch graublau bereift, mit einfachem und traubig-ästigem Blütenstand. Blt. herabg., gestielt, die oberen sitzend. Blüthen aurblan, auch heller und weiss-gescheckt mit runzlichem, schmalen oder verdickten, geraden oder gekrümmten Sporn.

Acónitum. Eisenhut, Sturmhut. Fünf gefärbte Kelchblt., das obere helmförmig-gewölbt. Fünf Kronenblt., die beiden oberen kappenförmig unter dem Helm versteckt. Drei oder fünf walzige unverwachsene Kapseln. XIII, 2.

A. Napellus L. A. pyramidale W. et Gr. Fl. sil. A. variabile Wimm. Fl. v. Schles. Die Honiggefässe auf einem bogigen Nagel wagerecht, nickend, der Sporn etwas zurückgekrümmt; die jüngeren Früchte auseinanderstehend; Samen scharf-dreikantig mit stumpfen Runzelfalten auf dem Rücken.

In den Wäldern und Gründen und an den pflanzenreichen Lehnen des Hochgebirges. *Im Riesengeb. sehr verbreitet in den Schneegruben, um die Teiche, Riesengrund; an der Kesselkoppe, Elbwiese und Elbfall u. s. w. In der Gr. Glatz um Reinerz und Cudowa an der h. Mense u. dem Schneeberge. Im Gesenke sehr häufig. In den Schluchten d. Baranio bei Teschen an den Quellbüchen der Weichsel. Juli, Aug. 2.*

Wurzel zwei rübenfg. Knollen. Stängel 2 - 3' h., meist gerade, aufrecht, einfach, oben in eine einfache oder mit kleinen Nebentrauben versehene dichte lange Blütentraube endigend; und daselbst kahl oder weichhaarig. Bltt. kurzgestielt, dreitheilig, der mittlere Zipfel dreitheilig mit gespaltenen Abschnitten, die seitlichen ungleich dreitheilig, fast fassförmig; die Abschnitte sind bald schmaler und von einander entfernt bald breiter und einander genähert. Nach oben gehen sie in dreispaltige und ungetheilte linealische, die Blüten begleitende Deckblätter über. Blumenstiele mehr oder weniger abstehend. Kelche hellblau oder meist satt violettblau. Der Helm fast halbkugelig in einen sehr kurzen oder gar keinen Schnabel auslaufend, mit sählig-geradlinigem oder schief aufsteigendem Unterrand. Die kappenförmigen Kronenbltt. sind oben abgerundet oder endigen in einen vorgekrümmten Kopf. Die drei unteren Kronenbltt. sehr klein linealisch, oft mangelnd. Die Blumen sind in der Wildniss sehr zur Verkrüppelung geneigt. — Die Pflanze ist sonach in manchen unwesentlichen Dingen veränderlich, jedoch der Hauptsache nach sehr beständig, und man bedarf heutiges Tages keiner Apologie mehr, wenn man die vielen aufgestellten Arten unter dem alten probehaltigen *A. Napellus* vereinigt.

A. Stoerkianum. Reichenbach. *A. Cammarum* Wimm. Fl. v. Schles. Die Honiggefäße auf einem oberwärts bogigen Nagel schief-geneigt; der Sporn hakenförmig; die jüngeren Früchte nach innen zusammenneigend; die Samen scharfdreikantig, mit scharfen Runzelfalten auf dem Rücken.

An denselben Orten wie die vorige, aber sehr selten. Ich habe diese Art nie selbst gesammelt; Günther besass sie von Kaiser *aus dem Riesengrunde*, Schramm *aus dem Gesenke bei Carlsbrunn* und Beiner *bei Charlottenbrunn* (ob hier wild?). Diese Art wird dagegen gewöhnlich in den Gärten gefunden. Juli, Aug. 2.

Gleicht der vorigen sehr; der Helm ist etwas höher und die Blattabschnitte etwas breiter. Auch oft mit blau und weiss gescheckten Blumen. — Alle *Aconitum*-Arten sind giftig. An der vorliegenden machte Stoerk seine berühmten Versuche. Man gebraucht besonders ein Extract aus den Blättern in der Arzneikunde; die Wurzel wirkt noch stärker. Es gehört zu den scharf-narcotischen Mitteln.

A. variegatum L. Die Honiggefäße aufrecht oder schief-geneigt, der Sporn hakenfg.; die jüngeren Früchte parallel; die Samen scharfdreikantig quergefaltet; die Falten auf dem Rücken flügelhäutig wellig.

α. gracile. Stängel bogig, schwach; Blütenstand locker; Helm kegelfg. mit kurzem Schnabel.

β. macranthum. Stängel steif, aufrecht; Blütenstand gedrängt; Helm weit-glockig, fast überall gleich breit mit sehr kurzem Schnabel.

γ. nasutum. Helm kegelfg. mit vorgezogenem niedergebogenem Schnabel.

δ. aduncum. Helm kegelfg., vorn über dem Schnabel ausgeschweift, mit vorgezogenem aufsteigendem Schnabel.

In Wäldern, auf Waldwiesen zwischen Gebüsch, in Gebirgsthälern und Schluchten. Nur selten in der Ebene, z. B. *β. im Walde bei Lissa und bei Ohlau*. Häufiger im Vorgebirge: *um Silsterwitz, Charlottenbrunn, am Hornschlosse, um Reinerz, Kupferberg, Hirschberg am Bober, um Bunzlau bei Sirckwitz, Würbenthal und Thomasdorf im Gesenke. Schneeberg. Hohe Mense. In den tieferen Gründen des Riesengebirges z. B. im Elbgrunde.* Juli, Aug. ♀.

Diese Art, welche früher gewöhnlich *A. Cammarum* hiess, wie auch in den schlesischen Centurien, ist durch den höheren Helm, dessen Wölbung die Honiggefässe nicht erreichen, und die breiteren Blattabschnitte kenntlich. Man findet sie, besonders in Gärten, oft mit weiss und blau gescheckten Blumen, und dann in der unter ♂ angegebenen Form; darauf bezieht sich eigentlich der Linnéische Name. Die Gestalt des Helms ist besonders sehr veränderlich.

A. Lycoctonum L. *Gelber E. A. Vulparia* Reichb. W. et Gr. Fl. sil. Die Honiggefässe aufrecht; der Sporn fädlich, kreisförmig zurückgerollt; die Samen stumpf-dreikantig mit scharfem Kiel, auf allen Seiten runzel-faltig.

An waldigen, etwas feuchten Gebirgslehnen. *Im Gesenke am Leiterberge und im Kessel*, ausserdem nach RuM *bei Kunau, Hillersdorf und Wiegstein.* Juli, Aug. ♀.

H. 2-4'. Dichte Blüthenähre, an deren Grunde 1-4 aufsteigende kleine Blüthenäste. Blüth. handfg., 5-7theilig, mit keilfg.-länglichen Zipfeln. Kelch schwefelgelb.

Resedaceae De Cand.

Kelch dauernd 4-6theilig. Kronenblüth. geschnitten. Staubgef. über zehn, auf dem Fruchtboden. Fruchtknoten oben geöffnet, einfächerig, mit fadenförmigen wandständigen, fest verwachsenen Samenhaltern zwischen den Klappen.

Reseda L. *Resede.* 10-24 Staubgefässe. Drei bis sechs Griffel. Frucht becherförmig. XI, 3.

R. lutea L. *Gelbe R. Wau.* Blätter am Stängel doppelt-fiederspaltig; Kelch 6theilig.

An Weg- und Landstrassenrändern, auf steinigen Plätzen. Bei uns nur hin und wieder vereinzelt gefunden, dagegen im benachbarten Böhmen häufig. *Bei Rengersdorf in der Gr. Glaz, Mistowitz und Grosstein b. Oppeln (Grabowski).* Juli. ☺.

R. luteola L. *Wau.* Blätter lanzettlich, am Grunde mit einem Zahn; Kelche 4theilig.

An Wegen einigemal *um Br. in der Schweidnitzer Vorstadt und bei Hundsfeld* von Krause, bei *Bunzlau* von Schneider gefunden; vermuthlich durch Zufall ausgesät und verwildernd. Juli, Aug. ☺.

Polygaleae Juss.

Kelch fünfblättrig; die beiden inneren Bltt. grösser und gefärbt. Kronenblätter unregelmässig, unter einander oder mit der Staubfadenröhre verwachsen. Die Staubfäden verwachsen. Acht einfächerige in ein Loch sich öffnende Staubbeutel. Kapsel zweifächerig, zweiklappig mit zwei hängenden Samen.

Niedrige am Grunde strauchartige Gewächse mit wechselständigen Blättern ohne Stützblätter, auf Wiesen.

Polygala L. Kreuzblume. Die beiden inneren Kelchbltt. flügelartig. Das untere Kronenbl. gekielt mit einem kammartig getheilten Mittellappen. Kapsel zusammengedrückt. XVII, 2.

P. vulgaris L. Natterblümchen, Tausendschön. Wurzelbltt. elliptisch; Blüthentraube endständig vielblumig; Deckblätter überragen nicht die Spitze der Traube vor dem Blühen; die Seitennerven der Kelchflügel ästig-geadert und oben durch Queradern verbunden.

Auf trocknen Wiesen und Triften, an grasreichen Dämmen und Rainen, in lichten Gehölzen und Haiden, an steinigen Hügeln, von der Ebene bis ins Hochgebirge. Durch das ganze Gebiet, gemein. Sommer und Herbst. 2.

* Stängel rasenförmig aus der spindeligen Wurzel, stets schief oder mit der unteren Hälfte niederliegend, $\frac{1}{2}$ ' lang, mit linealisch-lanzettlichen oft einseitwendigen Blättern besetzt. Die Deckblattspitzen ragen kaum über die Spitze der Traube hervor. Kelchflügel und Krone azurblau, lichtblau, milchweiss, selten lila-purpurf. oder rosafarben. Die stehbleibenden und die Kapsel umgebenden Kelchflügel verbleichen bei dieser und den folgenden Arten in das Grüne.

P. comosa Schkuhr. Wurzelbl. elliptisch; Blüthentrauben endständig vielblumig; Deckblätter überragen die Spitze der Achse vor dem Blühen als ein kleiner Schopf; die Seitennerven der Kelchflügel ästig-geadert und oben durch Queradern verbunden.

Wie die vorige, oft in ihrer Gesellschaft, und fast eben so häufig. Blüht ein wenig früher als die vorige.

Ist der vorigen Art sehr ähnlich. Die Stängel meist nur am Grunde aufsteigend, dann aufrecht; daher bildet sie einen dichteren Busch. Kelchflügel und Kronen gleich häufig azurblau und hellpurpurroth, seltener weisslich. Die Breite der Flügel zur Zeit der Kapselreife, und die Farbe der Blüthen ist bei allen veränderlich.

P. amara L. Bittere Kr. Wurzelbl. verkehrt-eifg., rosettenförmig; Blüthentrauben endständig vielblumig; die Seitennerven der Kelchflügel ästig-geadert und oben nicht durch Queradern verbunden.

Auf feuchten und sumpfigen, auch torfhaltigen Wiesen, von der tieferen Ebene bis an das Hochgebirge, wahrscheinlich durch das ganze Gebiet zerstreut und ziemlich selten. Um Br. bei Koberwitz. Seifersdorf bei Ohlau. Gr. Tschirnau bei Guhrau. Gröditzberg u. Hosenitz b. Bunzlau nach Sch. Häufig um Oppeln bei Sakrau,

Lenschin, Derschau. Um Troppau. Ustron bei Teschen. Auf der Iserwiese nach Tausch. Mai, Juli. 2.

Kleiner als die vorigen mit dichteren und breiteren Blättern. Blumen kleiner, vom dunkelblauer, häufig milchblauer und milchweisser Farbe. Nach der Tracht, der Grösse der Blumentheile und Gestalt der Kapseln hat man mehrere Schein-Arten unterschieden. — Diese Pflanze besitzt einen eigenthümlichen bitteren Extractivstoff, daher als tonisches Mittel als *Hb. Polygalae amarae* officinell.

Fumariaceae DC.

Zwei abfällige Kelchblätter. Krone unregelmässig; vier mehr oder weniger verbundene Kronenblätter, davon eins oder zwei gespornt; die beiden anderen seitlichen an der Spitze verbunden. Sechs Staubgefässe, je drei und drei unten verwachsen, ein Bündel hinter dem oberen, das andere hinter dem unteren Kronenblatt: die seitlichen Staubbeutel einfächerig. Fruchtknoten einfächerig, mit zwei fädigen Samenhaltern an der oberen und unteren Wand. Frucht eine Schote oder ein Nüsschen. Samen mit fleischigem Eiweiss.

Krauter mit wässrigem Saft. Vieltheilige Blätter. Sühlig-stehende Blumen.

Corydalis Dillen. *Hohlwurz*. Das obere Kronenblatt gespornt. Frucht: eine zusammengedrückte vielsamige Schote. XVII, 1.

Wurzel knollig. Waldpflanzen.

C. cava Schweigg. und Koerte. *Fum. bulbosa* α. Linn. Stängel zweiblättrig am Gr. ohne Schuppen. eine mehrblumige Aehre tragend; Deckbltt. ungetheilt; Sporn walzig an der Spitze gekrümmt.

In lichten Gehölzen, Hainen, Laubwäldern, besd. wo Haselnuss, Birke und Erle vermischt das Unterholz bilden, in der Hügelgegend der Ebene und dem Vorgebirge, verbreitet und heerdenweis. *Um Br. bei Wildschütz, Kapsdorf, Arnolds Mühl, Lissa. Um Ohlau, Wohlau, Oppeln. Im Vorgeb. am Zobten, um Charlottenbrunn, Fürstenstein, Wartha, Schreiberskau, Oberschmiedeberg, Czantory b. Ustron. März, April. 2.*

Wurzelknollen hohl. Kraut kahl, schwach graugrün. Stäng. 1' h., einfach; Wurzelbltt. fehlen oft. Bltt. doppelt-dreizählig, eingeschnitten mit stumpfen Zipfeln. Blumen schmutzig-purpurfarben oder gelblichweiss, letztere wohlriechend. — Enthält einen eigenthümlichen alkalischen Stoff.

C. fabacea Pers. *Fumaria bulbosa* β. Linn. Stängel zwispaltig-ästig, mit einer Schuppe unter der Theilung; armbliühige Blumenähren; Deckbltt. ungetheilt; Sporn kegelfg. gerade.

In lichten Gehölzen, an belaubten Dämmen und Hügellehnen, in der Hügelgegend der Ebene und im Vorgebirge. *Um Br. bei Lissa, Trebnitzer Hügel bei Magnitz, Skarsine, Totschen. Schosnitz bei Canth. Ohlau. Wohlau. Charlottenbrunn, Fürstenstein u. Freiburg,*

Rothlach u. Groeditz bei Bunzlau nach Schm. Landskrone. Leobschütz. Am Bober bei Hirschberg n. Nees v. E. Am Teufelsgräbchen nach Elsner. Um Teschen nach Kotschy. März, April. 2.

Wurzelknollen dicht. Stäng. 4-5" hoch, zweiblättrig; Wurzelblt. fehlen. Blüthen unrein purpurfarben kleiner als b. d. vorigen.

C. solida Smith. *C. Halleri* W. et Gr. Fl. sil. *Fumaria bulbosa* γ Linn. Stängel einfach mit einer Schuppe am Grunde; 6-8blumige Blumenähren; Deckblt. fingerförmig-getheilt; Sporn verdickt, fast gerade.

In Gehölzen. Bisher nur im südöstlichen Schl. um Leobschütz, Wehowitz, Gr. Herlitz, Jägerndorf, Spachendorf und Ustron bei Teschen. März, April. 2.

Etwas grösser als die vorhergehende Art. Die Fruchtsiele sind so lang als die Kapsel, da sie bei der vorhergehenden kaum halb so lang sind.

Fumaria L. *Erdrauch*. Das obere Kronenblatt gespornt. Frucht: ein einsamiges kugeliges Nüsschen. XVII, 1.

Einjährig.

F. officinalis L. *Feldraute, Taubenkopf*. Kelchblt. dreimal kürzer als die Krone, breiter als der Blumenstiel; Nüsschen rundlich, eingedrückt; Blattzipfel linealisch-länglich.

Auf Acker- und Gartenland, an Ackerrändern, auf Gemüsäckern, in Dörfern an Hecken und Zäunen, nicht überall aber häufig, wahrscheinl. d. d. g. G. bis in das Vorgeb. Sommer u. Herbst. ☉.

Bald aufrecht, bald liegend, 1' und höher. Blt. graugrün, bei allen Arten doppelt-siedrig-federspaltig, weitläufig und mit Abschnitten, die nach verschiedenen Richtungen liegen. Kronen rosenroth, a. d. S. purpurfarben, 2-3" lang. Die verlängerte Fruchtähre locker; Nüsschen wie Hirsekörner oben mit einer seichten Grube. — Ist schleimig-bitter und offtnehl.

F. Vaillantii Loiseleur. Kelchblt. winzig, schmaler als der Blumenstiel; Nüsschen kuglig, oben mit schwachem Eindruck und einer kleinen Spitze; Blattzipfel linealisch.

Wie die vorige, besd. auf Kalkboden. Zuerst von Grabowski am Schmelzberge bei Cudowa, dann bei Oppeln unter dem Getraide gefunden. Um Br. bei Wirrwitz. Vielleicht häufiger, doch verwechselt. Sommer. ☉.

Der vorigen, sehr ähnlich, meist kleiner und zarter, sehr graugrün. Blumen meist blässer, oft fleisch- und weisslich-roth.

F. capreolata L. Kelchblt. halb so lang als die Krone; Nüsschen kugelig; Blattzipfel länglich-eifg.; Stängel klimmend.

An Hecken. Bisher nur an Mauern und Gärten in Warmbrunn, zuerst von Krocke und Günther beobachtet. Sommer. ☉. Wahrscheinlich ist nicht nur diese, sondern auch die beiden vorigen Arten nicht ursprünglich einheimisch, sondern mit der Cultur eingewandert.

Höher als die vorigen. Die Blattstiele gehen oft in Ranken aus. Kronenblt. hellgelb, an d. Sp. schwarzroth. Fruchtsiele oft zurückgeschlagen.

Papaveraceae Juss.

Zwei abfällige Kelchbltt. Vier gleichförmige Kronenblätter. (Vier oder) Viele Staubgefäße meist in vier Büschel gesondert. Frucht eine Art Schote, einfächerig, mit zwei oder mehreren Klappen; zwei oder mehrere wandständige Samenhalter zwischen den Klappen, oder in Form unvollständiger Scheidewände tiefer in die Frucht hineinragend, selten in der Mitte verbunden. Samen mit geradem oder schwach gekrümmtem Keim, fleischigem Eiweiss und fettem Oel.

Kräuter mit wechselständigen gelappten oder vielschlitzigen Blättern und gefärbtem ätzendem oder narkotischem Saft.

Papaver L. Mohn. Die Frucht ist eine kapselförmige einfächerige Schote, welche unter der bleibenden Narbe in zahlreichen Oeffnungen als kurzen Klappen aufspringt, mit breiten tieflüneinragenden Samenhaltern. Narbe sitzend strahlig. XIII. 1.

Der Kelch fällt mit dem Aufklappen der Blume ab. Weisser Milchsaft

P. Argemone. Keulen-M., Sand-M. Staubfäden nach oben verbreitert; Schote keulenförmig borsthaarig.

Unter der Saat und auf Brachen, auf Sand- und Lehmboden d. d. g. G. in der Ebene und dem Vorgebirge häufig. Mai, Juli. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h., einzeln einfach wenigblumig auf Sandboden, oder mehrere aufsteigende auf Lehmboden, beblättert mit abstehenden entfernten Borsten besetzt. Bltt. doppelt fiederspaltig mit lineal.-lanzettlichen Zipfeln. Kronenbltt. blass scharlach- oder mennigroth, verkehrt-eifg., am Gr. mit einem schwarzen Nagelfleck.

P. Rhoeas L. Klapperrosen, Klatschrosen. Staubfäden pfriemlich; die Lappen der Narbe decken einander theilweis; die Schote verkehrt-eifg., am Gr. zugerundet; Kronenbltt. ohne Nagel.

Unter der Saat, besd. unter Waizen, gemein. Mai, Juli. ☉.

Stäng. 1-3' h., mit entfernten abstehenden Borsten besetzt. Bltt. fiederspaltig-eingeschnitten oder gesägt. Die Blumenstiele sind bald mit abstehenden, bald mit angedrückten Haaren bekleidet. Kronenbltt. fast kreisrund, scharlachroth, am Gr. mit schwarzem Fleck. Kapsel blan bereift. — Die Kronenbltt. haben reizmildernde Eigenschaften und sind daher ein Bestandtheil des Brustthees; auch bereitet man von ihnen einen Syrup und gebraucht sie zum Färben.

P. dubium L. Staubfäden pfriemlich; die Lappen der Narbe gesondert; Schote keulenförmig, nach d. Gr. hin verschmälert, kahl; die Kronenbltt. mit kurzem Nagel.

Auf sandigen Brachen und Sandplätzen. Bis jetzt nur selten in einzelnen Exempl. zuerst von Krockner! bei Kl. Kletschkau, dann um Schwoitsch und Sakerau von Krause gef. Nach Lehmann häufig um Creuzburg. Juni. ☉.

Stängel 1 - 3' h., oben ästig, mit abstehenden Borsten besetzt. Die Blumenstiele mit angedrückten Borsten besetzt. Bltt. doppelt-fiederspaltig mit entfernt gezähnten Zipfeln. Kronenbltt. blass-schwarzroth oder gelblichweiss mit schwarzem Nagelleck.

* *P. somniferum* L. *Garten-M.* Staubfäden nach oben verbreitert; Schote fast kugelig; Bltt. stängelumfassend unregelmässig eingeschnitten-gezähnt; Kronenbltt. ohne Nagel.

Stammt aus *Kleinasiën* und wird bei uns angebaut. Juli, Aug. ☉.

Graugrün. Man baut zwei Varietäten, mit weissen, und mit lilarothen mit schwarzem Nagelleck gezeichneten Kronenbltt. Bisweilen bleibt die Schote stets geschlossen. — Der durch Aufritzen der unreifen Schoten heraustretende Milchsaft giebt getrocknet das Opium, eines der wirksamsten Arzneimittel und Berausungsmittel der Orientalen, welches in kleineren Gaben beruhigend und schlafmachend, in grösseren aber als ein narkotisches Gift wirkt.

Chelidonium L. *Schellkraut, Schellwurz.* Die Frucht ist eine lange zweiklappige Schote, deren Klappen sich von unten nach oben öffnen. Zwei in eine falsche Scheidewand vereinigte Samenhälter. *XIII, 1.*

Gelber Milchsaft.

Ch. majus L. Bltt. fiederspaltig mit rundlichen buchtig-gezähnten Zipfeln; Blumen schirmförmig gestellt.

An bebauten und unbebauten Plätzen, besonders in der Nähe der Städte und Dörfer, in Gärten, an Hecken, Zäunen, auf Dächern, sehr verbreitet und häufig. Mai, Aug. ☉.

Stängel 2 - 3' h., aufrecht, mit zerstreuten Haaren, blaugrau bereift. Kelch gelblich. Kronenbltt. gelb. Bltt. weich, schnell verwelkend. — Bei dem Zerschneiden irgend eines Theiles strömt der orangegelbe Saft reichlich vor, dessen Bewegung im Inneren eigener Gefässe namentlich C. H. Schultz beschrieb. Der Saft ist scharf und äzend, wird daher in der Medicin äusserlich und innerlich angewandt.

Cruciferae Jussieu.

Vier Kelchblätter. Vier Kronenblätter mit Nägeln. Sechs Staubgefässe: je ein Paar längere hinter den äusseren, und je ein kürzerer hinter den inneren Kelchblättern. Frucht eine zweiklappige zweifächerige Schote, mit zwei durch eine zarte Scheidewand verbundenen zwischen den Klappen stehenden Samenhältern, oder eine Gliederschote, oder ein Nüsschen. Samen ohne Eiweiss mit gekrümmtem Keim.

Kräutartig, selten Stauden oder niedrige Sträucher. Blätter wechselständig. Blumen endständig in Strässen oder Trauben. — Alle enthalten eine flüchtige Schärfe die bald in den Samen, bald in der Wurzel mehr hervortritt, und als Reiz auf die Haut und Verdauungswerkzeuge angewandt wird; daher mehrere als Gewürz und Gemüse angebaut werden. Einige sind weit verbreitet; manche lieben die Nähe menschlicher Wohnungen; einige nur im Vorgebirge, wenige im Hochgebirge. Das Gebiet ist arm

Wimmer's Flora.

an Arten in Vergleich mit Böhmen und dem westlichen Deutschland. Viele einjährig. Dieser Familie entspricht die fünfzehnte Klasse Linnés.

1. *Thlaspideae*. Schote kurz mit kahnförmigen Klappen und schmaler Scheidewand; die Keimblätter liegen mit dem einen Rand am Würzelchen.

Thlaspi L. Pfennigkraut. Schote oval, oben ausge- randet, mit zwei- oder mehrsamigen Fächern. Staubgefäße ohne Zahn, die beiden kürzeren mit zwei Honigdrüsen am Grunde. xv, 1.

T. arvense L. Acker-Pf. Stängelbl. länglich am Grunde pfeilförmig; Samen runzlich.

Auf Saat- und Gemüseäckern, Gartenbeeten, Dung- und Schutt- haufen, Mauern und Dächern, durch d. g. G., zahlreich. Mai, Herbst. ☉.

Stängel nur oben ästig, 1' hoch. Kraut graugrün, etwas fettig. Lange Fruchtföhren mit bogenförmigen Stielen. Klappenwände durchscheinend. Fächer vielsamig. — Das Kraut riecht schwach nach Knoblauch.

T. perfoliatum L. Stängelbl. herzförmig, Samen glatt.

Auf Aeckern, in Gärten und auf Mauern, vielleicht nur verwil- dert. Nur bei *Cudowa* und bei *Oppeln* von Grabowski gef. Bei *Teschen* nach Kotschy. Mai. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' hoch. Fruchtsiele söhlig. Fächer viersamig. Im Uebrigen w. d. vorige.

Anmkg. *Thl. alpestre*, ausdauernd mit vielköpfiger Wurzel und rasenförmigen Stän- geln, von v. Mückensch bei *Briesau* und *Wagstadt* im *Troppaischen* ange- geben, ist nicht wieder gefunden worden und zweifelhaft.

Teesdalia R. Brown. Teesdalie. Schote oval oben aus- gerandet; Fächer zweisamig. Staubgefäße ohne Zahn am Grunde mit flachen Schuppen. xv, 1.

Blätter am Boden rosettenförmig.

T. nudicaulis R. Br. Bauernsef. Iberis nud. L. Ungleiche Kronenblätter.

Auf reinem Sandboden in Haiden, Kiefer- und Birkenwäldern, Sandäckern durch d. g. G., auch im Vorgeb., meist in grosser Menge, aber stellenweise. Um *Br. Karlowitz*, *Paschkowitz*, *Lissa*, in den *Trebnitzer Bergen*. *Wohlau*, *Bunzlau*, *Beuthen a. O.*, *Ohlau*, *Oppeln* und durch ganz *Ober-S.* Mai. ☉.

Blätter sitzen auf der Wurzel, spatelförmig, meist schrotsägeförmig. Stängel 1-3' aufrecht, oder mehrere bogig-aufsteigend, fast blattlos, einfach, 2-6" lang. Blumen klein weiss.

Die verwandten *Iberis umbellata*, *amara* mit schuppenlosen Staub- gef., einsamigen Fächern und grossen äussern Kronenblättern werden in Gärten als Zierpflanzen gezogen und verwildern hier und da.

Biscutella L. Brillenschote. Schote platt, beiderseits ausgerandet; Klappen kreisförmig ein Doppelschild darstellend; Fächer einsamig. XV, 1.

Kronen gelb.

B. laevigata L.

Auf Sand in Kieferwald in der Hügel-Ebene, bisher nur v. Mückusch bei Wagstadt unweit Troppau und von Hermann im Kottwitzer Walde bei Br. gefunden. Mai, Juni. $\frac{1}{2}$. Anderwärts bis auf die Alpen und an die Schneegränze.

H. 1-1 $\frac{1}{2}$ '. Wurzel stockig, oft vielköpfig. Bltt. a. d. W. länglich-lanzettlich gezähnt, bei uns stets dichthaarig. Stängel unten mit einigen am Grunde halbumbfassenden Blättern, oben in blüthenährentragende Aeste zertheilt. Kronenbl. schwefelgelb matt. Die Fruchtschilde lösen sich von der griffeltragenden Axe.

2. Lepidineae. Schote kurz mit kahnförmigen Klappen und schmaler Scheidewand. Keimblätter ungekielt, dem Würzelchen aufliegend. — Kr. klein, weiss.

Lepidium L. Kresse. Schote eiförmig od. rundlich; Fächer einsamig; Klappen gekielt. XV, 1.

L. Draba L. Schoten herzförmig, ungeflügelt; Bltt. länglich, gezähnt, die stängelständigen pfeilförmig.

An Wegen und Ackerrändern in der Ebene. Bisher nur bei Troppau von v. Mückusch um Jägerndorf, Briesau und Jungferndorf, u. um Lehmgruben bei Br. auf Dunghaufen von Schummel gefunden. Schwarzbach b. Hbg. nach N. v. E. Sommer. $\frac{1}{4}$.

H. 1'. Der Blütenstand ist eine umgekehrte Pyramide. Kr. klein, weiss.

L. sativum L. Garten-K. Schoten rund-eiförmig, geflügelt, aufrecht-angedrückt; untere Blätter einfach oder doppelt gefiedert.

Wird in Gärten gebaut, und verwildert hie und da. $\odot$

Scharf; Gemüs zum Salat.

L. campestre R. Br. Feld-Kr. Thlaspi camp. L. Schoten punktiert, eiförmig, von der Mitte an breit geflügelt; Bltt. länglich, untere buchtig, obere gezähnt, am Grunde pfeilförmig.

Auf Lehm- und Thonboden, an trocknen Dämmen, Ackerrändern, auf Brachen, durch d. ganze Gebiet, zerstreut aber häufig und meist heerdenweise. Um Br. bei Scheitnich, Oswitz, Barteln u. s. w. Sommer. $\odot$.

H. bis 1'. Steif aufrecht, oft röthlich angelaufen. Stängel dicht beblättert nebst den Bl. fein weichhaarig; oben mit 0- vielen ährentragenden Aesten. Kr. weisslich, klein.

L. ruderale L. Stink-K. Schoten rundlich-eiförmig, a. d. Spitze schmalgeflügelt, abstehend; untere Bltt. einfach oder doppelt fiederspaltig; nur zwei Staubgefässe.

Fast nur um menschliche Wohnungen, an Zäunen, Hecken, We-

gen, Mauern, auf Dächern, und in den Gassen der Städte. Um Breslau überall; wird aber hie und da wie um *Bunzlau* u. *Sprottau* vermisst. Sommer und Herbst. ☉.

II. bis 1'. Der Stängel löst sich von unten oder von der Mitte in angesperrte Aeste auf. Sowohl die Kronenblätter als auch vier Staubgef. fehlen. — Scharf und riecht widerlich. In Busstand Hausmittel gegen Wechselieber.

Capsella Medikus. Täschelkraut. Schote dreieckig; Klappen ungeflügelt. xv, 1.

C. Bursa pastoris Mönch. Hirtentäschel. Thlaspi B. p. L. Schoten verkehrt-eiförmig dreieckig.

Auf bebautem und unbebautem Land, Aeckern, Brachen, Triften, Grasplätzen, an Wegen, Häusern, auf Mauern. Fast die gemeinste Pflanze, welche das ganze Jahr selbst bei —1° u. 2° blüht. ☉.

Blätter oft rosettenförmig am Boden, länglich-lanzettlich, selten ganzrandig, meist schrotsägeförmig, bisweilen fiederspaltig. Bemerkenswerth Var. apetal: ohne Kronenabl. mit 10 Staubgef., indem die Kronenabl. in Staubgef. verwandelt sind.

3. Synclistae. Schoten kurz, rundlich, nicht aufspringend, mit einsamigen Fächern.

Coronopus. Allione. Krähenfuss. Schote zusammengedrückt nierenförmig zweifächerig; Fächer einsamig. Keimblätter aufliegend in d. Mitte zurückgeschlagen. xv, 1.

Kr. weiss.

C. Ruellii All. Samenkresse. Cochlearia Cor. L. Senebiera Cor. Poiret. Schoten netzaderig-kämmig, in winkelständigen Trauben; Bltt. fiederspaltig; Stängel gestreckt.

Bei uns nur an einer Stelle zwischen kurzem Grase auf einem Holzplatze vor dem Oderthore am Oderufer von Schummel entdeckt. Aug., Oct. 2.

Dicke, fast holzige am Boden liegende ästige Stängel mit kurzen Blatt- u. Blüthentrieben; die Fr. zuletzt knäufelförmig gehäuft. Länge ½-1'. — Sonst officinell *Herba Cor.*

Isatis L. Waid. Schote flach-zusammengedrückt länglich, einfächerig, einsamig. Keimbltt. aufliegend. xv, 1.

Kr. gelb.

* **I. tinctoria L. Färber-W.** Schoten keilförmig.

Heimat im westlichen u. südlichen Deutschland; bei uns gebaut. Einmal an der *alten Oder* verwildert von Schummel gefunden. ☉. Mai, Juni.

Stängel 1-2' hoch. steif aufrecht oben in eine Doldentraube gelber Blüthen endigend. Bltt. graugrün, am Stängel pfeilförmig. — Enthält Indigostoff.

Neslia Desv. Neslie. Schote kuglig, einfächerig, einsamig, Keimbl. aufliegend, flach. xv, 1.

Kr. gelb.

N. paniculata Desv. Leindotter. Myagrurn p. L., Alyssum p. Willd., Rapistrum p. Gärtner.

Auf Lehm- und Thonboden, unter allerlei Saatfrüchten, auf Brachfeldern, d. d. g. G., auch im Vorgeb. häufig. Sommer bis Herbst. ☉.

Steif, aufrecht, oben ästig, mit langen lockeren Fruchtähren. Stängel von Sternhaaren scharflich. Bltt. länglich-lanzettlich, pfeilförmig. — Bei dieser und d. vorigen Sippe wird die Frucht einfächerig durch das Schwinden der Scheidewand. Aehnlich sind die *Camelineae*, deren Früchte aber aufspringen.

4. Lomentaceae. Die Schote der Länge nach gegliedert, löst sich in einsamige rundliche Glieder.

Raphanus L. Rettich. Schote länglich aus einem oder mehreren länglich-runden Gliedern. Keimblätter gekielt auf dem Würzelchen reitend. xv, 2.

* **R. sativus L. Rettich.** Schoten stielrund zugespitzt, ein korkartiges Nüsschen darstellend.

Wird häufig gebaut, daher oft verwildert an Dorfzäunen, Acker-rändern, auf Dunghaufen. Sommer. ☉.

Sparrig-ästig. Blätter leierförmig scharflich. Kr. lila-violett. — Obwohl die Schote nur ein einziges Glied hat, kann diese Art doch hierher gerechnet werden. Die Wurzeln sind ein bekanntes Gemüs: Bettige und Radieschen.

R. Raphanistrum L. Haidenrettich, Hederich. Schoten rosenkranzförmig, in lederartige einsamige Glieder zerspringend.

Ein überall verbreitetes Unkraut unter Getraide und auf anderen Aeckern, das wie der Ackersenf oft grosse Strecken überzieht. Sommer. ☉.

Stängel 1' hoch, oben mit 1 - 3 weitabstehenden Aesten. Bltt. leierfg., scharf. Das vordere und hintere Kelchbltt. am Grunde sackförmig erweitert. Kr. schwefelgelb, wodurch er sich so wie durch aufrechte zusammenschliessende Kelchbltt. vom Ackersenf unterscheidet.

5. Camelineae. Schote kurz mit ungekielten Klappen und breiter Scheidewand. Keimblätter liegen auf dem Würzelchen.

Camelina Crantz. Leindotter. Schote birnförmig; Klappen nach dem Griffel zu in ein Spitzchen verlängert; Fächer vielsamig. xv, 1.

Kr. weissgelb.

C. sativa Cr. Finkensamen. Myagrurn sat. L. Bltt. lanzettlich, ganzrandig oder schwachgezähnt, a. Gr. pfeilförmig.

Auf Brachen, auch vereinzelt unter Getraide u. anderen Culturpflanzen der Felder, meist auf sandigem Boden. Wird auch ange-

baut. Verbreitet aber sehr zerstreut. *Um Br. bei Pöpelwitz, kl. Tinz und Schiedlagwitz u. s. w. Beuthen a. O. Drüselücker bei Bunzlau. Sommer.* ☉.

Stängel 1' hoch, fast einfach, mit gabligen Haaren bekleidet. Blüthenähre locker. lang. Schote v. d. Grösse einer Linse: — Aendert ab mit grösseren u. halb so-grossen Schoten, mit fast kahlen und haarigen Stängel u. Blättern, welche Abänderungen Fries und Wallroth für Arten halten. — Aus den Samen wird ein fettes Oel gepresst, und sie dienen dem Geflügel zur Nahrung.

C. dentata Persoon. *Gezählter Leind. Myagrum dent.* Willd. Bltt. länglich buchtig-gezähnt od. fiederspaltig, a. Gr. pfeil-förmig erweitert.

Auf Leinäckern bis in das Vorgebirge. *Um Br.: Lissa, Schleibitz; Trebnitzer Berge. Wohlau, Bunzlau, Ohlau. Oppeln-Falkenberg. Bei Freivaldau und um Trop. u. Ts. häufig. Sommer.* ☉.

Von der vorigen fast nur durch die Bltt. verschieden. Mit dem Leinsamen eingeführt, scheint sich aber nirgends von den Leinäckern zu entfernen.

6. *Alyssineae.* Schote kurz mit breiter Scheidewand. Keimblätter liegen mit einem ihrer Ränder dem Würzelchen an.

Armoracia Fl. der Wetterau. *Meerrettich.* Schote kugelig oder ellipsoidisch; vielsamig. Klappen gewölbt ohne Rückenkiel. Staubgefässe zahnlos. Kronenblätter ungetheilt. XV, 1.

Blüthenrispe aus langen Achren zusammengesetzt; Blumen klein abstehend.

* *A. rusticana* Fl. d. W. *Meerrettich. Cochlearia* Arm. L. Schoten kugelig; Wurzelbltt. eifg.-länglich, a. Gr. herzförmig; Stängelbltt. kämmig-fiederspaltig, die oberen lanzettlich, kerbig-gesägt, Kr. weiss.

Wird gebaut, hie und da verwildernd. Sommer. 2.

Wurzel fleischig, stark, ästig. Wurzelbltt. gestielt, $\frac{1}{2}$ ' lang, oft am Bande kraus. Stängel oben ästig, $1\frac{1}{2}$ - 2' hoch. Die Wurzel besonders enthält ein flüchtig-scharfes Oel mit Eiweiss und Schleim, und wird frisch-gerieben als hautröthendes Mittel gebraucht, reizt die Verdauungswerkzeuge.

A. austriaca nobis. *Myagrum a.* Jacq.; *Camelina a.* Pers., Wimm. Fl. v. Schles.; *Nasturtium a.* Crantz. Koch. Synops. *Myagrum quade?* Krock. sil. XV, 1. Schoten kugelig in den geflügelten Stiel verschmälert, a. Gr. ohrförmig-umfassend.

An sandigen und kiesigen Fluss-Ufern; *bei Troppau* von v. Mückusch, *an der Oder bei Scheitnick* (Schummel) und *Pirscham, und bei Brieg und Oppeln.* Scheint in Schlesien aus d. Süden eingewandert und durch Oderüberschwemmungen verbreitet zu sein. Sommer. 2.

H. 2 - 3'; Stängel eckig; Bltt. bisweilen fiederspaltig eingeschnitten. Kr. gelb.

A. amphibia E. Meyer. *Wasserhederich. Sisymbrium a.* L. XV, 2. *Nasturtium a.* R. Brown Wimm. Fl. Schl. Koch Syn.

Schoten ellipsoidisch; d. Bltt. über dem Wasser ungetheilt, lanzettlich, beiderseits spitz, zählig-gesägt, die unter d. W. kämmig-fiederspaltig oder leierförmig.

Am Wasser, an Bach-, Fluss- und Teichrändern, im Rohricht u. zwischen Gebüsch, seltener in offenen Lachen und Gräben, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorg., häufig. *Um Br. am Lehm damme, um Pöpelwitz, Oswitz etc.* Mai, Juli. 2.

Wurzel fast holzig. St. bis 3 oder 4' hoch, nie geradeaufrecht, oft bogig od. aufsteigend u. am Gr. wurzelnd. Da es bald nur unten, bald bis über die halbe Höhe im Wasser steht, so ändern die Bltt. in der Zertheilung, wie angegeben, sehr ab; bisweilen sind die Fetzen haarförmig; ansserdem sind sie am Gr. bald mit bald ohne Ohren. Fruchtsiele sählig, auch niedergebogen; Schoten rundlich- bis länglich-ellipsoidisch. Kr. goldgelb.

Erophila DC. *Hungerblume*. Schote eiförmig zusammengedrückt, vielsamig; Samen ungerandet. Staubgef. zahnlos. Kronenbltt. gespalten. XV, 1.

Wurzelbltt. rosettenförmig, Stängel blattlos.

E. vulgaris DC. *Draba verna* L. Wimm. Fl. v. Schles. Koch Syn. Schoten länglich-eiförmig.

Auf Sand, Brachen, Triften, Aeckern, Sandhügeln, dünnen Grasplätzen. Durch das ganze Gebiet, meist in unzähliger Menge, wie dicht gesäet. Febr., Mai. ☉.

Stängel bald einer mit 2-3 gestielten Blumen, bald viele aufsteigende, blattlos, 1/2" - 1/2' hoch. Bltt. länglich, schwach-gezähnt mit Sternhaaren. Kronenbltt. weiss.

Farsetia R. Brown. *Farsetia*. Schote eiförmig, scheibenförmig-zusammengedrückt; Fächer vielsamig. Samen gerandet. Staubgef. mit zahnförmigen Verbreiterungen. Kronenbltt. gespalten. XV, 1.

F. incana R. Br. *Alyssum inc.* L. *Berteroa inc.* DC.

Auf etwas sandigem Grunde, an Wegrändern, Ackerrainen, hügeligen Triften u. Sandhügeln, d. d. g. G. bis ins Vorgebirge, häufig, scheint jedoch in einigen Gegenden zu fehlen. Sommer bis in den Spätherbst. 2.

Von steifen Sternhaaren grauweiss, im Schatten weniger. Stängel aufsteigend, 1' h. Bltt. lanzettlich, unten in den Stiel verschmälert. Kronenbltt. weiss. Die längeren Staubgef. haben am Gr. einen flügelartigen Zahn. Schoten linsengross weichhaarig.

Alyssum L. *Schildkraut*. Schote rundlich oder eiförmig; Fächer 1-4 samig. Samen gerandet. Staubgef. mit zahnförmigen Verbreiterungen. Kronenbltt. ganz oder ausgerandet. XV, 1.

A. montanum L. *Berg-S* Stängel aufsteigend, am Grunde holzig; die längeren Staubgef. geflügelt, die kürzeren gezähnt, Schoten rundlich.

Auf Sandhügeln. Bisher nur um Karlowitz u. Ransern (Kranse) bei Br. und am Weinberge bei Ohlau, an beiden O. häufig. Mai, Juni. ☉.

Bltt. grau oder weissgran. Kronen goldgelb.

A. calycinum L. Stängel aufsteigend, krautig; nur die kürzeren Staubgef. mit einem borstlichen Zahne unterstützt; Schoten kreisrund.

Auf Sandboden, trocknen Grasplätzen, Dämmen, Brachen, auf Sandhügeln und an Sandgruben. Durch das ganze Gebiet stellenweise, meist zahlreich. *Um Br. bei Carlowitz, Oswitz, Mahlen, Wohlau, Ohlau, Mois b. Bunzlau. Kitzelberg b. Kauffung. Polsnitzer Berge. Oppeln. Trop. u. Te.* Mai. ☉.

Einfach oder von unten in aufsteigende Stängel theilt, $\frac{1}{2}$ - 1' hoch. Untere Bltt. verkehrt-eif., obere lanzettlich, weissgrau von Sternhaaren. Einfache Aehren. Kr. blassgelb, weiss-verbleichend. Schoten in der Mitte erhaben.

Lunaria L. Silberblatt. Schote ellipsoidisch, am Grunde in einen stielförmigen Fruchträger übergehend. Samen geflügelt. Staubgef. zahnlos. XV, 1.

Kronen violett.

L. rediviva L. Mondviole. Schoten beiderseits spitz, elliptisch-lanzettlich.

In feuchten und schattigen Wäldern des Vorgebirges bis nahe ans Hochgebirge, häufiger im südöstlichen Theile des Gebiets, sparsam und vereinzelt. Tiefster Standort: *Stadtwald bei Leobschütz. Tul bei Ustron. Ludwigsthal u. Leiterberg im Gesenke. Um Charlottenbrunn. Am Sattelwalde. Hohe Mense. Schneeberg. Um Hbg. an den Zeisigsteinen u. im Sechstetter Busche.* Juli. ♀.

H. 3 - 4'. Bltt. gross, breit, herz-eiförmig, gesägt. Armblüthige Endrispen. Samen nierenförmig, doppelt so breit als lang.

Anmerkung. In Gärten wird häufig *L. biennis* Mönch (*annua* L.) gezogen; die silberfarbenen Scheidewände der Schoten zu Immortellen-Kränzen.

7. **Arabideae. Schote gestreckt. Keimblätter mit einem ihrer Ränder dem Würzelchen anliegend. — Samen zusammengedrückt.**

Nasturtium R. Br. Brunnenkresse. Schote linealisch oder länglich; Klappen ohne deutlichen Rückgrat. Samen in jedem Fache zweizeilig. XV, 2.

? **N. officinale R. Br. Wahre Brunnenkresse. Sisymbrium Nast.** Linn. Schoten linealisch, Blätter gefiedert, Kronen weiss.

An Quellen. Wächst höchst wahrscheinlich auf dem *Planurberge im Riesengebirge*, welches für Schlesien und Böhmen der einzige Standort wäre. Nach v. Albertini auch am *Goldbach bei Warthe u. Nischwitz b. Bunzlau* Sommer. ♀.

Wurzelstock schief, in den wurzelschlagenden Stängel übergehend. Stängel dick und saftig; Bltt. fast fleischig, Blättchen angeschwefelt elliptisch, das obere rundlich-

herzförmig. — Die bitteren Blätter sind ein magenstärkendes Gemüs als Sallat; bei uns vertritt *Cardamine amara* die Stelle.

N. sylvestre R. Br. *Gelbe Br. Sisymbrium s. L.* Schoten linealisch; Bltt. gefiedert und fiederspaltig mit sägezahnigen oder eingeschnittenen Fiedern; Kronenblätter länger als die Kelchblätter, gelb.

Eine gemeine Wegpflanze, sowohl auf trockenem als nassem Grunde, an Weg- und Grabenrändern, auf feuchten Grasplätzen, an Fluss- und Lachenrändern. Sehr verbreitet und gemein in der Ebene. Juli, Sept. 2.

Stängel aufsteigend in eine schiefe, bisweilen söhligverlängerte Wurzel sich verlierend, bei 1' hoch. Die Blättchen und Blattzipfel wie bei allen vieltheiligen Bltt. bald breiter bald schmaler, und so die Theilung tiefer oder seichter. Schoten fast stielrund, an Dicke und Länge etwas veränderlich.

Anmkg. *Nast. anceps* Reichenb. Wimm. Fl. v. Schles. Koch Syn. ist nur eine Abänderung, vielleicht auch ein Bastard dieser und der folgenden Art, durch längliche kürzere Schoten und leierförmige Blätter unterschieden, bei Br. an den Oderufern bei Ransern, Treschen, Margareth vorkommend.

N. palustre DC. *Sumpf-Br. Sisymbrium p. Leysser. Nast. terrestre* R. Br. Schoten länglich, geschwollen; Bltt. leierförmig-fiederspaltig mit stumpfgezähnten Zipfeln; Kronenbltt. so lang a. d. Kelchblätter, gelb.

Nur auf feuchtem Grund, in Gräben, an Teich- und Flussufern, in austrocknenden Lachen bei sandigem Grund, und dann an solchen Stellen stets erscheinend. Ueberall in der Ebene zerstreut. Um Br. an d. alten Oder. Juni, Sept. ☉.

Stängel einfach bis 3' hoch, von anderen Pflanzen umgeben; sonst auf freiem Sande $\frac{1}{2}$ ' hoch, von unten ästig. Laub dunkelgrün, oft schmutzig-kastanienroth.

Barbaraea R. Br. *Winterkresse. Schote* linealisch, rundlich, durch gekielte Klappen fast vierkantig. Samen in jedem Fache einzellig. xv, 2.

Kr. gelb. Bltt. leierförmig. Kelch aufrecht.

B. vulgaris R. Br. *Barbara-Kraut. Erysimum Barbaraea* L. *Barb. arcuata* Sturm D. Fl. Heft 43. Fruchtsiele abstehend oder söhlig; Kronenbltt. doppelt so lang als der Kelch; Aeste abstehend; Seitenlappen der Blätter länglich-lanzettlich.

Auf lehmigem Grunde, auf etwss feuchten Aeckern und Brachen, an Acker- und Grabenrändern. D. d. g. G., auch im Vorgeb., zerstreut aber meist in Menge. Mai. ☉.

Stängel von der Mitte an in abstehende Blütenäste aufgelöst, aufrecht. Blätter leierförmig; endständiges Blättchen länglich-eiförmig, sehr gross; die seitenständigen 4-paarig, an Breite jenem gleich. Die Stängelbltt. buchtig oder gezähnt, selten fiederspaltig. Lange Blütenähren; die Schoten oft im Bogen aufsteigend. — Auch Koch Syn. unterscheidet hiervon *Barb. arcuata* Reichenb., welche nur Varietät ist. — Man hat in Gärten eine perennirende, mit gefüllten Blumen. Das Kraut besitzt einige Schärfe.

B. stricta Andrzejowaki. *Steife W. B. parviflora* Fries. Fruchtsiele aufrecht, sammt den Schoten dem Stängel parallel; Kronenbltt. halb so lang als d. Kelch; Aeste fast aufrecht; Seitenlappen der Blätter oval.

Auf feuchtem Grunde, in tieferen Gegenden der Ebene; in Gebüsch, an Graben- u. Flussrändern, feuchten Wäldern, vielleicht nur in der östlichen Hälfte des Gebiets; zerstreut und vereinzelt. Um *Br. bei Scheitnich, Treschen, Oswitz, u. m. Ohlau, Beuthen, Giersdf. b. Hbg., Oppeln, Troppau.* Mai, Juni. ☺.

Ist jener sehr ähnlich, aber durch kleinere Blumen, aufrechte Schoten und Aehren, und kleinere schmalere Seitenlappen der Blätter, deren Endlappen 15 - 20 mal grösser und 1 - 2 mal breiter als die Seitenlappen ist, zu unterscheiden.

Turrítis L. Thurmkraut. Schote linealisch, Klappen mit starkem Rückgrat, Samen in jedem Fache zweizeilig, ungerandet. xv, 2.

T. glabra L. Thurmsenf, Waldkohl. Stängel und Schoten steif, Bltt. pfeilförmig.

Auf kiesigem und sandigem Grunde; auf trockenem sonnigen Hügeln und Waldplätzen, lichten Gehölzen, an Dämmen und auf steinigen Hügeln, bis in das Vorgebirge. Zerstreut, bisweilen in zahlreicher Menge. Sommer. ☺.

Stängel meist einfach, steif aufrecht, 2 - 4' hoch, mit graublauem Relfe, kahl. Die jungen Bltt. mit dreizackigen Haaren; die späteren am Stängel pfeilförmig-umfassend genähert, kahl. Schoten steif-aufrecht, sehr lang. Kronenbltt. gelblich-weiss.

Arabis M. Gänsekresse. Schote linealisch, stark zusammengedrückt; Klappen gekielt oder längsstreilig-geadert. Samen in jedem Fache einzeilig, mit oder ohne Rand. xv, 2.

A. alpina L. Gebirgs-G. Mit gestreckten Wurzelkopf-Sprossen; Stängel zottig; Bltt. buchtig-gezähnt, obere herzförmig-umfassend; Schoten am Rande verdickt, Klappen kiellos, Samen schmal-flügel.

Auf felsigen Lehnen des Hochgebirges, um 4000' am Basalt der kleinen Schneegrube. Juni. ♀.

H. 1/2'. Untere Bltt. länglich-verkehrt-eifg., von ästigen Haaren scharf. Schoten abstehend. Kronenbltt. weiss.

A. Gerardi Besser. A. sagittata W. u. Gr. sil. Turrítis hirta Krock. sil. Haare am Stängel angedrückt; Stängel aufrecht einfach; die stängelständigen Bltt. länglich, mit der unteren Hälfte anliegend, am Gr. herzpfeilförmig mit anliegenden Ohren; Schoten ohne merklichen Kiel, Samen fein punktirt.

In schattigen, etwas feuchten Laubwäldern und Gehölzen der tieferen Ebene, besonders in den Oderwäldern; um *Scheitnich, Schwoitsch, Oswitz, in der Strachate; um Ohlau und Oppeln.* Gesellschaftlich und heerdenweise. Mai, Juni. ☺.

Wurzelbltt. rosettenfg., länglich, in den Stiel verschmälert. Stängel 1 - 2' hoch steif, aufrecht, dicht beblättert. Kronenbltt. weiss. Die Schoten sind länger und schmaler als an der folgenden Art. — Vielleicht ist diese nur eine Varietät der folgenden: dann müssen sie nach Decandolle *Arabis sagittata* heissen.

A. hirsuta Scopoli. Haare am Stängel abstehend; Stängel aufrecht einfach; die stängelständigen Bltt. länglich, etwas abstehend, am Gr. geöhrt mit abstehenden Ohren; Schoten mit vorragendem Kiel, Samen unpunktirt.

β. *glaberrima*, ganz kahl oder nur am Blattrande mit feinen Härchen.

Auf Waldplätzen, besonders auf steinigem Grunde, bis in das Hochgebirge. Um Br. bei *Schleibitz und Sibyllenort. Riemberg. Lewien. Oppeln. Proskau.* β. bei *Oppeln und im Kessel im Gesenke von Grabowski* gefunden. Zerstreut und sparsam. Mai, Juni. ☉.

A. arenosa Scop. *Sisymbrium a. L.* Vielästig, rauhaarig; Wurzelbltt. leier-schrotsägefg. mit steifen Gabelhaaren; Schoten abstehend.

Auf sandigem und steinigem Boden, auf Sandhügeln der Ebene, an steinigen Flussufern des Vorgebirges und Felsen des Hochgebirges. Um Br. bisweilen an der alten Oder; bei *Bunckey und Domatschine. An der Neisse bei Wartha, Cudowa, Wiegstein u. auf der Landecke. Jacobswalde. Im Kessel im Gesenke. Babia Gora.* Zerstreut; stets gesellschaftlich. Juni, Juli. ☉.

Stängel von der Mitte an ästig, ziemlich aufrecht, bisweilen fast kahl. Kronenbltt. weiss oder lilafarben.

A. Halleri L. Stängel von unten ästig, schlapp; Wurzelbltt. rundlich oder elliptisch gestielt, mit oder ohne Blattläppchen am Stiel, Schoten abstehend.

Auf grasigen Plätzen, trocknen Wiesen und an Steinwänden des Vor- und Hochgebirges. *Charlottenbrunn, Fürstenstein, Sonnenkoppe. Gesenke am Petersteine, Köperrick. Fuhrmannsteine u. m. Wiegstein. Im Riesengrunde.* Sommer. ♀.

Stängel meist schlapp und liegend oder aufsteigend, von unten aus ästig. Nach der Gestalt des Endblättchens der Wurzelbltt. u. der An- oder Abwesenheit von Seitenläppchen am Stiel, auch nach der Tracht und Grösse werden mehrere Abänderungen unterschieden. Weniger behaart als d. vorige. Kronenbltt. weiss.

Cardamine L. *Schaumkraut.* Schote linealisch; Klappen flach, ungekielt und ungeadert; Samen in jedem Fache einzeilig. XV, 2.

Wurzel büschelförmig; Blätter gefiedert oder gedreit.

C. resedifolia L. Wurzelbltt. eifg. oder rundlich gestielt, die oberen leierfg. und leierfg.-fiederspaltig, 2 - 3paarig, Blattstiele mit pfeilförmigen Ohren; Fruchstiele aufrecht.

In den Felsritzen des Hochgebirges, auf Granit und Glimmer schiefer. *Riesengebirge: am kleinen Teiche, Müdelsteine, Mittags*

steine, Schneegruben. Gesenke: Altwater. Peterstein, Köpernick, im Kessel. Sommer. 2.

Stängel 1 - 3' lang, schlapp und einzeln, oder kurz steif und rasenförmig. Wurzelblt. bilden einen Rasen. Kurze gedrängte Fruchttraube. Kronen weiss.

C. parviflora L. *Kleinblumiges S.* Alle Bltt. gefiedert, gleichförmig, vielpaarig, Blättchen ganzrandig, das endständige fast gleich gross; Blattstiele ungeöhrt; Fruchtstiele weit abstehend.

Auf feuchtem besonders sandigem Grunde zwischen Gras und Schilf an Rändern von Lachen und Teichen. Wird durch Ueberschwemmung bisweilen verbreitet; stets in Menge. *Um Br. zuerst von Krock. bei Oswitz u. Althof, am Lehmdamme, bei Grüneiche, Pöpelwitz, Schwöitsch. Neuvorwerk bei Ohlau. Oppeln am Kalichteiche. Schönfeld bei Bunzlau.* Juni, Sept. ☉.

H. 2" - 1', kahl. Bald einfach, bald vom Grunde aus vielästig. Die Blättchen der unteren Bltt. länglich, der oberen linealisch, das Endblättchen wenig grösser. Kronen sehr klein. Etwas ähnlich ist *C. hirsuta*.

C. Impatiens L. *Springkresse.* Alle Bltt. gefiedert, vielpaarig; Blättchen der unteren Bltt. 3 - 5spaltig, kurz-gestielt, der oberen am Hinterrande gezähnt; Blattstiele mit pfeilförmigen Ohren; Fruchtstiele abstehend.

In schattigen feuchten Wäldern, in feuchten Hohlwegen und an quelligen Stellen im Vorgebirge, nur ausnahmsweise in der Ebene. Selten und vereinzelt. *Bei Reuthen a. O. n. Beilschmied. Um Görlitz. Hornschloss bei Donnerau; Gold. Wald bei Weistritz. Im Schlesierthale, Volpersdorf, Cudowa. Grünbusch bei Hbg. Wiegstein bei Trop. Im Gesenke am Uhustein.* Juni. ☉.

Bltt. zart, leicht welkend, hellgrün. H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Aufrecht, einfach. Kronenbltt. fehlen. Die Schoten springen bei allen, besonders aber bei dieser Art, elastisch auf.

C. sylvatica Link. *Wald-Sch. C. hirsuta* β . *sylvatica* W. et Gr. sil. *C. hirsuta* β . *sylvestris* Fries. Alle Bltt. gefiedert, mehrpaarig; Blättchen der unteren rundlich geschweift oder gezähnt, das endständige grösser; Blattstiele ungeöhrt; Kronenbltt. doppelt so lang als der Kelch; Griffel so lang als die Schote breit ist.

In schattigen und feuchten Wäldern des Vorgebirges, nur selten in der Ebene. *Bei Oppeln. Charlottenbrunn; im Gesenke bei Carlsbrunn und Einsiedel, am Leiterberge, und um Ustron.* Mai, Juni. ☉.

Einfach und ästig, meist mit kurzen steifen Haaren besetzt. Laub dunkel und leicht welkend. Kronenblätter spatelförmig. Sechs Staubgefässe nach Treviranus. II. 3 - 6'.

C. hirsuta L. *Rauhhaariger Sch. C. hirsuta* α . *sabulosa* Wimm. et Grab. Fl. sil. *C. hirs. a campestris* Fries. Alle Bltt. gefiedert, mehrpaarig; Blättchen der unteren rundlich geschweift oder gezähnt, das endständige grösser; Blattstiele ungeöhrt; Kronenbltt. doppelt so lang als der Kelch; Griffel kürzer als die Schote breit ist.

Auf Waldplätzen, auf steinigem Grunde, hauptsächlich im Vorgebirge. Um Wohlau. Charlottenbrunn. Im Gesenke. Mai, Juni. ☉.

Diese Art gleicht der vorhergehenden ausnehmend; der Stängel pflegt weniger beblättert und die Blättchen schmäler aber steifer zu sein, mit etwas tieferen Zähnen; die Schoten sind mehr aufrecht, und nach Treviranus stets nur 4 Staubgefässe.

C. pratensis L. Wiesen-Sch. Stängel röhrig, rund, nach oben gestreift; alle Bltt. gefiedert, die Blättchen der unteren Blätter rundlich geschweift oder gezähnt, das endständige grösser; Kronenbltt. dreimal so lang als der Kelch; Griffel walzig, kurz.

Auf feuchten und sumpfigen freien Wiesen, in Gräben, auf Waldwiesen. Durch das ganze Gebiet, bis ans Hochgebirge, überall in unzähliger Menge. April, Mai. ♀.

Stängel aufrecht, 1 - 1½ hoch, kahl, einfach, auch mehrere aus einer Wurzel so, dass die seitenständigen niedriger bleiben. Blüthen in endständiger Doldentraube. Kelchbltt. gelblich. Kronenbltt. fleischfarben bis ins weisse. Staubbeutel gelb. — Abänderungen mit sehr kleinen und winklig-gezähnten Blättchen. Diese Art ist nächst *Erophila verna* wohl die gemeinste und verbreitetste dieser Familie.

C. amara L. Bitteres Sch. Schlesische Brunnenkresse. Sissymbrium Nasturtium Matt. und Krock. Stängel eckig, dicht; alle Bltt. gefiedert; die Blättchen der unteren Bltt. winklig-gezähnt, das endständige grösser; Kronenbltt. dreimal so lang als d. Kelch; Griffel pfriemlich lang.

β. *hirta* Fl. sil.; Stängel kurzhaarig, Fruchtsiele kahl.

γ. *subalpina* Koch. Syn. (*umbrosa* Fl. sil.) Stängel und Fruchtsiele kurzhaarig

Auf quelligen Stellen, an Waldbächen, in Brüchen und Waldsümpfen bis ans Hochgebirge. Verbreitet und an den geeigneten Orten zahlreich. Liebt besonders ocherhaltiges Wasser. Um Br. bei Kapsdorf, Lissa u. s. w. Trebnitz, Skarsine und Pollentschine, Riemberg, wo besonders Var. β. vorkommt. Var. γ. auf dem Gl. Schneeberge, an Lehnen des Altvaters u. im Kessel. April, Mai, im Gebirge später. ♀.

Stängel oft am Grunde wurzelnd. Kronenbltt. weisslich. Staubbeutel violett. — Die gewöhnliche Form ist kahl. Die Var. β. ist auch durch gedrängte steife Tracht, dichte Bltt. mit sehr vielen Blättchenpaaren ausgezeichnet, darf aber nicht für eigene Art angesehen werden. Blättchen oft saftig fast fleischig. — Die Blätter haben ein kräftiges Bitter, daher diese Pflanze, welche auch äusserlich der wahren Brunnenkresse ähnlich ist, statt deren bei uns üblich ist und zu Markt kommt.

C. trifolia L. Dreiblättriges Sch. Blätter gedreit.

Auf feuchten Waldwiesen im Vorgebirge. Bisher nur bei Wölfelsdorf u. Reinerz. Juni. ♀.

Der aufsteigende, blattlose oder einblättrige, einfache Stängel verlängert sich nach unten in ein schiefes kriechendes gegliedertes Rhizom. Blättchen rundlich, schweifig-gezähnt mit einer Stachelspitze. Endständige Doldentraube. Kronenbltt. weiss.

Dentaria L. Zahnwurz. Schote lanzettlich; Klappen flach, ungekielt; Samen in jedem Fache einzeilig. xv, 2.

Wurzel söhlig, schuppig-gezähnt.

D. enneaphyllos L. Neunblättrige Z. Drei wirtelförmige gedreite Bltt.; Staubgefässe so lang als die Krone.

In schattigen Laubwäldern und auf Waldwiesen des Vorgebirges bis in die Ebene bei Sprottau hinab. *Im Hochwalde bei Sprottau n. Göppert. Um Charlottenbrunn, Silberberg, Grunwalder Thal bei Reinerz, hohe Mense. Im Sattler, am Kochelfall u. b. Schmiedeberg nach N. v. E. Carlsthal bei Trop. u. am Tul u. Machova Gora bei Ustron.* April, Mai. 2.

Wurzel söhlig, fleischig, gleichsam aus gezähnten schuppigen Blättern verwachsen. Der Stängel trägt in einer H. v. $\frac{1}{2}$ ' drei gedreite Blätter, mit länglichen kahlen; ungleich-gesägten Blättchen; aus deren Mitte der Blütenstiel, welcher bis 10 doldentraubige, fast söhliche Blumen trägt. Kelche vergänglich. Schoten aufrecht. Kroneabl. gelblichweiss.

D. glandulosa Waldst. et Kitaib. Drüsige Z. Drei wirtelförmige gedreite Blätter; Staubgef. halb so lang als die Krone.

In schattigen Laubwäldern des Vorgebirges der östlichen Sudeten-Hälfte und des Klokacz-Gebirges. *Auf der Landecke bei Hultschin. Schillersdorf bei Ratibor. Czantory, Palomb, Lomnathal, Münchhof im Teschenschen.* April, Mai. 2. Diese Art erreicht an den genannten Punkten ihre nordwestliche Gränze.

Schwächer als die vorige. Wurzel söhlig, fadenförmig, in Absätzen verdickt und schuppig-gezähnt. Stängel u. Bltt. schwach weichhaarig. Blättchen lanzettlich-länglich; zwischen je zweien eine Drüse. Blumen 3 - 5. Kronenblt. purpurfarben.

D. bulbifera L. Zwiebeltragende Z. Blätter abwechselnd, untere gefiedert, obere ungetheilt.

In schattigen Wäldern des Vorgebirges längs des ganzen Gebirgszuges zerstreut und hin und wieder zahlreich. *Um Sprottau nach Göppert. Im Eulengebirge. Reinerz. Schneeberg. Molckenberg bei Schmdbg. u. am Zackenfalle. Landecke bei Hultschin. Im Gesenke im Kessel, Hochschar. Czantory bei Ustron.* Mai, Juni. 2.

Schlank bis 2' hoch, kahl. Mittlere Bltt. gedreit. Kurze endständige Doldentraube. Kronenblt. weiss oder lilafarben. In den Blattwinkeln entstehen Zwiebelknospen, aus 3 - 4 fleischigen braunschwarzen Schuppen, welche dann abfallen und fortpflanzungsfähig sind, wie bei *Lilium bulbiferum*.

8. **Sisymbreae. Schoten gestreckt, Klappen gekielt. Keimblätter dem Würzelchen aufliegend.**

Hesperis L. Nachtviole. Die Narbe besteht aus zwei aufrechten Blättchen. xv, 2.

* **H. matronalis L. Damascener-N.** Kronenblt. verkehrt-eiförmig; Bltt. gezähnt.

Wird in Gärten als Zierpflanze gebaut, aus denen sie bisweilen sich verbreitend verwildert. Mai, Juni. 2.

Bltt. ei-lanzettig.; Kronenblt. gesättigt lilafarben.

Sisymbrium L. Raukensenf. Narbe ungetheilt. Schote rundlich-sechskantig; Klappen mit drei gleich starken Kielen. Samenschale eben. xv, 2.

S. officinale Scop. *Wegesenf.* *Erysimum* off. L. Bltt. schrotsägeförmig-fiedertheilig; Schoten angedrückt.

Meist um menschliche Wohnungen, an Mauern, Zäunen, Hecken, auf Dächern und auf Schutt- und Dunghaufen. Gemein. Sommer und Herbst. ☿.

Der Endzypfel der Bltt. spiessförmig. Schoten weichhaarig. Stängel sparrig-ästig. Steife Tracht. H. bis 2', sehr veränderlich. Krönenbltt. klein, gelb. Der Saft des Krautes ist gegen Heiserkeit berühmt.

S. Sophia L. *Sophienkraut, Wurmkraut, Gr. Besemkraut.* Bltt. dreifach-gefiedert, mit kleinen linealischen Zipfeln; Schoten abstehend.

An denselben Standorten und meist in Gesellschaft der vorigen, auch auf Brachen. Sommer und Herbst. ☉.

Stängel in der Mitte ästig mit langen Fruchtlähren. Hat die am feinsten zertheilten Blätter unter allen dieser Familie. Krönenbltt. sehr klein, gelb.

S. Thalianum Gaudin. *Gänsekraut.* *Arabis Thal.* Linn. W. et Gr. sil. Bltt. länglich-lanzettlich gezähnelte; Schoten aufsteigend.

Auf sandigen Aeckern, Brachen und Triften. Gemein. Frühling. ☉.

Wurzelbltt. rosettenförmig. Stängel bisweilen ästig und vielästig, auch viele St. aus einer Wurzel, wenig beblättert; Aeste dünn. Krönenbltt. klein, weiss.

Alliaria Adanson. *Lüüchel.* Narbe ungetheilt. Schote rundlich-vierkantig; Klappen mit einem starken und zwei seitlichen schwächeren Kielen. Samenschale gestreift. XV, 2.

A. officinalis Andrzej. *Ramschwurz.* *Erysimum All. L. Sisymbrium All.* Scop. Koch Syn. Bltt. eifg.-rundlich, am Gr. herzförmig.

In lockerer Dammerde, in Gebüsch, an Hecken, schattigen Dämmen und Waldrändern. Verbreitet und äusserst häufig in der Ebene bis in das Vorgebirge. April, Mai. ☉.

Aufrecht, oben ästig. Bltt. gestielt, die unteren rundlich, buchtig gekerbt. Krönenbltt. weiss. Schoten abstehend, vielmal länger als ihr Stiel. Riecht zerquetscht nach Knoblauch.

Erysimum L. *Schotendotter.* Narbe ungetheilt. Schote vierkantig oder zweischneidig. Klappen mit einem Kiel. XV, 2. Krönenbltt. gelb.

E. strictum Fl. d. Wett. *E. hieracifolium* L. Flor. succ. Matt. Sil. Bltt. länglich-lanzettlich; Blumenstiele so lang als der Kelch.

Auf sandigen und steinigten Plätzen, an Flussufern, auf Mauern. Verbreitet, besd. in der Nähe der Oder. Sommer. ☉.

Steif, aufrecht, 1 - 2' hoch. Bltt. mit dreigabligten Haaren besetzt. Schoten scharflich, mit feinen Haaren, mehr aufrecht und die Krönenbltt. grösser als a. d. folgenden.

E. cheiranthoides L. Bltt. länglich-lanzettlich; Blumenstiele 2 - 3mal so lang als der Kelch.

Wie die vorige Art, aber weiter verbreitet und viel häufiger. Sommer. ☉.

Schoten glatt, mit zerstreuten Haaren, mehr abstehend und bisweilen im Bogen aufsteigend; Kronenbltt. kleiner als an der vorigen.

Conringia Heister. *Conringie*. Schote vierkantig-zusammengedrückt, pfriemlich, auf den vorderen Flächen ohne Kiel. Narbe ungetheilt. xv, 2.

Bltt. herzförmig-umfassend.

C. perfoliata Link. *Brassica orientalis* L. *Erysimum orient* R. Br. Koch Syn.

Auf Aeckern, wahrscheinlich mit Getraidesamen eingeführt; in manchen Jahren zahlreich. Nur um *Oppeln bei Chrumczitz von Grabowski u. Finke* und um *Teschen bei Skotschau* gefunden. *Nischwitz bei Bunzlau* nach Sch. Jun. ☉.

Aufrecht, einfach. Bltt. eiförmig, mit tiefherzförmigem umfassendem Grunde. Das Kraut graugrün. Kronenbltt. klein weissgelb. Schoten sehr lang, aufrecht.

9. *Brassicaceae*. Schote gestreckt. Keimblätter gekielt, auf dem Würzelchen reitend.

Brassica L. *Kohl*. Schote linealisch oder länglich. Klappen mit einem Rückenkiel oder mit Adern, die in zwei undeutliche Seitennerven münden. Samen kugelig, in jedem Fache einzeilig. xv, 2.

* *Br. oleracea* L. Die oberen Bltt. länglich sitzend, Blüthentrauben vor dem Aufblühen verlängert schlaff, Kelch aufrecht geschlossen, Staubgefäße aufrecht.

Wird als Gemüspflanze angebaut, in vielen durch Cultur sich fortpflanzenden Varietäten, selten verwildernd. Sommer. ☉☉.

Die Blätter sind ganz kahl und graugrün, die unteren leierförmig. Kronenbltt. hellgelb.

* *Br. Rapa* L. *Rübs*, *Sommerrübenreps*. *Weisse Rübe*. Die oberen Bltt. eig. zugespitzt mit herzförmigem Grunde umfassend; Blüthentrauben gleichigipflig; Kelche zuletzt söhlig abstehend; Staubgef. aufsteigend.

Wird als Gemüspflanze und Oelpflanze häufig gebaut, und häufig verwildert unter dem Getraide und an Ackerrändern, auf Dunghaufen gefunden. Mai. ☉ und ☉☉.

Die Wurzel ist bei der Oelpflanze und bei der verwilderten (hierzu: *Br. campestris* L. fl. succ. Wimm. Fl. v. Schles.), dünn spindelig, bei der Gemüspflanze dick und fleischig, länglich-rund, auch kugelig. Die Bltt. im ersten Jahre sind grün, im zweiten graugrün, die unteren leierfg. Kronenbltt. goldgelb. Schoten fast aufrecht.

* *Br. Napus* L. *Raps*, *Winterkohlraps*, *Kohlrübe*. Die oberen Bltt. länglich, gegen den Grund verbreitert, herzförmig umfas-

send; Blüthentrauben verlängert, schlaff, Kelch halb offen, Staubgef. aufliegend

Wird als Gemüs- und Oelpflanze häufig gebaut. Mai. ☉ u. ☺.

Die Wurzel ist bei der Oelpflanze dünn spindelig, bei der Gemüspflanze dickfleischig, kopfförmig. Bltt. graugrün, die unteren leierförmig. Kronenbltt. gelb. Schoten abstehend.

* *Br. nigra* Koch Deutschl. Fl. *Senfkohl. Schwarzer Senf. Sinapis nigra* L. Alle Bltt. gestielt; Kelch halb offen; Schoten angedrückt.

Wird nur hin und wieder angebaut. Sommer. ☉.

Kronenbltt. gelb.

Sinapis L. *Senf.* Schote linealisch oder länglich. Klappen mit drei oder fünf starken geraden Kielen. Samen kugelig, in jedem Fache einzeilig. — Schoten geschnäbelt. XV, 2.

S. arvensis L. *Acker-Senf.* Klappen dreinervig; Bltt. eiförmig, die unteren am Gr. geöhrt oder leierförmig.

Auf Aeckern unter der Saat, besd. auf Waizenfeldern, oft in unzähliger Menge und eines der lästigsten Unkräuter, bald mit dem *Hederich* bald dessen Stelle ersetzend. Sommer. ☉.

Bltt. steifhaarig. Die Schoten wulstig, mit zweischneidigem Schnabel, kahl oder steifhaarig. — Von dem ähnlichen Hederich durch die offenen Kelche und dunkelgelbe Kronenabl. zu unterscheiden.

* *S. alba* L. *Weisser Senf.* Klappen fünfnervig; Bltt. gefiedert.

Wird angebaut und findet sich bisweilen verwildert. Sommer. ☉.

Fiedern der Blätter grobgezähnt, fast gelappt; die drei oberen fließen zusammen. Schoten rauchhaarig. — Die Samen dieser Pfl. besitzen die den Cruciferen eigenthümliche Schärfe im ausgezeichnetsten Maasse, daher sie äusserlich und innerlich als Medicament, und in der Form des Mostrichs bei Speisen angewandt werden. Senfteig als Beizmittel auf die Haut.

Cistineae Dunal.

Kelchblätter fünf, zwei kleiner. Fünf gleichförmige Kronenbltt. mit zusammengebrochener Knospenlage. Staubgefässe zahlreich, unter dem Stempel. Die Samenhalter stehen in der Mitte der Klappenwände. Kapsel mit unvollständigen Scheidewänden. Keim liegt im Eiweiss gekrümmt.

Melast niedrige Sträucher, die besonders im südlichen Europa einheimisch sind; bei uns nur ein Repräsentant.

Helianthemum Tournefort. Kelch besteht aus 3 grösseren und zwei kleineren Blättchen. Kapsel dreiklappig; Samen an der Mitte der Klappen. XIII, 1.

H. vulgare Gärtner. *Elisabethblümchen. Cistus Helianthemum L.*

Auf lehmigem Boden, in hügligen Gegenden an Wegrändern, hohen und sonnigen Grasplätzen und Triften; bei uns nur in der höheren Ebene und dem Vorgebirge, anderwärts bis auf das hohe Gebirge. Um Br. bei *Althof* und *Arnoldsmühl*. In der *Trebnitzer Hügelkette* häufig. *Wohlau, Beuthen a. O., Ohlau, Charlottenbrunn, Striegau, Pölsnitz*. Um *Oppeln, Jägerndorf, Troppau* und *Te.* Juni. h.

Die Stängel sind am Grunde holzig, aufsteigend, mit gegenständigen ovalen und länglichen kurzhaarigen unterseits fast filzigen am Rande gewimperten und umgeschlagenen Blättern besetzt. Endständige kurze und weitläufige Aehre. Blumen einseitwendig. Kelchbltt. häutig 3-5 nervig. Fruchtsiele niedergebogen. — Aendert in der Bekleidung der Bltt. sehr ab; bisweilen sind sie fast ganz kahl und grün. Geöffnet die Blumen nur bei Sonnenschein.

Violeae De Candolle.

Kelchbltt. fünf. Fünf meist (bei uns stets) ungleichförmige Kronenbltt. Fünf Staubgef. auf einer unter dem Stempel stehenden Scheibe. Die Staubbeutel sitzen an der inneren Seite des Staubfadens, der sich darüber hinaus in eine trockne Haut verlängert, und sind an den Fruchtknoten angedrückt. Dreiklappige Kapsel mit wandständigen Samenhaltern. Blätter mit Stützblättern.

An den bei uns wachsenden Arten sind die Kelchbltt. am Grunde mit breiten Anhängeln versehen, und das untere Kronenblatt in einen sackförmigen Sporn verlängert. Die Arten sind schwer von einander zu sondern und nach Standort und küsseren Einflüssen sehr veränderlich. In den Wurzeln und Samen enthalten sie einen brechen-erregenden Stoff. Alle Arten sind an bestimmte Bodenverhältnisse angewiesen, einige sehr verbreitet, eine dem Hochgebirge eigen.

Viola L. Veilchen. Kelchblätter hinten in einen Fortsatz ausgedehnt. Das untere Kronenblatt gespornt. Staubgefäße in eine Walze verbunden nicht verwachsen; die beiden unteren am Grunde mit spornförmigem Fortsatz. XIX, 6. bei Linné, bei spätern V, 1.

Mehrere Arten haben das Eigenthümliche, dass nach der ersten Blüthezeit eine zweite Blüthenperiode eintritt, nachdem entweder die Blätter der Wurzel oder die Stängel sich vergrößert haben, in welcher zweiten stets kronenblattlose Blüthen, aber nachher viele vollständige Fruchtkapseln erscheinen. Die Blumen auf übergebogenen Stielen söhlig.

a. Stängellose.

V. palustris L. Sumpf-V. Bltt. kreisrund, herznierenförmig; Kelchbltt. stumpf; Stützbltt. eiförmig-drüsig-gesägt; Kronenbl. rundlich.

Auf Sumpfboden, sumpfigen Wiesen, Waldsümpfen, in Haidebrüchen auf Sumpfmossopolstern, in der Ebene und in den Mooren des Vor- und Hochgebirges. Durch das ganze Gebiet, bis 4000', häufig. Um

Br. bei *Friedewalde, Lissa, Heydewilzen, Deutsch-Hammer u. m.*
April, Mai. 2.

Kriechende fädige Wurzel, hin und wieder mit Schuppen. Blumenstiele 1—3" lang.
Kronenbl. lilafarben mit dunkleren Adern.

V. uliginosa Schrader. *Moor-V.* Bltt. dreieckig-länglich, herzförmig; Blattstiel geflügelt; Stützblätter zur Hälfte mit dem Blattstiel verwachsen; die beiden mittleren Kronenbltt. am Grunde sackförmig.

Auf waldigem Sumpfboden, bisher nur bei *Winow u. Königshuld* bei *Oppeln von Grabowski und Fincke* gefunden. April, Mai. 2.

Blumenstiele 2—4" hoch. Krone purpur-blau; Bltt. spatelförmig.

V. hirta L. *Kurzhaariges V.* Wurzelstock ästig, ohne Ausläufer; Bltt. dreieckig-eiförmig, herzförmig, unterseits kurzhaarig; Kelchbltt. stumpf; Kronenbltt. ausgerandet; Spora kurz kegelförmig.

In Dammerde, auf Waldboden; an Waldrändern, auf Waldwiesen, an buschigten Dämmen, in Hecken und lichtem Gehölz, auf Triften. Ebene und Vorgebirge, durch das ganze Gebiet, verbreitet, zahlreich. Um Br. bei *Oswitz, Schwöitsch, Kapsdorf, Lissa, Koberwitz u. m.* April, Mai. 2.

Wurzelstock fadentief-dick, gerunzelt; oben mehrköpfig-ästig. Die Behaarung der Blattstiele und Bltt. in der Jugend am stärksten, etwas veränderlich. Kronenbltt. blaue-lilafarben oder hellviolett. Später vergrößern sich die Blätter, besd. an schattigem Standort, so dass die Stiele fusslang (vorher $\frac{1}{2}$ - 2') werden, und aus der Wurzel treiben zahlreiche kronenlose Blumen bis in den Juni. Die Breite der Bltt. ist etwas veränderlich. Blüthen haben keinen Geruch.

V. odorata L. *März-Veilchen.* Wurzel sprossentreibend; Bltt. kreisförmig und eig.-rundlich, die ersten herz-nierenförmig, feinhaarig; Kelchbltt. stumpf; die oberen Kronenbltt. zugerundet; Sporn walzig an der Spitze einwärts gekrümmt.

Wie die vorige und in Gesellschaft derselben, noch häufiger. März, Mai. 2.

Kronenbltt. sattblau-violett; wohlriechend. Der Wurzelstock wie bei der vorigen, treibt aber fadenförmige kriechende Sprossenausläufer. — Aus den Kronenbl. wird der Veilchensyrup bereitet.

b. Aestige blaublühende.

V. mirabilis L. *Wunder-V.* Die Kronenblüthen aus der Wurzel, die kronenlosen aus dem Stängel; Bltt. bei der Entwicklung dufförmig-gerollt, rund, nieren-herzförmig; Stützblätter lanzettlich-spitz ganzrandig, Kelchbltt. spitz., Stängel mit einer Reihe von Haaren besetzt.

Auf lockerem gutem Waldboden; in den Laubwäldern der höheren Ebene und des Vorgebirges. Um Br. im *Goi* bei *Kapsdorf, Bischwitz, Lissa u. Arnoldsmühl.* Bei *Süsswinkel. Trebnitzer Berge.* Durch das ganze Vorgebirge zerstreut; meist zahlreich. März, Apr. 2.

Bei den folgenden Arten entspringen keine Blumenstiele aus der Wurzel: Blätter blaugrün. Die oberen Stützblätter am Rande gewimpert. Kronen lilafarben, wohlriechend.

V. arenaria DC. *Sand-V.* Stängel rasenförmig aus der Wurzel einfach, schief aufgerichtet; Bltt. rundlich, tiefherzförmig; Stützbltt. eiförmig-länglich, kämmig-gesägt; Kelchbltt. spitz, a. Gr. ganz; Sporn walzig; Kapsel feinhaarig.

Auf lockerem Sande in Kieferwäldungen, besonders an Rodeplätzen. In den *Trebnitzer Bergen* (bei *Mahlen*, *Heydewilxen*, *Deutsch-Hammer*, *Birnbäumel*), um *Wohlau* u. in O. S. um *Oppeln* bei *Winnow*, *Malapane*, *Königshuld*. April. 2.

Bltt. stets rundlich!, meist durchaus feinhaarig, selten kahl, graugrünlich, unterseits oft bleifarben oder röthlich überlaufen. Krone lilaf., wie alle folgenden geruchlos. Kapsel spitz.

V. canina L. *Hundsveilchen*. Stängel zerstreut, aus liegendem Grunde aufsteigend, unten ästig; Bltt. herz-eiförmig; Stützbltt. halbeiförmig oder länglich-lanzettlich, krautig, gesägt oder wimperig-gesägt, kurz; Kelchbltt. spitz; Kronenbl. eifg.; Sporn etwas zusammengedrückt abgekürzt ungefärbt; Kapsel stumpf. Mit drei Varietäten.

α. acaulis Fl. sil. zwergig und ohne Aeste, oft aschgrau- oder röthlich-grün.

β. ericetorum Schrad. Ästig, mit niederliegendem Grunde, niedrig, mit glänzenden Blättern.

γ. lucorum Rchbch. Ästig, aufsteigend-aufrecht, hoch, mit hellgrünen Bltt. und grösseren Stützbltt.

Auf Wald- und Haideplätzen besonders auf kiesigem und etwas sandigem Grunde durch das ganze Gebiet verbreitet bis an das Hochgebirge; ist die verbreitetste Art dieser Sippe; überall häufig und in mancherlei Formen. *α.* in dichtem festem Boden, auf hohen mageren Triften, an sonnigen dünnen Hügeln; *β.* besd. in Haiden, lichten Gebüsch, an Waldändern, auch auf sandigen Grasplätzen, an Dämmen; *γ.* in dichtbeschattetem Gebüsch und Wald, z. B. bei *Ransern*, *Lissa*. April, Juni. 2.

Ändert in der Grösse und den übrigen Beziehungen der Frucht nach dem Standorte. Krone azurblau, Sporn weisslich! Die Blätter sattgrün, meist auf der Oberfläche glänzend, eiförmig, so dass der Seitenrand einen Bogen bildet! Die var. *γ.* wurde einmal, bei *Ransern*, durchaus mit feinen Haaren bekleidet gefunden. Höhe von 1" — 1'.

V. Riviniana Rchbch. *V. sylvestris β. macrantha* Wimm. et Gr. Flor. sil. *V. sylvestris β.* Koch Syn. *V. canina β. silvatica b. Riviniana* Fries Nov. Suec.) Stängel aufsteigend, oben ästig; Bltt. fast kreisfg., herz-nierenfg.; Stützbl. lanzettlich häutig in feine Franzen gespalten kürzer als die Blattstiele; Kelchbl. am Gr. gestutzt; Kronenbl. länglich zugerundet; Sporn walzig.

Zwischen Gesträuch und Gebüsch in lockerer Walderde, in lichten Gehölzen, an Laub u. Kiefer-Waldändern, auch an grasreichen beschatteten Dämmen. Wahrscheinlich durch das ganze Gebiet bis in das Vorgebirge, doch zerstreut, und etwas seltner und sparsamer als die folgende. Um Br. bei *Grüneiche*, *Masselwitz*, *Oswitz*, *Lissa*, *Mahlen*. In den *Trebnitzer Bergen*. Um *Charlottenbrunn*. April, Mai. 2.

Diese Art wird gewöhnlich mit der folgenden sehr ähnlichen verwechselt. Sie blüht etwa 10 Tage später; die Bltt. sind mehr rund, tiefer gekerbt, lebhafter grün; die Stützblätter nicht so fein zertheilt, die Blumenkronen grösser, die Kronenbltt. breiter, die seitlichen mit stärkerem Bart, deren Farbe mehr zum Blau als zum Violett geneigt. Spornen oft weisslich.

V. sylvestris Lamarck. *Hundsveilchen*, *Waldveilchen*. *V. canina* β . *silvatica* Fries. Novit. Suec. Stängel aufsteigend oben ästig; Bltt. rundlich gegen die Spitze zu schmaler, am Grunde tief herzförmig, oberhalb mit zerstreuten Haaren; Stützbltt. lanzettlich, häufig, wimperig-gesägt, kürzer als die Blattstiele; Kelchbltt. am Gr. spitz; Kronenbl. eifg.-länglich; Sporn walzig verlängert; Kapsel spitz.

In Waldboden, in Laub-, besd. Eichen-Wäldern, auch in gras- oder busch-reichen Kieferwäldern bis an das Hochgebirge; am häufigsten und zahlreichsten in der Ebene. Apr., Mai. 2.

Die Kronenbltt. stets violett, zum Röhlichen geneigt. Diese ist nächst der *V. canina* die gemeinste Art.

V. Ruppil Allione. Stängel gerade aufrecht; Bltt. eiförmig- oder länglich-dreieckig, schwach herzförmig in den schwachgeflügelten Blattstiel ein wenig verlaufend; Stützblätter lanzettlich-spitz; fein gesägt oder gesägt, krautig, von mässiger Länge; Kelchbltt. spitz, Kronenbltt. länglich; Sporn kegelförmig; Kapsel stumpf. Hiervon zwei Hauptformen:

α . *humilis*. Stängel $\frac{1}{2}$ ' lang, schief-aufrecht, mit genäherten Blättern und Stützblättern dicht besetzt. — Hierher: *V. montana*. W. et Gr. sil. *V. pratensis* α et β Wimm. Fl. v. Schles.

β . *elatior*. Stängel gegen 1' hoch, aufrecht, mit entfernten Blättern. — Hierher: *V. Ruppil* Rchb. Exc. Iconogr. fig. 205. 206. Koch. Synops. *V. nemoralis* Kützing. Linnaea VII. p. 44.

Auf feuchten fruchtbaren Wiesen und Waldrändern, so dass α auf trockeneren höheren Stellen und in trockeneren Jahren, β dagegen an tieferen Stellen und in feuchteren Jahren zwischen höherem Grase oder im Gebüsch erscheint. Um Br. von *Scheitnich* nach *Schwoitsch* zu, bei *Ransern*, *Tschechnitz*, *Bleischwitz*; an den genannten Orten zahlreich. Wahrscheinlich über das ganze Gebiet zerstreut, doch nur in der Ebene. Mai. 2.

Stängel meist rasenförmig. Der Seitenrand der Bltt. läuft in einem ganz schwachen Bogen nach oben. Die obersten Stützbltt. ziemlich gross und breit. Kronenbltt. ziemlich gross, zuerst milchweiss, dann blass-lilafarben.

V. persicifolia Rupp. (et Schreb., Roth.) *V. lactea* Smith. brit.? *V. stagnina* Kit. W. et Gr. Fl. sil. Koch Syn. Stängel aufrecht; Bltt. zungenfg. od. länglich-lanzettlich, a. Gr. abgestutzt und in den schwachgeflügelten Blattstiel verlaufend; Stützbltt. linealisch oder lanzettlich gezähnt oder unregelmässig gesägt, krautig, von mässiger Länge; Kelchbltt. spitz; Kronenbl. rundlich-eifg., Sporn kurz.

α . *humilis*. 1-4" hoch, dicht beblättert, Bltt. zungenfg.; Stützbltt. schmal.

β . *elatior*. Stängel $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ ' hoch, schwach; Bltt. entfernt länglich-lanzettlich Stützblätter länger und breiter.

Auf nassen u. sumpfigen auch moorigen Wiesen und an den Rändern benachbarter Gebüsch und Wälder. Durch das ganze Gebiet, auch bis in das Vorgebirge, verbreitet und stets zahlreich. Um Br. bei *Scheitnich*, *Lilienthal*, *Kritttern*, *Tschechnitz*, *Treschen* u. *Olwitz*, *Lissa*. Bei *Riemberg*, *Ohlau*, *Wohlau* u. s. w. *Charlottenbrunn*. Mai. 2.

Der vorigen Art ähnlich, aber schwächer und schmächtiger, mit durchaus schmälern und längeren Bltt., deren Seitenrand eine gerade Linie bildet; Stützblt. schmaler und meist auch kürzer; Kronenblt. mehr rund, daher kleiner, milchweiss kaum in blau oder lila ziehend. Meist in dichten Rasen. Bltt. nur selten am Grunde seicht herabförmig. Die grösseren Exemplare aus Gebüsch sind der *V. canina* γ. *lacorum* sehr ähnlich. Stets ganz kahl.

V. elatior Clusius. Stängel aufrecht, steif; Bltt. länglich-lanzettlich, am Grunde gestutzt oder mit keilförmigem Zuschnitt in den breitgefögelten Blattstiel verlaufend; Stützbl. blattartig, breit lanzettlich, grob-gesägt, nach oben ungetheilt, länger als der Blattstiel; Kelchbl. spitz; Kronenbl. länglich; Sporn kegelförmig. Zwei Hauptformen:

α. pratensis. 3-6" hoch, kahl, Bltt. beiderseits spitz, a. Grunde keilförmig-herablaufend. — Hierher: *V. pratensis* Koch. Syn., *V. lactea* Fries. Novit. Succ.

β. dumetorum. 1/2 - 1' hoch, feinhaarig, Bltt. a. Gr. gestutzt oder seicht-herabförmig. Hierzu: *V. elatior* Wimm. Fl. v. Schles. *V. persicifolia* Reichenb. Icen. 100. W. et Gr. sil.

Auf fruchtbaren etwas trocknen Wiesen und den daranstossenden Rändern der Gebüsch und Gehölze, an belaubten Dämmen, Grabenrändern. Bisher nur aus der Umgegend von Breslau bekannt, aber zuverlässig auch anderwärts, doch sehr zerstreut und sparsam. *α.* nur um *Scheitnich* und *Ransern*; *β.* ebenda und *Zedlitz*, *Schottwitz*, *Masselwitz*. Mai, Juni. 2.

Blüht am spätesten. Kronen gross-rein lilafarben. Die Seitenränder der Bltt. bilden eine gerade Linie. An der Form *β.* sind die oberen Stützblätter sehr gross.

c. Aestige gelbblühende.

V. biflora L. *Zweiblumiges V.* Stängel trägt 2 Blätter und 1-2 Blumen; Bltt. rund gekerbt; Stützbl. oval ganzrandig; Kelchbl. spitz.

An feuchten und quelligen moosigen und steinigen Waldplätzen um Bäche und Quellen des Hochgebirges und Vorgebirges, etwa von 1300-4000'. *Sonnenkoppe*. Um *Reinerz*, an der *hohen Mense*, *Heuscheuer*, *Schneeberg*. *Riesengeb.*: im *Sattler*, am *Kochelfall*, *Kl. Teich*, *Schnee gruben*. *Gesenke am Köpernik*, *Oppafall*, unter der neuen *Schweizerei am Altwater*. *Baranio* bei *Ustron*. Mai, Juni. 2.

Kronen rein gelb, mit braunen Strichen. Bltt. kreis-nierenfg., sarrt, lebhaft grün. Wurzelstock kriechend.

V. tricolor L. *Stiefmütterchen*. *V. tricolor* L. und *V. arvensis* Murray. Bltt. gekerbt, die unteren herz-eiförmig; Stützblätter fiederspaltig, der mittlere Zipfel verlängert, Wurzel einfach.

Auf Acker- und Brachland, Gartenbeeten, Schutt, Mauern, in trocknen Wäldern und Haiden. Ueberall verbreitet und gemein. Mai, Septbr. ☉.

Die Krone ist bald kleiner, bald doppelt so gross als der Kelch, wechselt in der Farbe weissgelb, schwefel- und goldgelb, und theils gemischt mit dunkel-violett, theils rein violett mit gelben Strichen. Die Zertheilung der Stützblt. und die Bekleidung ist ebenfalls veränderlich.

V. lutea Smith. *Berg-V.* Bltt. gekerbt, die unteren herz-eiförmig; Stützbl. in linealische fast gleich lange Zipfel fingerförmig getheilt; Wurzel ästig kriechend.

Auf Wiesen und sanften Graslehnen des Hochgebirges. Selten im *Riesengebirge: an den Lehnen des Steinbodens gegen den Aupa- und blauen Grund und im Aupagrunde. Auf dem Gipfel des Glaz-er Schneeberges. Häufig auf den höchsten Kämmen des Gesen-kes. An der südlichen Seite d. Baranio gegen Kamczeniza (Th. Kotschy).* Juni, Juli. ☿.

Krone meist gelb, bisweilen auch violett gefleckt, gross, aber in der Grösse veränderlich. Im Aupengrunde zwischen hohem Grase hoch und kleinblumig.

Droseraceae De Cand.

Fünf Kelchblätter. Fünf gleichförmige Kronenblätter. Fünf freie Staubgefässe unter dem Stempel, mit endständigen Staubbeuteln. Kapsel ein- (oder drei-) fächerig, mit wandständigen Samenhaltern. Samen mit geradem Keim in knorplig-fleischigem Eiweiss. Mehrere oft getheilte Griffel.

Blätter bei der Entwicklung von oben nach unten kreiselig-eingerollt. Moorpflanzen von geringer Verbreitung, und schönem Bau.

Drosera L. *Sonnentau.* Kelch fünfspaltig. Drei bis fünf zweitheilige Griffel. Kapsel an der Spitze 3-5klappig, ohne Scheidewände; die Samen an der Klappenwand. v, 5.

Blätter oberseits mit rothen Drüsenhaaren besetzt.

D. rotundifolia L. *Rundblättriger S.* Blätter kreisförmig; Schaft aufrecht drei mal so lang als die Bltt.; Narben ungetheilt.

Auf sumpfigen mit Sumpfmoss (Sphagnum) bedeckten Wiesen in waldigen Gegenden und Haidebrüchen, von der tieferen Ebene bis in die Moore des Hochgebirges. Um Br. bei *Hundsfeld, Lissa, Riemberg* bei Trebnitz. *Deutsch-Hammer.* Um *Wohlau, Neumarkt, Oppeln.* Häufig in der Bunzlauer Ebene u. Haide. Gr. *See an der Heuscheuer. Moosebruch bei Reiwiesen.* Sommer, ☿, oder ☉?

Die gestielten Wurzelbl. rosettenförmig, in das Moos versenkt, fleischig. Blattloser Schaft von 3-4" H., mit anfangs überhängender kurzer einseitwendiger Blütenähre. Die kl. weissen Kronenblt. entfalten sich nur gegen Mittag bei Sonnenschein. An den klebrigen Drüsen der Bltt. hängen oft Insecten, wodurch sich das Blatt scheinbar zusammenzieht; Reizbarkeit konnten wir nie daran wahrnehmen. Vormalis offic.; *Hb. Roris solis.*

D. longifolia L. *Langblättriger S., Herrgottslöffel.* Bltt. linealisch-spatelförmig; Schaft aufrecht doppelt so lang als die Bltt.; Narben ungetheilt.

Wie die vorige, aber weit seltner, in der Ebene und dem Vorgebirge. Bisher nur auf den *Seefeldern bei Reinerz* (Schummel), *dem grossen See an der Heuscheuer* (Neumann), *Königshuld b. Oppeln* (Grabowski) und *Charkow bei Pless* von mir gefunden. Juli. 2 oder ☉.

? **D. intermedia Hayne.** *Mittlerer S.* Bltt. verkehrt-ei-spatelförmig; Schaft aufsteigend wenig länger als die Bltt.; Narben ausgerandet.

Wie die vorige. Nach Ludwig (?) soll sie auf der *Iserwiese im Riesengeb.* vorkommen. Nach Schneider um *Bunzlau bei Eckersdorf, Birkenbrük, Greulich, Klitschdorf, Aschitzau u. Tiefenfurth.*

Parnassia L. *Herzblatt.* Kelch und Krone 5 blättrig. Fünf gewimperte drüsentragende Nebenkronenblätter. Kapsel einfächerig, an der Spitze vierklappig. v, 4.

Stängel einblättrig.

P. palustris L. Auf eisenhaltigem feuchtem Wiesengrund, sumpfigen moorigen und torfigen Wiesen bis in das Vorgebirge; verbreitet und häufig. Um Br. bei *Höfchen, Oswitz, Bischwitz, Mahlen, Lissa* u. s. w. Aug., Sept. 2.

Stängel einfach, aufrecht $\frac{1}{2}$ hoch, mit einem sitzenden Blatt in der Mitte und einer endständigen Blume. Mehrere gestielte herzförmige Wurzelblätter. Krblatt. elliptisch, dicklich, milchweiss, $\frac{1}{2}$ lang. Ungefähr 10 gelbgrüne keilförmige wimperig-gespaltene Nebenkronenblätter.

Rutaceae Jussieu.

Kelch 3 - 5theilig mit dachziegelförmiger Knospenlage. Kronenbltt. mit den Kelchbltt. abwechselnd an einer unter dem Fruchtknoten stehenden Scheibe. Staubgefässe an derselben Scheibe. Der Fruchtknoten besteht aus so viel Blättern als Kelchblätter, die meist nur am Grunde verwachsen sind. Ein Griffel aus der Mitte. Die Fruchtschale ist doppelt, die äussere lederartig, die innere holzig und elastisch. Der Keim in fleischigem Eiweiss, gekrümmt.

Blätter durchsichtig-punktirt. Nur eine einheimische Art.

Ruta L. *Raute.* Kronenbltt. meist 4; doppelt so viel Staubgefässe. Drei bis fünf verwachsene Fruchtblätter. Die Fruchthäute verwachsen. x, 1.

* **R. graveolens L.** *Garten-R.* Kapselklappen stumpf; Blätter dreifach gefiedert, die Blättchen länglich-eiförmig.

Ist im südlichen Deutschland auf steinigem Hügeln einheimisch, und wird bei uns in Gärten gebaut. Sommer. 2.

Die Blätter enthalten ein aromatisch-ätherisches Oel mit bitterem Extractivstoff, und sind roh als ein magenstärkendes Gemüse beliebt. — Die Staubgefäße sind reizbar. Kronen gelb.

Dictamnus L. *Diptam.* Kelch abfällig, fünfteilig. Kronenblätter ungleichförmig. Zehn niedergebogene Staubgefäße. Fünf am Gr. verwachsene Fruchtknoten. Die innere Fruchthaut löst sich elastisch. x, 1.

D. Fraxinella Persoon. *D. albus* W. et Gr. sil. Wimm. Fl. v. Schles. Kronenbltt. spitz, die seitlichen etwas stumpf; Blätter gesägt.

An sonnigen bewaldeten Hügellehnen zwischen *Konska und All-Lischna bei Ustron* von Kotschy gefunden. Juni. 2.

Blätter gefiedert; Blättchen $\frac{1}{2}$ '' lang, dicklich, drüsig, punktiert. H. bis 2'. Blumen anscheinlich in endständiger Aehre; Kronenbltt. drei nach oben und zwei nach unten, fleischfarben mit dunkleren Adern.

Hippocastaneae De Cand.

Kelch 5blättrig. Krone unregelmässig, 4-5blättrig, unter einer unter dem Fruchtknoten stehenden Scheibe angeheftet. Sieben bis 8 Staubgefäße an der Scheibe, frei. Fruchtknoten frei, dreifächerig, mit je zwei Eichen; Klappen mit Scheidewand aus der Mitte. Kapsel 2-4samig. Samen mit breitem Nabelleck am Grunde, ohne Eiweiss, mit gekrümmtem Keim.

Aesculus L. *Rosscastanie.* Kelch glockig. Staubgefäße niedergebogen, aufsteigend. Kapseln lederartig. v, 1.

* **A. Hippocastanum L.**

Stammt aus Asien und ist durch Kultur fast allgemein verbreitet, obwohl eigentlich nicht verwildert. April, Mai, in günstigen Jahren einzelne Bäume im Sept. od. Octob. zum zweitenmale. h.

Ansehnlicher hoher Baum mit breiter Krone, glatter Rinde; Blt. gegenständig fingerfg.; Blättchen aus schmalerem Grunde länglich-keilförmig. Blumen in endständigen Trauben, weiss und rosa gemischt. Kapseln stachelig, selten fast ohne Stacheln. — Rinde als Chinasurrogat.

Acerineae De Cand.

Kelch mit dachziegelförmiger Knospenlage. Die Kronenbltt. stehen um eine drüsige, unter dem Fruchtknoten stehende, Scheibe, welche meist 8 Staubgef. trägt. Fruchtknoten zweilappig, zweifächerig mit je zwei Eichen. Die Frucht zerfällt in zwei zusammengedrückte, mit Flügelfortsatz versehene, Nüsschen. Samen ohne Eiweiss mit gekrümmtem Keim.

Acer L. Ahorn. Kelch fünftheilig. Fünf Kronenbltt. Acht Staubgefässe. — Bäume mit handförmig-getheilten Bltt. XXIII, 1 Linné, bei späteren VIII, 1.

A. campestre L. Feld-Ahorn. Blattzipfel ganzrandig, länglich, stumpf; Doldentrauben aufrecht; Frucht mit söhlligen Flügeln.

In Laubwäldern, besonders auf etwas feuchtem Grunde, hauptsächlich in der Ebene, weniger im Vorgebirge, bildet jedoch nie Wälder oder grössere Gruppen; nur in Strauchform gruppenweise, besd. in den Oderwäldern. Durch das ganze Gebiet. Mai. ♀.

Baum von mittlerer Höhe, oft strauchartig und selbst als Strauch blüthentragend. Die Rinde, besonders der strauchartigen, oft mit korkigen Flügeln. Bltt. etwa 2" breit und lang. Kronen gelbgrün. Die Blüthen fast mit den Blättern. — Aendert in der Grösse und in der Bekleidung (feinhaarig und kahl) der Blätter und Früchte.

A. platanoides L. Spitzflader, Urle. Blattzipfel buchtig-gesägt, langspitzig; Doldentrauben aufrecht; Frucht mit söhlligen Flügeln.

In Laubwäldern des Vorgebirges; in der Ebene wahrscheinlich nur durch Anbau verbreitet, oft in Gesellschaft des folgenden, den er aber nicht bis auf das Hochgebirge begleitet. *Vom Zobtenberge durch das ganze Vorgebirge des Gebiets.* April, Mai. ♀.

Ziemlich hoher Baum mit glatter Rinde und freund-grünem Laube. Die Knospen sind in eiförmige, aussen rothbraunfilzige, Schuppen eingeschlossen. Bltt. 3 - 4" lang. Kronen grüngelb. Die Blüthen fast vor den Blättern. Das weisse und sahe Holz wird vielfältig verarbeitet.

A. Pseudo-Platanus L. Fladerbaum. Blätter unterseits graugrün; Trauben hängend; Früchte mit parallelen Flügeln.

In Bergwäldern, vom Vorgebirge bis an 4000' im Hochgebirge, zuletzt als Strauch; in der Ebene nur durch Anbau verbreitet. *Vom Zobtenberge durch das Vorgebirge des ganzen Gebiets, doch nicht überall; in einigen Gegenden, z. B. um Jauer und am grossen Jauersberge (slavisch javor, Ahorn) sehr zahlreich; im Riesengeb. und Gesenke bis an die Gränze des Baumwuchses.* Mai, Juni. ♀.

Hoher und schöner Baum, mit glatter Rinde. Bltt. oberseits dunkelgrün, mit kernähnigen Zipfeln. Kr. grün. Das Holz wird verarbeitet.

Balsamineae A. Richard.

Kelch unregelmässig; das äussere (oder obere) Blatt lang-gespornt. Krone unregelmässig 3 - 4blättrig. Fünf unterständige Staubgef. dicht am Fruchtknoten, mit verbundenen Staubbeuteln, die der Länge nach aufspringen. Fruchtknoten fünffächerig, mit je mehreren Eichen. Samenhalter mittelständig. Kapsel fünfklappig elastisch-aufspringend. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Safteiche Gewächse mit durchscheinenden Stängeln.

Impatiens L. Springkraut. Fünf vereinigte Narben. Kapsel länglich; einige Klappen rollen sich beim Aufspringen spiralisch zusammen. XIX, 6 bei Linné, bei späteren V, 1.

I. Noli Tangere L. Gelbe Balsamine.

In dunkeln Laubwäldern, Brüchen und sumpfigen Gehölzen, stets im Feuchten, meist gruppenweise um verfaulte Stämme und in moderndem Laube, sowohl in der tieferen Ebene, als auch im Vorgebirge, daselbst oft ganze Hügellehnen bedeckend, *am Hochwalde, am Pass bei Dittersbach, am Sandgebirge bei Charlottenbrunn.* Um *Br. im Koseler Walde.* Um *Trebnitz, Dyhrenfurth* u. m. Zerstreut, doch nicht selten. Juli, August. ☉.

Stängel einfach, 1' hoch, saftig, schmutzig weiss, fettglänzend mit geschwellenen Gelenken. Bltt. wechselständig, eifg., grobgezähnt. Blumenstiele 2-4blumig winkelständig. Kronen goldgelb.

Elatineae Cambessedes.

Kelch 3-, 4-, 5theilig. Kronenbltt. zwischen den Kelchzipfeln, unterständig. Staubgef. gleich viel oder doppelt so viel, frei, unterständig. Drei- bis fünf-kopfförmige Narben auf freien Griffeln. Kapsel 3-5fächerig, auf dem Rücken aufspringend; Samenhalter säulenfg., mittelständig. Samen gekrümmt ohne Eiweiss mit langem Würzelchen.

Kleine Sumpfkrauter mit gegen- oder wirtelständigen Bltt. ohne Stützbltt. und kleinen Blumen in den Blattwinkeln. Bei uns selten.

Elatine L. Taunel, Tännel. Kelch drei- oder viertheilig. Drei oder vier Kronenbltt. Drei, vier, sechs oder acht Staubgef. Drei oder vier Griffel. Drei- oder vierfächerige vielsamige Kapsel. VIII, 4.

E. Hydropiper L. Scharfer T. Blätter spatelfg., gegenständig.

Auf überschwemmten Stellen, an Teichrändern. Bisher nur bei *Woelfelsdorf* von Seliger und bei *Leobschütz* von Schramm gef. *Uttiger Lache bei Bunzlau* nach Sch. Sommer. ☉.

Man unterscheidet von dieser Art noch zwei ähnliche, *E. triandra Schkuhr* mit drei Kronenbltt. und drei Staubgef., und *E. hexandra DC.* mit drei Kronenbltt. und sechs Staubgef., da die eigentliche *E. Hydr.* vier Kronenbltt. und acht Staubgef. hat. Wir konnten diese Pflanze nie lebend beobachten, und wissen daher nicht, zu welchen Formen die bei uns gefundenen gehören. — Sieht einer *Montia minor* sehr ähnlich. Stängel 1" hoch, niederliegend und wurzelnd. Bltt. gestielt. Samen halbkreisfg.

Anmk. Bei Babenhorst wird *E. Hydr.* auch bei Görlitz und *E. tiandra* bei Niesky angeführt.

E. Alsinastrum L. Wirtel-T. Bltt. länglich, wirtelständig.

In stehenden Wässern, Lachen. Bisher nur bei *Leobschütz* von Schramm und *auf d. breiten Berge bei Striegau* von Krause gef.

Nach Matt. im *Hillgenbruch bei Freistadt* u. nach v. Albertini um *Bunzlau*. ☉.

Gleicht etwas der *Hippuris*. Stäng. 2" - 1' lang, dick und hohl, gegliedert. Aus den unteren Gelenken entspringen Wurzelfasern, oder, wenn er schräg liegt, nach oben aufrechte Aeste. Die oberen Bltt. eig., gezähnt, die unteren linealisch. Vier Kronenbltt.

Hypericinae DC.

Kelch 4 - 5theilig, dauernd. Vier oder fünf gleichförmige, unterständige, in der Knospe zusammengedrehte Kronenbltt. Die Staubgefäße stehen zwischen den Kronenbltt. in Büdeln, indem die Staubfäden am Gr. verwachsen sind; Staubbeutel schwebend. Drei oder fünf kopfförmige Narben. Kapsel 3- oder 5fächerig, mit an der Spitze gesonderten und sich öffnenden Fächern, deren Scheidewände aus den eingebogenen Klappenrändern gebildet werden, an deren Rändern die zu einer Mittelsäule zusammentretenden Samenhalter sitzen. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Kräuter mit gegenständigen Bltt. ohne Stützbltt., die oft punktirt sind.

Hypericum L. *Hartheu*, *Johanniskraut*. Kelch 5theilig. Krone 5blättrig. Drei Griffel. Kapsel dünnwandig, 3fächerig. XVIII, 3.

a. die Kelchbltt. am Rande ohne Drüsen oder Fransen.

H. humifusum L. Stängel gestreckt, fädlich; Kelchbltt. länglich, länger als die Kronenbltt.

Auf feuchtem Sand- und Lehmboden, in Haiden, auf Aeckern und Brachen, in der Ebene und dem Vorgeb. verbreitet und stets sehr zahlreich. Um *Br. bei Bischwitz a. W.*, *Lissa*; in der *Trebnitzer Hügelkette* und *d. d. g. G.* Juni, Sept. ☉.

Diese ist die kleinste Art, mit 1 - 3" langen, im Kreise am Boden liegenden, seltener vereinzelt emporgerichtetsten Stängeln. Kelch und Krone oft mit rothen Drüsen. Kronenbltt. nur bei Sonnenschein ausgebreitet.

H. perforatum L. Stängel aufrecht, zweischneidig; Kelchbltt. lanzettlich spitz.

Auf trockenen sonnigen Plätzen, auf Triften, an Wegen, Acker- und Waldrändern, an buschigen Dämmen *d. d. g. G.* bis in das Vor- und an das Hochgebirge, die gemeinste Art dieser Sippe. Juni, Juli. ♀.

Stängel aufrecht, 1 - 3' h., oben ästig mit doldentraubiger Bisp. Blätter oval-länglich, durchsichtig-punktirt. Kronenbltt. gelb, verkehrt-eig., am Rande punktirt. Die Blüten sind officinell, und enthalten einen rothen harzigen Farbestoff, der dem Gummigutt verwandt ist. Die Blätter haben zerrieben einen harzig-aromatischen Geruch. Soll als Futter den Schafen nachtheilig sein. An den Wurzeln lebt ein *Coccus*.

H. quadrangulare L. *H. dubium* Leers und vieler Autt. Stängel aufrecht, viereckig; Kelchbltt. elliptisch, stumpf.

In Gebüsch und Wäldern, auf Waldwiesen und an Waldrändern d. d. g. G. verbreitet. obwohl zerstreut. Juli, Aug. 2.

Stängel aufrecht, wenig ästig, 1 - 2' h. Bltt. oval, breiter als an dem vorigen, mit deutlichen Nerven, unendlich oder gar nicht punktirt. Kronenbltt. elliptisch goldgelb, auf der ganzen Fläche schwarzpunktirt.

H. tetrapterum Fries. *H. quadrangulare* Smith engl. Bot. und vieler Autoren. Stängel geflügelt - viereckig; Kelchbltt. lanzettlich, kurzspitzig.

Auf sumpfigen und quelligen Stellen, auf Torfwiesen, an Gräben und Bächen, in Erlenbrüchen, in der Hügelgegend der Ebene und dem Vorgeb., zerstreut. Um *Br. bei Lissa, Paschkerwitz, Koberwitz. In der Trebnitzer Hügelreihe. Ohlau, Oppeln, Bunzlau. Am Rummelsberge. Um Freiburg, Hirschberg, Cudowa. Im Gesenke. Am kl. Teiche im Rsgb. Im Klokacz-Geb. bis an die Hütten der Dzialas an der Czantory etc.* Juli. 2.

Aufrecht, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ h. Blütenstand gedrängter und Blüten halb so gross als bei den beiden vorhergehenden. Kronenbltt. unpunktirt.

b. Kelchblätter drüsig-gewimpert.

H. montanum L. Bltt. herz-eifg., sitzend; Stängel kahl, stielrund.

An sonnigen Hügellehnen und in Gehölzen im Vorgebirge und in der Hügelregion der Ebene, verbreitet aber zerstreut und einzeln. *In den Trebnitzer Hügeln bei Skarsine u. Totschen. Kleinoels bei Ohlau. Gröditz und Wartha bei Bunzlau. Auf Bergen um Strehlen. Nimptsch. Reichenbach. Silberberg. Fürstenstein. Sattler bei Hirschberg. Niesky. Um Oppeln bei Wienow, Proskau, Malapane. Troppau. Um Eckersdorf, Hartau u. d. Hurkenwalde. Klokacz-Geb. am Stożek u. d. Beskiden.* Juli, Aug. 2.

Einfach, 1 - 2' h., mit gedrängter armlüthiger, fast kopfförmiger Doldentraube. Blätter wie mit fettem Reif überzogen, mit durchscheinenden, am Rande mit schwarzen Punkten. Kelchbltt. am Rande mit gestielten kugeligen Drüsen.

H. hirsutum L. Bltt. länglich, kurz-gestielt; Stängel schwachzottig, stielrund.

In schattigen Gehölzen und Wäldern der Ebene und des Vorgeb., zerstreut meist zahlreich. Um *Br. bei Scheitnich, Oswitz u. m. Ausserdem um Ohlau, Wohlau, Salzbrunn, Charlottenbrunn, Oppeln, Leobschütz und Troppau* bemerkt. Juli. 2.

Dunkelgrün. Länglich-doldentraubige Rispe. Bltt. unterseits weichhaarig, durchscheinend-punktirt.

Tiliaceae Jussieu.

Fünfblättriger Kelch mit klappiger Knospenlage. Fünf unterständige Kronenbltt. zwischen den Kelchbltt. Staubgef. zahlreich, unterständig; Staubfäden am Gr. in einen Kranz oder in mehrere Bündel verwachsen; Staubbeutel aus zwei Längs-

fächern bestehend. Der Fruchtknoten besteht aus einem, vier oder zehn um eine Axe verbundenen Fruchtblättchen mit mittelständigen Samenhältern. Frucht (auf dem Rücken aufspringend, kapselartig, oder) nicht aufspringend, lederartig. Samen mit fleischigem Eiweiss und geradem Keim.

Bäume mit wechselständigen Blättern und Deckblättern; die meisten in tropischen Ländern.

Tilia L. Linde. Kelch abfällig, fünfblättrig. Fünf Kronenblättchen mit oder ohne Schuppe am Grunde. Fruchtknoten 5fächerig. Ein Griffel. Frucht: ein durch Fehlschlagen einfächeriges, ein- oder zweisamiges Nüsschen. XIII, 1.

Die untere Hälfte des Blumenstiels ist mit dem Deckblatt verwachsen.

T. parvifolia Ehrhart. Winterlinde. Blättchen beiderseits kahl, Blattstiele kahl; Lappen der Narbe wöhlig-ausgebildet; Nüsschen schief-birnförmig, geschnäbelt, undeutlich fünfkantig.

In den Wäldern der Ebene und des Vorgebirges und durch den Anbau weit verbreitet; selten in grösseren Gruppen, sondern meist mit anderem Laubholze vermischt. Juli. h.

Baum bis 60' h., als Strauch nie blühend. Blättchen schief-herzförmig-rundlich, gesägt, oberseits dunkel, unterseits graugrün. Blumenstiele aus den Blattwinkeln, unten mit dem zungenförmigen gelblichen Deckblatt bis an dessen Hälfte verwachsen, mit 5 - 7 Blumen in einer Doldentraube. Kronenblättchen blassgelblich. Frucht lederartig, feinfilzig. — Ein vielfältig nutzbarer Baum. Die Blättchen und die innere Rinde enthalten viel Schleim; die Blüthen als Theeaufguss ein krampfstillendes und schweisstreibendes Hausmittel. Die Samen enthalten ein fettes Oel. Der Bast wird zu Matten und Seilen, und das weiche, weisse Holz, so wie die feine Kohle, verschiedenartig verwandt.

Anmkg. Was in unseren früheren Floren als *T. vulgaris* Hayne aufgeführt wurde, ist eine grossblättrige Abart der vorigen oder vielleicht auch ein Bastard zwischen unseren beiden Arten.

T. grandifolia Ehrhart. Sommerlinde. T. pauciflora Hayne. W. et Gr. sil. Blättchen unterseits weichhaarig; Blattstiele feinzottig; Lappen der Narbe aufrecht; Nüsschen kugelig mit kurzem Spitzchen und fünf Kanten.

In Wäldern der Hügellage, der Ebene und des Vorgebirges, durch Anbau verbreitet, aber viel seltner als die vorige. Bei Skarsine Rummelsberg b. Strehlen. Zobtenberg. Juni, Juli etwas 10 Tage früher als die vorige. h.

Die Blättchen, Deckblättchen und Blüthen sind grösser als an der vorhergehenden Art, daher erscheint der ansehnliche Baum reicher belaubt; aus der Ferne schimmern die Blätter grau. Die Blüthen beider Arten verbreiten einen süßlichen Geruch, und werden stark von Bienen besucht.

Malvaceae Jussieu.

Kelch 3 - 5spaltig, mit klappiger Knospelage, oft mit einer kelchartigen Hülle umgeben. Krone besteht aus fünf auf

dem Fruchtboden entspringenden freien oder am Grunde mit der Staubfadenröhre verwachsenen Blättern mit spiralig-gedrehter Knospenlage. Staubgef. zahlreich, unterständig; Staubfäden am Gr. zu einer Röhre verwachsen, Staubbeutel einfächerig in einer Querspalte sich öffnend. Der Fruchtknoten besteht aus vielen, um eine aus dem Fruchtboden sich erhebende Axe ringförmig gestellten Fruchtblättern, welche zu ein- oder zweisamigen, mehr oder weniger verwachsenen, an der inneren Nath sich öffnenden Nüsschen werden. Samen ohne Eiweiss, mit fast geradem Keim und gefalteten Keimblättchen.

Stauden oder Kräuter mit wechselständigen gelappten Blättern und Stützblättern; reich an Schleim. Die meisten sind in warmen Zonen heimisch. Unsere Arten nur in niederen Regionen.

Malva L. Malve. Küsepappel. Blumenhülle dreiblättrig. Kelch fünfspaltig. Nüsschen kreisständig. XVI, 5.

Die Frucht lässt sich auch als eine kreisförmige vielfächerige Kapsel betrachten, deren Scheidewände durch die eingeschlagenen Klappenränder gebildet werden, und deren Klappen sich einzeln lösend gesonderte Früchte darstellen.

M. sylvestris L. Rossappel. Stängel aufrecht; Bltt. kreisförmig, seicht 5 - 7 lappig; Blumenstiele nach dem Blühen aufrecht; Kronenbltt. dreimal länger als der Kelch.

Auf bebauten Plätzen, um Dörfer und Angerplätze, an Wegen, Zäunen, Gräben, Dunghaufen. Häufig d. d. g. G. Juli, Sept. ☉.

Stäng. $1\frac{1}{2}$ - 3' h., einfach und ästig, mit entfernten steifen Haaren. Bltt. getheilt, mit seichten gezähnten Lappen. Kronenbltt. angerandet satt rosenroth mit Purpurstreifen. Nüsschen gerandet netzaderig. — Die Blumen geben einen unveränderlichen violetten Farbestoff und werden als Theeaufguss bei Husten und Heiserkeit gebraucht.

M. rotundifolia L. M. neglecta Wallroth. Hasenpappel. Stängel gestreckt; Bltt. herzfg.-kreisrund, seicht 5 - 7 lappig; Blumenstiele nach dem Blühen niedergebogen; Kronenbltt. doppelt so lang als der Kelch; Nüsschen glatt.

In Dörfern und Städten an Mauern, Zäunen, auf Garten- und Gemüsebeeten und ungebauten Orten gemein. Juni, Sept. ☉.

Bltt. langgestielt. Kronenbltt. blass lilafarben ausgerandet. Nüsschen ungerandet, glatt, behaart. — Die Blätter enthalten viel Schleim und werden wie die der vorigen ausserlich zu erweichenden Umschlägen, innerlich als Gurgelmittel gebraucht.

M. borealis Liljeblad. M. rotundifolia Wallroth. Stängel gestreckt; Bltt. herzfg.-kreisrund, seicht 5 - 7 lappig; Blumenstiele nach dem Blühen niedergebogen; Kronenbltt. kaum länger als der Kelch; Nüsschen netzaderig.

Wie die vorige und in Gesellschaft derselben, doch seltner. Um Br. in der Nicolai- und Oder-Vorstadt, Oswitz, Schwoitsch, Kletendorf u. m. Um Ohlau, Bunzlau, Oppeln. Fehlt in der Flora von R. u. M. Juni, Sept. ☉.

Werde früher mit der vorigen verwechselt. Ist hellgrüner, die Stängel etwas dicker und saftiger; Kronenblt. ausgerandet weisslich. Die Nüsschen gerandet netzaderig-gerunzelt.

M. Alcea L. Siegmarskraut, Rosenpappel. Stängel aufrecht; Wurzelbltt. herzfg.-rundlich, gelappt; Stängelbltt. handfg.-5theilig mit dreispaltigen fiederschlitzigen Zipfeln; Blumenstiele filzig; Nüsschen am Rücken gekielt.

Auf lehmigem Boden, an bebauten Dämmen, in Hecken, an Dorfzäunen, d. d. g. G. in der Ebene nicht selten. Um Br. bei Carlowitz, Oswitz, Grüneiche, Schwoitsch. Um Wohlau, Beuthen a. O., Bunzlau, Hirschberg, Schweidnitz, Ohlau, Oppeln, Leobschütz, Juli, Aug. 2.

Stäng. 2-3' h., einfach oder 2stig. Grosse Blumen. Kronenblt. tiefausgerandet blassrosafarben.

Lavatera L. Lavatere. Blumenhülle dreispaltig. Kelch fünfspaltig. Nüsschen kreisständig. xvi, 5.

L. thuringiaca L. Stängel und Bltt. filzig; Bltt. 5- und 3-lappig.

In Dörfern; an Wegen, Hecken und Zäunen. Zerstreut und nicht sehr zahlreich. Um Br. in Bischwitz a. W., Kl. Weigelsdorf, Kapsdorf bei Trebnitz, Masschwitz. Auf den Gypsbergen bei Dirschel. Juli, Aug. 2.

Weissgraufilzig. Stäng. 2stig 2-3' h.; lange einzelne winkelständige Blumenstiele. Kronenbl. verkehrt-herzfg., rosenroth.

Anmkg. In Gärten werden Althaea (mit 6-9spaltiger Hülle) officinalis und rosea angebaut. Hibiscus Trionum, mit vieltheiliger Hülle und gelblich weissen am Gr. braunrothen Kronenbltt. kommt hin und wieder verwildert vor, z. B. auf Kartoffelfäckern um Kl. Bresa bei Bohras nach Krause.

Oxalideae De Cand.

Kelch 5theilig mit dachziegelförmiger Knospenlage. Krone regelmässig; fünf unterständige Kronenbltt. mit gewundener Knospenlage. Zehn Staubgefässe. Ein freier, fünffächeriger Fruchtknoten mit je mehreren Eichen. Samenhalter mittelständig. Kapsel 5-10klappig. Samen in einem fleischigen Mantel, welcher sich elastisch aufrollt und den Samen fortschleudert, mit Eiweiss und geradem Keim.

Kräuter mit saurem Saft.

Oxalis L. Sauerklee. Fünf Kelch- und Kronenblätter. Staubgef. a. Gr. verwachsen, die fünf äusseren kürzer. Kapsel länglich. X, 4.

Bltt. gedreit.

O. Acetosella L. Wald-S. Ohne Stängel; Wurzel kriechend schuppig-gezähnt.

In Laubwäldern und noch mehr Kieferwäldern, seltener in anderem Nadelholzwald, an etwas feuchten und schattigen Stellen, in der Hügelgegend der Ebene und im Vorgebirge, durch das ganze Gebiet verbreitet und stets in zahlreichen Gruppen oft kleine Strecken überziehend. Um Br. bei *Lissa*; *Trebnitzer Berge*. *Zobtenberg* und durch das ganze Vorgebirge. April, Mai. 2.

Wurzel weiss, fast schuppig. Gestielte gedrehte Bltt. mit verkehrtherzförmigen feinhaarigen Blättchen; zwischen den Bltt. ein längerer Blütenstiel mit einer Blume. Kronenbl. weiss oder rosaf., selten violett, mit purpurnen Streifen und gelbem Grundfleck. — Bei trübem Wetter legen sich die Blättchen zusammen. Aus denselben wird das Sauerklee-salz (saurer oxalsaures Kali) bereitet, welches Flecke aus Kleiderstoffen tilgt, und abführende Kraft besitzt.

O. stricta L. Garten-S. Stängel aufrecht; Wurzel sprossentreibend.

Auf Aeckern und Gartenland ein lästiges Unkraut, welches aus Nord-Amerika stammen soll. Juni. Herbst. ☉.

Wird durch die dauernden fleischigen Wurzelsprossen fortgepflanzt. Kr. gelb.

Anmkg. In Gärten wird *O. esculenta* mit röhlicher Blume und rübenförmigen essbaren Wurzelknollen gebaut.

Lineae De Cand.

Vier bis fünf dauernde Kelchbltt. mit dachziegelförmiger Knospenlage. Eben so viel Kronenbltt. mit zusammengedrehter Knospenlage. Fünf Staubgefässe zwischen den Kronenbltt., am Gr. in einen Ring verwachsen, mit einem Zahne (d. h. unentwickelten Staubgef.) zwischen je zweien. Vier oder fünf freie Griffel. Kapsel 4- oder 5fächerig; jedes Fach durch eine fast vollständige Scheidewand in zwei einsamige Fächer geschieden. Samen am inneren Winkel, ohne Eiweiss, mit geradem Keim.

Kräuter mit sehr zähen Faserzellbündeln, ungetheilten geradnervigen Bltt. ohne Stützbltt. und ölhaltigen Samen.

Linum L. Lein. Fünf Kelchbltt., Kronenbltt. u. Staubgef. Kapsel mit zehn oder mit fünf gespaltenen Klappen. v. 5.

* **L. usitatissimum L. Lein, Flachs.** Blätter wechselständig.

Wird häufig angebaut, und ist in Schlesien, namentlich im Vorgebirge ein wichtiger Gegenstand der Landescultur, sowohl als Bodenproduct als auch für die Manufactur. Sommer. ☉.

Stängel aufrecht, 1-2' h. Bltt. linealisch. Kronenbltt. hell azurblau. Man unterscheidet zwei Abarten, mit aufspringenden und mit nicht aufspringenden Kapseln. — Die Samen enthalten fettes Oel mit vielem Schleim, welche zu erweichenden Umschlä-

gen angewandt und aus denen das Leinöl gepresst wird. Aus den Stängeln wird Garn und Leinwand, mittelbar Papier bereitet.

L. catharticum L. Blätter gegenständig.

Auf fetten und schwarzen Wiesen, Sumpf- und Torfwiesen sehr verbreitet. Um Br. bei *Höfchen* u. m. Juli, Aug. ☉.

Stängel südlich, ästig, 1-4" hoch, gablig-ästig. Bltt. eifg. Kronenbl. weiss. Ist bitter und wurde sonst als Purgirmittel gebraucht.

Radiola Gmelin. *Zwerglein.* Kelch vierspaltig, mit 2-3spaltigen Zipfeln. Kapsel achtfächerig, achtklappig. v, b.

R. Millegrana Smith. *Linum Radiola.* Linn.

Auf feuchtem Sandboden, feuchten sandigen Aeckern, an Rändern von Gewässern und Lachen, nicht überall, aber stets gesellschaflich. Um Br. bei *Friedewalde*, *Leipe* bei *Oswitz*, *Riemberg*, *Lissa* u. m. Um *Ohlau*, *Wohlau*, *Bunzlau*, *Oppeln*. Juli, Aug. ☉.

Kaum sollhoch, von unten an in viele Aeate gabelspaltig zertheilt. Bltt. eifg., gegenständig. Die Blüten endständig sehr zahlreich. Krbltt. weiss.

Geraniaceae De Cand.

Kelch fünfblättrig, mit dachziegelförmiger Knospenlage. Fünf gleichförmige unterständige Kronenbltt. zwischen den Kelchbltt. Saubgef. doppelt so viel als Kronenbltt., am Gr. verwachsen. Fruchtknoten aus fünf Fruchtbltt. gebildet, 5fächerig, mit je zwei hängenden Eichen, geschnäbelt. Fünf einsamige Früchtchen, die sich von unten nach oben von der Mittelsäule lösen, während die stehengebliebenen an der Spitze der Säule befestigten Griffel (Grannen) sich krümmend die Samen emporheben. Samen ohne Eiweiss mit gekrümmtem Keim.

Untere Bltt. gegenüberstehend, obere abwechselnd dem Blütenstiel gegenüberstehend. Bltt. handförmig-getheilt oder gefiedert.

Geranium L. *Kranichschnabel.* Die Grannen der Fruchtklappen rollen sich schneckenförmig. XVI, 2.

Alle Arten bis auf eine haben Staubbeutel an allen 10 Staubgefässen. Bltt. handförmig-vieltheilig.

a. mehrjährige; meist mit grossen Blumen.

? **G. macrorrhizum L.** Fruchtklappen quer-runzlich; Kronenbltt. spatelförmig; Staubgef. niedergebogen.

Soll nach Kunze ehemals von Ludwig in der *kleinen Schnee-grube des Riesengebirges* gefunden worden sein; ich befürchte eine Verwechslung. Juni. ☿.

Die blutrothen Kronenbltt. und niedergebogenen Staubgef. machen diese Art leicht kenntlich. Stängel gabelfg., 1-2' hoch.

G. phaeum L. Rothbrauner K. Fruchtklappen quer-gefaltet; Kronenbltt. a. Gr. bärtig; Staubgef. unten gewimpert.

In Gebüschern und Wäldern des Vorgebirges. Um *Zirlau*, *Conradswaldau* b. *Landeshut*, *Dittersbach am Pass*, *Wölfelsdorf*, *Reinerz*, *Neustadt*, *Leobschütz*, *Waldenburg im Gesenke*, *Herrmannsdorf* u. *Gr. Herlitz* bei *Troppau*, *Ustron*. Auch um *Br.* bei *Scheitnich* von *Krause* gef., welches Vorkommen nicht für ursprünglich gelten kann. Nur sehr zerstreut und sparsam. Sommer. 2.

Die Wurzel aller Arten dieser Abtheilung ist ein schiefer oder söhlig gestutzter unten dichte Fasern treibender oben von Blattresten schopfiger 4-6'' dicker Wurzelstock. Stängel aufrecht mit zerstreuten Haaren. Bltt. handfg. - 5-7theilig mit 8 spaltigen eingeschnitten-gezähnten Lappen, oberseits feinhaarig, unterseits grauschimmernd. Kronenbltt. flach oder etwas zurückgeschlagen, blutroth-braun.

G. sylvaticum L. Blumenstiele nach dem Blühen aufrecht; Fruchtklappen glatt, mit abstehenden Drüsenhaaren besetzt; Staubfäden lanzettlich; Bltt. handförmig-7spaltig; Stängel oben mit Drüsenhaaren.

Auf fruchtbaren Grasplätzen, an Waldrändern, auf Waldwiesen des ganzen Vorgebirges; und auf fruchtbaren Stellen der Kämme, Lehnen und Gründe des Hochgebirges, von 1300' bis 4500'. Am *Geiersberge*, um *Charlottenbrunn*, an der *Sonnenkoppe*, *hohen Mense*, dem *Schneeberge*. Im *Riesengeb.* in den *Schneegruben*, dem *Elb- und Aupa-Gründe*. Im *Gesenke* auf d. *Wiesen am Altvater*, *Hockschar*, *Hirschwiesen*. *Czantory* b. *Ustron*. *Babia Gora*. Juni, Juli. 2.

Aufrecht, 1½-2' hoch. Wurzelbltt. lang gestielt. Bltt. beiderseits feinhaarig. Kelche zottig mit kurzer Granne. Kronenbl. lila-azurblau, mit kurzem Bart. Samen, wie bei den drei folgenden, fein punctirt. — Die Tiefe der Blatttheilung ist veränderlich.

G. pratense L. Blumenstiele nach dem Blühen zurückgeschlagen; Fruchtklappen glatt mit abstehenden Drüsenhaaren besetzt; Staubfäden a. Gr. kreisförmig erweitert; Bltt. handförmig-7theilig; Stängel oben mit Drüsenhaaren.

Auf höheren etwas trocknen Waldwiesen und an grasreichen Wegrändern, bis in das Vorgebirge; zerstreut aber stets zahlreich. Um *Br.* bei *Kleinburg*, *Gräbschen*, und an vielen Wegrändern gegen Mittag; am *Trebnitzer Wege* um *Hühnern*, *Kapsdorf* und in den *Trebnitzer Bergen* hin und wieder um *Pollentschine*, *Trebnitz*; *Zobtenberg*; *Weistritz*; *Proskau* in *O. S. Troppau* u. *Te.* Fehlt um *Bunzlau*. Juni, Juli. 2.

Stängel dicklich, bis 2' hoch, fein-filzig, an den Gelenken aufgetrieben. Kelchbltt. lang-begrannt. Kronenbl. azurblau. — An die Stelle dieser Art tritt in höheren Gegenden die vorhergehende.

G. palustre L. Sumpf-K. Blumenstiele nach dem Blühen niedergebogen; Fruchtklappen glatt mit abstehenden drüsenlosen Haaren; Staubfäden lanzettlich; Bltt. handförmig-5spaltig; Stängel oben mit drüsenlosen rückwärtsliegenden Haaren.

Auf tiefliegenden sumpfigen Waldwiesen an den Rändern der Gebüsche, in Erlenbrüchen; verbreitet und häufig, bis in das Vorgebirge. Um Br. bei *Bischofswalde*, *Oswitz*, *Bischwitz*. Um *Trebnitz* und *Dyhrenfurth*. *Oppeln*. *Troppau*. Juli, Aug. 2.

Stängel oben gespreizt-ästig. Bltt. rauhhaarig. Kronenbl. purpurfarben.

G. sanguineum L. *Blutkraut*. Blütenstiele oft einblumig; Blumenstiele nach d. Blühen etwas niedergebogen; Fruchtklappen glatt mit zerstreuten drüsenlosen Haaren; Bltt. tief-siebentheilig mit linealischen Abschnitten; Stängel mit drüsenlosen söhliglen Haaren; Kronenbltt. ausgerandet.

Auf sandigem Boden an sonnigen Hügeln zwischen Gebüsch, in trocknen Gehölzen. Um Br. bei *Schwoitsch* und *Althof*. Um *Riemberg*. *Mittelberg* bei Zobten. *Oppeln*. *Rosenberg*. Um *Troppau* bei *Zottig* u. *Grätz*. Selten, nicht sehr zahlreich. Juni, Aug. 2.

Stängel oben gespreizt-ästig, unten meist roth, an den Gelenken aufgetrieben. Kronenbltt. purpurroth. Alle vorhergehende Arten haben zweiblumige Blütenstiele, diese oft einblumige.

G. pyrenaicum L. Blumenstiele nach dem Blühen niedergebogen; Fruchtklappen glatt feinhaarig ohne Drüsen, Bltt. 7-9spaltig mit stumpf gekerbten Zipfeln; Kronenbltt. verkehrt-herzfg. zweispaltig; Samen glatt.

In Gebüsch. *Koberwitz*. *Oels*. u. *Grätz* bei *Troppau*, wo es zuerst von Mayer gefunden wurde. Wahrscheinlich noch an mehreren Orten, doch gewiss bei uns überhaupt selten. Juni, Aug. 2 nach Koch, sonst von uns für zweijährig gehalten.

Diese Art gleicht mehr den nächsten der folgenden Abtheilung. Die Blumen sind kleiner als bei den vorigen, der Kelch nur mit einer Stachelspitze. Stängel und Bltt. feinhaarig schwachzottig. Krbtt. doppelt so lang als der Kelch, lila-purpurfarben.

b. einjährige, meist mit kleinen Blumen.

G. pusillum L. Spec. pl. (non Flor. Suec.) *G. rotundifolium* Wimm. Fl. v. Schles. Bltt. fast kreisrund 7-9theilig; Kelch mit kurzer Granne, so lang als die ausgerandet-zweispaltigen Kronenbltt., welche am Nagel schwach-gewimpert sind; Fruchtklappen glatt, weichhaarig; Samen glatt.

Auf Acker- und Gartenland, fast nur um bebaute Plätze und menschliche Wohnungen an Hecken und Zäunen. Gemein. Juni, Sept. ☉.

Von $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ hoch, liegend oder aufrecht. Stängel mit kurzen Drüsenhaaren besetzt. Krbtt. lila-purpurfarben. Soll nach Koch stets nur auf 5 Staubfäden Staubbeutel tragen.

G. molle L. Bltt. nierenförmig-rundlich 7-9spaltig; Stängel fein-zottig; Kelchbltt. kurz-stachelspitzig, kürzer als die zweispaltigen am Gr. gewimperten Kronenbl.; Fruchtklappen querrunzlig kahl; Samen glatt.

An Hecken und Zäunen in Dörfern u. Vorstädten; auch in trocknen Kieferwäldern. In der *Schweidnitzer Vorstadt* von Br., in Oh-

lau, Bunzlau, Gröditz, Troppau. Nicht sehr verbreitet. Mai, Juli. ☉.

Bis 1' hoch, meist mit schiefen weitschweifig-ästigen Stängeln. Sonst in der Tracht sehr ähnlich. Kronenbl. purpurfarben.

G. dissectum L. Bltt. 5-7theilig, mit linealischen Abschnitten; Stängel kurzhaarig; Kelchbl. begrannt so lang als die ausgerandeten über dem Nagel bärtigen Kronenbl.; Fruchtklappen glatt haarig; Samen grubig - punctirt.

Auf Ackerland, unter der Saat und auf Brachen, durch das ganze Gebiet in der Ebene und dem Vorgebirge, aber zerstreut. *Schwoitsch u. Hühnern b. Br., Wohlau. N. Salzbrunn. Schmiedeberg. Oppeln. Leobschütz, Grätz u. Herlitz b. Troppau; Jägerndorf. Sommer.* ☉.

Die Zipfel der Bltt. tiefer getheilt und schmaler als bei den vorigen, daher die letzten Abschnitte linealisch; die der oberen Bltt. dreitheilig. Die Blumen etwa doppelt so gross als die der vorigen. Kronenbltt. purpurfarben.

G. columbinum L. Bltt. 5-7theilig, mit linealischen Abschnitten; Stängel feinhaarig; Kelchbltt. mit langer Granne so lang als die ausgerandeten am Gr. bärtigen Kronenbltt.; Fruchtklappen glatt und kahl, Samen netzförmig - grubig.

Auf trockenem Damm- und Waldboden, an Dämmen, in hochliegenden trocknen Gehölzen, auf steinigen Hügeln, bis in das Vorgebirge, zerstreut und nicht zahlreich. Um Br. *Nikolaivorstadt, bei Pöpelwitz, Oswitz, Arnoldsmühl, Marienau, Treschen. Um Oppeln, Cudowa, Troppau. Ustron.* Juli. ☉.

Der vorigen ziemlich ähnlich, Blumen noch ein wenig grösser. Kronenbltt. hell purpurfarben. Stängel liegend und ausgespreizt.

G. divaricatum Ehrhart. *G. bohemicum* Krock Fl. Sil. Bltt. handförmig - 5spaltig, die oberen dreispaltig, der eine Seitenzipfel ist allemal länger; Fruchtklappen querrunzlig kurzhaarig; Samen glatt.

An Zäunen. *Bisher nur an Dorfzäunen um Br. bei Bischwitz an der Weide* und nach Schummel *in Ransern, Herrnprotsch u. Leuthen;* daselbst zahlreich. Ist überhaupt selten. Juli, Aug. ☉.

Ist durch die ungleichen Blattlappen kenntlich. Stängel schlapp, mit weitläufigen Aesten. Kronenbltt. hellpurpurf. kleiner als der vorigen Arten, so lang als der begrante Kelch.

G. Robertianum L. *Ruprechtskraut. Rothlaufkraut.* Bltt. drei- oder fünf-zählig, Blättchen kurzgestielt dreispaltig, fiederig-eingeschnitten; Fruchtklappen netzförmig - runzlig; Samen glatt.

Auf steinigen Waldplätzen des Vorgebirges und der Ebene, sowohl im trocknen als feuchten. Durch das ganze Gebiet sehr zahlreich. Mai, Juni. ☉.

Stängel aufrecht, meist 1' hoch, oft wie auch die Bltt. fast blutroth. Kronenbltt. schmutzig hellroth mit weissen Strichen. Kelche etwas klebrig. — Die Pflanze hat einen starken widerlichen Geruch.

Erodium l'Heritier. Reiherschnabel. Die Grannen der Fruchtklappen rollen sich schraubensförmig. Fünf Staubgef. mit und fünf ohne Staubbeutel. XIV, 2.

Blätter gefiedert.

E. cicutarium l'Heritier. Geranium cic. L.

Auf etwas sandigem Boden, auf trocknen Triften, an Dämmen, auf Brachen und Aeckern. Verbreitet u. gemein. April—Sommer. ☉.

Wurzel spindelig, mehrstänglig; Stängel dicklich, oft blutroth, meist niederliegend nur an der Spitze aufgerichtet. Bltt. gefiedert mit tief-federspaltigen Blättchen, deren Zipfel gezähnt sind, haarig. Blüthenstiele vielblumig. — Die Behaarung der Stäng., d. Blätter, Kelche und Fruchtklappen ist veränderlich. Krobenbltt. purpurn., rosaf. oder weisslich.

Sileneae De Cand.

Kelch einblättrig, röhrig, a. d. Spitze 4-5zählig. Kronenblätter zwischen den Kelchzähnen, sammt den Staubgef. auf einem besonderen den Stempel tragenden Träger eingefügt. Fünf oder zehn Staubgef. Fruchtknoten a. Gr. 2-5fächerig; mit einem mittelständigen oben freien Samenhälter. Zwei bis fünf gesonderte Griffel. Kapsel springt in 4-5 Zähnen auf. Samen mit Eiweiss und ringförmigem Keim.

Die Kronenbltt. bestehen aus Nagel und Platte; am Uebergange des Nagels in die Platte befindet sich bei den meisten ein Krönchen. Bltt. gegenständig, a. Gr. verbunden, ohne Stützblätter. Stängel an den Gelenken knotig-aufgetrieben. — Es kommt bei den Pflanzen dieser und der folgenden Familie häufig eine polygamische Bildung der Blüthen vor, indem entweder die Staubgefässe und Krone sammt Kelch grösser u. vollständiger entwickelt, dagegen die Stempel klein und verkümmert sind, oder umgekehrt die Stempel vollkommen sind bei verkümmerten Staubgefässen und kleineren Kelchen und Kronen. Am häufigsten wird dies gefunden bei *Silene Otites* u. *S. inflata*. Die Sippen dieser und der folgenden Familie sind schwer zu sondern; der Kelchbau ist von Bedeutung; auch die Arten sind oft schwer zu unterscheiden wie bei *Dianthus*. Sie sind in der gemässigten Zone einheimisch und gehen weit bis Norden. Von dem unsrigen sind einige weit verbreitet und charakteristisch; alle bis auf eine der Ebene und dem Vorgebirge eigen. Sämmtliche gehören in die zehnte Klasse Linnés.

Dianthus L. Nelke. Kelch 5zählig, a. Gr. von dachziegelförmigen Deckblättern umschlossen. Fünf Kronenbltt., deren breite Platte in schmallinealische Nägel übergeht. Zwei Griffel. Kapsel einfächerig, oben vierklappig. Samen schildförmig. X, 2.

a. Blumen zusammengedrängt.

D. prolifer L. Knopfnelke. Blumen kopfförmig-gedrängt; die inneren Deckblätter am Kelch sind länger als dieser, stumpf, und hüllen ihn ein.

Auf sandigem Boden, an trocknen Dämmen und Hügeln, selten und sparsam, auch im Vorgebirge. Um Br. bei *Pöpelwitz*, *Tschirnau a. O.*, *Trebnitz* und *Heydewitz*. Bei *Wohlau* und *Steinau Breiter B.* bei *Striegau*, *Polsnizer Bg.* *Görlitz*. Juli, Aug. ☉.

Die Deckblätter am Kelche strohfarben. Krbllt. klein, nur bei Sonnenschein ausgebreitet, rosafarben, wohlriechend. Stängel dünn, einfach.

D. Armeria L. Blumen büschelig; die Deckblätter lanzettlichspitz so lang als die Kelchröhre.

Auf lehmigem Boden an buschigten Dämmen und Hügeln, Waldrändern, in lichten Gehölzen zerstreut und hin u. wieder zahlreich, auch im Vorgebirge. Um Br. bei *Carlowitz*, *Schwoitsch*, *Treschen*, *Ransern*, *Lissa*, *Oswitz* u. m. Sommer. ☉.

Stängel steif, 1' hoch, oben mit fast aufrechten Aesten. Kronenblt. klein, blass purpurfarben, nur am Vormittag ausgebreitet. Stängel, Bltt. und Kelche meist schwachrauhhaarig, aber bisweilen auch kahl.

D. Carthusianorum L. *Karthäuser-N.*, *Donner-N.*, *Stein-N.* Blumen zu sechs in endständigem Kopf; die Deckblt. am Kelch stumpf mit pfriemlicher Granne so lang als die halbe Kelchröhre.

Auf lehmigem Boden, an trocknen Dämmen, auf hohen Waldtriften, an steinigen Hügelrändern, in der Ebene und dem Vorgebirge bis an das Hochgebirge. Durch das ganze Gebiet häufig. Sommer. ♀.

Blätter linealisch starknervig, an der Wurzel büschelig. Kronenblt. bärtig, purpurbtrot, am Gr. mit dunklerer Zeichnung. H. 1-2'.

b. Blumen vereinzelt oder in Rispen.

D. deltoides L. *Deltafleckige N.* Blumen vereinzelt; Krbllt. verkehrt-eifg., gezähnt; Kelchdeckblt. zu zweien, elliptisch mit pfriemlicher Granne; Bltt. lineal-lanzettlich, die unteren stumpf gegen den Grund hin verschmälert.

An Dämmen und auf trocknen Wiesen, an Rainen und Waldrändern. Durch das ganze Gebiet häufig. Juni, Sept. ♀.

Stäng. schlapp, aufsteigend, von feinen Haaren scharflich, $\frac{1}{2}$ -1' hoch, gablig-ästig. Bltt. feingesägt.

* **D. Caryophyllus L.** *Garten-N.* Blumen vereinzelt; Krbllt. verkehrt-eifg., gekerbt; Kelchdeckblt. rautenfg. mit kurzer Spitze; Bltt. linealisch graugrün.

Ist im südlichen Europa einheimisch, und wird bei uns als beliebte Zierpflanze in Gärten in unzähligen Spielarten gezogen. Juli, Aug. ♀.

D. caesius Smith. *Kiefer-N.* Stängel meist einblumig; Kelchdeckblt. eifg., stumpf, mit einer Stachelspitze; Kronenblt. bis gegen die Mitte in lanzettliche Zähne gespalten, bärtig; Bltt. linealisch, stumpf, graugrün.

Auf Sandboden in grossen Kieferwäldungen, nur auf dem rechten Oderufer. Bisher nur bei *Birnbäumel*, und in den oberschlesischen Wäldern um *Malapane*, *Königshuld* u. m. Anderwärts kommt diese Art auf Felsen vor. Mai, Juni. ♀.

Treibt so wie die Gartennelke von dem Wurzelkopfe aus niederliegende sprossende und wurzelnde Stängel, wodurch sie sich vermehren lässt. Dichte Blätterrosen. Stängel oben blattlos, aufrecht, 4-6'' hoch. Kelche graugrün und roth überlaufen. Kronenbltt. sattrosenroth; die Tiefe der Einschnitte ist veränderlich.

D. arenarius L. Sand-N. Stängel meist einblumig; Kelchdeckbltt. eifg., stumpf mit kurzer Spitze; Kronenbltt. fiederschlitziggetheilt, bärtig; Bltt. linealisch-pfriemlich grün.

Auf Sandboden in Kieferwäldern. Bisher nur *in der Kynauer Haide bei Grünberg* von Schmäck gefunden, welches der südwestlichste Standort in unseren Gegenden zu sein scheint. Sommer. ♀.

Hat die Tracht der vorigen Art, Stängel $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ ' hoch, bisweilen an den Knoten gekniet, 2-3blumig. Bltt. fast rosettenförmig, am Rande schärflich. Kronenbltt. weisslich a. Gr. mit grünlichem Fleck und mit einigen purpurfarbenen Haaren besetzt.

D. superbus L. Feder-N. Stängel 2- mehrblumig; Kelchdeckbltt. eifg. in eine Granne zugespitzt; Kronenbltt. fiederschlitziggetheilt; Bltt. lineal-lanzettlich, die unteren stumpflich.

Auf feuchten und fruchtbaren Wiesen, an Waldrändern, in lichten Wäldern, Berglehnen und auf Gebirgswiesen, von der Ebene bis ins Hochgebirge 4500', zerstreut. *Um Br. bei Wildschütz, Mahlen, Lissa, Am Geiersberge, Polsnitzer Bg. und im übr. Vorgebirge* zerstreut. *Herlitz und Dorfeschen. Tul bei Ustron.* Im Hochgebirge an einzelnen Stellen: *im Teufelsgärtchen im Riesengeb., auf dem Gipfel des Schneeberges, im Kessel und am Peterssteine im Gesenke.* Juli, Aug. ♀.

H. $\frac{1}{2}$ -2'. Die Kronenbl. fleischf. rosaf. oder lila-purpurroth, mit rothen Haaren besetzt. Man kann eine Form der Ebene, mehr grün, mit höherem dünnerem Stängel. längeren Blütenstielen und weitläufigen Blumen, und eine Gebirgsform, mehr roth angefaulen, mit steiferem kürzeren Stängel und Blumenstielen und gedrängteren Blumen unterscheiden. Schwach wohlriechend.

Vaccaria Fl. d. Wett. Kelch 5zählig, ohne Deckblätter, 5eckig-gellügelt. Kronenbltt. mit linealischem Nagel. Zwei Griffel. Kapsel einfächerig, vierzählig. Samen nierenförmig-kugelig. x, 2.

V. pyramidata Fl. der Wett. Saponaria Vacc. L. Koch Syn. Gypsophila V. Smith. Wimm. Fl. v. Schl.

Auf Aeckern unter der Saat. *Um Oppeln* von Grabowski gef. In manchen Jahren zahlreich, in anderen sehr sparsam. Juni, Juli. ☉.

Stängel aufrecht, oben dreigabelig-getheilt, 1-1 $\frac{1}{2}$ ' hoch, kahl. Bltt. lanzettlich, kahl. Lockere Doldentraube. Kronenbl. ausgebreitet und unregelmässig gekerbt, sattrosafarben.

Saponaria L. Seifenkraut. Kelch fünfzählig, ohne Deckblätter, stielrund. Fünf Kronenbltt. mit linealischem Nagel und Krönchen am Schlunde. Zwei Griffel. Kapsel einfächerig vierzählig. Samen nierenförmig x, 2.

S. officinalis L. Blüten in büscheliger Doldentraube; Kelche walzig.

Auf sandigem und steinigem Boden zwischen Gebüsch und Ge-
strüpp an den Ufern der Flüsse. Um Br. längs den Oderufern mit
Oenothera und *Eryngium planum Wohlau. Ohlau. Bei Jauer,*
Reichenstein, Hirschberg, Oppeln. An der Mora bei Troppau,
Grätz, Weichsel bei Ustron. Juli, Aug. 2.

Stängel aufrecht, 2-3' hoch, stielrund, oben ästig, oft roth. Bltt. länglich bis
lanzettlich, dreinervig. Kronenbltt. spatelförmig, eingedrückt, fleischfarben. — Die
Wurzel, ehemals nur die Blätter, ist officinell; sie enthält einen eigenthümlichen im
Wasser auflöselichen Extractivstoff, welcher Linnen- und Wollenzeuge reinigt, und ist
neuerdings unter den Schafzüchtern wieder als Wollwäschmittel in Ruf gekommen.

Gypsóphila L. Gypskraut. Kelch 5zählig, ohne Deck-
blätter. Fünf in einen keilförmigen Nagel verschmälerte Kro-
nenbltt. Zwei Griffel. Samen nierenförmig. x, 2.

Blumen klein, zahlreich.

G. fastigiata L. Stängel einfach, oben eine gedrängte Dolden-
traube tragend; Kelche glockig.

In lockerem Sand, auf Hügeln zwischen Kiefern und Birken. In
Oberschlesien bei *Gr. Lassowitz* nach *Matt.* Um Br. bei *Paschker-*
witz, Mirkau b. Hundsfeld. Birnbäumel. Wohlau. Fuñeck b. Trop-
pau nach v. *Mück. Riegersdorf bei Te.* nach *Kotschy.* Sehr zer-
streut aber stets in zahlreichen Gruppen. Sommer. 2.

Wurzelstock vielköpfig. Stängel oft aufsteigend. Bltt. unten gehäuft, linealisch.
Die Aeste bilden eine gleichgipfliche gedrängte Doldentraube und sind klebrig-feinhaar-
rig. Staubgef. und Stempel ragen über die weissen Kronenbltt. hervor.

G. muralis L. Stängel gabelspaltig-ästig; Blüten zerstreut;
Kelch kreiselförmig.

Auf Sandplätzen, feuchten und trocknen, Aeckern, Brachen, auf
ausgetrockneten Lachen. Gemein. Juli, Aug. 2.

Ein dünnes Pflänzchen, mit fädigen Stängeln und Aesten, 1-6" hoch. Bltt. lineal-
lisch-pfriemlich, Kronenbltt. gekerbt blass-purpurfarben.

Siléne L. Taubenkropf, Leinkraut. Kelch fünfzählig,
ohne Deckblätter. Fünf Kronenblätter mit oder ohne Krön-
chen am Schlunde. Drei Griffel. Kapsel im Grunde 3fächer-
rig, oben 6klappig. Samen nierenförmig. x, 3.

S. gallica L. Blütenäste klebrig-weichhaarig, aufrecht;
Kelch röhrig rauchhaarig mit lanzettlich-spitzen Zähnen; Frucht-
stiele abstehend oder zurückgeschlagen; Kronenbltt. ungetheilt; Bltt.
lineal-länglich, die unteren spatelförmig.

Auf sandigen Aeckern unter der Saat und auf Brachen, durch das
ganze Gebiet aber sehr zerstreut. Um Br. bei *Maria-Höfchen, Lissa.*
Oels, Landeck und Reichenstein. Niesky. Oppeln. Neustadt i. O.S.
Bei Einsiedel u. Freiwaldau. Bei Teschen. Sommer. ☉.

Durchaus weichhaarig. Stängel oft röthlich, 6''-1' hoch, aufrecht, meist ästig. Kelch gerippt, nach dem Blühen eiförmig. Kronenbltt. schmutzig rosearoth, bisweilen feingezähnt.

S. nutans L. Hängendes L. Blütenäste drüsig-klebrig, sählig-niedergeschlagen; Rispe einseitwendig; Kelch röhrig keulenförmig mit spitzen Zähnen; Kronenbltt. zweispaltig mit Krönchen; Bltt. lanzettlich-elliptisch.

An Waldrändern, grasreichen und buschigen Hügellehnen und Dammrändern, an den Rändern der Hohlwege, in der Ebene besd. der Hügellgegend und durch das ganze Vorgebirge bis in das Hochgebirge, im g. G. häufig. Um Br. bei Oswitz, Ransern, Schwoitsch u. m. Juni, Juli. ♀.

Stängel aufrecht oben überhängend, weichhaarig. Bltt. bei dieser und den 3 folgenden Arten an der mehrköpfigen Wurzel büschelig. Blütenstiels gepaart dreigabelig, mit 3-7 Blumen. Kronenbl. weiss. Staubbeutel violett. Nach dem Blühen richten sich die Fruchtsiele empor. Kapselähne umgerollt.

Anmkg. Nach v. Mueckusch soll *S. nemoralis*, welche sich von dieser Art durch aufrechte gedrängte Rispe, Kronenbltt. ohne Krönchen und am Gr. bärtig-gewimperte Bltt. unterscheidet, um Wolfsdorf bei Troppan gefunden worden sein.

S. chlorantha Ehrhart. Blütenäste kahl, 1-3blumig; Blumen vor dem Blühen nickend; Kelche röhrig fast keulenfg., mit stumpfen Zähnen; Kronenbltt. zweispaltig mit Krönchen; Bltt. lineal.-lanzettlich.

In sandigen Kiefer- und Birkenwäldern der Ebene. Zuerst bei Lüben von Treviranus gefunden; Arnsdorf bei Wohlau. Um Br. bei Mirkau und Gr. Weigelsdorf. Das Odergebiet scheint die westliche Gränze zu sein. Juli. ♀.

Stäng. aufrecht, 1½-2' hoch, fast blattlos, kahl wie die ganze Pflanze. Kelche weissgrün mit violetterm Anlauf. Kronenbltt. gelb-grünlich. — Hierher gehört wahrscheinlich *Cucubalus cathoticus* Krock sil.

S. Otites Smith. Cucubalus O. L. Blütenäste kahl, eine aus Wirteln zusammengesetzte Rispe bildend; Kelche röhrig-glücklich, mit stumpfen Zähnen; Kronenbltt. linealisch ungetheilt ohne Krönchen; Bltt. lanzett-spatelförmig.

Auf Sand; auf Hügeln, an Dämmen, Hügellehnen und an steinigen Wegrändern in der Ebene und dem Vorgebirge. Zerstreut und hie und da fehlend. Um Br. bei Schwoitsch, Carlowitz, Oswitz, Lissa u. m. Um Wohlau, Beuthen a. O., Ohlau, selten um Tropp. u. Teschen; fehlt um Bunzlau. Juni, Juli. ♀.

Wuchs wie der vorigen. Stängel und Bltt. feinhaarig-schärflich. Kronenbltt. klein, grünlich. — Entweder sind die Staubgefässe vollständig entwickelt, die Stempel aber klein und verkümmert oder umgekehrt.

S. inflata Smith. Cucubalus Behen L. Blütenäste in gabliger Rispe; Kelche eiförmig aufgeblasen vielnervig und netzaderig mit eiförmigen spitzen Zähnen; Kronenbltt. zweitheilig am Schlunde mit zwei Hökern.

Auf grasigen Anhöhen u. Dämmen, Wegrändern in Hügelgegenden, auf hohen Triften, steinigen Waldgegenden von der Ebene bis auf die Lehnen und Grasränder des Hochgebirges. Sehr verbreitet und häufig. Juli, Aug. 2.

Stängel aufsteigend, 1-2' hoch. Bltt. eig.-länglich, auch lanzettlich, meist kahl, graugrün. Krbllt. weiss. Die Blumen sind polygamisch, im Gebirge grösser.

S. noctiflora L. Stängel oben gabelspaltig, klebrig-zottig; Kelch bauchig-röhrig, mit 10 Nerven, geadert, mit pfriemlichen Zähnen; Kronenbltt. tiefzweispaltig mit Krönchen; untere Bltt. spatheförmig.

Auf Aeckern unter der Saat und auf Brachen, auf thonigem Grunde, zerstreut und sparsam. Um Br. bei *Oswitz*, *Gräbschen*, *Bettlern* u. *Koberwitz*. *Riemberg*. *Dittmannsd. b. Schweidnitz*. *Wohlau*. *Ohlau*. *Oppeln*. *Reichenstein*. *Palhanetz b. Trop.* Um *Teschen*. Juli, Aug. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ -1' hoch, rauchhaarig, zuweilen einblumig. Kronenbltt. weiss oder fleischfarben, nur in der Dämmerung ausgebreitet, wohlriechend. Gleich der *Lychnis vespertina*.

Cucubalus L. *Hühnerbiss*. Kelch fünfzählig, ohne Deckblätter. Fünf Kronenbltt. mit Krönchen. Drei Griffel. Kapsel einfächerig beerenförmig kuglig. x, 3.

Diese Sippe mit nur einer Art weicht sowohl in Tracht und Wuchs als auch durch die Frucht sehr von dieser Familie ab, mit der sie im Blütenbau völlig übereinkommt.

C. baccifer L. *Silene baccifera* Willdenow.

In feuchten Gebüschern und Hecken an niedrigen Flussrändern; wahrscheinlich nur in der tieferen Ebene, und sehr zerstreut. Um Br. nicht selten bei *Bischofswalde*, *Marienau*, *Schwoitsch*, *Treschen* u. m. *Oppeln*, *Tropp.* u. *Te.* Juli, Aug. 2.

Stängel vierkantig, 2-4' hoch, mit armförmig-gespreizten Aesten, schwach und im Gebüsch kletternd, feinhaarig. Bltt. länglich-eiförmig, wimperig-gesägt. Aeste dreigabelig. Kelch bauchig-glockig, mit krausen Härchen. Kronenbl. grünlich-weiss. Kapseln grün, zuletzt glänzend schwarz.

Viscaria Rivin. *Kleinelke*. Kelch fünfzählig ohne Deckblätter. Fünf Griffel. Kapsel bis zur Hälfte fünffächerig, oben fünfzählig. x, 4.

V. purpurea nobis. *Pechnelke*. *Lychnis Viscaria* L. und bei allen Autoren. Kronenbltt. ungetheilt mit Krönchen; Stängel unter den Gelenken leimig.

An trocknen grasreichen Hügellehnen, Wegrändern u. Dämmen, in der höheren Ebene und dem Vorgebirge, ziemlich verbreitet und zahlreich. Um Br. bei *Oswitz* und *Ransern*, *Lissa*, *Allhof* u. m. *Mai*, *Juni*. 2.

Stängel steif aufrecht, 1-1 $\frac{1}{2}$ ' hoch, unter den Knieen rothleimig. Bltt. kahl spatheförmig, die oberen linealisch. Blumen fast wirtelsf. in aufrechter Traubenrispe. Krbllt. wässerig-purpurfarben. — In Gärten gefüllt, roth und weiss.

Lychnis L. *Lichtnelke*. Kelch fünfzählig ohne Deckbltt., kürzer als die Krone. Fünf Kronenbltt. (mit Krönchen). Fünf Griffel. Kapsel einfächerig, oben fünfzählig. x, 4.

L. *Flos Cuculi* L. *Kuckucksblume*. *Rindfleisch*. Kronenbltt. und Krönchen bis über die Hälfte vierspaltig.

Auf nassen und sumpfigen Wiesen, Waldwiesen der Ebene u. d. Vorgebirges gemein, so dass zur Blüthezeit ganze Strecken davon roth erscheinen. Mai, Juni. ♀.

Stängel aufrecht, 1 - 2' hoch, schärflich, oft roth. Bltt. lanzettlich. Blüthen in weitläufiger Rispe. Kelche glockig; 10-rippig. Kronenbltt. purpurf. od. fleischfarben, selten weiss.

L. *vespertina* Sibthorp. L. *dioica* L. Wimm. Fl. v. Schl. Kronenbltt. bis zur Hälfte zweiseitig-ästig; Stängel unten zottig, die Bltt. und oberen Theile drüsig-kurzhaarig; Kapselzähne gerade.

An Weg- und Ackerrändern, an Dämmen, auf trocknen Wiesen und unbauten Hügeln, gemein. Juni, Aug. ☉.

Stängel aufrecht, gabelspaltig-ästig, 1 - 3' hoch. Bltt. elliptisch und lanzettlich. Kelche oft roth überlaufen. Kronenbltt. weiss, mit breiten genäherten Lappen, nur gegen Abend ausgebreitet. Blumen polygamisch. Spielart mit vielschlitzigen Kronenbltt. Wohlriechend.

L. *diurna* Sibthorp. L. *dioica* α L. L. *sylvestris* Hoppe. Wimm. Fl. v. Schles. Kronenbltt. bis zur Hälfte zweiseitig; Stängel, Bltt. und Kelche zottig; Kapselzähne umgerollt.

In feuchten Wäldern und Gebüsch, besonders an Flüssenfern des Vorgebirges, bisweilen bis in die Ebene herabsteigend und vielleicht durch die Flüsse herabgeführt, bis auf Wald- und Grasplätze des Hochgebirges. Um Br. bei Sibyllenort. An der Weistritz bei Schosnitz und Schweidnitz. Kroischwitz bei Bunzlau. Görlitz. Durch das Vorgebirge verbreitet, z. B. um Silsterwitz, im Eulengebirge, an der Sonnenkoppe; um Charlottenbrunn, Bolkenhain, Hirschberg; in den Bergen der Grafschaft Glatz. Tafelfichte. Kämme des Riesengebirges und Gesenkes und Gipfel des Schneeberges. Klokaczgeb. Mai, Juni. ♀.

Höhe und Gestalt der vorigen. Wurzelbltt. langgestielt. Kelche meist schmutzig-roth. Kronenbltt. etwas kleiner, rosa-purpurf., mit auseinanderstehenden Lappen, am Tage ausgebreitet. Geruchlos. Blumen polygamisch.

Agrostemma L. *Rade*, *Rathe*. Kelch lederartig, fünfspaltig, länger als die Krone, ohne Deckbltt. Fünf Kronenbltt. (ohne Krönchen). Fünf Griffel. Kapsel einfächerig, oben fünfzählig. x, 4.

A. *Githago* L. *Korn-Rathe*. *Lychnis Gith*. Lamarck. Koch Syn. Kronenbltt. mit einem Eindrucke.

Auf Aeckern unter der Saat ein lästiges und gemeines Unkraut. Sommer. ☉.

Stängel oben ästig, 2-4' h., rauchhaarig. Bltt. lineal-lanzettlich grauhhaarig. Der erweiterte und verhärtete Kelch bedeckt die Kapsel. Kronenbltt. rosa-purpurfarben. Samen schwarz, tetraedrisch, gekörnt.

Alsineae De Cand.

Kelch 4 - 5blättrig. Kronenbltt. zwischen den Kelchbltt. Zehn oder weniger freie Staubgef. sitzen auf einem unterständigen Ringe. Fruchtknoten frei, einfächerig, mit einem freien mittelständigen Samenhälter. Zwei bis fünf gesonderte Griffel. Kapsel in Zähnen oder Klappen aufspringend. Samen mit Eiweiss und ringförmigem Keim.

Bltt. gegenständig, ohne Stützbltt. Blumen meist einzeln in den Gabeltheilungen der Zweige. Meist niedrige ästige kleinblättrige Pflänzchen mit kleinen weissen Blüthen. Sie gehören den kälteren Gegenden der Erde an, sind gegen niedrige Temperatur wenig empfindlich, und einige gehören zu den verbreitetsten und gemeinsten Pflanzen. Die Sippen sind schwer zu sondern. Diese und die vorige Familie bilden die *Caryophyllaceae* Jusieu. Fast sämtliche gehören in die zehnte Klasse Linnés.

Alsine Wahlenberg. *Alsine*. Kelch fünftheilig. Fünf ungetheilte Kronenbltt. Zehn oder 4 - 5 Staubgef. Drei Griffel. Kapsel dreiklappig. x, 3.

A. verna Bartling. *Arenaria verna* L. W. et Gr. sil. Mit rasenförmigen Stängelstöcken; Blumenstängel aufsteigend, an der Spitze ein oder mehrere Blüthen tragend; Kronenbltt. länger als der Kelch.

Anf Felsen im Hochgebirge. Nur im Teufelsgärtchen 4000', zuerst von Ludwig gefunden. Juni. 2.

Bildet kleine, fast polsterförmige Basen. Bltt. linealisch-pfriemlich, dreinervig, aufrecht; die Blütenstiele meist dreitheilig.

A. tenuifolia Wahlenberg. *Arenaria ten.* L. W. et Gr. sil. Krock. sil. *A. viscidula* Thuill. Wimm. Fl. v. Schl. Stängel aufrecht gabelspaltig-ästig; Blüthen in Büscheln; Kronenbltt. kürzer als der Kelch; Bltt. borstlich-pfriemlich.

Auf sandigen Brachäckern, in der Ebene zerstreut, und bisher nur bei Gr. Tschirnau b. Guhrau (zuerst von Starke), Riemberg am Wartberge, Militsch, Grossstein bei Oppeln (von Grabowski) und um Bunzlau von v. Alibertini gefunden, aber gewiss noch hie und da, doch übersehen. Juni, Juli. ☉.

Ein dürftiges 1 - 2'' hohes Pflänzchen mit kurzen borstlich-pfriemlichen Bltt., bald dicht mit feinem Drüsenhaare besetzt, bald fast kahl.

***Arenaria* L. Sandkraut. Kelch fünfblättrig. Fünf ungetheilte Kronenbltt. Zehn Staubgef. Drei Griffel. Kapsel sechsklappig. x, 3.**

A. trinervia L. *Mochringia trinervia* Clairville. Koch
 Syn. Bltt. unpunktirt, 3 - 5nervig, die unteren gestielt.

In feuchter Laub- und Holz-Erde; in feuchten schattigen Wäldern, hohlen Bäumen, an Mauern. Bis in das Vorgebirge, häufig. Sommer. ☉.

Stängel ästig, 2 - 6" lang, zart und schwach, auf einer Seite feinhaarig. Bltt. 3 - 4" breit. Kelchbltt. etwas länger als die Kronenbltt. Die Samenhaut hat am Nabel eine Anschwellung, wodurch man die Sippe *Mochringia* von *Arenaria* unterscheidet.

Aamkg. *Arenaria (Mochringia) muscosa*, welche in allen subalpinen Gegenden Deutschlands wächst, kommt nach Nees von E. Verzeichniss an der Iser vor.

A. serpyllifolia L. Bltt. durchscheinend-punktirt, sitzend.
 Auf Sandboden, Aeckern, Brachen, Triften, Mauern und Dächern. Gemein. Sommer. ☉.

Stängel gablig-ästig, 1 - 2" hoch. Bltt. eifg.-spitz, 1 - 2" breit. Kelchbltt. anderthalbmal so lang als die winzigen Kronenbltt. Samenhaut ohne Anschwellung. Man unterscheidet Varietäten nach der grösseren oder geringeren Bekleidung; auch bisweilen klebrig und drüsig.

Stellaria L. *Vogelkraut, Sternkraut.* Kelch fünfblättrig. Fünf zweispaltige oder zweitheilige Kronenbltt. Zehn Staubgef. Drei Griffel. Kapsel sechsklappig. x, 3.

a. Kapsel springt an der Spitze in Zähne auf; Mittelsaule lang.

St. viscida Marsch v. Bieberstein. *Cerastium anomalum*
 Waldst. et Kitaib. W. et Gr. sil. Bltt. linealisch, die unteren spatheilig; Blumenstiele klebrig-haarig; Stängel stielrund, oben gablig-ästig; Kronenblätter länger als der Kelch.

Auf sandigen Triften, bisher nur um Breslau an vielen Stellen, besonders in der Nähe der Oder: *Viehweiden bei Pöpelwitz, Kosel u. Oswitz. Hinter dem Lehmdamm, bei Leerbeutel, Zedlitz. Um Gr. Mochbern. Klettendorf.* Mai. ☉.

Meist 1 - 3', seltner an Gräben und auf aufgeworfenem Boden auch fusslang und dann ansteigend, viele aus einer Wurzel, sonst aufrecht einzeln. Kelchbltt. stumpf, drüsig. Diese Art scheint hier ihre nordwestliche Gränze zu haben.

b. Kapsel springt bis zur Hälfte in Klappen auf; Mittelsaule lang.

S. nemorum L. *Waldmiere.* Bltt. länglich-eifg., die unteren herzfg. und gestielt; Kronenbltt. doppelt so lang als der Kelch.

Auf feuchtem Grunde in schattigen Laubwäldern und Gebüsch, in der Nähe von Gewässern und quellreichen Stellen, hauptsächlich in der Hügellage der Ebene und dem Vorgebirge. Um Br. bei Lissa, Kl. Weigelsdorf und in den Trebnitzer Hüg., z. B. bei Magnitz am Teiche. Zobten, Sandgebirge bei Charlottenbrunn, Gröditz, Wehrau, Mois bei Bunzlau. Trop. u. Te. Juni. 2.

Stängel schwach, 1' h., oben weichhaarig, mit endständiger gabelspaltiger Rispe. Bltt. weich. Kapsel länglich.

c. Kapsel springt bis zur Hälfte in Klappen auf; Mittelsäule sehr kurz.

S. media Villars. *Vogelkraut, Vogelmeier, Vogelmiere. Alsine med.* V, 3 Linné. Bltt. eig., kurz-spitzig, die unteren gestielt; Kronenbltt. so lang oder kürzer als d. Kelch, tief zweitheilig; Kapsel länger als d. Kelch.

Auf jeder Art von Boden, an allen bebauten und unbebauten Plätzen, Acker-, Brach- und Garten-Land, an Gräben, in Gebüsch und Wäldern, auf Mauern und Dächern. Ist eine der gemeinsten Pflanzen und unter allen gegen die Kälte am unempfindlichsten; fast noch unter dem Schnee blühend, das ganze Jahr hindurch.

Der Stängel ist mit einer Reihe von Haaren besetzt. Meist fünf Staubgef. Grössere Exemplare mit breiteren Bltt. und zehn Staubgef. sind *S. neglecta* Weihe. W. et Gr. sil.

S. Holostea L. *Grasnelken.* Bltt. lanzettlich-langspitzig am Rande und Kiele scharf, gabelspaltige Doldentraube mit krautigen Deckbltt.; Kelchbltt. ohne Nerven, halb so lang als die Kronenbltt. und so lang als die kuglige Kapsel; Stängel vierkantig.

Auf trockenem Waldboden, in grasigen Vorwäldern, lichten Gebüsch, zwar häufig in der Ebene, doch mehr an höheren Stellen und im Vorgebirge. Um *Br. bei Leerbeutel, Schwoitsch, Arnolds-mühl, Lissa. In den Trebnitzer Bergen.* April, Mai. 2.

Wurzel kriechend. Stängel aufrecht, $\frac{1}{2}$ ' hoch, etwas starr. Bltt. steiflich stark-gekielt. Kelchbltt. mit weissem Hautrande. Samen beinhart.

S. glauca Withering *S. graminea* β L. *S. palustris* Retz. Wimm. Fl. v. Schl. Bltt. lineal-lanzettlich spitz, kahl; gabelspaltige Doldentrauben mit häutigen ungewimperten Deckbltt.; Kelchbltt. dreinervig, kürzer als die Kronenbltt., so lang als die elliptische Kapsel; Stängel vierkantig.

Auf nassem und sumpfigen Boden, auf Sumpfwiesen, an Sumpf- und Teichrändern. Um *Br. bei Kletschkau, Schiesswerder, Bischofswalde u. m.* Durch das ganze Gebiet, auch im Vorgebirge, Juni, Juli. 2.

Stängel aufrecht, 1' hoch; Bltt. meist graugrün. Blumen polygamisch. Bald mit wenigen bald mit mehreren Blumen.

S. graminea L. *Sternkraut.* Bltt. lanzettlich spitz, kahl am Gr. gewimpert; gabelspaltige Doldentraube mit häutigen gewimperten Deckbltt.; Kelchbltt. dreinervig; so lang als die Kronenbltt., kürzer als die längliche Kapsel; Stängel vierkantig kahl.

Auf trocknen und etwas feuchten Grasplätzen, auf Wiesen, an Wegrändern, in Gebüsch. Gemein. Sommer. 2.

Stängel oft lang-gestreckt und niederliegend, bis 2' lang, gablig-ästig, mit endständiger rispiger Doldentraube. Blumen polygamisch, kleiner als die vorige Art.

S. Friesiana Seringe *S. longifolia* Fries Nov. succ. Wimm. Fl. v. Schl. Bltt. lineal-lanzettlich spitz, gegen den Grund verschmälert; armlüthige gabelspaltige Rispe mit trockenhäutigen Deckbltt.; Kelchbltt. nervenlos, kürzer als die längliche Kapsel; Stängel schwach, flatterig, vierkantig.

Auf Grasplätzen. Bisher nur auf trocknen Hügeln bei *Carlsbrunn im Gesenke*, und von Grabowski in Gebüschern *um Königshuld bei Oppeln* gefunden. Juli 2.

Diese Art ist der vorigen sehr ähnlich und nur durch die angezeigten Merkmale zu unterscheiden. Der Kelch bekommt beim Trocknen Spuren von Nerven. Die Expl. von *Carlsbrunn* sind steif, 4" hoch, hellgrün; die von *Königshuld* schwach und lang-stänglich, 8-10" lang, sattgrün. Wir sahen diese Art auch aus der Gegend von *Königsberg*.

S. uliginosa Murray. *S. graminea* γ L. *S. aquatica* Pollich. W. et Gr. sil. *S. lateriflora* Krock. sil. Bltt. länglich-lanzettlich, am Gr. gewimpert; gabliche Rispe mit häutigen, am Rande kahlen Deckbltt.; Kelch länger als die Kronenbltt., so lang als die eiförmige Kapsel; Stängel viereckig.

Auf quelligen Plätzen, an Bächen und Quellsümpfen der höheren Ebene und des Vorgebirges bis auf das Hochgebirge. Um *Br. bei Lissa, Skarsine, Rienberg*. Ueberall im Vorgebirge, z. B. bei *Zobten, Kynau, Charlottenbrunn, Warmbrunn u. m.* Um die *Gränzbänden. Im Gesenke in den Schluchten des Altvaters u. m.*

Meist mit schwachen liegenden Stängeln, 2-6" lang; durchaus kahl, etwas ins Graugrüne ziehend.

Moenchia Ehrhart. *Mönchie*. Kelch vierblättrig. Vier ungetheilte Kronenbltt. Vier (oder acht) Staubgefäße. Vier Griffel. Kapsel oben in acht Klappen aufspringend. IV, 2.

M. erecta Flora d. Wetterau. *Sagina erecta* L. *Moench. quaternella* Ehrh.

Auf hügligen Brachäckern, bisher nur einmal aber zahlreich bei *Tarnast an der Trebnitzer Hügelkette* von Krause gefunden. Mai. ☉.

Aufrecht, 1-2" hoch, dünn und dürftig, mit 1-2 Blumen; etwas graugrün. Bltt. an der Wurzel 2-3" lang, linealisch, nach oben ein wenig breiter; am Stängel 2-2 Paar, die oberen aufg., spitz. Kelchbltt. mit weißem Hautrand; Kronenbltt. weiss, so lang a. d. Kelch.

Malachium Fries. *Weichling*. Kelch fünfblättrig. Fünf (ausgerandete oder) zweitheilige Kronenblätter. Zehn Staubgef. Fünf Griffel. Kapsel in fünf zweizählige Klappen aufspringend. X, 4.

M. aquaticum Fries. *Cerastium aquaticum* L. W. et Gr. sil. Bltt. herz-eiförmig; Kapsel kürzer als der Kelch.

Ad Auf feuchten Stellen, an Sümpfen, Bächen, Gräben, Teichrändern, in feuchten Gebüschern. Zerstreut aber häufig d. d. g. G. Juli Aug. 2.

Sieht der *Stellaria nemorum* sehr ähnlich, ist aber bes. unten kahl, oben drüsig-klebrig. Stängel eckig, am Gr. liegend u. wurzelnd, bis 1' lang. Obere Bltt.

lanzettlich, an den blumenlosen Stängeln auch gestielt. Weitläufige gablige Blütenrispe. Kronenbltt. weiss, tief-zweitheilig, doppelt so lang als die Kelchbltt.

Cerastium L. Hornkraut. Kelch fünfblättrig. Fünf zweispaltige Kronenbltt. Zehn Staubgef. Fünf Griffel. Kapsel oben in zehn Klappen aufspringend. X, 4.

a. Ein- oder zweijährige, ohne überwinternde Nebenstängel; kleinblumig.

C. vulgatum L. Gemeinstes H. C. triviale Link. W. et Gr. sil. Koch Syn. Rauchhaarig; Stängel aufsteigend; Bltt. länglich; Deckbltt. zur Hälfte häutig; Fruchtsiele 2 - 3mal länger als der Kelch; Kronenbltt. so lang oder ein wenig länger als der Kelch.

Auf Triften, Wiesen, an Wegrändern, Dämmen, Gräben, Aeckern und Brachen, in Gebüsch, sowohl auf feuchtem als trockenem, auch auf steinigem Grunde, und auf allerlei Boden. Sehr gemein. Von der Ebene bis aufs Hochgebirge, 5000' z. B. mit *Cer. alpinum* auf der *Babia Gora*. Mai, Herbst. ☉ und ☺.

Meist von dunkelgrüner Farbe, mit zerstreuten rückwärts-gerichteten Haaren. Stängel oft fusslang, bisw. rüthlich. Im Schatten der Wälder und auf Gebirgen findet man eine grosse Varietät mit sehr breiten Bltt., am leizeren Ort auch mit grösseren Blumen. — Alle Arten dieser Sippe sind in der Bekleidung sehr veränderlich, indem bald mehr bald weniger Haare und bald mit bald ohne Drüsen bemerkt werden. Doch hat jede Art ihren besonderen Typus in der Bekleidung. Die vorliegende ist meist ohne Drüsen oder hat dergleichen nur an den Zweigen der Blütenrispe.

C. semidecandrum L. C. semid. et C. glutinosum Wimm. Fl. v. Schl. C. semid. et C. viscidum W. et Gr. sil. C. semid. et C. punitum Koch Syn. Kurzzottig; Stängel aufrecht oder liegend; Bltt. eiförmig; Deckbltt. zur Hälfte häutig; Fruchtsiele 2 - 3mal länger als der Kelch; Kronenbltt. so lang oder ein wenig kürzer als der Kelch.

Auf sandigem und anderem Boden; auf dünnen Triften, an Weg-, Graben- und Dammrändern, berasten Sandplätzen und sandigen Brachen. Gemein bis in das Vorgebirge. April, Mai. ☉.

Meist von heller grüner Farbe, mit kurzen dichten abstehenden Haaren und meist von unten, gewöhnlich aber an den Zweigen der Blütenrispe von mehr oder weniger dichten Drüsen klebrig. Stängel bald wenige, bald sehr viele aus der Wurzel von 1 - 12" Länge, auf freien Plätzen kurz und liegend, zwischen dem Grase aufrecht und länger. Bltt. meist oval und stumpflich. Die Deckbltt. und Kelchbltt. haben bald einen schmalen weisshäutigen Rand, welches *C. semidecandrum*, bald einen sehr breiten weissen Hautrand, welches *C. punitum* Curtis oder *glutinosum* Fries oder *viscidum* Link genannt wird. Wir können diese beide Formen, welche wir früher als Arten getrennt haben, jetzt nur für Formen einer Art erkennen.

C. glomeratum Thuillier. C. ovale Pers. W. et Gr. sil. C. vulgatum Linn. herbar. Zottig; Stängel fast aufrecht; Bltt. rundlich; Deckbltt. krautig, an der Spitze bärtig; Fruchtsiele so lang als der Kelch; Kelchbltt. a. d. Spitze bärtig, so lang als die Kronenblätter.

Auf etwas feuchtem sandigen Grunde; auf feuchten Grasplätzen, Wiesen, Aeckern, an grasigen Lachen- und Flussrändern, oft in der Nähe von Dörfern. Durch das ganze Gebiet in der Ebene und dem Vorgebirge zerstreut und an einzelnen Plätzen, doch nicht selten. Um *Br. bei Kosel und Pilsnitz, Lissa, Neukirch, Tschansch, Tot-schen u. m. Um Ohtau, Bunzlau. Charlottenbrunn. Hirschberg. Karlsbrunn im Gesenke.* Sommer. ☉.

Fast gelblich-grün; starkhaarig, der obere Theil drüsig-klebrig. Die Rispenäste gedrängt knäuelförmig.

C. brachypetalum Desportes bei Persoon Syn. Graubärtig; Stängel fast aufrecht; Bltt. oval; Deckbltt. krautig an der Spitze bärtig; Fruchtsiele 2 - 3mal länger als der Kelch; Kelchbltt an der Spitze bärtig, so lang oder ein wenig länger als die Kronenbltt.

An trocknen grasigen Hügelwänden, bisher nur in den *Trebnitzer Hugetn bei Kt. Tot-schen und Pollentschne, und am breiten Berge bei Striegau* (Krause) gefunden. Mai. ☉.

Kenntlich durch die langen grauen Haare, welche Bekleidung besonders am Kelche auffallend ist. Von 2 - 10' lang.

b. Mehrjährige, mit überwinternden Nebenstängeln; grossblumig.

C. alpinum L. *Alpen-H.* Die Nebenstängel mit rosettenförmigen Bltt.; Stängel aufsteigend 1 - 5blumig; Bltt. elliptisch; Deckbltt. mit schmalem Hautrande; Kronenbltt. doppelt so lang als der Kelch.

Auf Gebirgskämmen. *Gipfel der Babia Gora, 5000'.* Juli. 2.

Stängel 2 - 3 Zoll lang, niederliegend-aufsteigend. Kronenbltt. bis zum vierten Theile zweispaltig.

C. arvense L. *Acker-H.* Die Nebenstängel am Gr. wurzelnd; Stängel aufsteigend-aufrecht, 7 - 15blumig; Bltt. lineal-lanzettlich; Deckbltt. mit breitem Hautrande; Kronenbltt. doppelt so lang als der Kelch.

An grasigen und trockenen Weg-, Acker- und Wiesenrändern, an Dämmen, auf Triften, gemein in der Ebene und dem Vorgebirge. Mai, Juni. 2.

Ändert ab mit schmalen und breiteren Bltt. Stets buschig; von $\frac{1}{2}$ - 1' H. Blumenstiele kurzhaarig, meist ohne Drüsen.

Holósteum L. *Spurre.* Fünf Kelchbltt. Fünf gezähnte Kronenbltt, Drei bis fünf Staubgefäße. Drei Griffel. Kapsel oben sechsklappig. III, 3.

Blumen schirmförmig. Kraut graugrün.

H. umbellatum L. *Nelkengras.*

Auf sandigen Triften, Aeckern, Brachen. Sehr verbreitet und häufig. April, Mai. ☉.

Aufrecht, $\frac{1}{2}$ ' hoch, einfach. Bltt. oval, etwas saftig und fettig. Fruchtsiele lang, etwas niedergebogen. Kronenbltt. weisslich, wenig länger als der Kelch.

Sagina L. Sagine. Kelch 4- oder 5-blättrig. Vier oder fünf ungetheilte Kronenbltt. Vier, fünf oder zehn Staubgef. Vier oder fünf Griffel. Kapsel springt in vier oder fünf Klappen auf. IV, 3. und X, 4.

Niedrige felblättrige Gew. mit zahlreichen unscheinlichen grünlichen Blüten; Kronenbltt. fehlen bisweilen. Keine Stützblätter. Nach Bartlings und Meyers Vorgang habe ich die *Spergula*-Arten ohne Stützbltt. unter diese Sippe gebracht. In der Flora von Schlesien hatte ich sämtliche ehemalige *Saginae* unter *Spergula* gebracht, weil die Vier- oder Fünf-Zahl einen generischen Unterschied nicht giebt. Allein die ächten *Spergulae* haben eine andere Tracht, verschiedenen Bau der Bltt. und Stützbltt. und flache gerandete Samen.

a. mit vierblättrigem Kelch und Krone und vierklappiger Kapsel.
Sagina L.

S. procumbens L. Mastkraut. Bltt. endigen in eine kurze Stachelspitze; Blumenstiele nach dem Blühen oben hakenfg., später aufrecht; die Kelchbltt. sämmtlich stumpf; Kronenbltt. 3 - 4mal kürzer als der Kelch.

Auf feuchten, sandigen und unfruchtbaren Grasplätzen, in trockengelegten Gräben und Lachen, auf Brachen, Rode- und Brandstellen. Gemein bis in das Hochgebirge. Mai bis Herbst. ☉.

H. 1". In der Mitte Blätterbüschel, zur Seite niederliegende und wurzelnde, dann aufsteigend-aufrechte Aeste. Bltt. sehr schmal linealisch, am Gr. durch eine Haut verbunden, wie bei allen Arten. Blütenstiele aus den oberen Winkeln. Blüthenknospen von der Grösse eines Senfkorns. Samen bei allen Arten winzig, unregelmässig-tetraedrisch, fast nierenförmig.

S. apetala L. IV, 3. Bltt. endigen in eine Grannenspitze; Blumenstiele nach dem Blühen fortwährend aufrecht; Kelchbltt. stumpf, die beiden äusseren mit eingekrümmter Stachelspitze; Kronenbltt. 3 - 4mal kürzer als der Kelch.

Auf Brachen, Aeckern, besd. Klee-A. und Triften. Zuerst um Gr. Tschirnau bei Guhrau von Starke gefunden. Um Br. bei Wessig u. Koberwitz. Kl. Totschen. Am Stollenberge bei Zobten, Grocheberge bei Frankenstein, Kieselschieferbrüchen bei Steine. Bei Troppau. Bei Bunzlau nach Albertini. Juni, Aug. ☉.

Stängel und Aeste etwas höher, dünner und schlanker als an der vorigen. An unseren Exemplaren sind die Bltt. mit zerstreuten Wimpfern und die Blumenstiele mit zerstreuten Drüsen besetzt.

Anmkg. Auch *Sag. ciliata* Fries, mit gewimperten Bltt. und zwei spitzigen Kelchblättchen kommt wahrscheinlich in Schlesien vor.

b. mit fünfblättrigem Kelch und Krone und fünfklappiger Kapsel. — Arten der Sippe *Spergula* bei L. Koch Syn. und W. et Gr. sil.

S. saxatilis nobis. *Spergula saginoides* L. X, 4. Koch Syn. W. et Gr. sil. *Sperg. saxatilis* Wimm. Fl. v. Schl. Bltt. kurz stachelspitzig, linealisch, kahl; Blumenstiele nach dem Blühen nickend, später aufrecht; Kelchbltt. kahl, länger als die Kronenbltt.

An dünn berasteten steinigten Berglehnen in der höheren Region des Vor- und tieferen des Hochgebirges. Zuerst von Grabowski und mir bei *Waldenburg und am Uhusteine*, dann von Mayer am *Peterssteine im Gesenke* gef., dann im *Riesengebirge im Riesengrunde, an der schwarzen Koppe*, und nach Nees v. E. im *Seidelbusche und auf der Iserwiese*. Sommer. ☉.

Ist leicht mit *Sag. procumbens* zu verwechseln. Die Blumenstiele sind länger und mehr vereinzelt, die Kelchbltt. an die Kapsel angedrückt und kürzer.

S. subulata nobis. Spergula subulata Swartz. Koch Syn. W. et Gr. sil. Bltt. endigen in eine Grannenspitze, linealisch-pfriemlich, gewimpert; Blumenstiele nach dem Blühen nickend; später aufrecht; Kelchbltt. feinhaarig, so lang als die Kronenbltt.

Auf sandigen Brachäckern, bisher nur bei *Grosstein bei Oppeln* von Grabowski gef. Juli. ☉.

In dichten Basen, kaum 1' hoch. Die Blumenstiele sehr lang, oben mit einzelnen Haaren besetzt.

S. nodosa E. Meyer. *Spergula nodosa* L. x, 4. Koch Syn. W. et Gr. sil. Bltt. endigen in eine Stachelspitze, linealisch-fädig; die oberen Bltt. in den Blattwinkeln büschelfg.; Blumenstiele stets aufrecht; Kronenbltt. grösser als der Kelch.

Auf nassen Sandplätzen, feuchten Aeckern, Sumpf- und Torfwiesen, durch das g. G., aber zerstreut und nicht zu häufig. Um *Br. bei Friedewalde, Schleibitz, Bischwitz a. W. Um Ohlau, Bunzlau, Charlottenbrunn, Oppeln*. Juli, Sept. 2.

Stängel im ersten Jahr aufrecht, dann niederliegend und wurzelnd. Meist kahl, bisweilen auch mit Drüsen besetzt. Die Blumen nur am Mittag ausgebreitet. — Diese Art ist sowohl in der Tracht als durch die Samen von den andern *Spergulae* verschieden.

II. DICOT. POLYPET. CALYCI-FLORAE.

Die Kelchblätter sind am Grunde mehr oder weniger mit einander verbunden. Die Kronenblätter und Staubgefässe stehen auf einer mit dem Grunde des Kelches verwachsenen Scheibe; oder indem die Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen ist auf der Kelchröhre.

Zu den Pflanzen dieser Abtheilung gehören der grösste Theil der *elften, zwölften und siebzehnten*, und ein Theil der *zehnten, fünften und achten* Klasse Linnés.

Paronychieae Aug. St. Hilaire.

Kelch fünftheilig mit dachziegelförmiger Knospenlage. Kronenblätter entspringen aus dem Kelchschlunde, zwischen den Kelchzipfeln. Staubgefässe sitzen auf dem Kelche unter

den Kronenblättern, an Zahl gleich oder doppelt, selten geringer. Zwei oder drei am Gr. oft verwachsene Griffel. Frucht: eine einfächerige oder dreifächerige Kapsel mit freier Mittelsäule oder ein einsamiges häutiges Nüsschen. Samen mit mehligem Eiweiss und gekrümmtem Keim.

Kleine Kräuter mit meist gegenständigen ungetheilten Bltt., trockenhäutigen Stützbltt. und kleinen unscheinlichen Blumen, denen oft die Kronenbltt. fehlen. Meist knotig-gegliedert. Diese Familie ist mit den *Alsineae* und andererseits den *Portulacaceae* sehr nahe verwandt. Fast alle lieben feuchten Sandboden ebener Gegenden.

Spérgula L. *Sperk.* Kelch tief fünftheilig. Fünf rundliche Kronenblätter. Zehn Staubgefässe. Fünf Narben auf sehr kurzem Griffel. Kapsel einfächerig, fünfklappig, vielsamig mit freier Mittelsäule. Samen kreisfg. zusammenge drückt, geflügelt. $\times$, 4.

Bltt. in zwei gegenständigen Büscheln, daher scheinbar wirtelständig. Kronenbltt. weiss, Vgl. die Sippe *Sagina*.

S. arvensis L. *Futter-S.* Bltt. linealisch-pfriemlich, unterseits mit einer Längsfurche; Samen linsenf. warzig, mit schmalem Hautrande geflügelt.

α . *sativa*. Samen schwarz, von feinen Punkten scharf.

β . *vulgaris*. Samen mit weissen, später braunen Warzen besetzt.

γ . *mazima*. Samen wie bei der vorigen, doppelt so gross; Stängel höher, weit-schweifig.

Auf Aeckern, Brachen, Kartoffelfeldern und Gartenbeeten gemein; wird auch hin und wieder angebaut, besonders β . Die Form γ ist selten und wird stets nur unter dem Lein gefunden, z. B. um *Ohlau*, *Schönau*, *Hirschberg*, *Schmiedeberg* u. m. Juni, Aug. ☉.

Stängel knotig-gegliedert mit geschwollenen Gelenken, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h., bei γ 2 - 3' hoch; meist viele rasenf. aus einer Wurzel. Trockenhäutige weissbraune Stützbltt. zwischen den Stängelbltt. Blüthe in endständiger weitläufiger Rispe mit söhligem und zurückgeschlagenen Fruchtsielen. Bei α sind die Stängel 5 - 7gliedrig, nebst den Bltt. drüsig und die Samen schmal gerandet, bei β etwas breiter gerandet, bei γ die Stängel 7 - 9gliedrig nebst den Bltt. drüsenlos, die Blumenstiele und Kelche klebrig-haarig; daher möchte man diese Formen und besonders γ , welche nur unter dem Lein vorkommt, für besondere Arten zu halten geneigt sein. Da es jedoch Uebergänge zu geben scheint, haben wir dieselben vereinigt.

Sp. pentandra L. Bltt. linealisch-pfriemlich, stielrund; Samen plattzusammengedrückt, glatt, mit breitem strahlig-gestreiftem Hautrande geflügelt.

Auf sandigem Grunde, Sandplätzen, in Haiden, auf Brachen, bis an das Vorgeb. zerstreut, doch häufig. Um *Br. bei Carlowitz*, *Paschkerwitz*. Um *Ohlau*, *Wohlau*, *Bunzlau*, *Hirschberg*, *Opeln*. *Trop. Tesch.* Mai. ☉.

Hat kürzere, mehr dicklichere Bltt. Stängel bald einzeln bald in Rasen, $\frac{1}{2}$ ' h. Blumenstiele und Kelche glatt. Meist tragen nur die Hälfte der Staubgef. Staubbeutel.

Lepidogonum Fries. Kelch tief-fünftheilig. Fünf eiförmige Kronenblätter. Zehn Staubgefäße. Drei Griffel. Kapsel einfächerig, dreiklappig mit freier Mittelsäule. Samen verkehrt eiförmig oder dreikantig. x, 3.

Bltt. gegenständig.

L. rubrum Fries. *Arenaria rubra* L. W. et Gr. Fl. sil. *Alsine rubra* Wahlenberg. Koch Syn. Bltt. beiderseits flach, stachelspitzig; Samen dreikantig, feinrunzlig.

Auf sandigen Plätzen, feuchten und trocknen; auf Brachen, an Fluss-, Teich- und Lachenrändern, sandigen Triften, d. d. g. G. bis in das Vorgeb. gemein. Juni, Sept. ☉.

Gestreckte Stängel, v. Gr. an ästig, 1 - 6'' lang. Bltt. linealisch-fädlich. Kelch drüsig. Kronenbltt. rosaf., nur bei Sonnenschein ausgebreitet. Auf fruchtbarem Boden bisweilen saftig. Den Namen *Lepigonum* habe ich mir in *Lepidogonum* umzuändern erlaubt.

Polycarpum L. *Nagelkraut.* Kelch fünfstheilig mit gekielten Zipfeln. Fünf Kronenbltt. Drei oder fünf Staubgef. Drei Griffel. Einfächerige dreiklappige vielsamige Kapsel.

Blätter zu vier.

† **P. tetraphyllum L.** Bltt. am Stängel zu vier, an den Aesten zu zwei.

Auf Gemüseäckern um *Br. an der Nikolaivorstadt und bei Ohlau* zuerst von Krock er gefunden, an beiden Punkten sich wenig verbreitend, und wahrscheinlich eingewandert. Aug., Oct. ☉.

H. $\frac{1}{2}$. Bald über dem Grunde gabelspaltig-getheilt und in einen dichten Busch von Aesten sich auflösend. Bltt. verkehrt eig. mit je einem häutigen Stützblatt. Blüthen zahlreich doldentraubig. Kronenbltt. kleiner als der Kelch anserandet. Drei Staubgef.

Corrigiola L. *Strandling.* Kelch fünfstheilig. Fünf Kronenbltt. am Grunde des Kelches eingefügt. Fünf Staubgef. Drei sitzende Narben. Frucht ein einsamiges, nicht aufspringendes, vom bleihenden Kelche umgebenes Nüsschen. v, 3.

Gestreckt, vielästig und ganz mit kleinkörnigen Blüthen bedeckt von weissrother Farbe.

C. litoralis L. Beblätterte Doldentrauben; Stengelbltt. linealisch-keilförmig.

An sandigen Flussufern. Bei *Sagan* nach Krock er! Suppl. sil. Nr. 451 als *Polygonum ramosissimum*. Bei *Sprottau* von Göppert, bei *Glogau am Artillerie-Exercierplatz und am Wege nach Fraustadt* von Krause gefunden. Aug., Sept. ☉.

Vielstänglig, $\frac{1}{2}$ - 1' lang, gestreckt. Silberweiss-häutige Stützblättchen. Kronenbltt. weiss, so lang als die röthlichen Kelchblättchen. Bltt. grügrün. Der Same hängend an einer aus dem Grunde der Frucht entspringenden Schnur.

Illécebrum L. Knorpelkraut. Kelch fünftheilig, mit vorn kappenrörmigen gespitzten Zipfeln. Krone fehlt. Fünf Staubgef. mit, fünf ohne Staubbeutel. Einsamige, vom Kelch bedeckte, gefurcht-gelappte, in den Furchen aufspringende, Kapsel. V, 1.

Gestreckt, vielästig mit zahlreichen wirtelständigen Blumen, röthlichweiss.

I. verticillatum L.

Auf sandigen feuchten Aeckern und Brachen. Um *Oppeln* zahlreich. Bei *Pless n. Teschen. Mühlbock und Tiefenfurth bei Bunzlau* nach Schneider. *Kl. Lassowitz in Ob. Schles.* nach Matt. *Deutsch-Rasselwitz* nach Krockner. Juli, Aug. 2.

Stängel fädlich, röthlich, 2 - 6' lang. Bltt. verkehrt-eifg., gestielt, kahl. Zwei stumpfe Narben. Die fünf unfruchtbaren Staubgef. vertreten gewissermassen die Stelle der fehlenden Kronenbltt. Kelche weiss, fast knorpelartig, umgeben die Kapsel.

Herniária L. Tausendkorn, Bruchkraut. Kelch fünftheilig, innen weissgelb, Krone fehlt. Fünf Staubgef. mit, fünf ohne Staubbeutel. Nüsschen einsamig, eiförmig, nicht aufspringend, vom Kelch umschlossen. V, 2.

Gestreckt-vielästig, mit kleinkörnigen Blüten bedeckt; gelblichgrün.

H. glabra L. Bltt. eifg.-länglich, kahl; Kelchzipfel stumpf.

Auf trockenem Sand, an Flussufern, auf sandigen und kiesigen Triften und Brachen. Gemein. Juli, Oct. 2.

Die Blumen in kleinen winkelständigen Knäueln.

Anmk. Nach dem Verzeichnisse von Tausch in dem Gedenkbuche der Wiesenbaude wächst *Herniaria hirsuta*, mit kurzhaarigen Bltt. und Kelchen, und stachelborstigen Kelchzipfeln, am Fusse des Riesengebirges bei *Hohenelb* und nach *Rabenhorst* dieselbe in der Gegend von *Priebus*.

Portulaceae Jussieu.

Kelch zweiblättrig: das äussere Blatt umfasst die Ränder des inneren. Fünf bisweilen am Gr. verbundene Kronenbltt. Staubgef. entweder so viel als Kronenbltt. und hinter denselben oder mehrere. Ein bisweilen oben getheilter Griffel mit mehreren Narben. Kapsel einfächerig, dreiklappig oder umschnitten-aufspringend, mit freier Mittelsäule. Samen mit mehligem Eiweiss und ringförmigem Keim.

Niedrige Kräuter mit etwas fleischigen ungetheilten Bltt. ohne Stützbltt. und kleinen Blumen.

Portúlaca L. Portulak. Kelch abfällig. Vier bis fünf Kronenbltt. Acht und mehr Staubgef. Drei- bis fünftheilige Griffel. Fruchtknoten rundlich. Kapsel umschnitten-aufspringend. XI, 1.

† *P. oleracea* L. Bltt. länglich-keilfg., fleischig; Kelchspfel mit stumpfem Kiel.

Auf Gemüseäckern, auf den Kräutereien um Breslau, und nach Schneider bei Kupferberg, ohne Zweifel eingewandert. August, Oct. ☉.

Stängel gestreckt. am Gr. kstig, $\frac{1}{2}$ ' lang, fleischig und saftig, rothgrün. Blüthen zu 2 - 3 in den Blattwinkeln. Kronenbltt. gelb, nur am hohlen Mittage ausgebreitet. Am Grunde der Bltt. findet sich ein kleiner Haarring, als Andeutung der Stützbltt. — Man unterscheidet *P. sativa* Haworth, mit am Rücken geflügelten Kelchspfeln, welche als Sallatpflanze angebaut wird.

Móntia L. *Montie*. Kelch dauernd. Fünf am Grunde röhrig-verwachsene Kronenbltt.; zwei grösser, drei kleiner. Hinter den drei kleineren drei Staubgefässe. Kurzer Griffel. Fruchtknote birnförmig. Kapsel dreiklappig. III, 3.

M. fontana L.

α. fontana, im Wasser stehend, mit winkelständigen Blüthen, glänzenden schuppig-geschichteten Samen. *M. fontana* W. et Gr. Fl. sil.

β. minor, auf dem Lande, mit endständigen Blumen, matten gekörnten Samen.

Auf quelligen Stellen, in Bächen und Gräben des Vorgebirges sehr verbreitet. Um *Schwoeidnitz*, *Burkersdorf* u. *Kynau*, *Charlottenbrunn*, *Salzbrunn*, *Kupferberg*, *Hirschberg*, *Scheibershau*, *Schmiedeberg*, *Neurode*, *Carlsbrunn* im *Gesenke*. *Weichsel* b. *Ustron*. *β*. auf feuchten Aeckern, um *Br. b. Lissa*, am *Warteberge* b. *Riemberg*. *Deutschhammer*. *Chmielowitz* bei *Oppeln*. Nach Schneider am *Schönfeld* bei *Bunzlau*, *Wohlau* und *Salzbrunn*. *Sommer*. Vielleicht *α* $\neq$ *β*, aber *β* gewiss ☉.

Fluthende oder schwimmende dünne aber saftige, 2 - 12" lange Stängel. Bltt. gegenständig, spatelförmig. Blumen winkelständig. Die Krone hat einen Längsspalt, der bis an den Grund geht, ausserdem ist der Saum fünftheilig, klein, weisslich. Kapsel vielsamig. — Die var. *β* ist aufrecht vielästig und die Blüthen mehr nach der Spitze gedrängt, kaum zollhoch. Besonders weil diese in Gegenden der Ebene vorkommt, wo *α* noch nicht gefunden war, hielt ich sie für eine verschiedene Art. Aber kürzlich sah ich am *Zentner* unweit *Kunzendorf* bei *Neurode* die Uebergänge.

Scleranthae Link.

Kelch dauernd, mit einer glockigen Röhre und vier oder fünf Zipfeln, an deren Grunde ein drüsiger Ring herumläuft. Krone fehlt. Fünf oder zehn Staubgef. am Kelchschlunde auf dem Ringe aufsitzend. Fruchtknoten einfächerig, mit zwei Eichen, welche an einer aus dem Gr. entspringenden Schnur sitzen und wovon nur einer sich ausbildet. (Ein oder) zwei Griffel. Frucht: ein einsamiger von der verhärteten Kelchröhre bedeckter häutiger Schlauch. Samen mit mehligem Eiweiss und ringförmigem Keim.

Kräuter mit gegenständigen Bltt. ohne Stützbltt., trocken und unansehnlich, mit zahlreichen kleinen grünlichen Blumen.

Scleranthus L. *Knaut, Knörrich.* Kelch fünfspaltig. Zehn Staubgefäße. Zwei Griffel. X, 2.

Bltt. pfriemlich - linealisch.

S. annuus L. Die Kelchzipfel mit schmalem Hautrande, etwas spitz, an der Frucht abstehend.

Auf sandigem Grunde, sowohl trockenem als feuchtem, Aeckern, Brachen, Triften, gemein d. d. g. G. Sommer, Oct. ☉.

Niederliegend, ästig, durchaus mattgrün, bald reicher an Blüthen mit kürzeren bald ärmer mit längeren Bltt. Blumen doldentraubig.

S. perennis L. Die Kelchzipfel mit breitem Hautrande, stumpf, an der Frucht geschlossen.

Auf trockenem Sande, Sandhügeln, in Haiden. Häufig. Um *Br. bei Schwoitsch, Paschkerwitz, Carlowitz* u. m. Sommer bis Herbst. ♀.

Meist mehr aufrecht, steifer und mit gedrängteren Blumen; doch auch von diesem kommen dieselben Formen vor, wie von dem vorigen.

Amarantaceae Juss.

Kelch tief, vier- oder fünftheilig und oft gefärbt. Krone fehlt. Staubgefäße meist fünf, hinter den Kelchzipfeln, frei oder mit zu einer Röhre am Gr. verwachsenen Staubfäden. Fruchtknoten frei, einfächerig, ein- oder mehrsamig; die Eichen am Grunde angeheftet. Frucht: eine einsamige Nuss, oder eine umschnitten - aufspringende Kapsel. Samen linsenförmig, mit mehligem Eiweiss und ringförmigem Keim.

Staudenartige Kräuter mit abwechselnden Blättern ohne Stützblätter, zahlreichen kleinen unansehnlichen trockenhäutigen Blumen mit je zwei oder drei Deckbltt. — Da diese und die folgende Familie sich an die nächst vorhergehenden und durch diese an die *Siteneae* und *Alsineae* genau anschliessen, so mussten sie hierher gestellt werden, da man sie sonst zu der Klasse der *Apetalae* rechnet.

Amarantus L. *Amarant.* Blumen polygamisch, von drei Deckbltt. gestützt. Drei bis fünf freie Staubfäden. Drei Griffel. Kapsel einsamig umschnitten-aufspringend. XXI, 5.

A. Blitum L. *A. adscendens* W. et Gr. Fl. sil. Bltt. ei-rautenförmig, nach oben abgerundet mit einem Eindruck; Blüthen in winkelständigen und nach oben zu einem blattlosen Aehrenstrauß versammelten Knäueln.

Auf bebauten Plätzen um menschliche Wohnungen, in Dörfern und Vorstädten, an Mauern, Dunghaufen, an Abzugsgräben, auf Gemütsäckern u. Gartenbeeten d. d. g. G. in der Ebene. Juli, Sept. ☉.

Ästig, niederliegend oder aufsteigend, mit dicken, saftigen, glänzenden, kahlen Stängeln, 1 - 1½' lang. Bltt. am Rande schwachwellig, gefleckt oder ungesfleckt. Je

nahrhafter und feuchter der Boden desto dicklicher und fettglänzender wird die **Pflanze**. Drei Staubgefäße. Kelchbltt. grün mit weissem Hautrande.

† *A. retroflexus* L. Bltt. eig.-zugespitzt, stumpf; Deckbltt. mit dorniger Spitze; Blüten in einem endständigen Ährenstrauß.

Auf Schuttplätzen der Vorstädte. Um *Breslau, Ohlau, Oppeln* und wahrscheinlich noch anderwärts, doch kaum ausser der Ebene. Juli, Sept. ☉.

Aufrecht, 2 - 3' h., Stängel haarig. Bltt. blassgrün, schuppig-punktirt, die unteren niedergesenkt, schwachwellig. Deckbltt. lanzettlich, weisshäutig.

Polycnëmum L. *Knorpelkraut*. Blumen Zwitter, fünfblättrig, von zwei Deckbltt. gestützt. Drei am Gr. zu einem Ringe verwachsene Staubgef. Zwei Narben. Ein einsamiges Nüsschen. III, 1.

P. arvense L. Bltt. pfriemlich-dreikantig, stachelspitzig; Blumen winkelständig sitzend.

Auf trocknen etwas sandigen Aeckern und Brachen, zerstreut, doch an vielen Orten und stets in Menge. Um *Br. bei Carlowitz, Pöpelwitz, Sakerau, Neukirch, Mahlen, Laskowitz. Ottag bei Ohlau.* Um *Lüben, Guhrau, Wohlau, Oppeln.* Um *Tillendorf, Aschitzau u. Eichberg bei Bunzlau* nach Schn. Um *Herlitz, Jägerndorf, Braunsdorf.* Juli, Sept. ☉.

Zoll-fusslang, gestreckt, trocken, ausgesperri-vielästig, schmutzigrün. Kelchbltt. weisshäutig.

Chenopodiaceae Ventenat.

Kelch fünftheilig. Krone fehlt. Blumen zwittrig oder polygamisch. Staubgef. hinter den Kelchzipfeln, bisweilen weniger, entweder aus dem Fruchtboden oder aus einem, mit der Kelchröhre verwachsenen, den Fruchtknoten umgehenden Ringe entspringend. Fruchtknote linsenförmig, zusammengedrückt oder niedergedrückt, einfächerig, mit einem Ei im Grunde. Narben fädlich. Frucht: ein trockenes von dem unveränderten, oder verhärteten, oder fleischig anschwellenden Kelche umgebenes, einsamiges Nüsschen. Samen senkrecht oder sählig mit mehligem Eiweiss und gekrümmtem, (schraubenförmigem oder) ringförmigem Keim.

Kräuter von etwas fetter Substanz, oft mit einem eigenen Mehlstaube besetzt, mit wechselständigen, meist gelappten Bltt., ohne Stütz- und ohne Deckbltt, mit zahlreichen kleinen unscheinlichen grünlichen Blumen, an bebauten Orten und um menschliche Wohnungen wachsend, denen sie bis auf die Berge folgen.

Chenopodium L. *Gänsefuss. Melde*. Blumen zwittrig. Zwei bis fünf Staubgefäße aus dem Fruchtboden. Frucht von dem unveränderten oder verhärteten Kelche um-

geben, einzeln. Samen sählig, oder zum Theil aufrecht, linienförmig. v, 2.

a. Sämmtliche Blumen mit fünf Staubgef. und sähligen Samen.

C. hybridum L. Schwein-M. Bltt. herzfg., winklig-gezähnt mit zugespitzten Winkeln, wovon der mittlere vorgezogen ist; Blüthen in Afterdolden, die eine Rispe bilden; Samen grubig-punctirt.

Auf Garten-, Acker- und Schutt-Böden, in Dörfern u. Städten, verbreitet und häufig bis ins Vorgeb. bei *Kupferberg u. Ketschdorf* n. Nees v. E. Juli, Aug. ☉.

H. 1-3'. Stängel winkel-kantig, mit weit abstehenden oft sähligen Blütenästen. Die Bltt. etwas dünner und zarter, nicht sehr mehlig, grün; die oberen dreilappig spießförmig.

C. urbicum L. Bltt. dreieckig, a. Gr. in den Blattstiel vorgezogen, buchtig-gezähnt; Blüthen in aufrechten Aehren; Samen glatt.

In Dörfern, auf Angern, hin und wieder, doch nur zerstreut. *Um Br. in Gräbschen, Oswitz, Bischwitz, Kapsdorf. Um Ohtau, Bunztau, Oppeln, Trop. Tesch.* Aug., Septbr. ☉.

H. 2-3'. Kennlich durch die aufrechten oft steifen meist blattlosen Blütenähren. Bltt. grau, etwas dicklich, glänzend, mit tieferen oder seichterem Randzähnen.

C. murale L. Bltt. rautenfg., spitz, buchtig-gezähnt; Blüthen in ausgesperrten Afterdolden; Samen matt, am Rande gekielt.

Wie die vorigen, sehr verbreitet und häufig, auch auf Brachen u. Gemüesäckern. Juli, Sept. ☉.

H. 1-2'. Meist von unten ab ästig, und bis oben mit gleichgrossen und gleichförmigen Bltt. Afterdolden in den Blattwinkeln meist kürzer als die Blätter. Bltt. dunkelgrün, etwas dicklich, schwach mehlig.

C. album L. Melde. Bltt. ei-rautenfg., oft dreilappig, ausgefressen-gezähnt, die oberen länglich und lanzettlich-ganzrandig; Samen glatt glänzend.

α. *spicatum*. Blüthen in Aehren. Hierher *C. album L.*

β. *cymigerum*. Blüthen in Afterdolden. Hierher *C. viride L.*

Wie die vorigen, auch unter dem Getraide und anderer Saat; die gemeinste Art und eine der gemeinsten und verbreitetsten Pflanzen; oft in ungeheuren Mengen, bis ins Gebirge. Juli, Sept. ☉.

Blass und weisslich grün, stark mit Mehlstaub besetzt; Bltt. weich, etwas saftig, leicht welkend. Aeste ruthenförmig meist von unten auf, aber auch, besd. auf Aeckern, ganz einfach, und von $\frac{1}{2}$ '-4' Höhe. Stängel stumpf-kantig. Der Blütenstand bildet bald kurze knäufelförmige oder etwas lockere Afterdolden, bald sind diese ährenförmig an den Aesten vertheilt, und die Blätter mehr oder weniger tief gezähnt, an kleineren Herbstformen und auf festem Boden auch bisweilen ganzrandig. Ein aufmerksamer Beobachter wird die Uebergänge dieser Formen leicht auffinden. Die Kelche werden gegen die Samenreife etwas härter und dicker und bekommen Kiele auf dem Rücken des Zipfel, was auch bei den übrigen Arten dieser Abtheilung stattfindet.

C. opulifolium Schrader. Bltt. rautenförmig-rundlich, stumpf mit einem feinen Spitzchen, dreilappig, buchtig- oder ausgefressen-gezähnt, die oberen elliptisch oder lanzettlich; Samen glatt glänzend.

An Zäunen und Mauern in Dörfern und Städten. Bisher nur in der *Umgegend von Breslau*, in allen Vorstädten und den umliegenden Dörfern, aber vermuthlich auch anderwärts, nur bisher nicht beobachtet. Juli, Sept. ☉.

Ist von der vorigen durch graugrüne Farbe und die rundlichen Bltt., deren Mittel-lappe halbkreisförmig und abgerundet ist, auf das bestimmteste verschieden. Ueber-gänge sah ich noch nie.

C. ficifolium Smith. Bltt. fast spießförmig-dreilappig, mit vorgezogenem länglichen stumpfen, fast ganzrandigen Mittellappen, die oberen lineal.-lanzettlich ganzrandig; Samen glänzend fein punctirt.

Wie die vorigen, auch auf Aeckern. Bisher nur in der *Nähe von Breslau*, einigemal vereinzelt am *Lehmdamme* u. am *Ufer der alten Oder* von Schummel und auf einem *Teichacker zwischen Sayne und Prausnitz* in Menge von mir gefunden. Juli, Aug. ☉.

Blassgrün, dem *C. album* sehr ähnlich, aber durch die Blattform leicht zu unterscheiden. Die Bltt. sind weniger gezähnt und der mittlere Lappen lang vorgezogen, fast gleichbreit.

C. polyspermum L. Bltt. eiförmig, ganzrandig, feinspitzig, kahl; Samen glänzend, fein punctirt, in halböffnem Kelche ruhend.

α. *cymosum*, Blüthentrauben bestehen aus Aferdolden. Bltt. stumpf.

β. *spicatum*, Blüthentrauben bestehen aus kleinen Aehren, Bltt. etwas spitz. Hierher *C. acutifolium* Kitaibel.

Auf Garten- und Ackerland, Gemüsebeeten; auch an Gräben, Teichrändern und kiesigen Flussufern, verbreitet, doch nicht überall, meist häufig. Um *Br. bei Scheitnich, Marienau, Pöpelwitz, Gr. Rake* u. vielen O. Um *Ohlau, Bunzlau, Opatowitz, Tropp.*, *Tesch.* Wahrscheinlich nur in der Ebene. Juli, Sept. ☉.

Stängel liegend, schief-aufsteigend, selten aufrecht, nur am Gr. ästig, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' lang. Glatt, ohne Mehl, meist dunkelgrün und matt, oft durchaus schmutzgrün. Bltt. besonders bei α bisweilen a. Gr. beiderseits mit einem vorstehenden Zahn. Der Kelch umgibt den Samen nur locker und steht ab.

C. Vulvaria L. *C. olidum* Curtis W. et Gr. Fl. sil. Bltt. rauten-eiförmig, ganzrandig, graumehlig; Samen glänzend fein punctirt.

In Dörfern und Städten an Mauern, Hecken, um Dunghaufen, Wegen. Um *Breslau* in den Vorstädten u. unliegenden Dörfern, *Oswitz, Rosenthal* u. m. Um *Ohlau, Wohlaw, Bunzlau* am *Sauteiche. Jägerndf. u. Troppau* selten. Nicht überall. Juli, Sept. ☉.

Gestreckt, am unteren Theile ästig, ganz mit grauem Mehle bedeckt. Theilt bei der Berührung der Hand einen widrigen, schwer zu tilgender Geruch, wie nach faulen Heringen, mit.

† *C. Botrys* L. Drüsig-weichhaarig; Bltt. länglich, fast fieder-spaltig-buchtetig, stumpf gezähnt; die oberen lanzettlich ganzrandig; Deckbl. blattartig; Samen glänzend, fein-punctirt.

An Wegen. Bisher nur vereinzelt und sparsam im Dorfe Skarsine bei Breslau und von Schramm um Leobschütz gefunden, wahrscheinlich an beiden Orten von angebauten Exemplaren stammend. Juli, Aug. ☉.

H. $\frac{1}{2}$ '. Riecht stark, etwas würzig.

b. Sämmtliche Blumen mit fünf Staubgef. und aufrechten Samen.

C. Bonus Henricus L. Guter Heinrich, Hackenschaar. Bltt. spießförmig-dreieckig ganzrandig; Blüthen in winkel- und endständigen Aehren; die Kelche bei der Samenreife unverändert.

In Dörfern und Vorstädten, an Mauern und Zäunen, auf Ängern, besd. auf lehmigem Boden, d. d. g. G. verbreitet bis in das Vorgeb. Um Br. Oswitz, Schwoitsch, Klettendorf u. m. Ohlau, Wohlau, Bunzlau, Oppeln, Charlottenbrunn, Kupferberg, Hirschberg. Um Troppau. Juni, Aug. 2.

Stäng. einfach, 1-2' h. Die endständigen Aehren bilden einen langen kegelförmigen unbeblätterten Strauss. Die untere Bltt. gestielt ein wenig ausgeschweift. Der Kelch wird bei der Samenreife weder grösser noch härter, und die Samen ruhen auf dem Grunde, nicht wie die vorigen auf der Fläche. — Neuerdings stellt man diese und die beiden folgenden Arten unter die Sippe *Blitum*, weil entweder alle oder ein Theil der Samen senkrecht sind. Allein die folgenden Arten bilden den Uebergang, und *Blitum* ist durch die beerenförmige Fruchthülle verschieden. Richtiger würde man sowohl *Ch. Bon. H.* als auch *Ch. rubrum* nebst *Ch. glaucum* unter besondere Sippen stellen.

c. Die obersten Blumen jedes Knäuels mit fünf Staubgef. und söhligem Samen, die seitlichen mit 2-3 Staubgef. und aufrechten Samen.

C. glaucum L. Bltt. länglich, stumpf, entfernt-gezähnt, unterseits weissgrau; Samen glatt.

In Dörfern und Vorstädten, an Abzugsgräben, Mistlachen, auf Dunghaufen; an Lachenrändern, gemein. Juli, Sept. ☉.

Meist von unten ästig und gestreckt. Dickliche saftige, oft rothgestreifte, 4''-1' lange Stängel. Die Unterseite der Bltt. dick mehlig. Blütenknäuel kurz, blattlos. Die Mehrzahl der Samen liegt söhlig.

C. rubrum L. Neunspitzen. Bltt. rautenförmig-dreieckig u. fast spießförmig-dreilappig, tiefbuchtig-gezähnt; Blüthen in beblätterten zusammengesetzten Aehren; Samen glatt.

In Dörfern und Städten an Mauern und Zäunen um Mistpfützen, bisweilen an Teichrändern, zerstreut, aber wahrscheinlich über d. g. G. verbreitet. Um Br. bei Siebenhuben, Gräbschen, Paschkerwitz, Hühnern, Trebnitz. Bunzlau, Kupferberg, Neurode, Oppeln, Leobschütz, Troppau. Juli, Sept. ☉.

H. $\frac{1}{2}$ '-1 $\frac{1}{2}$ '. Stängel meist von unten ästig, saftig, aufrecht. Bltt. etwas fleischig, oft röthlich, mit lanzettlichen Zähnen. Die seitlichen Blumen sind dreispaltig, mit 1-3 Staubgef. und aufrechten Samen; die endständige fünfspaltig mit fünf Staubgef. und söhligem Samen.

Blitum L. Erdbeerspinat. Blumen zwitterig. Ein bis fünf Staubgef. aus dem Fruchtboden. Frucht einsamig, von

dem saftig-aufschwellenden beerenähnlichen Kelche bedeckt Same fast kugelig. 1, 2.

† *B. virgatum* L. Bltt. tief-gezähnt; alle Blüten winkelständig; Samen am Rande stumpf.

Kommt bisweilen in der Nähe der Städte und Dörfer vor, ohne Zweifel nur als ein Flüchtling aus Gärten. Um Br. in *Scheitnich* von Schummel, und in *Marienau* von Krause, in der *Nicolaivorstadt im Holzhofe* von Wichura gef. Auch um *Bunzlau* und *Wohlau* nach Schneider. Sommer. ☉.

* Aufrecht, unterhalb ästig, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h., kahl. Bltt. länglich-dreieckig, fast spießförmig, den Bltt. von *Chenopodium rubrum* ähnlich, nach oben allmählig kleiner, aber bis an die Spitze reichend. Die obere Blüthe jedes Knäule 4- oder 5spaltig, mit eben so viel Staubgef., die seitlichen mit einem Staubgef.

Beta L. *Runkelrübe, Mangold*. Blumen zwittrig. Kelch fünfspaltig. Fünf Staubgef. auf einem den Fruchtknoten umgebenden Ringe. Nuss kugelig von der am Gr. verhärteten Hülle umgeben und von dem Ringe bedeckt. v, 2.

Zwei oder drei Blumen pflegen bei der Reife zu verwachsen und stellen eine scheinbar zusammengesetzte Frucht dar.

* *B. vulgaris* L. Bltt. herzfg., eifg.-länglich, stumpf; Blüten in beblätterten Aehren.

Von dieser Pflanze ist die Abart mit dicker und fleischiger rübenförmiger Wurzel von jeher und neuerdings, seitdem sie zur Zuckerrfabrikation verwendet wird, ein allgemeiner Gegenstand des Anbaues. Sommer. ☉ und ☺.

H. 2-6'. Kahl und glänzend. Bltt. am Rande etwas wellig, die oberen rautenförmig. Die Wurzel ist essbar und enthält vielen Zuckerstoff. Viele Abarten; mit rother Wurzel und Bltt. *rothe Rübe*, mit weißer W. u. Bl. *Runkelrübe*. In Gärten auch mit bunten Blättern.

Spinacia L. *Spinat*. Blüten getrennt. Staubfädenblume mit viertheiligem Kelch und vier Staubfäden aus dem Fruchtboden. Stempelblume mit 2-3spaltigem Kelch und vier Griffeln. Der Kelch verhärtet u. verwächst mit der Samendecke. xxii, 5.

† *S. oleracea* L. Bltt. eifg.-länglich, am Gr. fast spießförmig.

Wird auf Gemüsäckern gebaut und verwildert auch hie und da. Sommer. ☉.

Die jungen Bltt. werden als Gemüse genossen. Die Früchte sind bald gekörnt, bald unbewehrt.

Atriplex L. *Melde*. Blüten halbgetrennt, auch mit Zwitterblumen untermengt. Staubgef.-Blumen mit 3-5theiligem Kelch und drei bis fünf Staubgef. aus dem Fruchtboden.

Stempelblumen mit zweitheiligem Kelch, dessen Lappen platt auf einander liegen, sich dann vergrössern und die zusammengedrückte Nuss bedecken. XXIII, 1 Linné, bei späteren V, 2.

A. patulum L. *A. angustifolium* Smith. Bltt. beiderseits grün, länglich-lanzettlich, die unteren am Gr. spießförmig, die obersten linealisch; Fruchtkelche spieß-rautenfg.

Auf bebautem Lande, um Dörfer und Städte, an Mauern, Zäunen, Schutt- und Dunghaufen, an Gräben, an Ackerrändern und auf Gemüäckern, Kartoffelfeldern, verbreitet und sehr häufig. Juli, Sept. ☉.

Meist von unten ästig, mit söhlig-gespreizten, weit ausgesperren Aesten, oft liegend, aber eigentlich von aufrechtem Wuchs, einige Zoll bis mehrere Fuss lang. Schmutziggrün. Die Grösse der Fruchtkelche ist sehr veränderlich, und sie sind auf dem Rücken bald glatt bald mit weichen Stacheln besetzt.

A. latifolium Wahlenberg. *A. patulum* Smith. Bltt. beiderseits grün, dreieckig-spießförmig, die oberen lanzettlich; die Fruchtkelche dreieckig.

Wie die vorige, besd. an Abzugsgräben und um Dunghaufen, aber seltner und nicht überall. Um Br. Nikolaivorstadt hinter d. gr. Kirchhofe, am Wege nach Gräbschen, in Paschkerwitz u. m. Um Bunzlau, Kupferberg und Charlottenbrunn nach Schneider. Jägerndf. u. Te. Juli, Sept. ☉.

Wuchs und Höhe der vorigen. Bltt. zuweilen dicklich, mehr oder minder gezähnt. Fruchtkelche veränderlich wie bei der vorigen, ganzrandig oder gezähnt.

A. album Scopoli. *A. roseum* L. W. et Gr. Fl. sil. Bltt. rautenförmig, unterseits silberschuppig; Fruchtkelche dreieckig-rautenförmig, gezähnt.

In Dörfern an Mauern und Zäunen, nicht an allen Orten, aber d. d. g. G. in der Ebene zerstreut. Um Br. in Gräbschen, Hundsfeld u. Gr. Weigelsdorf, Herrmannsdorf, Domslau, Koberwitz. Um Bunzlau, Reinberg u. Köttisch bei Beuthen a. O., Ohlau und in vielen Dörfern um Oppeln. Teschen. Juli, Sept. ☉.

Buschig, mit vielen sparrigen Aesten, $1\frac{1}{2}$ -2' h. Bltt. buchtig-gezähnt, weisslichgrün; auch Stängel und Aeste weisslich. Die Blumen in winkel- und schweifig-endständigen Häufchen.

A. nitens. *Rebentisch*. Bltt. unterseits silbergrau, oberseits glänzend-dunkelgrün, herzfg.-dreieckig; Fruchtkelche eifg., zugespitzt, netzaderig, ganzrandig.

In Dörfern, an Zäunen und um Dunghaufen, nur hie und da. Um Br. bei Hube, Lehmgruben, Höfchen, Gräbschen und überhaupt den nahen Dörfern gegen Mittag. Im Schlossgarten bei Beuthen a. O. nach Beilschmied. Wohlau n. Günstel. Troppau. Aug., Oct. ☉.

Aufrecht, 2-5' h. Bltt. gross polirt-glänzend, unterseits graugrün bis ins silberweisse. Bei dieser und der folgenden Art haben die Stempelblumen zweitheilige Kelche und senkrechte Samen, die Zwitterblumen 3-5theilige Kelche und söhliche Samen.

* *A. hortensis* L. Bltt. beiderseits grün oder roth, herzförmig-dreieckig. Fruchtkelche rundlich-eifig., zugespitzt, netznaderig, ganzrandig.

Wird angebaut und findet sich hie und da, z. B. bei *Beuthen a. O.*, als Auswurf der Gärten. Juli, Sept. ☉.

Eine Abart davon ist durchaus blutroth. Soll aus des Tataren stammen.

Crassulaceae DC.

Kelch 3-, 5- auch mehrtheilig. Kronenbltt. zwischen den Kelchblappen, auf der Kelchröhre angeheftet, bisweilen a. Gr. verwachsen. Staubgef. am Kelch angeheftet. Fruchtknoten so viele als Kronenbltt., hinter denselben, am Gr. mit einer Honigschuppe, frei oder am Gr. verwachsen mit kurzem Griffel. Früchte: vielsamige Schläuche, die an der inneren Nath mehrere Samen tragen. Samen mit wenigem Eiweiss und geradem Keim.

Kräuter mit fleischigen wechselständigen Blättern ohne Stützblätter. Blumen zahlreich in endständigen Axtolden. Die Zahl ist in den verschiedenen Blathkreisen der Blüthe gleich. Alle sind von saftiger Substanz, enthalten Schleim, viel Wasser, apfelsauren Kalk u. bisweilen scharfen Stoff, und sind daher kühlend. Sie wachsen an sandigen und steinigen Orten, mehrere im Gebirge.

Rhodiola L. *Rosenwurz*. Blüthen getrennt. Kelch viertheilig. Krone vierblättrig, in der Stempelblume auch fehlend. Vier Honigschuppen. Acht Staubgef. Vier Schlauchkapseln. XXII, 7.

Grüngrün, mit dicht dachziegelförmigen Blättern.

Rh. rosea L. *Sedum Rhodiola* DeCand. W. et Gr. Fl. sil. Bltt. länglich-keilförmig, an der Spitze gesägt.

An Lehnen und Gründen in Felsritzen und zwischen Steinen im Hochgebirge. *Im Riesengeb. in der kl. Schneeegrube, im Teufelsgärtchen, und nach Elsner an der Kesselkoppe. Im Gesenke am Peterssteine u. im Kessel. Babia Gora.* Juni, Juli. ♀., in Gärten schon im April und Mai.

Dickes vielköpfiger Wurzelstock. Stäng. dicht beblättert 4-6'' hoch. Endständige Doldentraube. Kronenbltt. gelb ins röthliche. Die getrocknete Wurzel riecht nach Rosen.

Sedum L. *Fetthenne*. Kelch fünftheilig. Fünf Kronenblätter. Doppelter Kreis von fünf Staubgef. Fünf Honigschuppen. Fünf Schlauchkapseln. X, 4.

a. Blätter flach; Wurzel vielköpfig ohne kriechende Stängel.

S. Telephium L. *Bruchkraut*. Bltt. eifig.-rundlich und eifig.-länglich, a. Gr. schwach- oder deutlich-herzförmig, ungleich stumpf gesägt, oft scheinbar gegen- u. wirtelständig; Doldentrauben blattlos.

Auf trockenem, etwas sonnigem Waldboden, an buschigen Hügel-
lehnen, auf Mauern, Dächern und Steinhäufen in den Gebirgsdörfern.
D. d. g. G. in der Ebene und dem Vorgebirge bis an das Hochgebirge.
Um Br. bei Oswitz, Schwoitsch am Fuchsberge, Lissa. In den
Trebritzer Bergen z. B. Skarsine u. s. w. Juli, Sept. 2.

Wurzel knollig. Die Stängel selten aufrecht, meist gebogen und umliegend, dick
und am Gr. fast verholzend. Bltt. bald gedrängt bald enifernt, etwas graugrün in ver-
schiedenen Abstufungen bereift; die unteren häufig zu zwei oder drei so genähert, dass
sie gegenständig oder wirtelständig scheinen, ohne es wirklich zu sein. Endständige
schwach gewölbte, fast kreisförmige afterdoldige Doldentraube. Kronen weiss ins
Gelbliche. — Neuerdings pflegt man *S. maximum* Suter mit am Gr. herzförmig-um-
fassenden, und *S. Telephium* mit am Gr. gerundeten Blättern zu unterscheiden. Beide
Formen wachsen bei uns, und wir haben uns früher bei Skarsine und neuerdings an
den Hügellehnen des Hausdorfer Gebirges von dem vollständigen Uebergange derselben
in einander überzeugt. Die vortretenden Oehrichen der Bltt. werden kürzer und da-
durch der Grund des Blattes aus der herzförmigen Gestalt in die gerundete oder ge-
stutzte: auch die von den Kronenbltt. entlehnten Merkmale liessen keine konstante
Unterscheidung zu. — Eine Varietät dieser Art mit rothen Kronenbltt. sah ich im hie-
sigen botanischen Garten. Der ausgepresste Saft der Bltt. ist schleimig und enthält
sauren apfelsauren Kalk.

S. purpureum Bauhin. *S. Fabaria* Koch Syn. Bltt. länglich-
elliptisch, gegen den Grund ein wenig verschmälert, stumpf- und un-
gleich-gezähnt, sämmtlich wechselständig; Doldentraube von einzel-
nen Blättern begleitet.

In kleinen felsigen Schluchten zwischen Steingerölle nahe an dem
Gipfel der Babia Gora. Juli, Aug. 2.

Stängel aufrecht, 1-1½'. Wurzel und Tracht der vorigen. Bltt. grün, ohne Reif,
am Gr. nie herzf., sondern in gerader Linie ansitzend. Kronenbltt. purpurfarben. —
Dieses ist *Telephium purpureum majus* Bauhin, und *Sedum Telephium* β. *purpu-*
reum Linn., daher der Name *S. purpureum* beibehalten zu werden verdient.

b. Blätter stielrund; Wurzel dünn ohne kriechende Stängel.

S. villosum L. *Wiesenknorpel*. Bltt. fast stielrund, linealisch,
stumpf, nebst den Blütenstielen drüsig-feinhaarig; Afterdolden arm-
blüthig.

Auf quelligen sumpfigen Wiesen besd. im Vorgebirge, bis an das
Hochgebirge. *Bei Strehlen, O. Donnerau, Gottesberg, Hosentz b.*
Bunzlau nach Schn. Kupferberg. Im Hirschberger Thale. Schrei-
berschau. An der Heuscheyer. Um Leobschütz. Zossen, Dorflieschen,
Schlackau. Juni, Juli. ☉.

Stängel einfach, aufrecht, 3-4" h. Krbtt. rosafarben mit purpurfarbenem Streif.

c. Blätter stielrund; Wurzel dünn mit kriechenden Stängeln, die
theils nur blätter- theils auch blüthentragende Aeste treiben.

S. album L. Bltt. walzig, stumpf, kahl; Blütenstängel auf-
recht mit rispiger Doldentraube.

Auf Mauern. *Um Troppau nach v. Mückusch. In Jordans-*
mühle b. Br. nach Winkler. Juni. 2.

Vier bis 8" hoch. An den Blattkisten stehen die Bltt. locker und weit ab. Kronenblt. doppelt so lang als der Kelch, weisslich bis ins fleischfarbene; Staubbeutel braunroth.

S. acre L. Mauerpfeffer. Bltt. eifg., dickfleischig, am Rücken buckelig, am Gr. stumpf, abstehend.

Auf Sandboden; Sandplätzen, Rainen und Grabenrändern, trocknen Dämmen und Mauern, sandigen Haide- und Waldplätzen, d. d. g. G. auch im Vorgebirge. Juni, Juli. 2.

H. 2-4"; beblätterte und blüthenlose Aeste zahlreich unter einander; die Blätter sind an den nicht blühenden Aesten in sechs Zeilen. Kronenbltt. gelb, doppelt so lang als der Kelch. — Das frische Kraut hat einen scharfen pfefferartigen Geschmack.

S. sexangulare L. Bltt. stielrund, linealisch, stumpf, a. Gr. mit einer kleinen Spitze ansitzend, fast aufrecht.

Wie die vorige, mit welcher sie gesellschaftlich, obwohl seltner, vorkommt. Juni, Juli. 2.

In Grösse und Tracht und den anderen Kennzeichen der vorigen völlig ähnlich, nur durch die Bltt. zu unterscheiden. Das Kraut ist nicht scharf.

S. rubens Hänke. S. repens Schleicher. Koch Syn. Bltt. linealisch, gedrückt-walzig, a. Gr. gleichbreit; Afterdolde armbüthig; Kronenbltt. stumpf.

In den Felsritzen des Hochgebirges. *Im Riesengeb. a. d. Schneekoppe, in den Schneegruben. am kl. Teiche u. m. Im Gesenke am Altvater, Peterssteine u. im Kessel. Um den Gipfel der Babia Gora.* Juni. 2.

Den beiden vorigen ähnlich, aber $\frac{1}{2}$ -2" lang; durch die geringere Zahl der Blumen, und kleinere Kronenbltt., die nicht viel länger sind als der Kelch leicht zu unterscheiden. Die Kapseln sind häufig, auch das Kraut, schmutzigröth.

S. reflexum L. Tripmadam. S. collinum W. et Gr. Fl. sil. S. reflexum et S. rupestre Matt. et Krock. Bltt. lineal-pfriemlich, spitz, am Gr. mit einem Fortsatz; die Afterdolde vor dem Blühen überhängend.

Auf Sandboden, in Haiden, an trocknen sonnigen Hügeln u. Wegrändern, in Birkengehölzen und Kieferhauen, hauptsächlich in der Ebene. Um Br. bei *Carlowitz, Schwedenschanze b. Oswitz, Fuchsberg bei Schwoitsch, Lissa. Trebnitzer Hügel. Um Ohlau, Dalkau u. Beitsch b. Beuthen a. O., Boberlehnen u. Eichberg b. Bunzlau. Arnsdorf bei Wohlau. Burgberg b. Jägerndf.* Juli, Aug. 2.

Meist mit einem grauen Aufzuge, bisweilen stark blaugrau. Die blättertragenden Aeste dicht mit Bltt. besetzt, die bisweilen zurückgekrümmt sind. Stängel $\frac{3}{4}$ -1' h., mit Bltt. locker besetzt, welche leicht abfallen. Kronenblt. gelb, doppelt so lang als der Kelch.

Sempervivum L. Hauslauch. Dachwurz. Kelch (6-20-, meist) 12theilig. Eben so viel meist am Gr. zusammenhängende Kronenblätter. Doppelter Kreis von Staubgefässen. Houigschuppen und Schlauchkapseln so viel als Kronenblätter. XI, 6.

Zahlreiche kurze Stängel aus der Wurzel mit Blätterrosetten.

† *S. tectorum* L. Die Bltt. der Rosetten länglich-verkehrt-eifg., plötzlich zugespitzt mit einer Stachelspitze, am Rande gewimpert, sonst kahl; Kronenbltt. sternförmig ausgebreitet, am Gr. nicht verwachsen.

Einheimisch auf Felsen der süddeutschen Gebirge; bei uns in vielen Gegenden durch Cultur auf Mauern und besonders auf den Schobendächern der Dorfgebäude verbreitet. *Ohlau. Wohlau. Bunzlau. Strehlen. Brieg. Gleiwitz. Leobschütz. Charlottenbrunn. Kupferberg.* Juli, Aug. 2.

Die grösste unserer Arten; die Rosetten sind stets ausgebreitet, dunkelgrün. Die blühenden Stängel dick, weichhaarig, 1-1½' hoch. Kronenhl. rosa-purpurb. Die Honigschuppen kurz, dick und drüsig. Koch bemerkt, dass an unseren Expl. der innere Staubfadenkreis in gestielte Fruchtknoten verwandelt ist. Hiess bei den Alten *Barba Jovis*; die Bltt. sind kühlend und zusammenziehend und enthalten viel apfelsauren Kalk; als äusseres Mittel bei Entzündungen gebräuchlich.

S. montanum L. Die Bltt. der Rosetten länglich-keilfg., kurz-zugespitzt, beiderseits drüsig-feinhaarig, am R. gewimpert; der Stängel fast geflügelt; Kronenbltt. sternfg. ausgebreitet, am Gr. verwachsen.

Zwischen den Steinen *um den Gipfel der Babia Gora.* Juli. 2.

H. ½'. Die Bltt. sind am Gr. gelblich, gegen die Spitze purpurfarbig überlaufen. Kronenbltt. rosa-purpurfarben ins violette. Honigschuppen viereckig.

S. soboliferum Sims. *S. hirtum* Krock II. p. 117. W. et Gr. sil. Die Blätter der Rosetten länglich-keilfg., spitz, beiderseits kahl, am Rande gewimpert; Kronen glockenförmig mit aufrechten Kronenblättern.

Auf Felsen im Vorgebirge, und vielleicht durch Cultur auf Schobendächern der Dörfer in der Ebene. Zuerst von Krock *am Kynast* gef.; *um Giersdorf u. Herischdorf* nach Nees; *Prudelberg bei Stonsdorf. Lähn. Breiter Berg bei Striegau. Reimsbach b. Tannhausen. Cudowa. Warthau u. Gröditz bei Bunzlau. Krumhübel. Um Br. in Bischwitz a. W.* Auf Dächern in *Kostenblut.* Juli, Aug. 2.

Kronenbltt. gelblich weiss. Bltt. hellgrün. H. ¾-1'. Die Blätterrosetten sind anfangs kugelig-geschlossen.

Saxifrageae Ventenat.

Kelch 4- oder 5-theilig, die Röhre mit dem Fruchtknoten zur Hälfte oder sehr kurz oder nicht verwachsen. Vier oder fünf Kronenbltt. zwischen den Kelchzipfeln, aus der Kelchröhre. Vier oder fünf, oder doppelt so viele freie Staubgef. aus der Kelchröhre oder einer damit verwachsenen den Stempel umgebenden Scheibe. Fruchtknoten aus zwei bis gegen die Spitze verwachsenen Fruchtblättern, welche an den Rändern die Samen tragen, so dass die Samenhalter in der Mitte

steben; oder einfächerig mit wandständigen Samenhaltern. Zwei Griffel mit schiefen Narben. Kapsel mit zwei getrennten Schnäbeln, zwischen denen sie sich öffnet; oder von unten aus aufspringend. Samen mit fleischigem Eiweiss und geradem Keim.

Kräuter mit meist wechselständigen Bltt. ohne Stäbblatt. und in endständigen Blthenständen vereinigten Blumen. Hauptsächlich im Norden heimisch und die meisten Arten Gebirge und Felsen bewohnend.

Saxifraga L. Steinbrech. Kelch fünftheilig. Fünf Kronenblätter. Kapsel zweischnäblig, zweifächerig, zwischen den Schnäbeln sich öffnend. x, 2.

a. Keine Blätterstängel aus der Wurzel.

S. nivalis L. Wurzelbl. spatelfg., gekerbt, gegen den Grund verschmälert; Stängel blattlos; Blüten kopfförmig-genähert.

An Gebirgsfelsen. In der *kl. Schneegrube*, zuerst von Ludwig! gef. Krock. Suppl. nr. 456. Juli. 2.

Stängel 3-4" h., klebrig-kurshaarig. Wurzelbl. rechteckig, in einem kurzen Stiel verschmälert. Blumen kurz-gestielt, fast schirmförmig zu 6-8; Kronenbl. klein weiss, wenig länger als der Kelch.

S. tridactylites L. Stängel beblättert, drüsig-behaart, meist ästig; die untersten Bltt. spatelfg., ungetheilt, die nächsten dreispaltig, die oberen handförmig-dreispaltig; Wurzel spindelig, fädig; Kronenbltt. wenig länger als der Kelch.

Auf sandigem Boden, Aeckern, Brachen, Haideplätzen bis in das Vorgeb., zerstreut aber stets in Menge. Um Br. bei Kleinburg, Grüneiche, Neukirch, Wildschütz, Sibyllenort, Skarsine u. m. Um Ohlau, Wohlau, Beuthen a. O., Bunzlau, Zobten, Hirschberg, Oppeln. Apr., Mai. ☉.

Stängel 2-6" hoch, meist ästig mit weit abstehenden Stielen; bisweilen swergig und einfach, meist röthlich. Kelche napffg. Kronenbltt. weiss.

S. granulata L. Stäng. ästig-doldentraubig; die unteren Bltt. nierenfg., kerbig-gelappt, gestielt; Wurzel körnig; Kronenbltt. doppelt so lang als der Kelch.

Auf trocknen Grasplätzen, auf trocknen Wiesen und Triften, an Dämmen, Gebüsch und Waldrändern, sehr gemein auch im Vorgebirge wo sie grasige und steinige Hügelwände bewohnt. Mai, Juni. 2.

Stängel 1-1½" h., rauhaarig und schwach klebrig. mit 2-Skeilförmigen Bltt. Kronenbltt. spatelfg. Blumen schwach wohlriechend, weiss. Das Kraut ist schwach säuerlich und wird vom Vieh nicht gefressen.

b. Die Wurzel treibt ausser den Blütenstängeln beblätterte Nebenstängel.

S. Aizoon Jacquin. Mit Blätterrosetten; Bltt. zungenfg., knorpelig-gesägt, längs des Randes grubig-punctirt; Stängel aufrecht doldentraubig.

In den Felsritzen des Hochgebirges, in der östlichen Hälfte. *Auf dem Altwater, Peterssteine, Fuhrmannssteine und im Kessel im Gesenke. Am Gipfel der Babia Gora. Juli. 2.*

H. 1/2-1'. Aus der Wurzel entspringen fast im Kreise kurze Stängel mit Blätterrosetten, wie bei den *Semperviva*. Die Gruben am Rande der Bltt. sind mit kleinen Schuppen kohlen-sauren Kalkes bedeckt. Kronenbltt. rundlich weiss mit feinen rothen Punkten.

S. oppositifolia L. Stäng. kriechend, vielästig grosse Rasenpolster bildend; die blühenden Aeste aufrecht, einblumig; Bltt. rundlich, gewimpert, an der stumpfen Spitze verdickt, dachziegelfg.; Kelch gewimpert; Kronenbl. verkehrt-eifg.

Auf Felsen des Hochgebirges. *Im Riesengebirge, im Riesen-grunde am alten Bergwerke und im Teufelsgärtchen* zuerst von Weigel gef.; nach Elsner auch an der *Kesselkoppe* und nach Krock. Suppl. 450 *in den Schnee-gruben. Mai, Juni. 2.*

Die Blütenäste kaum 2" hoch. Bltt. starr gegenständig, in vier Zeilen. Kelch napfförmig. Kronenbl. lila-purpurf.

S. bryoides L. Die Stängel bilden dichte, fast kugelige einblüthige Rasen: Bltt. lineal-lanzettlich, mit dorniger Spitze, gewimpert.

Auf Felsen des Hochgebirges. *Am Basalt der kleinen Schnee-grube*, zuerst von Starcke, nach Krock. Suppl. 455. Juni. 2.

Die Rasen bestehen aus zusammengeballten Knospen und darunter stehenden Blättern. Blumenstiele etwa zolllang, einblumig. Krbtt. weisslich.

S. Hirculus L. Fadenförmige Nebenstängel; Blütenstängel aufrecht beblättert; Bltt. lanzettlich, kahl; Kronenbltt. nervig am Gr. mit zwei Schwielen.

Auf Moorzweigen. *Czenschkowitz in Oberschlesien* von Wenck gefunden. Juli. 2.

H. 3-6"; die Blumenstiele einblumig, rostbraun-zottig. Kronenbl. gelb.

S. muscoides Wulfen. Die Nebenstängel tragen Blätterrosetten; die Bltt. glatt linealisch ungetheilt oder linealisch-keifg. dreispaltig; Blütenstängel aufrecht, einblättrig, 3-5 blumig; Kronenbltt. elliptisch-länglich stumpf.

Auf Felsen im Hochgebirge. *Am Basalt in der kl. Schnee-grube. Krock. Suppl. 457*, zuerst von Weigel und Ludwig gef. Juni. 2.

An unseren Expl. sind Stängel und Bltt. von drüsigen Haaren klebrig. H. 1-4'', und darnach die Rosetten dichter oder lockerer, die Bltt. kleiner oder grösser. Stängel aufrecht, 2-4blumig, mit gelblichgrünen Kronenbltt.

S. caespitosa L. Die Nebenstängel rasenförmig, an d. Spitze mit Blätterrosetten; die Bltt. gestielt, handfg. 5-9spaltig mit lanzettlichen Zipfeln, am Stängel dreispaltig; Blütenstängel fast aufrecht 4-6blumig; Kronenbl. oval, doppelt so lang als d. Kelch.

Polsterförmig auf Steinen *in Wäldern bei Dörnükau, an der Heuscheuer* etwa 1800' von Neumann gef. Juni. 2. Dieselbe Art ward auch unter d. N. *S. decipiens* von v. Müekusch angegeben, als bei *Saubsdorf vor Freiwaldau* gef. Juni. 2.

Unsere Exempl. etwa 2'' hoch, mit fein gewimperten Bltt. Kronenbltt. weiss. — Eigentlich gehören unsere Expl. zur *S. sponhemica* Gmel., die sich aber als Art von *S. caespitosa* nicht unterscheiden lässt.

Anmkg. *S. umbrosa* wurde von Hochstetter „am hohen Falle zwischen Alt-ater und Petersstein“ angegeben. An mehreren Punkten des Gesenkes, welche den Namen hoher Fall führen, ist bisher vergeblich nach dieser Pflanze gesucht worden. — Nach mündlichen Angaben soll *S. aizoides* am Berge Baranio bei Teschen gefunden worden sein; Exemplare sah ich noch nicht.

Chrysosplénium L. Milzkraut. Kelch flach vierlappig; zwei gegenüberliegende Zipfel kleiner. Krone fehlt. Acht Staubgef. Kapsel kurz zweischnäbelig, einfächerig, bis zur Hälfte in zwei Klappen aufspringend. x, 2.

Bisweilen findet sich eine oder die andere Blume mit 5lappigem Kelch und 10 Staubgef. Dicht unter der Blume grosse gefärbte Deckblätter.

C. alternifolium L. Golden Milzkraut. Bltt. wechselständig kreis-nierenfg., tief gekerbt.

Auf sumpfigen und quelligen Stellen, an Waldsümpfen, seichten Ufern von Waldbächen; in Erlenbrüchen, in der Ebene und Vorgebirge, d. d. g. G. verbreitet. Um Br. bei Bischwitz a. W., Goi bei Kapsdorf, Mahler Wald, Lissa, Arnolds Mühl. März, Apr. 2.

Stäng. einfach, aufrecht, 2 - 4'' h., glasartig glänzend. Bltt. gestielt oben mit wenigen borstlichen Haaren. Oben theilt sich der St. gablig u. trägt eine ebene Dolde- traube. Deck- und Kelchbltt. goldgelb.

C. oppositifolium L. Bltt. gegenständig halbkreisförmig schweifig-gekerbt.

An Quellbächen und brüchigen Stellen zwischen Moosen, besd. im Vorgebirge, auch an einzelnen Punkten in der Ebene, überhaupt selten. Im Hirschberger Thale an mehreren Stellen, bei Mittel- und Ober-Schmiedeberg, am Wege nach den Grenzbauden, am Zacken- falle. Um Bunzlau bei der Goldmühle und bei Warthau. Juni. 2.

Kleiner und blasser als die vorhergehende. Stäng. am Gr. wurzelod.

Umbelliferae Jussieu.

Kelchröhre mit dem Fruchtknoten völlig verwachsen; der Saum fünfzählig und bisweilen undeutlich. Fünf Kronenbltt. am Kelchschlunde eingefügt, zwischen den Kelchzähnen, mit eingerollter Knospenlage. Fünf Staubgef. zwischen den Kronenbltt. am Kelchschlunde eingefügt, in der Knospe eingerollt. Fruchtknote zwelfächerig, mit je einem Ei; ein Fach hinter dem unpaarigen Kelchbl., das andere hinter dem unpaarigen Kronenblatte, oben von einer polsterförmigen Honigdrüse (Stempelpolster, *stylopodium*) bedeckt. Zwei fädliche Griffel.

Die Frucht besteht aus zwei Nüsschen, (Halbfrüchte, *mericarpia*), deren jedes von aussen von einer Seite der verwachsenen Kelchröhre bedeckt ist, und die von der Spitze eines zwispaltigen stielförmigen Fruchthalters herabhängen. Die Aussenseite der Nüsschen ist von aussen mit fünf hervorragenden Riefen (*juga*), und die dazwischen befindlichen Rillen auch von Nebenriefen durchzogen; unter letzteren liegen auf der inneren Seite der Frucht Oelkanäle (Striemen, *vittae*). Samen meist mit der Samenschale verwachsen, mit grossem Eiweiss und kleinem Keim.

Die Kronenbltt. haben häufig eine eingeschlagene Spitze, so dass sie ausgerandet scheinen. Die Kronen am Umfange bisweilen grösser mit ungleichen Blättchen und dann gewöhnlich ohne Staubgefässe. Das Eiweiss ist auf der inneren Seite flach oder gewölbt, oder von den Seiten eingerollt und mit tiefer Furche, oder der Länge nach zusammengekrümmt. — Kräuter oder Stauden mit spindliger oder rübenförmiger Wurzel, meist zweijährig, mit meist wechselständigen zusammengesetzten Blättern auf scheidenartig umfassendem Stiel, und Blumen in Schirmen oder Dolden. Die Kronen meist weiss oder gelb. — Die Familie der Doldenpflanzen gehört mehr den gemässigten Zonen an. Sie zeichnen sich aus durch einen eigenthümlichen, oft scharfen, auch narkotischen Stoff, der mit Schleim, Zucker, ätherisch-öligen und harzigen Bestandtheilen vermischt ist, wodurch sie für die Arzneikunde sehr wichtig werden. Die Unterscheidung der Sippen geschieht hauptsächlich nach der Frucht, welche man einweichen und in feinen Querschnitten untersuchen muss. Jede Region hat einige ihr eigenthümliche Arten. Sämmtlich bei Linné in Cl. V, O. 2.

A. Das Eiweiss ist auf der innern Seite eben.

1. *Hydrocotyleae*. Blüten in einem Schirm. Frucht flach-zusammengedrückt.

Hydrocotyle L. Wassernabel. Frucht von der Form eines Doppelschildes, ohne Striemen. Kelchsaum undeutlich.

Stängel kriechend. Bltt. schildförmig.

H. vulgaris L. Schirme kopfförmig; Stängel wurzelnd; Bltt. kreisrund.

Auf moosigen Sumpf- und Torfwiesen, in Waldgegenden, an bewaldeten Teichufern, in der Ebene hin und wieder. Um *Br. bei Lissa*. *Garsuche bei Ohlau*. *Deutschhammer*. *Militsch*. *Wohlau*. *Beuthen a. O.* Häufig um *Bunzlau bei Försterbach*, *Gnadenberg*, *Eckersdorf*, *Tiefenfurth*. In *O. S. bei Königshuld*, *Proskau*, *Malapane*. Juli, Aug. 2.

Die Blattstiele und die blattlosen Blumenstiele entspringen aus den wurzelnden Knoten des kriechenden Stängels. Kronen weisslich, bisweilen ins röthliche ziehend. Von 1 - 10' hoch. Die beiden Zwischenriefen deutlich. — Das Krant ist scharf.

2. *Saniculeae*. Blüten in kopfförmigen Schirmen. Frucht im Durchschnitt stielrund. Fünf gleichförmige Hauptriefen; keine Nebenriefen. Kronenblätter mit eingeschlagener Spitze.

Sanicula L. Sanickel. Kopfförmige Schirme, die eine unregelmässige Dolde bilden. Frucht fast kugelig, dicht mit Stacheln bedeckt, so dass die Riefen undeutlich werden, mit vielen Striemen, sich von selbst nicht trennend.

Bltt. gelappt; Stängel arnblättrig.

S. europaea L. S. vulgaris Koch Syn. Wurzelbltt. handfg. getheilt, mit dreispaltigen ungleich-gesägten Zipfeln.

In schattigen und etwas feuchten Nadel- und Laubwäldern der Hügellgegend der Ebene und des Vorgebirges d. d. g. G. verbreitet. *Wald vor Schwöitsch. In den Trebnitzer Hügeln, um Skarsine, Glauche, Totschen, Wohlau. Bnnzlau bei Gröditz u. in der Haide. Charlottenbrunn. Zobtenberg, Sonnenkoppe, Jauersberg u. s. w. Oppeln. Trop. Tesch. Mai, Juni. 2.*

Stängel 1' h., kahl. Die Blumen sind polygamisch. Kronenbltt. weiss. — Das Kraut ist etwas scharf und war ehemals officinell.

Hacquetia Necker. Kopfförmiger Schirm von einer dreimal grösseren Blätterhülle getragen. Nüsschen bucklig, mit fünf ländigen Riefen.

H. Epipactis DC. Astantia E. L. Dondia E. Sprengel. W. et Gr. sil. Wurzelbltt. gedreht; Blütenstängel blattlos.

In schattigen Laubwäldern des südöstlichen Schlesiens, wo die Gränze dieser Art gegen Nordwesten ist. *Auf der Landecke bei Hultschin. Am Hrabinerberge, b. Strzebowitz b. Trop. In den Thälern des Klokaczgebirges, um Ustron, Jablunka u. m. April Mai. 2.*

Die ganze Pflanze grün. Wurzelbltt. langgestielt, gedreht; die Blättchen verkehrt-ei-keilfg., mit spitzigen Sägezähnen. In deren Mitte ein wenig längerer Blütenstiel. $\frac{1}{2}$ ' h. Hüllbltt. des Schirms 5-8, länglich-verkehrt-eifg., nach oben gesägt. Kronenbltt. gelbgrün.

Astrantia L. Stränze. Büschelförmige Schirme von gleichlangen Hüllen umgeben, eine Dolde bildend. Frucht vom Rücken zusammengedrückt. Nüsschen mit fünf stumpfen, faltig-gezähnten, aufgeblasenen Riefen, ohne Striemen und deutlichen Fruchthalter.

A. maior L. Meisterwurz, Ostritz. Wurzelbltt. handfg.-fünftheilig; Kelchsähne stachelspitzig.

Auf etwas feuchten Waldwiesen, Torfwiesen, in Waldgegenden, an feuchten Waldlehnen, in der höheren Gegend der Ebene und im Vorg. Um *Br. im Goi bei Kapsdorf, Lisst, Skarsine, Heydewilxen. Bei Riemberg und Haussen. Siefersdorf bei Ohlau.* Durch das ganze Vorgebirge zerstreut, *um Hirschberg, bei Ketschdorf, Kauffung nach Nees v. E. Oppeln. Trop. Tesch. Juni, Juli. 2.*

Stängel ästig, 1 - 2' h. Die Hüllblättchen der Schirme aufrecht-abstehend bisweilen länger als der Schirm, verkehrt-eif., unterhalb weisshäutig mit grünen Netzadern, ganzrandig oder oberhalb gezähnt. Der Kelchsaum ist bei dieser und den anderen dieser Zunft blattartig. — Die schwarze Wurzel war ehemals officinell als *R. Imperatoriae nigrae*.

Eryngium L. Mannstreu. Blüten kopfförmig hin und wieder mit Deckspreublättern. Frucht im Durchschnitt stielrund, mit Schuppen oder Knötchen bedeckt, ohne Riefen und Striemen.

Starr und trocken; bläuliche Blütenköpfe.

? **E. campestre L.** Untere Bltt. gedreit und doppelt-fiederspaltig; Kelch länger als die Krone.

Auf sandigen Stellen an Flussufern. Diese in Böhmen an Wegrändern sehr häufige Pflanze kommt bei uns höchst selten vor. *An d. Oder bei Pirscham* nach Matt., und bei *Pöpelwitz* von *Krocker* und Schummel, in wenigen Exempl. und seither nicht wieder gefaunden. *Schwarzwasser bei Teschen* n. Kotschy. Juli, Aug. 2.

Die Blumen sind graublangrün. Stängelbltt. umfassend mit zerschlitzt-gezähnten Ohren.

E. planum L. Blaue Laufdistel. Wurzelbltt. eierzförmig, stumpf, ungetheilt, gestielt.

Auf trocknen sandigen Stellen an Flussufern, nur an den Ufern der Oder in der niederschlesischen Ebene. *Um Br. bei Pöpelwitz, Oswitz, Massewitz, Sandberg, Dyhrenfurth, Rosenthal, Scheitnich. Um Ohlau und Beuthen. Weder um Trop. noch um Teschen.* Juli, Aug. 2.

Wurzelbltt. dicklich, schwachglänzend; die oberen Stängelbltt. getheilt dornig-gesägt, mit weisser Rippe und Adern. Hüllblättchen des Kopfes lineal-lanzettlich, dornig-gesägt. Die Köpfe sammt den oberen Aesten blau.

3. Ammineae. Vollständige Dolden. Frucht zusammengedrückt. Fünf südliche, selten schwach geflügelte gleichförmiger Hauptriefen; die seitlichen am Rande.

Cicuta L. Wasserschieferling. Kelchzähne blattartig. Kronenbltt. verkehrt-herzförmig. Frucht rundlich. Fünf flachgewölbte Riefen; je ein Striemen in einer Rille, nicht vertieft. Fruchthalter zweitheilig. Eiweiss rund.

Kuglige Doldchen mit zahlreichen linealischen Hüllchen.

C. virosa L. Wütherich. Stängel röhrig; Bltt. dreifach-gesiedert mit lineal-lanzettlichen starkgesägten Zipfeln.

In Gräben, Teichen und an Flussufern, zwischen Schilf, Gestrüch oder anderen Wasserpflanzen, zerstreut an mehreren Stellen, nicht überall. *Um Br. bei Marienau und Zedlitz, Oswitz, Hundsfeld, Bischwitz und überhaupt längs der Weide. Ohlau, Wohlau, Poln.*

Wimmer's Flora.

Tarnau u. Rosenthal b. Beuthen a. O., Bunzlau, Hirschberg, Opateln, Leobschütz, Schwarzwasser bei Tesch. Juli, Aug. ♀.

Wurzel dick, hohlzellig. Stängel unterhalb gegliedert und aus den Gelenken ringförmig Fasern treibend, dick. Blattstiele rund, röhrig. Blattscheiden länglich. Die seitlichen Dolden oft einem Blatt gegenüber, kleiner als die endständigen. Stängel oft roth. Kronen weiss. Frucht klein, zwei Knoten bildend. — Die Blt. riechen schwach aromatisch und schmecken scharf. Die Wurzel ist eines der stärksten Pflanzengifte, wogegen Brechmittel, Campher und Pflanzensäuren empfohlen werden.

Apium L. Selleri. Kelchsaum undeutlich. Kronenblt. rundlich ohne Ausrandung. Stempelpolster flach. Frucht rundlich. Fünf fädliche gleichförmige Riefen. Die Rillen mit je einer Strieme. Fruchthalter ungetheilt.

* *A. graveolens L.* Blt. gefiedert, die oberen gedreht; Blättchen gedreit.

Wächst auf Salzboden am Ufer d. Ost- u. Nordsee u. des adriatischen Meeres, und im Binnenland an Salzseen. Wird bei uns als Küchengewächs kultivirt. Spätsommer. ☺.

An der kultivirten Pflanze ist die Wurzel ein ründlicher nach unten spindeligere Knollen, von aromatischem Geruche und Geschmack. H. 1-1½'. Stängel gefurcht oft mit quirligen Aesten. Kronenblt. grünlich-weiss.

Petroselinum Hoffmann. Petersilie. Kelchsaum undeutlich. Kronenblt. rundlich mit schwach eingekrümmter Spitze. Stempelpolster erhaben. Frucht eifg. Fünf fädliche gleichförmige Riefen. Rillen mit je einer Strieme. Fruchthalter zweitheilig.

* *P. sativum Hoffm.* Stängel eckig; Blt. glänzend, dreifach-gefiedert mit ei-keilförmigen Blättchen.

Stammt aus Südeuropa und wird als Küchengewächs angebaut. Juni, Juli. ☺.

H. 1½-2'. Wurzel spindelig, weiss, aromatisch. Krbt. klein, grünlichgelb. — Die Wurzel besitzt eine flüchtige Schärfe, und aus den Samen scheidet man ein ätherisches Oel. Das Kraut, welches in Suppen gethan wird, ist zuweilen mit dem Kraute von *Conium* verwechselt worden.

Falcária Rivin. Sichelmöre. Kelchsaum fünfzählig. Kronenblt. ausgerandet. Frucht länglich. Fünf fädliche gleichförmige Riefen. Rillen mit je einer feinen Strieme. Fruchthalter zweispaltig.

F. Rivini Host. Sium Falc. L. Critamus agrestis Besser W. et Gr. Fl. sil. Blt. meist gedreit; Blättchen lineal-lanzettlich, scharf knorplig- und dornig-gesägt.

Auf Aeckern unter der Saat und Ackerrändern, an Kartoffel-, Röhre- und Kohl-Feldern, hin und wieder, besonders gegen das Vor-

gebirge zu, in manchen Gegenden fehlend. Um Br. bei Prottsch u. Kapsdorf, Kleinburg, Lohé u. gegen Strehlen u. Schweidnitz hin. Striegau. Um Beuthen a. O., Hirschberg, Oppeln. Trop. bei d. Gipsbrünnel. Juli, Aug. 2.

Stängel meist von unten an in Aeste ausgebreitet, 1-2' h. Hüllen fädlich. Dolden klein, kegelförmig; Doldchen flach. Krbltt. weiss.

Aegopodium L. Giersch, Gersch. Kelchrand undeutlich. Kronenbltt. ausgerandet. Frucht länglich. Fünf fädliche gleichmässige Riefen. Rillen ohne Striemen. Fruchthalter kurz gespalten.

A. Podagraria L. Gerhardskraut. Wurzelbltt. doppelt-gedreit; Blättchen eifg.-länglich, ungleich-gesägt.

In Hecken und Gebüsch, an buschigen Dämmen und Waldrändern, in Grasgärten, an Zäunen, d. d. g. G., bis an das Hochgebirge, gemein. Mai, Juli. 2.

Stängel aufrecht, steif, hohl, 3-4', meist kahl, bisweilen feinhaarig. Scheiden bauchig. Hüllen fehlen. Krbltt. weiss.

Carum L. Kümmel, Karbe. Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. ausgerandet. Frucht länglich. Fünf fädliche gleichförmige Riefen. Rillen mit je einer Strieme. Fugenfläche platt. Fruchthalter an der Spitze gabelförmig.

C. Carvi L. Bltt. doppelt-gefiedert; Blättchen fiedertheilg-vielspaltig; Hüllblättchen fehlen.

Auf Wiesen, Triften, Waldwiesen, und angebaut. Gemein bis auf das Hochgebirge. April, Mai, am frühesten unter allen Doldenpfl. 2.

Stängel kantig, 1-2' h. Bltt. viel- und feintheilig. Die Dolden etwas hohl. — Die Früchte sind der bekannte Kümmel, von angenehmem Geruch u. bitterlich-gewürzhaftem Geschmack, ein ätherisches Oel enthaltend, ein bekanntes magenstärkendes Mittel.

Pimpinella L. Bibernelle. Kelchrand undeutlich. Kronenbltt. ausgerandet. Frucht eifg., mit polsterförmigem Stempelpolster und zurückgebogenen Griffeln. Fünf fädliche gleichförmige Riefen. Rillen mit je mehreren Striemen. Fruchthalter zweispaltig.

P. Saxifraga L. Steinpeterlein. Bltt. gefiedert; Blättchen eifg., stumpf, gezähnt, gelappt oder geschlitzt; Stängel stielrund; Früchte kahl.

Auf trockenem festem und mageren Boden, Triften, trocknen Dämmen und Hügeln, sonnigen und steinigen Waldplätzen, an Ackerrändern u. Rainen. Bis in das Hochgebirge. Gemein. Juli, Aug. 2.

II. 1-2'. Dolden nicht gross, flach, ohne Hüllen. Kronenbltt. weiss. Kommt ganz kahl und auch durchaus feinhaarig vor. Die Bltt. sind in der Zertheilung veränderlich;

selten sind Exempl., woran auch die Wurselblättchen schlüssig getheilt sind. — Die Wurzel dieser und der folgenden Art hat einen aromatischen, erst süßen dann brennend scharfen Geschmack, und ist ein wirksames Reizmittel. Eine Form, welche *P. nigra* Willd. heisst, soll ein blaues ätherisches Oel geben.

P. magna L. Bltt. gefiedert; Blättchen eifg., spitz, zählig, gesägt, oder gelappt, oder geschlitzt; Stängel eckig; Früchte kahl.

Auf lockerem etwas fruchtbarem Boden, Waldwiesen, Graspärten, und an trocknen Lehnen des Hochgebirges, seltner als die vorige, aber d. d. g. G. Um Br. im Goi bei Kapsdorf, Gr. Rake, Lissa, Sandberg u. m. Charlottenbrunn. Hirschberg. Im Riesengrunde am alten Bergwerke und auf dem Bibernellfleck unter dem Teufelsgräben. Köpernik im Gesenke. Juni, Juli. 2.

Höher und stärker als die vorige Art. Blattscheiden lanzettlich. Krbltt. weiss oder, besd. im Gebirge, rosafarben.

* *P. Anisum* L. *Anis*. Bltt. herzf. - rundlich, eingeschnitten-gesägt; die mittleren gefiedert mit keilförmigen Blättchen; Früchte weichhaarig.

Wird angebaut, und stammt von den Küsten des mittelländ. Meeres. Juli. ☉.

Stängel 1' h., zartgest. fleischhaarig. Kronenbltt. weiss. Die Samen sind aromatisch, und das *Oleum Anisi* ein Arzneimittel, das auf die Verdauung wirkt und bei Brustübeln angewandt wird.

Bérula Koch. *Berle*. Kelchsaum fünfzählig. Bltt. ausgerandet. Frucht eifg., mit kegelförmigem Stempel und zurückgebogenen Griffeln. Fünf fädliche etwas stumpfe Riefen; die seitlichen vom Rande ein wenig entfernt. Rillen mit je vielen Striemen, welche die rindenartige Samenschale bedecken. Eiweiss rundlich. Samenblätter undeutlich.

Bérula angustifolia Koch. *Sium ang.* L. Bltt. gefiedert mit eingeschnitten-gesägten Blättchen; Dolden einem Blatt gegenüber; Blattblätter fiederspaltig.

In tiefen sumpfigen Gräben, in Brüchen, an Teichrändern zwischen Schilf, hin und wieder, stets heerdenweis, wahrscheinlich nur in der Ebene. Um Br. bei Lehmgruben, Wildschütz und Weigelsdorf, Bischwitz a. W., Schmolz, Kobowitz, Dyhrenfurth, im Ohlau, Wohlau, Beuthen u. O.; Goldmühle und Warthe bei Breslau. Opatowitz, Trop. u. Te. Juli, Aug. 2.

Die allerersten Bltt. unter Wasser haarig. - vieltheilig. Stängel mit Bltt. schlapp und vieläst. Saft. Scheiden länglich. Dolden klein sech. Kronenbltt. weiss. Die Bltt. sind bald grünlich bald gelblich.

Sium L. *Sium*. Kelchsaum fünfzählig. Bltt. ausgerandet. Frucht eifg., mit polsterförmigem Stempel und zurückgebogenem Griffel. Fünf fädliche etwas stumpfe Riefen. Rillen mit je drei Striemen nahe der Oberfläche.

S. latifolium L. *Wassermerk, Froschpeterlein*. Blätter gefiedert; Blättchen länglich-lanzettlich, am Gr. ungleich, scharf gesägt; Hülle vielblättrig.

In fließendem und stehendem Wasser, Gräben, Waldsümpfen, an Teich- und Bachrändern zw. Gesträuch und Schilf. Gemein d. d. g. G. bis in das Vorgebirge, doch hier seltner. Juli, Aug. 2.

Stängel 2-4' h., hohl, markig, eckig-gefurcht. Die allerersten Wurzelbltt. unter Wasser sind in haarförmige Fetzen kämmig-zertheilt; je weiter nach oben, desto weniger sind die Bltt. zertheilt. Dolden endständig, etwas erhaben. Kronenbltt. weiss. — Wurzel und Kraut, ehem. officinell, wirken betäubend.

Bupleurum L. *Hasenöhrchen, Durchwachs*. Kelchsaum undeutlich Kronenbltt. länglich, einwärts gerollt mit abgestutzter Spitze. Frucht länglich, mit flachem Stempelpolster. Fünf gleichförmige fädliche oder geschärfte oder geflügelte Riefen. Rillen mit oder ohne Striemen.

Bltt. nervig und ungetheilt. Kronen gelb.

B. falcatum L. Bltt. elliptisch, in den Stiel verschmälert, die oberen lanzettlich, sitzend; Hüllblätter lanzettlich.

Auf trocknen sonnigen Hügeln, bei *Katscher in Oberschl.* von Kelch und Wenck gef. Nach v. Mückusch auch bei *Troppau u. Strzebowiz*. Aug., Sept. 2.

Stängel ästig 1-2' h. Bltt. 5-7 nervig, schwach sichelfg., grangrün. Krbtt. goldgelb. Rillen dreistriemig.

B. longifolium L. Bltt. eifg.-länglich, die unteren in den Stiel verschmälert, die oberen mit herzförmig-umfassenden Grunde ansitzend; Hüllblätter elliptisch so lang als die Doldchen.

An gras- und kräuterreichen Lehnen des Hochgebirges; anderwärts auch in tieferen Gegenden. *Im Riesengeb. im Riesengrunde um das alte Bergwerk und im Kessel im Gesenke, um 4000'*. Juli, Aug. 2.

Stängel einfach oder oben ästig, 1-1/2' h. Bltt. und Stängel oft mit bläulichem verwischbarem Reif überzogen. Durch die scharfen Riefen erscheinen die Früchte funfleckig. Rillen dreistriemig.

† *B. rotundifolium* L. *Durchwachs*. Bltt. eifg., durchwachsen; die unteren nach dem umfassenden Grunde zu verschmälert; Hüllblättchen eifg.

Auf Thon- und Kalkboden unter der Saat, vielleicht nicht als einheimisch zu betrachten. *Höfchen bei Br. Um Oppeln. Zw. Teschen und Ustron*. Juni, Juli. ☉.

Stängel ästig, starr. Bltt. fast lederartig, blassgrün, ins graue. Rillen gestreift, ohne Striemen. Das Kraut war ehem. officinell. Wird um Krummhübel angebaut.

4. *Seselineae*. *Vollständige Dolden*. *Frucht im Durchschnitts rundlich*. *Fünf fädliche oder geflügelte Riefen; die seitli-*

chen am Rande und bisweilen etwas breiter. Die Fugennaht nahe oder dicht am Rande.

Oenanthe L. Drüswurz. Kelchsaum fünfzählig. Frucht birnförmig oder länglich, mit langen aufrechten Griffeln. Riefen stumpf, die seitlichen etwas breiter. Rillen mit je einer Strieme. Fruchthalter undeutlich.

Dolden kurzstrahlig.

O. fistulosa L. Troppfenzurz, Rebendolde. Wurzel büschelig, mit knollig-verdickten Fasern; Dolden endständig 3-7 strahlig; Blattstiele röhrig.

In Gräben u. Sümpfen, an schilfigen Teichrändern, war hin und wieder in der Ebene. Um Br. bei Krittern, Lilienthal, Wildschütz, Birschwitz a. W., Schweinern. Trachenberg an der Bartsch nach Beichau zu. Ohlau, Wohlau, Beuthen a. O. Um Bunzlau bei der Goldmühle u. d. Gnadenberger Teichen. Nicht um Tropp. und Te. Juli, Aug. ☽.

Stängel ganz hohl, daher schwach, treibt blättertragende Ausläufer mit gefiederten Bltt. und eig. dreispaltigen Blättchen, 1-2' h., an den Gelenken zusammengezogen. Bltt. 2-3 fiederig. Die späteren Dolden tragen a. R. unfruchtbare Strahlblumen. Die Riefen bedecken die Billen. Soll giftig, wenigstens schädlich sein.

O. Phellandrium Lamarck. Rossfenchel. Pferdesamen. *Phellandrium aquaticum L.* Wurzel spindelrig; Stängel sehr ästig; Bltt. 2-3fach-gefiedert mit fiederspaltigen Blättchen; Dolde einem Blatt gegenüber, vielstrahlig.

In seichten Gewässern, Sümpfen, Gräben, Teichen und den Ausläufern der Ebenenflüsse hier und da häufig und bisweilen ganze Strecken bedeckend, d. d. g. G. bis ins Vorgebirge. Juli, Aug. ☽.

Der Stängel wird unten bis 4" dick und treibt ringförmig Wurzelfasern aus den Gelenken, oben in sehr viele kurze und dünne Aeste getheilt. Dolden klein. Die Blättchen auseinandergesperrt, und wie bei Sinn diejenigen, welche unter Wasser sind, in haarförmige Zipfel zertheilt. Früchte eif.-länglich. — Der Same ist etwas aromatisch. In den Stängeln lebt die Larve des *Lycus paraplecticus*.

Aethusa L. Gleisse. Kelchsaum undeutlich. Frucht kugelig-eif. Riefen dick mit scharfem Kiel, die seitlichen etwas breiter und einen kurzgeflügelten Rand bildend. Rillen mit je einem, Fugenfläche mit zwei Striemen. Fruchthalter zweitheilig.

Hüllblättchen der Doldchen zurückgeschlagen.

A. Cynapium L. Gartengleisse. Hüllblättchen der Dolden zu dreien, länger als dieselben; die äusseren Fruchtsiele doppelt so lang als die Frucht; die Striemen der Fugenfläche am Gr. entfernt.

β. *agrestis*. 1-3 Zoll hoch; Doldenstiele kürzer als die Blätter.

Auf Acker- und Gartenland, an Hecken, in Gärten, auf Mauern. β. auf Brachen, Kartoffel- und Stoppelfeldern. Juni, Sept. ☽.

Stängel aufrecht, ästig, hohl, mit einem Reif bedeckt. Bltt. dunkelgrün, unterseits glänzend, 2-3fach gefiedert mit eig. fiederspaltigen Blättchen. Die allgemeine Hülle fehlt; die besondere ist halbirt aus linealisch-lanzettlichen Blättchen. — Gilt als giftig und wird bisweilen mit *Conium* verwechselt.

Foeniculum Hoffm. Fenchel. Kelchsaum geschwollen undeutlich. Kronenbltt. rundlich, eingerollt. Frucht im Durchschnitt stielrund. Riefen vorragend mit stumpfem Kiel. Rillen mit je einer Strieme. Fruchthalter zweitheilig.

* **F. officinale Allione. Anethum Foen. L.** Blattzipfel haarförmig; Kronen gelb.

Auf steinigem Hügeln im südlichen Europa; bei uns häufig angebaut. Juli, Aug. ☉.

Graubereift, Bltt. drei- und mehrfach gefiedert. Hüllblätter fehlen. — Samen und Wurzel stark aromatisch, ein gelindes Reizmittel der Schleimhäute der Respirations- und Verdauungsorgane.

Séseli L. Sesel. Kelchsaum fünfzählig. Frucht oval oder länglich, im Durchschnitt stielrund, mit zurückgebogenen Griffeln. Riefen hervorragend, dick und rindig. Riefen mit je einer (oder 2, 3) Striemen. Fruchthalter zweitheilig.

S. annum L. S. coloratum. Ehrh. Koch Syn. Blattzipfel linealisch; Früchte feinhaarig; allgemeine Hülle fehlt.

Auf trocknen sandigen Hügeln an grasreichen und belaubten Hügel- und Berglehnen, in der Ebene und dem Vorgeb., an vielen Orten, aber nicht überall. Um Br. bei *Schwoitsch* und *Althof am Fuchsberge, Oswitz und Ransern, Pilsnitz, Lissa u. m. Trebnitz, Ohlau, Bunzlau, Chartottenbrunn, Oppeln, Tropp., Te.* Aug., Sept. ☉ oder ☉?

Stängel 1-2' hoch, hin und wieder feinhaarig, am Gr. von schopfigen Blattsüßwurzresten umgeben. Döldchen fast kugelig. Stängel nebst den Blütenstielen oft roth. Kronenbltt. weiss. Bltt. dreifach-gefiedert, mit rinnenförmigem Blattstiel.

S. Libanotis Koch. Athamanta Lib. L. Libanotis montana Allione Koch Syn. Blattzipfel lanzettlich, die untersten Blättchenpaare an der Mittelrippe einander kreuzend; Früchte kurzhaarig; allgemeine Hülle vielblättrig.

An grasreichen und felsigen sonnigen Hügel- und Berg-Lehnen des Vorgebirges. Bei *Podiebrad* nach *Kröcker. Kreuzberg bei Striegau. Im Schlesiethale bei Kynau. Fürstenstein u. Fischerbg. b. Pilsnitz* nach *Unverricht. Kapellenberg bei Wartha. Um Kunzendorf bei Neustadt. Pochauhl b. Troppau* und *a. d. Horka bei Stremplowitz.* Juli, Aug. * ♀.

Stängel eckig starkgefurcht 1½-2' h. Bltt. etwas graugrün mit ausgesperrten Zipfeln. Scheiden länglich. Döldchen kugelig. Kronenbltt. schmutzigweiss. Früchte fast filzig.

Cnidium Cussone. Brenndolde. Kelchsaum undeutlich. Frucht im Durchschnitte stielrund. Fünf gleichförmige Riefen mit schmalem Flügel. Rillen mit je einer Strieme. Fruchthalter frei.

C. venosum Koch. Seseli annuum Ehrh. S. dubium Schk. S. venosum Hoffm. Aeste wenige, aufrecht; Bltt. doppeltgefiedert mit linealischen Zipfeln, im Bogen überhängend; die oberen Blattscheiden den Stängel einhüllend.

Auf Wiesen, besd. um Gebüsch und auf Waldwiesen zerstreut. Um Br. bei Pöpelwitz, Scheitnich und Schwoitsch, Bischofswalde, Lissa u. m. Um Ohlau und Hirschberg. Wahrscheinlich häufiger, aber übersehen. Juli, Aug. ☉.

Stängel kahl, 1-2' h., steif aufrecht, einfach oder oben mit einigen Aesten. Dolden oben flach-kugelig. Die Blättchen der besonderen Hülle pfriemlich kahl.

Silaus Besser. Silau. Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. am Gr. breit. Fünf gleichförmige scharfe fast geflügelte Riefen. Rillen mit je viel Striemen. Fruchthalter zweitheilig.

S. pratensis Bess. Peucedanum Silaus L. Stängel eckig, mit abstehenden Aesten; Bltt. 3-4fach gefiedert; Zipfel lineal-lanzettlich, stachelspitzig, geadert.

Auf Wiesen, gemein d. d. g. G. bis ins Vorgeb. Juni, Juli. ☽.

Stäng. 2-3' h., kahl. Blattscheiden klein. Allgem. Halle 1-2blättrig. Dolde etwas hohl, Doldchen erhaben. Kronenbltt. blassgelb.

Meum Tournefort. Bärenwurz. Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. ganz, elliptisch, oben und unten spitz. Fünf hervorragende Riefen mit scharfem Kiel. Rillen mit je viel Striemen. Fruchthalter zweitheilig.

Hochgebirgspflanzen; Wurzel mit starkem Schopfe.

M. athamanticum Jacq. Athamantha Meum L. Bltt. doppelt-gefiedert; Bltt. fiederig-vieltheilig; Zipfel haardünn.

Auf Gebirgswiesen, an der Gränze des Vor- und Hochgebirges. Am Molkenberge bei Schmiedeberg, unsere Exempl. von Kaiser. Nach Wenck auch bei der alten schlesischen Banke und nach Tausch am Iserkamme. Juli, Aug. ☽.

St. $\frac{1}{2}$ -1' h. Durch die feinen Blattzipfel vor allen ausgezeichnet. Kronenbltt. weiss. Die Wurzel ist aromatisch und reizend, aber als Heilmittel veraltet.

M. Mutellina Gärtner. Bärenwurz. Phellandrium Mut. L. Bltt. doppelt-gefiedert; Zipfel lineal-lanzettlich.

Auf den Triften und Wiesen der Kämme des Hochgebirges im östlichen Theile der Sudeten. Gl. Schneeberg auf dem Gipfel. Kamm des Gesenkes. Babia Gora. Juli, Aug. ☽.

H. 1-1 $\frac{1}{2}$ '. Kronenbltt. rosen- oder purpurroth. Die Reste der Blattstiele bilden am Wurzelhalse einen dichten braunen Schopf. Radix Mutellinae ehemals officinell.

Conioselinum Fischer. *Grausilge.* Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. verkehrt-herzfg. Fünf Riefen mit häufigen Flügeln, welche an den beiden randständigen doppelt so breit sind. Rillen mit je vielen Striemen. Fruchthalter zweitheilig.

C. Fischeri W. et Grab. *C. tataricum* Fisch. *Angelica chaerophyllea* Lottermoser. Stängel stielrund, bereift; Aeste gefurcht; Blattscheiden aufgeblasen; Blätter dreifach-gefiedert, mit länglichen Zipfeln.

An waldigen und steinigen Gebirgalehnen. Auf dem *Nesselurlich und kleinen Keilig im Gesenke*, und in einigen Graspärten der Dörfer *Thomasdorf und Waldenburg*, wohin die Bewohner dieselbe verpflanzt haben, von Grabowski entdeckt. Juli, Aug. 2.

H. 2-3'. Die Bltt. haben rhomboidalen Umriss; die Zipfel mit feinen weissen Spitzen und mit umgebogenem Bunde; den Blättern von *Conium* sehr ähnlich. Dolden ziemlich flach. Kronenbltt. schmutzig weiss.

5. *Angeliceae.* Frucht niedergedrückt, mit doppeltem breit geflügeltem Rande. Drei Mittelriefen sädig oder geflügelt, die beiden seitlichen mit doppelt so breitem Flügel. Eiweiss innen flach.

Levisticum Koch. *Liebstockel.* Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. eingekrümmt, rundlich, mit vorgezogener Spitze. Frucht am Rande klaffend. Drei Mittelriefen geflügelt. Rillen mit je einer Strieme.

* **L. officinale Koch.** *Ligusticum Lev.* Linn. Blattstiele kahl; Blätter dreifach-gefiedert, Blättchen breit-eifg.; Blütenstielen sehr kurz; Hüllblätter lanzettlich.

Einheimisch im südlichen Europa, bei uns besonders um die Graspärten der Gebirgsdörfer nebst *Archangelica und Imperatoria* angebaut und halb verwildert. Juli, Aug. 2.

Stängel 4-5' h., röhrig, weiss bereift. Blättchen dicklich, fast fleischig. Kronenbltt. gelb. Wurzel dick, ästig, bräunlich-gelb, innen weiss, mit harzigem Milchsaft, von süslichem, dann bitter scharfem Geschmack. Ist officinell.

Selinum L. *Silge.* Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. verkehrt-eifg., ausgerandet. Fugenfläche zu einem Kie^l verschmälert. Drei Mittelriefen geflügelt. Rillen mit je einer, auch zwei Striemen.

S. Carvifolia L. Stängel eckig-gefurcht; die Stiele der Doldchen kahl.

In Wäldern, Gebüsch, auf Waldwiesen, d. d. g. Gebiet bis in das Vorg. häufig. Juli, Aug. 2.

Stängel 2 - 3' h. Bltt. 3fach gefiedert mit tief fiederspaltigen Blättchen, deren Zipfel weisse Spitzen haben. Allgem. Hülle fehlt. Dolde flach. Kronenbltt. weiss. Narben rüthlich.

Anmkg. Günther besass ein Exemplar von *Ostercicum pulstre*, das aus Schlesien und mathematisch aus der Gegend von *Liegnitz* sein sollte.

Angélica L. Brustwurz. Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. lanzettlich, zugespitzt, gerade oder eingekrümmt. Fugenfläche sehr schmal. Drei Mittelriefen vorragend fädlich; die beiden seitlichen geflügelt. Rillen mit je einer Strieme.

Doldchen kuglig; Blattzipfel breit und gross.

A. sylvestris L. Bltt. dreifach-gefiedert; Blättchen eig. scharf-gesägt.

β. alpestris Centur. sil. 10. Bltt. grösser und breiter, unterseits schärflich; die obersten Blättchen herablaufend. *A. montana* Schleich. Koch Syn.

Auf Waldwiesen, in Gebüsch und Gehölzen, an Waldrändern, auf etwas feuchtem Grunde in der Ebene und dem Vorgebirge. *β an Fusse des Riesengebirges, auf Wiesen um Warmbrunn.* Sehr verbreitet und häufig. Juli, Aug. 2.

Stängel stielrund, rübrig, oft bereift, dreitheilig. Kronenblätter weisslich ins schmutzig fleischfarbene.

Archangélica Hoffmann. Engelwurz. Kelchsaum fünfzählig. Kronenbltt. elliptisch, zugespitzt, mit eingekrümmter Spitze. Fugenfläche schmal. Drei Mittelriefen erhaben, dicklich, mit flügelartigem Kiel; die beiden seitlichen breitgeflegt. Fruchtschale lose. Samenschale mit vielen Striemen.

A. officinalis Hoffm. Angelica Archangelica L. Stängel gestreift; Bltt. doppelt-gefiedert mit herzförmigen ungleich-gesägten Blättchen.

In den kräuterreichen Schluchten des Hochgebirges, in den *Schneeegruben* und nach Nees v. E. im *Elbgrunde des Riesengebirges* und an der *Iser*; ausserdem fast in allen Gärten der Bauden und Gebirgsdörfer des Riesengebirges, der Gr. Glatz und des Gesenkes; auch in *Lomnitz bei Charlottenbrunn.* Juni, Aug. 2.

Stängel dick, kahl. Blattscheiden gross und bauchig aufgeblasen. Dolden halbkugelig; Doldchen fast kugelig. Kronenbltt. weissgrün. Wurzelstock kurz, verdickt, mit vielen langen einfachen verflochtenen dunkelbraunen, innen weisslichen Fasern von stark-aromatischem bitterm Geschmack, welche als nervenbelebendes Mittel von jeher im Ruf stand. Das Kraut riecht schwach nach Moschus.

6. Peucedaneae. Vollständige Dolden. Frucht niedergedrückt, mit geflügeltem, plattem, oder erhaben-verdicktem Rande. Drei fädige, bisweilen sehr feine Mittelriefen; die seitlichen dicht an einander liegend. Fugenfläche breit, mit randständiger Nath. Eiweiss flach, oder aussen etwas erhaben.

Peucedanum L. Haarstrang. Kelchsaum fünfzählig. Kronenbltt. verkehrt-eifg., nach oben in ein eingeschlagenes Lappchen zusammengezogen. Frucht mit breitem plattem Rande. Riefen in gleicher Entfernung; die seitlichen in den Rand übergehend. Rillen mit je einer bis drei Striemen. Die Striemen der Fugenfläche von aussen sichtbar.

P. Cervaria Lapeyrouse. Hirschwurz. Athamanta Cerv. L. Bltt. dreifach gefiedert; Blättchen eifg., fast dornig gesägt; die Striemen der Fugenfläche parallel.

Auf hohen und trocknen Wiesen und Waldtriften, auf sonnigen und buschigten Hügeln, in lichten Gehölzen, zerstreut und nicht aller Orten. Um Br. bei Bischofswalde, Schwoitsch, Oswitz, Lissa, Ohlau, Wohltau, Bunzlau, Oppeln. Am Fusse des Geiersberges. Troppau. Juli, Aug. ♀.

Stängel steif, $1\frac{1}{2}$ - 3' h. Bltt. grau, etwas dicklich und starr. Stängel oben meist dreitheilig. Kronenbltt. weiss. Dolde schwach erhaben. Hüllbltt. zahlreich, zurückgeschlagen. — Ehedem als *Rad. Gentianae nigrae* officinell.

P. Oreoselinum Mönch. Bergpetersilie. Athamanta Or. Linné. Blätter dreifach-gefiedert; die Verästelungen des Blattes nach vielen Richtungen ausgesperrt, Blättchen eifg., eingeschnitten-gezähnt, die Striemen der Fugenfläche bogenförmig.

Auf sandigem Boden, besd. auf sandigen und sonnigen besuchten Hügeln, in lichten Haidegehölzen, Kieferhauen, d. d. g. G. nicht selten. Um Br. bei Carlowitz, Schwoitsch, Bischofswalde, Oswitz, Ransern, Lissa etc. Um Ohlau, Bunzlau, Wohltau, Oppeln, Charlottenbrunn, Buchwald bei Schmiedeberg. Juli, Aug. ♀.

Die besondere Gestalt der Bltt. unterscheidet dieses Gewächs von allen anderen dieser Familie; die Nebenstiele sind unter rechtem oder stumpfem Winkel niedergebogen, so dass die Blättchen nicht in einer Ebene liegen, und das ganze Blatt einen hohlen Raum umschliesst. Die Hüllbltt. zahlreich, zurückgeschlagen. Kronen weisslich. — Wurzel und noch mehr die Samen haben einen starken Geruch und aromatisch-bitteren Geschmack, und sind officinell.

Thysselinum Hoffmann. Oelsenich. Character von *Peucedanum*, ausser: die Striemen der Fugenfläche bedeckt und von aussen nicht sichtbar.

Th. palustre Hoffmann. Selinum pal. Linné suc. Stängel gefurcht; Bltt. dreifach-gefiedert; Zipfel am Rande schärflich.

Am Rande von Gewässern, an Gräben, Flüssen und Teichen, zwischen Gesträuch und Schilf, bis ins Vorgebirge, an vielen Orten doch nicht allzu häufig. Um Br. bei Marienau, Wildschütz, Schleibitz, Lissa und häufig längs der Weide. Ohlau, Wohltau, Trachenberg, Bunzlau, Beuthen a. d. O., Kupferberg, Warmbrunn, Oppeln, Trop. u. Te. Juli, Sept. ♀.

Stängel gefurcht, am Grunde oft roth, 3 - 4' hoch. Blättchen tief-fiederspaltig, Zipfel lineal-lanzettlich. Die Zipfel sind bald breiter bald schmaler,

näher oder entfernter. Doldchen erhaben. Kronenblätter weiss. Hüllbltt. zahlreich, zurückgeschlagen.

Imperatoria L. Meisterwurz. Character von *Peucedanum*; ausser: Kelchsaum fünfzählig.

? I. **Ostruthium L.** Bltt. doppelt-gedreit; Blättchen breit-eifg., doppelt gesägt.

Auf Gebirgswiesen. Findet sich in sehr vielen Gärten in den Gebirgsdörfern des Riesengebirges, der Gr. Glatz und des Gesenkes; doch weiss ich ausser den *Saalwiesen bei Landeck* nach *Grabowski* keinen Standort anzugeben, auf dem man sie als wild betrachten könnte. Juni, Juli. ♀.

Eins der ansehnlichsten Doldengew., von 3-4' H. und mit grossen breiten Bltt. Keine Hüllbltt. Kronenbltt. weiss. Frucht fast kreiisf. — Die Wurzel ist sehr stark, aromatisch-bitter und ein starkes Heilmittel für das Nervensystem, officinell als *R. Imperatoriae albae*.

Anéthum L. Dill. Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. rundlich, eingerollt, mit viereckigem Zipfel. Frucht mit breitem platten Rande. Riefen gleichweitentfernt; die drei mittleren mit scharfem Kiel; die beiden seitlichen undeutlich und in den Rand verlaufend. Rillen mit je einer die ganze Rille ausfüllenden Strieme.

* **A. graveolens L.** Blattzipfel haarförmig.

Aus Südeuropa, wird bei uns angebaut. Juli, Aug. ☉.

H. 2-3'. Meergrün, mit haardünn-zertheilten Blättern und gelben Kronenbltt. An Geruch und Geschmack dem *Fenchel* ähnlich; wird als Würze bei Speisen u. dgl. gebraucht.

Pastinaca L. Pastinak. Kelchsaum winzig. Kronenbltt. rundlich, eingerollt. Frucht mit breitem platten Rande. Riefen sehr fein; die beiden seitlichen weiter abstehend. Rillen mit je einer Strieme, die so lang ist als die Rille.

P. sativa L. Bltt. gefiedert, oberseits glänzend, unterseits weichhaarig.

Auf Wiesen, besd. zwischen Gebüsch und an Waldrändern. Wird auch angebaut. Durch d. g. G., auch im Vorg. sehr häufig. Juli, Aug. ☉.

Stängel aufrecht, 1-2' h., eckig-gefurcht, fast immer dreitheilig. Blättchen eifg.-länglich, stumpf, kerbig-gesägt. Hüllen fehlen. Kronenbltt. goldgelb. — Die Wurzel ist süss, aromatisch und nahrhaft; an der gebauten Pflanze viel dicker und fleischig.

Heracléum L. Bärenklau. Kelchsaum fünfzählig. Kronenbltt. verkehrt-eifg., ausgerandet, mit eingeschlagenem Lappchen. Frucht mit breitem platten Rande. Riefen sehr

fein; die beiden seitlichen weiter abstehend und in den Rand übergehend. Rillen mit je einer, nur his zur Hälfte reichenden, nach unten verdickten Strieme.

Die Kronen am Umfange der Dolde meist grösser und unfruchtbar. Grosse breite Blätter.

H. Sphondylium L. Bartsch. Bltt. scharf-rauhhaarig, gefiedert oder tief-fiederspaltig, mit gelappten oder handförmig-getheilten Fiedern; die Kronen am Umfange der Dolde grösser; Fruchtknoten feinhaarig; Früchte oval, stumpf, ausgerandet, kahl.

β. elegans. Blattzipfel in die Länge gezogen, spitzig.

Auf etwas feuchten und fruchtbaren Wiesen, besd. zwischen Gebüsch und in Gehölzen durch d. g. Gebiet von der Ebene bis in die Gründe und an die Lehnen des Hochgebirges, wo besd. *β.* vorkommt. Juni, Sept. ☉.

Stängel 2 - 4' h., eckig-gefurcht, oft dreitheilig. Scheiden aufgeblasen. Hüllblättchen der Doldchen zahlreich, lanzettlich. Dolde und Doldchen flach. Kronenbltt. weisslich, bisweilen ins grüne oder röthliche.

H. sibiricum L. H. Sphondylium γ. angustifol. W. et Gr. sil. Bltt. scharf-rauhhaarig, gefiedert oder tief-fiederspaltig; Fiedern gelappt oder handförmig-getheilt; Fruchtknoten glatt; Früchte rundlich-eifg., oben herzfg.; sämtliche Kronen fast gleich gross.

In den kräuterreichen Gründen des Hochgebirges. Im Riesengebirge, am kl. Teiche und in den Schnee gruben; vielleicht auch an einigen anderen Stellen. Juli, Aug. 2.

Der vorigen Art bis auf wenige Kennzeichen völlig ähnlich. Ob die bei uns wachsende Pflanze wirklich von *H. Sphondylium* verschieden und ob sie das wahre *H. sibiricum* Linné ist, bleibt mir noch zweifelhaft.

7. *Thapsiae.* Frucht niedergedrückt. Fünf fädliche Hauptriefen, drei auf dem Rücken, die beiden seitlichen nach innen auf der Fugenfläche. Vier Nebenriefen, zwei fädlich und zwei geflügelt oder alle vier geflügelt.

Laserpitium L. Laserkraut. Kelchsaum fünfzählig. Die vier Nebenriefen geflügelt, darunter je eine Rille mit je einer Strieme.

L. latifolium L. Weisse Hirschwurz. Bltt. gedreit-zweifederig; Blättchen eifg.-rundlich oder länglich, am Gr. herzfg., gesägt; Stängel stielrund.

An buschigen Hügellehnen, im Vorgebirge, auch bisweilen in der Ebene, nur an einigen Orten. Oberhalb Silsterwitz am Fusse des Zobtenb. und des Geiersberges. Am Kreuzberge bei Striegau. Im Schlesierrhale. Um Grosstein bei Oppeln. Bei Katscher nach Wenck. Juli, Aug. 2.

Stängel 4' h., kahl, schwachbläulich-bereift. Blätter graugrün, Blattscheiden bauchig. Blättchen fast zolllang. Kronenblitt weiss. — Die Wurzel enthält einen Milchsafft, ist gewürzhaft-bitter, ehedem officinell.

L. prutenicum L. Blitt doppelt gefiedert; Blättchen fieder-spaltig mit lanzettlichen, am Rande rauhaarigen Zipfeln; Hauptriefen der Frucht mit Borsten besetzt; Stängel eckig-gefurcht mit rückwärts stehenden Haaren besetzt.

Auf feuchten Waldwiesen, an waldigen Hügellehnen, in der Hügellgegend der Ebene und im Vorgebirge, stellenweise durch d. g. G. Um *Br. bei Lissa. Trebnitzer Hügel, bei Riemberg, Dyhrenfurth. Um Ohlau, Wohlau, Bunzlau. Mittelberg bei Zobten Charlottenbrunn. Rummelsberg. Stonsdorf. Cudowa. Hirschberg.* Juli, Sept. ☺.

H. 1 - 2'. Hüllblättchen der Doldchen zurückgeschlagen, mit weissem Hautrande. Kronenblitt. weiss, durchs Trocknen gelblich. War ehedem officinell.

L. Archangelica L. Blitt. unterseits nebst den Stielen rauchhaarig, gedreit-dreifiederig; Blättchen eigf., ungleich-gesägt, die oberen keilfg.-herablaufend; die oberen Scheiden aufgeblasen; Früchte glatt; Stängel gefurcht, rauhaarig.

An waldigen Gebirgslehnen und Abhängen des Hochgebirges. Nur im *Gesenke, am Altwater, an der Hungerlehne und im Kessel.* Zuerst von v. Mükusch und Grabowski gef. Juli, Aug. 2.

Stängel 3 - 4' h., fast langzottig. Hüllblättchen lang, linealisch, im Bogen aufsteigend. Fruchtfügel schwach-wellig. Kronenblitt. weiss.

8. **Daucineae.** Frucht niedergedrückt. Fünf fadenförmige Hauptriefen, drei auf dem Rücken, zwei auf der Fugenfläche. Vier stärker hervorragende, mit Stacheln besetzte, oder in einen stachelichen Flügel ausgedehnte Nebenriefen.

Daucus L. Möre. Die äusseren Kronenblätter grösser, tief zweispaltig. Hauptriefen mit Borsten besetzt. Vier stachelig-geflügelte Nebenriefen; darunter Rille mit je einer Strieme.

D. Carota L. Stängel hakrig; Blitt. 2-3fach gefiedert; die Blättchen der allgemeinen Hülle fiederspaltig, so lang als die Dolde.

Auf Wiesen, Ackerrainen, Triften, an Waldrändern, in der Ebene und dem Vorgeb. gemein. Juni, Sept. ☺.

Durch die stachelichten Früchte und die langen Hüllblitt. leicht kenntlich. H. 1 - 3'. Die Länge der Fruchstacheln sehr veränderlich. Nach dem Blühen zieht sich die Dolde zusammen. In der Mitte der Dolde verwandeln sich die Blumen in einen rothen fleischigen Körper. Die Wurzel der wilden Pflanze ist scharf und aromatisch; die der gebauten viel stärker, süss und nahrhaft, und als Gemüs so wie als Kaffeherzogt allgemein bekannt.

B. Das Eiweiss ist am Rande oder ganz eingewickelt, oder auf der inneren Seite mit einer Längsfurche versehen.

9. *Caucalineae*. Frucht zusammengedrückt oder stielrund. Fünf fädige, mit Borsten oder Stacheln besetzte Hauptriefen; zwei auf der Fugenfläche. Vier stärker hervorragende, stachelige Nebenriefen, die vor der Menge der Stacheln unkenntlich werden.

Caucalis Hoffmann. *Haftdolde*. Frucht fast zusammengedrückt. Fünf Hauptriefen mit Borsten oder Stacheln besetzt. Vier Nebenriefen stärker hervorragend in eine einfache Reihe von Stacheln tief gespalten.

C. daucoides L. Bltt. 2-3fach gefiedert; die Stacheln der Nebenriefen hakenförmig.

Unter der Saat. Bisher nur um *Cudowa*, *Oppeln* und *Teschen*. Zuerst von Grabowski gef. Juni, Juli. ☉.

Stängel 1' h., oben gefurcht, kahl. Dolden meist dreispaltig. Kronenbltt anfangs röthlich, dann weiss. Allgem. Hülle fehlt.

Tórilis Adanson. Frucht von der Seite zusammengezogen. Fünf Hauptriefen mit feinen Borsten besetzt. Vier Nebenriefen unkenntlich, indem die Stacheln die Rillen ganz ausfüllen.

T. Anthriscus Gärtner. *Klettenkerbel*. *Tordylium Anth.* Linné. Bltt. doppelt-gefiedert; Dolden lang-gestielt; allgemeine Hülle vielblättrig; Stacheln der Früchte eingekrümmt.

An Hecken und Zäunen, in Gebüsch und schattigen Gärten, d. d. g. G. bis in das Vorgebirge gemein. Juni, Juli. ☉.

Von grau-schmutzigrüner Farbe. Stängel mit Borsten besetzt, 2' h. Blättchen länglich, eingeschnitten-gesägt. Dolden flach. Kronenbltt. schmutzig röthlich.

10. *Scandicineae*. Frucht zusammengedrückt, oft geschnäbelt. Fünf gleichförmige, fädliche, selten geflügelte oder nach unten zu undeutliche Hauptriefen; die beiden seitlichen dicht am Rande. Keine Nebenriefen.

Anthriscus Hoffmann. *Kerbel*. Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. mit eingeschlagenem Zipfel. Frucht geschnäbelt. Fünf Riefen nur am Schnabel der Frucht vorhanden. Striemen fehlen.

A. sylvestris Hoffm. *Wilder K.* *Chaerophyllum sylv.* Linné. Stängel unten rauhaarig; Bltt. unterseits an den Hauptribben mit feinen Borstenhaaren besetzt, zweifiederig mit fiederspaltigen Blättchen; Früchte länglich, glatt, viermal so lang als der Schnabel; besondere Hüllen fünfblättrig.

β. alpestris Wimm. Fl. v. Schles. Blatzipfel breiter, Randblumen der Dolden grösser; Früchte meist mit stumpfen Hökern unregelmässig besetzt.

An Waldrändern, in Gebüsch und Hecken, Grasgärten und auf waldigen Wiesen, **gemein**. Die Form β . besonders in Thälern und Gründen des Gebirges, z. B. im *Cudower Thale*, im *Riesengeb.*, am *kl. Teiche*, *Schnee gruben*, im *Gesenke*. Juli, Aug. ♀.

H. 3 - 4'. Die Zertheilung der Bltt. und daher die Gestalt der Blättchen ist zwar veränderlich, doch würde ich die Abart β , welche in der Flor. siles. als eigene Art *A. alpestris* genannt wurde, lieber wieder als solche betrachten, wenn sich beständigere Merkmale fänden. Die jungen Bltt. sind stark rauhhartig. Halblättchen netzgewimpert. Kronenbltt. weiss. Am Grunde der Früchte weisse Borsten, welche bei β . gewöhnlich fehlen.

† *A. Cerefolium* Hoffmann. *Gartenkerbel*. *Scandix Cer.* Linné. Stängel über den Gelenken feinhaarig; Bltt. dreifach-gefiedert, unterseits an den Ribben mit zerstreuten Haaren; Früchte linienförmig, kahl, doppelt so lang als der Schnabel; Blättchen der besonderen Hülle 2 - 3, nur auf einer Seite.

Stammt aus Südeuropa und ist bei uns nur verwildert, in Dörfern, an Zäunen und in Gras- und Gemüsgärten, am *Br.*, in *Scheitnich*, *Oswitz*; am *Bunzlau*, *Charlottenbrunn* und hin und wieder in Oberschlesien. Juni, Juli. ☉.

Stängel glatt, 1' h. Bltt. hart. Es giebt eine Abart, woran die Früchte mit Borsten besetzt sind. Die Bltt. haben einen aromatischen anisartigen Geruch und Geschmack und werden als Suppenkraut, so wie der ausgepresste Saft in der Medicin gebraucht.

A. vulgaris Persoon. *Eselkerbel*. *Scandix Anthriscus* L. Stängel kahl; Bltt. dreifach-gefiedert, unterseits an den Ribben mit zerstreuten Haaren; Früchte eiförmig mit pfriemlichen, eingebogenen Stacheln besetzt, dreimal so lang als der Schnabel; Blätter der besonderen Hüllen 2 - 5, nur auf einer Seite.

In Dörfern, an Mauern, Häusern, Zäunen, auf Schutt und Mauern, auch im Vorgebirge; nicht selten doch nicht überall. Um *Br. bei Polnisch-Neudorf*, in *Schwoitsch*, *Bettlern*, *Koberwitz*, und überhaupt den Dörfern gegen Mittag. Um *Ohlau*, *Wohlau*, *Beuthen a. O.* *Bunzlau*. *Oppeln*. Juli, Aug. ☉.

H. 1" - 1½'. Bltt. sehr fein. Dolden oft den Bltt. gegenständig, mit wenigen Strahlen. Kronen weiss, sehr klein.

Chaerophyllum L. *Kälberkropf*. Frucht ohne Schnabel. Fünf gleichmässige stumpfe Riefen. Rillen mit je einer Strieme.

C. temulum L. *Taumelkerbel*. Stängel unter den Gelenken angeschwollen, am Gr. steifhaarig, oberhalb kurzhaarig; Bltt. doppelt gefiedert, Blättchen gelappt-fiederspaltig mit stumpfen Lappen; Griffel umgebogen.

In Gebüsch und Wäldern, zwischen Gesträuch, an unfruchtbaren Plätzen. D. d. g. G. **gemein**, bis ins Vorgeb. Juni, Juli. ☉.

Von schmutzig-grüner Farbe; Stängel 1 - 1½' h., am Gr. oft schmutzig-roth gefleckt. Blättchen der besonderen Hülle eilanzettlich gewimpert. Kronenbltt. schmutzig-weiss. Man hält diese Pflanze für schädlich.

C. bulbosum L. Rübenkörbel. Stängel unter den Gelenken aufgeblasen, am Gr. steifborstig, oben kahl; Bltt. mehrfach-zusammengesetzt, mit spitzen lineal-lanzettlichen Zipfeln; Griffel zurückgeschlagen.

An angebauten Orten, zwischen Gesträuch, an Strauchdämmen, Hecken, im Gesträuch, an Flussufern, an den Dorfzäunen, d. d. g. G. bis ins Vorgebirge häufig. Um Br. am Kratzbusch, Kleinburg, Höfchen, Lehmgruben etc. Juni, Juli. ☉.

Stängel 3 - 4' h., am Gr. gewöhnlich mit blutrothen Flecken, hohl, oben vielästig, mit feinen Aesten. Wurzel spindelig mit rübenförmig verdicktem Kopfe. Die allerersten Bltt. kahl, die unteren stängelständigen unterseits mit weissen Haaren gewimpert. Blättchen der besonderen Hülle lanzettlich kahl. Kronenbltt. reinweiss.

Anmkg. Von *C. aureum* L., welches mit *Anthriscus sylvestris* β grosse Aehnlichkeit hat, bewahrte Günther in seinem Herbarium ein Exemplar, welches von Ludwig im Riesengeb. ohne genaue Angabe des Standortes gefunden worden war. Bisher ist diese Pflanze vergebens in unserem Gebirge gesucht worden.

C. hirsutum L. Stängel fast gleichdick; Bltt. doppelt gedreit; Blättchen fast fiederspaltig eingeschnitten-gesägt; Griffel aufrecht.

An Bächen und Quellen, auf quelligen und sumpfigen Wiesen und an nassen Waldplätzen, im Vor- und Hochgebirge, an einigen Punkten auch bis in die Ebene herabsteigend. Im Vor- und Hochgeb. d. d. g. G. In der Ebene um Ohlau, Ludwigsdorf b. Creuzburg und bis Gleiwitz und Oppeln. Juni, Aug. ♀.

Stängel 1 - 3' h., meist etwas schief, hohl, gefurcht. Bltt. sind bald mit breiteren bald mit schmälern Zipfeln. Blättchen der besonderen Hülle breit, lanzettfg., gewimpert. Kronenbltt. gewimpert, weiss oder rosafarben. Es giebt eine haarige und eine fast kahle Form.

C. aromaticum L. Stängel unter den Gelenken geschwollen; Blätter dreifach-gedreit, Blättchen ungetheilt, eifg.-länglich, gesägt; Griffel söhlig.

Auf feuchten waldigen Stellen, Gebüsch, an Ufern, an strauchbesetzten Gräben, in der Ebene und d. Vorgeb. d. d. g. G. zerstreut aber häufig. Um Br. bei Carlowitz, Gr. Rake. Skarsine. Dyhrenfurth. Ohlau. Wohlau. Hohlstein bei Bunzlau. Charlottenbrunn. Briesnitzer Berge bei Silberberg. Hirschberg. Oppeln. Trop. u. Te. Juni. ♀.

Stängel 3 - 4' h., hohl, am Gr. weissborstig. Bltt. dunkelgrün, unterseits feinhaarig, gerieben von angenehmen Geruch. Kronenbltt. weiss. Früchte gross.

Myrrhis Scopoli. Süssdolde. Frucht zusammengedrückt. Der Same hat eine doppelte Schale; die äussere hat fünf scharfgekielte, innen hohle Riefen; die innere ist fest mit ihm verwachsen. Striemen fehlen.

† *M. odorata* Scop. *Scandix od.* Linné. Bltt. dreifach-gedreit, unterseits mit schwarzem Zottenhaar; Blättchen der besonderen Hülle zurückgeschlagen; Früchte länglich.

In den Graspärten, des Vor- und am Hochgebirge fast d. d. g. G., und wahrscheinlich auch ursprünglich bei uns wild, obwohl an einem solchen Standorte bisher noch nicht gefunden. Von *Charlottenbrunn* an, bei *Donnerau* u. *Lehmwasser*, durch das ganze *Vor- und Riesengebirge*, *Gr. Glatz* und *Gesenke*. Juli, Aug. 2.

Vor allen durch die sehr langen, fast halbzolllangen Früchte kenntlich. Allgem. Hülle fehlt. Dolde schwach erhaben. Kronenbltt. weiss.

11. *Smyrneae*. Frucht schwellend, meist von d. Seite zusammengesogen, ohne Schnabel. Fünf Hauptriefen, die seitlichen auf oder neben dem Rande, meist dick oder aufgeblasen. Nebenriefen fehlen.

Conium L. *Schierling*. Kelchsaum undeutlich. Kronenbltt. verkehrt-herzfg. Fünf vorragende, gleichförmige, wellig-gekerbte Riefen. Rillen mit Streifen ohne Striemen.

C. maculatum L. *Gefleckter S.* Blättchen der besonderen Hülle 2 - 3, nur auf einer Seite.

In Dörfern und Städten, an Zäunen, Dunghaufen, auf Gemüßäckern, d. d. g. G. aber nicht sehr häufig. Um *Br. bei Lehmgraben*, *Scheitrich*, *Schwoitsch* u. m. *Fürstenstein* um d. *Schloss*. Juni, Juli. ☉.

Stängel 2 - 4' h., röhrig stielrund, kahl, nach oben schwach gefurcht, am Gr. mit bluthrothen Flecken. Bltt. dunkelgrün, kahl, dreifach-geädert, Blättchen lanzettlich, fiederspaltig; Zipfel und Zähne mit weissen Spitzen. — Das Kraut verbreitet in der Sonne und mehr beim Welken und Zerreiben einen widrigen Geruch, schmeckt widerlich scharf. Der Sch. gehört zu den scharf-betäubenden Giftpflanzen, wogegen Brechmittel, Pflanzensäuren und Cassih empfohlen werden, und ist officinell.

Pleurospermum Hoffmann. Kelchsaum fünfzählig. Kronenbltt. verkehrt-eifg. Fünf aufgeblasene hohle, innen fünf andere Riefen einschliessende, Hauptriefen. Unter den Rillen in der inneren Fruchthaut je ein bis drei Striemen.

P. austriacum Hoff. *Ligusticum a.* Linné. Blätter 2 - 3fiedrig, mit länglichen gesägten Zipfeln; Hüllen vielblättrig; Riefen mit stumpfen gekerbten Kiel.

In fruchtbaren Thälern und Gründen, an den Ufern der Bäche, im Vor- und Hochgebirge. Im *Schlesierthale*. Im *Sattler bei Hirschberg* und am *Bober bei Kupferberg* nach Nees v. E. Im *Riesengebirge*: am *kl. Teiche*, im *Riesengrunde*, den 3 *Schnee gruben* u. s. w. Im *Gesenke* am *Hockschar*, *Altwater*, im *Kessel*. Juli, Aug. 2.

Stängel 3 - 4' h., dick, gefurcht, röhrig. Hüllbltt. oft dreispaltig. Bolächen kopfförmig. Kronenbltt. weiss.

C. Eiweiss sackförmig ausgehöhlt.

Coriandrum L. *Koriander*. Frucht kugelig mit fünf hin- und hergebogenen Hauptriefen ohne Striemen.

* *C. sativum* L.

Aus Südeuropa, wird bei uns angebaut, und verwildert hie und da. Sommer. ○.

H. 1 - 2'. Die grundständigen Bltt. einfach-gefiedert mit ründlichen Blüten, die oberen doppelt-gefiedert. Die Randblumen der Dolden grösser. Riecht während des Blühens stark nach Wanzen. Die Früchte dienen als Gewürz.

Adoxeae E. Meyer.

Kelchröhre mit der Hälfte des Fruchtknotens verwachsen, Saum dauernd, 2 - 3- oder 4 - 5theilig. Kronenbltt. mit geschindelter Knospenlage, aus einer den Fruchtknoten umgebenden Scheibe entspringend, am Gr. durch die Staubfäden kurz unter sich verwachsen. Staubgef. zwischen den Kronenbltt.; Staubfäden tief gespalten, jeder Arm ein Fach des Staubbeutel tragend. Griffel mit stumpfen Narben von der Zahl der Kronenbltt. oder Staubgef. Fruchtknoten oberhalb frei, 4 - 5theilig, mit je einem hängenden Ei. Frucht eine Beere, von den bleibenden Griffeln und im Umfange vom Kelchsaum gekrönt, 3 - 5samig. Samen umgekehrt mit fleischigem Eiweiss und kleinem Keim.

Stand sonst neben *Sambucus* unter den *Lonicereae* oder in der folgenden Familie. Nur eine Sippe mit einer Art. Eine niedrige Staude mit schuppiger Wurzel, zwei zerschlitzen gegenständigen Stängelbltt. und fünf Blumen in einem endständigen kopfförmigen Schirm.

Adoxa L. *Bisamkraut*.

A. moschatellina L. VIII, 4.

In Wäldern und Gehölzen, an schattigen Stellen, zwischen abgefallenem Laube, besonders um alte Baumstämme, auch oft in hohlen Stämmen, in der höheren Ebene und dem Vorgeb. häufig. Um *Br. bei Wildschütz, Mahlen, Arnolds Mühl, Lissa. Trebnitzer B. etc. Trop. Teschen bei Mönchhof.* März, April. 2.

Wurzelstock söhlig oder schief, zweizeilig, schuppig, weiss. Stängel 2 - 4' h., einzeln oder paarweis, glasartig, röthlich-weiss. Zwei gestielte Wurzel- und zwei gegenständige Stängelbltt., doppelt-gedreit; Blättchen dreilappig, zart, blassgrün, fast saftig. Blumen grün, seitlich und nach oben gerichtet, auf ganz kurzen Stielen, riechen nach Moschus.

Araliaceae Jussieu.

Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen, Saum 4 - 5zählig. Kronenbltt. 4 - 5, oder 10 - 15, aus dem Kelchschlunde, mit klappiger Knospenlage. Fünf Staubgef. zwischen den Kronenbltt., aus dem Kelchschlunde, oder zehn.

Fruchtknote zwei- oder mehrfächerig, mit je einem häogenen Ei. Frucht beeren- oder pflaumenartig. Samen mit fleischi- gem Eiweiss und geradem Keim.

Sträucher mit gestielten Blättern, ohne Stützblätter.

Hédera L. Epheu. Kelchsaum mit fünf kurzen Zäh- nen. Krönenbltt. 5 oder 10. Eben so viel Staubgef. und Griffel. Beere 5- oder 10fächerig. v, 1.

H. Helix L. Stängel wurzeltreibend; Bltt. winklich-gelappt, an den blühenden Aesten eifg.; Blumen in Schirmen.

In schattigen Wäldern, besd. des Vorgebirges, an Bäumen, Mauern und Felsen emporklimmend. Um Br. bei *Arnoldsmühl, im Goi b. Kapsdorf u. im Buchenwalde bei Trebnitz.* Durch d. g. Vor- geb. Auch um *Ohlau, Wohlau, Beuthen a. O., Bunzlau, Leob- schütz, Jägerndorf, Herlitz.* Blüht im Sept., Oct. und reift im nächsten Frühjahr. h.

Stängel klimmend und Luftwurzeln treibend. Bltt. 3-5lappig, glänzend lederartig, oft bunteadert: die blüthenaständigen eifg.-zugespitzt, ungelappt. Krönenbltt. grün- lich-weiss. Beeren schwarz. Blüht nur in alten grossen Stöcken. Die Beeren bewir- ken Brechen. Aus dem Holz Filtrirbecher.

Cornus L. Kornelle. Kelchsaum 5zählig. Vier Kro- nenbltt. und Staubgef. Ein Griffel. Pflaume mit zweifächeri- ger Schale, mit je einem Samen. IV, 1.

C. sanguinea L. Hartriegel. Blumen weiss in Aferdolden.

Als Unterholz in Gebüsch und Wäldern, im feuchten und trock- nen, d. d. g. G., bis ins Vorgeb. häufig. Mai, Juni. h.

Von 4-6' h., mit geraden, im Herbst bluthrothen Aesten. Bltt. breit-eifg. Kro- nenbltt. weiss, lanzettlich. Früchte schmutzig-weiss, etwas schleimig. Das Holz ist hart und zu Drechslerarbeiten tauglich.

* *C. Mas L. Judenkirschen.* Blumen gelb, in Schirmen mit Hüllen.

In bergigen Gegenden, im südl. Deutschland, bei uns zu Laub- gängen in Gärten angepflanzt. März, April. h.

Blüht vor der Entwicklung des länglich-eifg. Blattes. Pflaume roth mit fadem Fleisch.

Halorrhageae R. Brown.

Kelchöhre mit dem Fruchtknoten verwachsen, mit vier theiligem oder undeutlichem Saum; oder Kelch fehlend. Kro- nenbltt. zwischen den Kelchzipfeln, hinfällig, auch fehlend. Staubgef. aus dem Kelchschlunde, zwischen den Krönenbltt. und an Zahl diesen gleich oder doppelt, oder weniger. Staub- beutel zwei- oder einfächerig. Fruchtknoten vier- oder drei-

fächerig, mit je einem hängenden Ei. Drei bis vier Narben. Frucht ein trockenes, meist häutiges, zwei - vier- oder einsamiges Nüsschen. Samen mit fleischigem Eiweiss und geradem Keim.

Wassergewächse mit gegen- oder wirtelständigen Bltt. ohne Stützbltt., unscheinlichen Blumen in den Blattwinkeln, welche oft unvollständig und halbgetrennten Geschlechts sind. — Hierunter auch die *Hippurideae* Link, *Hydrocaryes* Link und *Callichitrinae* Link; die letzteren sind indess sehr abweichend.

Trapa L. Wassernuss. Kelchsaum viertheilig. Vier Kronenbltt. Vier Staubgef. Ein Griffel. Frucht eine harte, von den vergrösserten Kelchzipfeln bedeckte und in vier Dornspitzen gekrönte Nuss mit einem Samen. Keimbltt. an Grösse verschieden. IV, 1.

Tr. natans L. Bltt. rautenförmig, sägezählig.

In stehenden Gewässern mit trübem u. schlammigem Wasser, selten. Um Br. ehemals in Menge im *Stadtgraben*, jetzt nur noch in dessen Ueberresten hinter der *Kreuzkirche*; um *Ransern* und *Marienau*. Bei *Oppeln*. *Oderberg*. Juni. ☉.

Treibt lange Wurzel und Stängel mit kammförmig-haarfeinen Bltt., rautenförmig lederartige glänzende Bltt., welche dicht über einander stehen, oft mit aufgeblasenen Stielen. Kronenbltt. weiss. Die Frucht enthält viel Stärkmehl und wird gekocht gegessen.

Myriophyllum L. Tausendblatt. Blüthe in endständigen Aehren; untere Blumen mit Stempeln ohne Kelchsaum und Kronenbltt., obere mit Staubgefässen, mit 4theiligem Kelchsaum und 4 hinfälligen Kronenblättern. Nüsschen 4fächerig, 4samig. XXI, 8.

Blumen eigentlich winkelständig, nur sind die Bltt. geschwunden und in Deckblattform übergegangen.

M. spicatum L. Teichfenchel. Die unteren Deckblätter der Blumen eingeschnitten, die oberen ganzrandig kürzer als der Blumenquirl.

In stehendem und fliessendem Wasser häufig, doch nicht allwärts, nur in der tieferen Ebene. Um Br. gemein. *Ohlau*. *Beuthen*. *Bunzlau*. *Oppeln*. Juli, Aug. ♀.

Lange oberhalb ästige Stängel. Bltt. wirtelförmig, fiederig in haarförmige Zipfel getheilt. Blüthen scheinbar in endständigen Aehren wirtelförmig. Kronenbltt. fleischfarben. Narben pinselförmig, rosenroth.

M. verticillatum L. Die Deckblätter sämmtlich kännig-gespalten.

Wie die vorige, aber seltner. Um Br. am *Lehmdamme*, bei *Rosenthal*, *Oswitz*, *Bischwitz a. W.*, *Scheitnich*, *Wildschütz*, *Massel*

witz. Um *Ohlau*, *Wohlau* (v. Flotow), *Beuthen a. O.*, *Bunzlau*, *Oppeln*. Juli, Aug. 2.

Die Deckbl. sind länger als die Blumenquirle, doch auch kürzer, und wenn die Pflanze vom Wasser verlassen auf dem Boden wächst, verändern sich die Deckblätter völlig zu Blättern, so dass dann die Blüten wirklich in den Blattwinkeln stehen. Ist hellergrün und reinlicher als die vorige Art. Narben purpurroth.

Hippuris L. *Tannwedel*. Kelchsaum undeutlich. Krone fehlt. Ein Staubgef. aus dem Rande der Kelchröhre. Einsamiges Nüsschen mit knorpeliger Schale. 1, 1.

Blätter wirtelständig. Blumen in den Blattwinkeln.

H. vulgaris L. Bltt. linealisch, viele in jedem Quirl.

In freien Sümpfen und Teichen und in den Aussümpfungen stagnirender Flüsse, zerstreut und sparsam. Um *Br.* an der *Ohlau* bei der *Margarethenmühle* u. b. d. *Milchkretscham*. *Sibyllenort*. *Trebnitz*. *Kl. Laudon* bei *Strehlen*. Um *Ohlau*. *Oppeln*, *Salzbrunn* u. *Hirschberg Jägerndf.* *Schwarzwasser* bei *Te.* Juli, Aug. 2.

Aufrecht, einfach, selten mit einem Ast, 1-1½ h. Stängel gegliedert. Blätter erst aufrecht, dann abstehend. Vom Kelchsaum bisweilen eine Spur in 2 kleinen Lappchen. Narbe sitzig in einer Furche des Staubbeutels ruhend.

Callitriche L. *Wasserstern*. Zwei-gegenständige kronenblattartige Deckblätter am Gr. der Blume. Kelch und Krone fehlen. Ein Staubgef. mit nierenförmigem einfächerigem Staubbeutel. Frucht fällt in vier einsamige Nüsschen auseinander. 1, 2.

C. verna L. Die unteren Bltt. linealisch, die oberen spatel-eiförmig; die Früchte an den Rändern gekielt.

In Gräben, Lachen und allerlei stehendem und fließendem Wasser, d. d. g. G. bis ins Vorgeb. sehr häufig. Vom April an durch den ganzen Sommer. 2.

Nur die Spitzen der blühenden Zweige erheben sich über das Wasser, und bilden daselbst, indem die Blätterpaare dicht über einander stehen, sternförmige Rosetten, in deren Winkeln die Blumen stehen. Wahrscheinlich giebt es auch bei uns mehrere der von Kützing sorgfältig unterschiedenen Arten, die ich indess hier noch nicht aufführe, da ich sie noch nicht genau beobachtet habe. Doch füge ich ihre Merkmale bei: *C. stagnalis* Scop. hat lanter spatelförmige Bltt.; *C. platycarpa* sichelförmige an der Spitze gerade Deckbltt. und zurückgeschlagene Griffel; *C. vernalis* aufrechte Griffel und schmalgefügelte Früchte; *C. hamulata* sichelförmige an der Spitze hakenförmige Deckbltt. und gefügelte Früchte; *C. autumnalis* L. lanter linealische Bltt. und gefügelte Früchte.

Lythriariae Jussieu.

Kelchröhre glockig; Saum gezähnt mit klappiger oder offener Knospenlage; bisweilen sind auch die Buchten in äus-

sere Zähne verlängert. Kronenblätter entspringen aus dem Kelchschlunde zwischen den Zähnen; bisweilen fehlen sie. Freie Staubgef. aus der Kelchröhre. Fruchtknote frei, vom Kelch bedeckt, 2-4fächerig. Ein Griffel mit einfacher Narbe. Kapsel vom Kelch bedeckt, mit starker Mittelsäule, 2-4fächerig oder durch Verschwinden der Scheidewände bei der Reife einfächerig, vielsamig. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Kräuter mit einfachen ganzrandigen drüsenlosen Blättern ohne Nebenblätter, an feuchten Orten in der unteren Region.

Lythrum L. Weiderich. Kelch walzig, mit 4-6 inneren und eben so vielen äusseren Zähnen. Kapsel länglich, zweifächerig, an der Spitze in 2 oder 4 Zähnen aufspringend. XI, 1.

L. Salicaria L. Aehren-W. Bltt. herzfg., breit-lanzettlich; Blüten in endständigen gequirkten Aehren; die inneren Kelchzähne doppelt so lang als die äusseren.

An Bächen, Gräben, Teich- und Flussufern, besd. zw. Gestrüch, auf sumpfigen und überschwemmten Wiesen, d. d. g. G., sehr häufig und bis ins Vorgebirge. Juli, Sept. 2.

Stängel bis 4' h., vierkantig, meist einfach. Bltt. wechsel-gegenständig, auch im Quirl. Kronen purpurfarben-blutroth. Zwölf Staubgefässe. Enthält etwas Gerbestoff und Schleim, und war officinell.

L. Hyssopifolia L. Bltt. linealisch, abwechselnd; Blüten einzeln in den Blattwinkeln; äussere u. innere Kelchzähne gleichgross.

An Gräben, Rändern von Lachen und Teichen, besd. in und um Dörfer, nur in der Ebene, zwar zerstreut aber an vielen Orten, stets heerdenweis. Um *Br. in Neukirch, Gr. Weigelsdorf, Paschkerwitz, Muckerau, Rogau bei Zobten, Wohlau, Bunzlau, Salzbrunn, Ohlau, Oppeln, Braunsd. b. Trop.* Juli, Sept. 2.

Einfach, oder am Gr. aestig, $\frac{1}{4}$ ' h., oft am Gr. wurzelnd, bleich oder schmutzgrün. Bltt. etwas saftig. Kronenbl. klein lilaf. oder purpur-violett.

Pepelis, L. Zipselkraut. Kelch kurz, glockig, mit 6 inneren und eben so vielen äusseren Zähnen. Sechs hinfallige Kronenbltt., oder keine. Sechs Staubgef. Kapsel fast kugelig, zweifächerig, unregelmässig zerreissend. VI, 1.

P. Portula L. Blätter gegenständig, verkehrt-eifg.; Blüten einzeln in den Blattwinkeln.

Auf überschwemmt gewesenen Plätzen, am Rande von Lachen, Teichen, Flüssen. besd. auf sandigem Grunde, in der Ebene und dem Vorgebirge, sehr verbreitet, vielleicht in einigen Gegenden fehlend. Juni, Sept. ☉.

Stängel 1-4" lang, gestreckt, vielästig, unterseits wurzelnd, rothlich. Bltt. und Blüten klein.

Onagrariae Jussieu.

Kelchröhre mit d. Fruchtknoten verwachsen, mit 2- oder 4theiligem Saume, und klappiger Knospelage. Kronenbltt. aus dem Kelchschlunde, von der Zahl der Kelchlappen und zwischen denselben, mit gewundener Knospung, leicht abfällig. Staubgef. aus der Kelchröhre doppelt oder eben so viele als Kronenbltt. Fruchthalter mit so viel Fächern als Kronenbltt. sind, mit Samenhaltern am inneren Winkel. Ein Griffel mit kopfiger oder gespaltener Narbe. Frucht eine Kapsel, auf dem Rücken aufspringend mit vierkantiger Mittelsäule. Samen aufrecht, ohne Eiweiss, mit geradem Keim.

Kräuter mit unten gegen-, oben wechselständigen, einfachen Bltt. ohne Stützbl.; in allen Gegenden der Erde zerstreut, in allen Regionen verbreitet; viele an feuchten Orten. Sie sind von fadem Geschmack und ohne wirksame Stoffe.

Epilóbium L. Schotenweiderich. Vier Kelchzipfel u. Kronenbltt. Acht Staubgef. Kapsel prismatisch-vierkantig. Samen mit einem Haarschopf. VIII, 1.

Kronenbltt. röthlich. Kapsel schotenförmig, vierklappig. Die Kelchröhre ist länger als der Fruchtknoten und nach dem Blühen fällt der Saum mit dem obersten Stück der Böhre vom Gipfel des Fruchtknotens ab.

E. angustifolium L. Bltt. zerstreut, lanzettlich, geadert; Kronenbltt. verkehrt-eifg. mit einem Nagel; Griffel späterhin niedergebogen.

In trocknen Hauen besd. in hügligen und bergigen Gegenden, im Vorgeb. oft ganze Berglehnen überziehend, besd. auf sandigem und steinigem Grunde; d. d. g. G. verbreitet und stets heerdenweis. Juli, Aug. 2.

Wurzel kriechend. Stängel kahl, einfach, 1-3' h., oft roth, mit weidenblattähnlichen ganzrandigen oder schwach drüsig-gesägten Bltt. und endständiger lockerer Blüthenähre. Kronenbltt. purpurf., selten weiss. An dieser und der folgenden Art ist die Verlängerung der Kelchröhre kaum sichtbar.

E. Dodonaei Villars. E. angustissimum Aiton W. et Gr. Fl. sil. Bltt. zerstreut, linealisch, ohne Adern; Kronenbltt. elliptisch, gegen d. Grund verschmälert; Griffel zuletzt zurückgekrümmt.

Auf kiesigen und sandigen Flussufern im Vorgebirge. Bisher nur an der Neisse bei Wartha, bei Würbenthal, Braunsdf. u. Gotschdf, um Freystadt an der Oelse u. an der Weichsel bei Ustron u. Oberweichsel. Juli, Aug. 2.

Stängel etwas aufsteigend, 1-2' h., meist roth, oberhalb weissfilzig, bald einfach, bald mit rutenförmigen Aesten. Bltt. ganzrandig oder schwachgezähnt. Kronenbltt. purpurf.

E. hirsutum L. Bltt. gegenständig, umfassend-herablaufend, länglich-lanzettlich, sägezählig; die oberen wechselständig; Stängel stielrund, vielästig, schwach- oder stark-zottig; Kronenbltt. doppelt so gross als die Kelchzipfel.

In Gräben, an Fluss- und Teich-Rändern zwischen Gesträuch, nicht überall, aber häufig d. d. g. G. und gesellschaftlich, meist nur in der Ebene. Um Br. bei Gräbschen, Klettendorf, Tschansch, Bischwitz a. W., Rake. Trebnitz. Dyhrenfurth. Ohlau. Wohlau. Beuthen a. O. Probsthain. Oppeln. Trop. Juli, Aug. 2.

Stängel 3-4' h., mit abstehenden längeren und kürzeren drüsentragenden Haaren bekleidet. Kronen gross rosa-purpurf.

E. parviflorum Schreber. *E. hirsutum* β . L. *E. villosum* Krock. sil. Bltt. lanzettlich, spitz, feingezähnt, die unteren gegenständig und kurz gestielt; Stängel stielrund weichhaarig oder kurzzottig; Narben viertheilig.

In Gräben, an Teichrändern, an Quellen und auf Wiesen, bis in das Vorgeb., d. d. g. G., häufig. Um Br. bei Höfchen, Oswitz, Hühnern, Bischwitz a. W., Mochbern etc. Juni, Aug. 2.

Durchaus grauhaarig, 1-2' h. Die Kronen viel kleiner als an der vorigen, saftfleischroth oder weiss. Diese und die folgenden Arten ändern ab mit kleinen und mit fast doppelt grösseren Blumen.

E. montanum L. Bltt. eifg.-länglich, ungleich sägezählig, fast kahl, die unteren gegenständig u. gestielt; Stängel stielrund feinhaarig; Narben viertheilig.

β . *collinum* Gmel. *E. mont.* β *minus* W. et Gr. Fl. sil. Kleiner, Bltt. stark und buchtig-gezähnt, meist wechselständig, oft v. Gr. an vielästig.

In Wäldern, Hainen und Gebüsch, an trocknen und steinigen Plätzen, an steinigen Hügel- und Berglehnen, auf Mauern, d. d. g. G. bis an das Hochgebirge. β besonders in Hohlwegen und an steinigen Wegrändern im Vorgebirge um Striegau, Firnstein, Charlottenbrunn, Neurode, Krumhübel, Agnetendorf, Einsiedel und Waldenburg im Gesenke. Juni, Sept. 2.

Höhe von 2'' - 2', oft einfach, meist oberhalb ästig; Stängel oft roth. Bisweilen Bltt. zu drei scheinbar quirlig. Kronenbltt. fleischroth. Die Var. β ist sich in ihrer Tracht so gleichbleibend und auffallend, dass man sie gern für eine eigene Art halten möchte, wenn sie nur ein einziges constantes Merkmal hätte.

E. trigonum Schrank. *E. alpestre* Krock. sil. Bltt. gegenständig, oder zu drei oder vier im Quirl, fast umfassend, länglich-eifg., ungleich sägezählig, die obersten wechselständig; Stängel mit 2 bis 4 von den Blättern herablaufenden Linien; Narben verbunden keulengf.

In den Gründen und Schluchten des Hochgebirges an feuchten u. pflanzenreichen Stellen, besd. um Quellen und an Bächen. Auf dem Riesengeb. im Riesengrunde, am kl. Teiche, Schnee gruben, Kesselgrube, Elbwiese u. m. Im Gesenke am Leiterberge, Altvater, Kessel. Am Glätzer Schneeberge im Klessen- und Wölfelsgrunde. Jul. Aug. 2.

H. von 1 - 3', meist einfach, oft röthlich. Die Form mit je zwei gegenständigen Bltt. ist die seltene. Kronenbltt. satt rosenroth. Die Bltt. sind an sehr feuchten Plätzen etwas saftig, oberseits fettglänzig.

E. roseum Schreb. Bltt. länglich, beiderseits spitz, gestielt, ungleich fein-sägezählig, die unteren gegenständig; Stängel mit 2 bis 4 von den Bltt. herablaufenden Linien; Narben vereinigt keulenfg., später mit den Spitzen auseinanderstehend.

In feuchten Wäldern, an Gräben, Lachen, in feuchten Hohlwegen, auch in schattigen Gärten, zerstreut d. d. g. G. bis ins Vorgeb., zahlreich. Um *Br. Odervorstadt u. Kräutereien, Bischwitz a. W., Hühnern, Rake, Lissa* etc. Juli, Aug. 2.

H. $1\frac{1}{2}$ - 2'. Mattgrün, auch schmutzig-roth. Bltt. leicht welkend, zart. Kronenbltt. klein, fleisch-rosafarben! die Linien am Stängel sind schwach.

E. tetragonum L. Bltt. lanzettlich, sägezählig, die mittleren mit jedem ihrer beiden Ränder bis zum nächsten Paar flügelig-herablaufend, die unteren sehr kurz gestielt; Stängel vielästig ruthenfg.; Narben vereinigt, keulenfg.

In Gräben, an Bächen, Quellen. d. d. g. G. bis ins Vorgeb., doch etwas seltner als die vorigen. Um *Br. bei Gräbschen, Klettendorf, Weide, Rothkretscham, Kapsdorf* etc. Juli, Sept. 2.

H. 2 - 3', oft röthlich, auch mit röthlichen Blattadern. Die Bltt. verschmälern sich allmählig vom Gr. gegen die Spitze. Die herablaufenden Blattränder vereinigen sich oft in der Mitte des Stängelgliedes in eine Linie. Kronenbltt. klein, rosafarben.

E. virgatum Fries. Bltt. lanzettlich mit entfernten schwachen Zähnen, am Gr. abgerundet, die unteren gegenständig; Stängel mit 2 bis 4 von den Blatträndern herablaufenden Linien; Narben vereinigt keulenfg., später an der Spitze auseinanderstehend.

Auf feuchten Hügellehnen n. Waldplätzen im Vorgebirge. Auf einem Hau des *Zobtenberges* in Gesellschaft der folgenden von mir und um *Carlsbrunn im Gesenke* von *Grabowski* gef. Juli, Aug. 2.

H. 1 - $1\frac{1}{2}$ '. In den Bltt. dem vorhergehenden, in der Tracht dem folgenden ähnlich, doch bestimmt unterschieden. Kronenbltt. lilaf. oder purpurviolett. Stängel schwach-feinhaarig, einfach oder ästig.

E. palustre L. Bltt. lanzettlich bis ins elliptische undeutlich gezähnt oder ganzrandig, am Gr. keilfg., die unteren gegenständig, Stängel stielrund fast ohne Linien, mit krausen angedrückten Haaren besetzt; Narben vereinigt keulenfg.

β. alpinum. Niedrig, mit meist einfachem Stängel und elliptischen stampfen Bltt.

E. alpinum Linné und der andern Autoren. Krock. sil. 592.

Auf quelligen und sumpfigen Stellen, besd. auf Sumpf- u. Moorwiesen, durch das g. G. von der Ebene bis auf das Hochgebirge. *β.* im *Riesengeb.* und *Gesenke* auf den Moorwiesen und um alle quellige Stellen, z. B. an den *Teichen, Elbwiese, am Weisswasser, am Hock-schar im Ges.* Juli, Aug. 2.

Der Stängel treibt am Gr. wurzelnde Ausläufer, was besonders bei *β* im hohen Grade der Fall ist, die im Moose (*Sphagnum*) wächst. Höhe von 2' - $1\frac{1}{2}$ '. *β* ge-

wöhnlich kleiner. Einfach, auch astig. Kronenbltt. lilaf. oder purpurf.-violett. Die Blumen vor dem Blühen nickend. Die Form β kommt in allen Kennzeichen mit der gewöhnlichen überein, und ist nur in der Blattform verschieden. Von dieser aber lassen sich auf den Gebirgen selbst alle Uebergänge beobachten (wozu z. B. *E. nutans* Tausch gehört); daher kann ich die Ansicht, dass *E. alpinum* nur eine Varietät des *E. palustre* sei, nicht aufgeben.

E. origanifolium Lamarck. Kahl und glänzend; Bltt. eigf., schweifig-gezähnt, die unteren stumpf, die obersten wechselständig; Stängel einfach, mit zwei erhabenen feinhaarigen Linien; Narben vereinigt keulenförmig.

An Quellen, Bächen und auf sumpfigen Stellen des Hochgebirges. Im *Riesengeb.* häufig, bis an die *Grenzbauden* herab. Im *Gesenke* auf den *Knoblauchwiesen*, am *Peterssteine*, im *Kessel*. Auf der *Babia Gora*. Juli, Aug. 2.

Diese Art stellt ein vergrössertes *E. alpinum* dar. Bltt. glänzend, bisweilen fast fleischig; Stängel 8 - 12" hoch, oben übergeneigt. Kronenbltt. purpurviolett.

Oenothéra L. *Nachtkerze*. Vier Kelchzipfel und Kronenblätter. Acht Staubgef. Kapsel länglich oder keulenförmig. Samen kahl. VIII, 1.

† *O. biennis* L. *Rapontika*. Bltt. eilanzettlich, Stängel schärflich, behaart.

An sandigen und kiesigen Flussufern zwischen Gebüsch. Längs den Ufern der *Oder* um *Breslau*, *Ohlau*, *Brieg*, *Oppeln*, auch bei *Wohlau* u. *Beuthen*. Am *Bober* bei *Hirschberg* u. *Bunzlau*. Auch um *Charlottenbrunn* u. *Kupferberg*, *Bielau b. Neisse*. Es heisst, dass diese Pflanze 1614 aus Virginien nach Europa kam; sie ist völlig eingebürgert. Juni, Aug. ☉.

Wurzel spindelig, mit blutrother Oberhaut, innen weiss, mit rothen Ringen. Stängel etwa 2' h. Kronenbltt. blass citrongelb, gross, rundlich, mit sehr kurzem Nagel. Die schwach wohlriechende Blume öffnet sich nur gegen Abend oder an trüben Tagen und bleibt bis zum Morgen offen. Die Wurzel ist essbar, als Sallat.

Circaea L. *Hexenkraut*. Kelchsaum zweitheilig. Zwei verkehrt-herzförmige Kronenbltt. Zwei Staubgef. zwischen den Kronenbltt. Frucht eine birnförmige zweifächerige zweiklappige Kapsel. II, 1.

Frucht mit Hakenborsten. Waldpflanzen.

C. lutetiana L. Ohne Deckblätter; Blätter eigf., schwach-herzförmig, schweifig-gezähnt.

In schattigen und feuchten Laubwäldern der Ebene und des Vorgebirges zerstreut, aber an vielen Orten und stets zahlreich. In den Oderwäldern. Um *Br. bei Masschwitz*, *Schwuitsch* etc. *Trebnitzer Buchenwald*. Um *Ohlau*, *Wohlau*, *Beuthen a. O.*, *Charlottenbrunn*, *Kupferberg*, *Oppeln*. Juli, Aug. 2.

Stängel einfach, aufrecht, 1 - 1½' h., kahl oder feinhaarig, mit endständiger lockerer Blütenähre, auch eine zweite aus einem oberen Winkel. Bltt. langgestielt, gegenständig mit sehr seichten Zähnen. Kronenblt. röthlich-weiss.

× *C. intermedia* Ehrh. Mit borstenförmigen Deckbltt.; Bltt. eifg., herzfg., schweifig-gezähnt.

An nassen und sumpfigen Waldplätzen, besonders im Vorgebirge. Um *Ohlau* nach Beilschmied. Bei *Charlottenbrunn* von Schummel gef. *Fürstensteiner Gr. Mülke bei Neurode. Rosenthal bei Bunzlau* nach Schneider. Am *Biele-ufer in Thomasdorf*. Juli. 2.

Diese Art ist ein räthselhaftes Mittelding zwischen *C. lutetiana* und der folgenden, und theilt sich in die Kennzeichen beider. Früchte etwas kürzer und dicker als an der folgenden. Blumen wie der vorigen. Meist mit 3 - 4 Blütenähren.

C. alpina L. Mit borstenförmigen Deckbltt.; Bltt. breit-eifg., tief-herzförmig, schweifig-gezähnt.

In schattigen Wäldern, besonders auf moderndem Laube und in hohlen Baumstämmen, im Vorgeb. am *schwarzen Berge bei Charlottenbrunn, am hohen B. bei Conradswaldau*, und am Fusse des Hochgebirges, im *Riesengeb.: Kochelthal, Agnetend.-Schneeegrube, Gr. Glatz* und *Gesenke*, häufiger im östlichen Theile. Vielleicht auch in der Ebene, z. B. *Polgsen bei Wohlau*, nach Schneider um die *Goldmühle bei Bunzlau* und nach Krause b. *Przybor b. Oppeln*. Juli, Aug. 2.

H. 4'' - 1'. Stängel meist röthlich, glasartig, oben mit 1 - 8 Blüthenähren. Bltt. fettglänzend. Kronenblt. doppelt kleiner als an *C. lutetiana*, röthlich-weiss. Früchte länglich-keulenförmig.

Tamariscineae Desvaux.

Kelch 5theilig mit dachziegelförmig. Knospentage; 5 gleichförmig. Blumenbl. zwischen den Kelchzipfeln, aus deren Grunde entspr. Staubgef. 5 oder 10, die Staubfäden am Gr. mehr oder weniger zusammenhängend. Ein freier, dreikantiger, einfächeriger Fruchtknoten mit 2-6 Narben. Frucht eine dreiklappige Kapsel, mit zahlreichen Samen an wandständigen Samenhaltern. Samen schopfig mit geradem Keim ohne Eiweiss.

Sträucher mit kleinen, etwas fleischigen schuppig-dachziegelförmigen Blättern ohne Stützblätter.

Myricaria Desvaux. Fünf längere wechseln mit fünf kürzeren Staubgef.; die Staubfäden bis zur Hälfte verwachsen. Narbe sitzend. Samen mit gestieltem Haarschopf. v, 3.

M. germanica Desv. *Tamarix germanica* L. Blumen in endständigen Aehren; die Deckblätter länger als der Blumenstiel; Kapseln aufrecht-abstehend.

Auf kiesigen Flussufern im südöstlichen Theile des Gebiets. An der Weichsel bei Ustron und an der Oelse bei Freystadt. Juli. ♀.

Stranch von 3 - 5' H., mit kahlen stielrunden rufenförmigen Aesten mit grauer Rinde. Die Blüten klein, lineal-lanzettlich, denen des Haidekrauts ähnlich. Kronenbltt. blass rosenroth. Die Rinde der Aeste ist adstringirend und war officinell.

Pomaceae Lindley.

Kelebröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen; Saum 5zählig od. 5spaltig, an der Frucht einschrumpfend, mit geschindelter Knospenlage. Fünf Kronenblätter, mit geschindelter Knospenlage, entspringen nebst ungefähr 20 Staubgef. aus einem den Kelchschlund umgebenden Ringe. Fruchtknoten 2 bis 5fächerig, mit je 2 oder mehreren aufrechten Eichen und mittelständigen Samenhaltern. Meist fünf Griffel. Frucht vom vergrösserten und fleischig-gewordenen Kelche bedeckt, wodurch die mit einer ganz feinen oder papierartigen oder knorpeligen Haut umschlossenen Fächer (richtiger Carpelle) umschlossen und verbunden sind. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim und grossen Keimblättern.

Bäume oder Sträucher mit wechselständigen Bltt., mit Stützbltt., gleichmässigen ziemlich ansehnlichen weissen oder röthlichen Kronen und meist esabaren Früchten. — Nur eine Art vorherrschend in der Ebene: andere im Vor- und Hochgebirge, aber selten. In den reifen Früchten viel Zuckergehalt und Aepfelsäure.

Crataegus L. Weissdorn. Fruchtknote 2-5fächerig, mit je zwei Eichen. Frucht eine oben zusammengezogene Pflaume mit 2-5 zwei- oder einsamigen Kernen. XII, 2.

C. Oxyacantha L. Mehlbeeren. Bltt. verkehrt eifg., 3-5lappig mit eingeschnittenen u. gesägten Lappen; die Zweige kahl; Kelchzipfel eifg.-zugespitzt.

α. vera, mit seichteren Blatteinschnitten, kahlen Blumenstielen, ovalen 1-3kernigen Pflaumen.

β. monogyna, mit tieferen Blatteinschnitten, zottigen Blumenstielen, kugelförmigen 1kernigen Pflaumen. *C. monogyna* Ehrh. Koch Syn.

In Gebüsch, an Waldrändern, Dämmen, in der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Mai, Juni. ♀.

Stranch von 4 - 5' H. mit grauröthlicher glatter Rinde, vielästig. Aeste verworren; Zweige oft in Stachela endigend. Bltt. büschelweise, nach der tieferen oder seichteren Zertheilung von verschiedenem Ansehn, fast lederartig. Blumen in Doldentrauben. Kronenbltt. hohl, rund, weiss. Griffel bis zur Mitte oder bis zum Grunde getheilt, oder einfach. Staubbeutel roth. Pflaume beerenartig, roth, mit mehligem süsslich-fadem Fleisch. Die Blumen riechen süsslich. Das Holz ist süsse und hart. Die beiden Varietäten lassen sich nicht durch konstante Merkmale trennen.

Cotoneaster Medikus. Zwergmispel. Fruchtknote 2-5-fächerig, mit je zwei Eichen. Pflaume mit 3-5 verbundenen an der Spitze freien unten an den fleischigen Kelch angewachsenen Kernen. XII, 2.

C. vulgaris Lindl. Bergquitten. Mespilus Coton L. Blätter elliptisch-rundlich, unterseits weissfilzig; Kelche kuhl.

Auf sonnigen und steinigen Hügeln und Gebirgslehnen. Nach Matt. am *Brunnenberge* im *Riesengeb.* und bei *Adersbach*. Im *Teufelsgärtchen* nach Krause. In der *kl. Schnergrube* nach Elsner. *Lähnhaus* n. v. Flotow. *Breiter Berg b. Striegau. Spitzberg bei Probsthain. Küpernik, Bründelhaide u. Kessel im Gesenke.* Mai, Juni. ♀.

Strach von 2 - 3' H., mit braunrothen geraden Aesten. Bltt. oberseits dunkelgrün, am Ende mit feiner Spitze. Blumen zu 3 - 4. Kronenbltt. aufrecht, rosenroth. Pflaume beerenartig, roth, erbsengross.

Pyrus L. Fruchtknote 2-5 fächerig mit je zwei Eichen. Frucht: ein 2-5fächeriger Apfel. Die Fächer mit knorpelhäutiger Wand, zweisamig, oft nach innen geöffnet. XII, 4

P. communis L. Birne. Frucht am Grunde nicht vertieft; Griffel frei; Blattstiel so lang als die Blätter.

α. *glabra*, Blätter, Blumenstiele und Kelche mit feinem spinnwebartigen Wollüberzuge, der mit der Entwicklung verschwindet.

β. *tomentosa*, Bltt., Blumenstiele und Kelche mit langedauerndem Wollfilz.

In Wäldern, besonders der tieferen Ebene, in den Odergegenden, und in der Nähe der Dörfer bis in das Vorgebirge, doch hier seltener. Scheint doch wohl bei uns ursprünglich heimisch zu sein. Mai. ♀.

Hoher Baum mit grauer Rinde, die sich in kleinen länglichen Schuppen ablöst. Bltt. eig., fein-gesägt. Blüten in Doldentrauben. Kronenbltt. rundlich, hohl, weiss. Früchte kugelig oder am Gr. vorgezogen. Von diesem Baume stammen die mannigfaltigen, durch Kultur erzielten edlen Birnensorten. Die Fr. der wilden Birne werden teig oder gebacken gegessen.

P. Malus L. Frucht am Gr. vertieft; Griffel am Gr. verwachsen; Blattstiel halb so lang als die Blätter.

α. *glabra*. Blätter und Kelche ganz kahl.

β. *tomentosa*. Blätter auf der unteren Seite und Kelche filzig.

In Wäldern, besonders der Odergegend, z. B. in der Strachate, doch seltner als die vorige, bis ins Vorgebirge, wahrscheinlich verwildert. Mai. ♀.

Baum von mässiger Höhe. Bltt. breiteifg., bisweilen lederartig, stumpf-gesägt. Blüten in Doldentrauben. Kronenbltt. hohl, rundlich, weiss oder rüthlich, oder innen weiss und aussen roth. Früchte fast kugelig, von sauerem zusammensiehendem Geschmack. Von diesem die kultivirten Aepfelsorten.

Sorbus L. Eberesche. Fruchtknote fünffächerig mit je zwei Eichen. Frucht eine Beere, deren Fächer mit einer dünnhäutigen Wand versehen sind, mit 1-5 Samen. XII, 3.

S. Aucuparia L. Eberesche. Quitschbeeren. Blätter gefiedert.

β. alpestris. Bltt. lederartig, Früchte elliptisch.

In Bergwäldern, an steinigen Lehnen und sonnigen Abhängen des Vor- und Hochgebirges bis an die Gränze des Baumwuchses, auch in der Ebene häufig angebaut. Die Form *β.* im Hochgebirge z. B. *am kl. Teiche, im Elbgrunde, im Riesengeb., am Allwater und im Kessel im Gesenke.* Mai, Juni. *h.*

Schlanker Baum, im Hochgeb. Strauch. Bltt. oberseits kahl, unterseits mit mehr oder minder dickem, weissgrauem Filz, oft fast kahl, bei *β* ganz kahl. Blättchen länglich, spitz-gesägt. Blattknospen dick, filzig. Blumen in Trugdolden. Kronen weiss von süsslichem Geruch. Beeren kugelig oder länglich, roth; Speise der Grossvögel, daher sie zum Fange derselben in Dohnen aufgestellt werden. Im Riesengeb. bereitet man daraus starken Brantwein.

S. Aria Crantz. Bltt. eifg. - länglich, gesägt oder schwachgelappt, unterseits filzig.

An Gebirgslehnen. Im Riesengeb. im *Riesengrunde*, am *Koppenbache*, am *Teufelsgärtchen* und im *Elbgrunde.* Mai. *h.*

Strauch von 3-4' H., mit biegsamen Aesten. Bltt. unten bald grau- bald weissfilzig. Blüten in Trugdolden. Kronenbltt. weiss, oder nach Tausch, welcher daraus seine *S. sudetica* macht, rosenroth. Beeren elliptisch rötlich.

S. torminalis Crantz. Ruhrbirne. Bltt. eifg., gelappt; Lappen spitz ungleichgesägt, kahl.

In Wäldern und an waldigen Lehnen im Vorgebirge. Am *Rummelsberge* bei *Strehlen* von Schummel, am *Hartheberge* bei *Frankenstein* von mir und am *Sakrauer Berge* von Fincke gef., von *Krocker* nur vermuthet. Mai. *h.*

Schlanker, nicht hoher Baum oder Strauch. Bltt. fast siebenlappig. Blumen in Trugdolden. Blüht selten bei uns. Beeren oval, bräunlich.

Rosaceae Juss. Bartling.

Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen am Schlunde zusammengezogen, mit fünfblättrigem Saum in dachziegelförmiger Knospenlage. Fünf Kronenbltt. in dachziegelförmiger Knospenlage aus dem Kelchschlunde sammt den in mehrere Reihen geordneten Staubgef. von unbestimmter Anzahl. Viele freie von der Kelchröhre umschlossene eineiige Fruchtknoten mit gleichvielen, seitlichen, freien oder oben vereinigten Griffeln. Frucht eine durch die anschwellende Kelchröhre gebildete Beere mit vielen einsamigen Nüsschen. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Strücker, deren Aeste mit Stacheln und Borsten besetzt sind; mit gefiederten Blättern, grossen Stützblättern, grossen rothen Kronenblättern. Die meisten in der Ebene; eine Art im Vor- und Hochgebirge. Die Bekleidung der Aeste und Bltt. ist sehr veränderlich und die Arten schwer zu unterscheiden, und von manchen Autoren im Uebermaass vervielfältigt. Feine aromatisch-wohlriechende Stoffe in den Blumen (Rosenöl); die Kronenbltt. wirken schwach purgirend.

Rosa L. Rose. Kelchröhre krugförmig, fleischig, am Schlunde durch einen drüsigen Ring verengert. Frucht eine durch die geschwollene Kelchröhre entstandene Schein-Beere. Nüsschen von den herausragenden Griffeln gekrönt. XII, 5.

R. alpina L. Gebirgs-R. Die mehrjährigen Stängel ohne Stacheln, die jährigen mit geraden borstlichen Stacheln dicht besetzt; Blättchen zu 7-11 länglich-elliptisch; Kelchblätter ungetheilt länger als die Krone; Fruchtsiele zurückgekrümmt; Früchte lang u. schmal, überhängend, vom Kelchsaum gekrönt.

β. *pyrenaica* Gouan. Blumenstiele und Kelche ganz oder theilweise mit drüsigen Borsten besetzt.

In Schluchten und Gründen, an Lehnen und Wänden des Vor- u. Hochgebirges, fast bis in das Gebiet der Ebene herab. Im *Fürstener Gr. u. Schlesierthale. Lomnitz bei Charlottenbrunn. Zentner bei Hausdorf. Reinerz, Cudower Thal, Heuscheuer. Hohe Mense. Schneeberg* bis unter *Wölfelsdorf* herab. Riesengeb. *Koppelwiesen, Haynsfall, Elbgrund, Baberhäuser*, bis *Schreibershau* herab. *Geneske* um *Bieberteich, Hirschwiesen, Carlsbrunn*, am *Oppafalle* etc. *Czantory b. Ustron.* Juni, Juli. h.

II. 2-4'. Bltt. haben eine Art von fettigem Beif, kahl, oder feinhaarig. Kronen meist satt purpurfarben. Die Kelche und Blumenstiele sind entweder ganz glatt, oder wie bei β, was nicht minder häufig, mit drüsigen, steifen Haaren besetzt.

† **R. cinnamomea L. Pfingströschen.** Stacheln an den jährigen Aesten gerade gedrängt, an den Stützblättchen gebogen; Blättchen zu 5-7 eig.-länglich; Kelchbltt. ungetheilt so lang als die Krone; Früchte kugelig aufrecht, vom Kelchsaum gekrönt.

Ist im südlichen Deutschland heimisch, und findet sich bei uns nur hie und da, wie um *Troppau, Strehlen* u. *Reichenbach*, scheinbar verwildert. Mai, Juni. h.

II. 4-5'. Bltt. mit fettigem Beif. Kronenbltt. fleisch-rosaf. Blumen fast immer halbgefüllt. Bei dieser und der vorigen Art stehen die Fruchtknoten im Grunde der Kelchröhre auf einem kurzen, bei den drei folgenden auf einem langen Stiele, bei der letzten sind sie ohne Stiel.

R. canina L. Hundsrose. Hagebutte. Hanbutten. Stacheln stark, zusammengedrückt; sichelförmig; Blättchen zu 5-7, eig., mit spitzen Sägezähnen, die nach oben sich zusammenheigen; Kelchbltt. fiederspaltig so lang als die Krone zurückgeschlagen gegen die Frucht-reife abfallend; Früchte elliptisch oder kugelig, aufrecht.

Die vorzüglichsten Formen nach Koch:

- a. vulgaris.* Blattstiele, Blättchen, Blumenstiele und Kelch kahl, nur die Blattstiele mit wenigen Haaren und Drüsen besetzt.
- β. dumetorum.* Blattstiele und die untere oder beide Seiten der Bltt. weichhaarig; Blumenstiele und Kelche nackt.
- γ. cottina.* Blumenstiele mit Drüsenborsten; Bltt. kahl oder behaart; Kelch nackt oder mit Drüsenborsten.
- δ. sepium.* Blumenstiele und Kelche nackt; Blattstiele und die untere oder beide Blattseiten von Drüsen klebrig. — Hierher auch *R. Kluckii* W. et Grab Fl. sil.

In Gebüsch, an Waldrändern, trocknen Dämmen und Hügeln, an Weg- und Ackerrändern, d. d. g. G. bis ins Vorgeb., häufig. Jun. h.

Bei dieser Art wechselt die Bekleidung auf das mannigfaltigste, und die entfernteren Formen sehen einander sehr unähnlich, bis man bei aufmerksamer Beobachtung die verbindenden Mittelglieder gefunden hat. Auch die Gestalt der Aeste ist nach dem Boden veränderlich, bald lang und gerade, bald kurz, krumm und winkelig. Es giebt ferner Formen mit kleinen Bltt. und Blumen. Kronenbltt. meist blass fleischroth, doch auch bis ins tief rosenrothe, rund mit schwachem Eindrucke. Blumen schwach wohlriechend. Früchte orangeroth, bis in den Spätherbst hart und knorpelartig. — Häufig moosartige Gallauswüchse, *Bedeguar*, an den Zweigen, vom Stiche einer Gallwespe veranlaßt. Officinell waren *Fructus et Semen Cynosbati*. Die fleischigen Fruchtkelche sind zusammensiehend und werden zu Suppen und Liqueurs benutzt.

R. rubiginosa L. *Wein-R. Christusdorn.* Stacheln stark, zusammengedrückt, sichelfg.; Blättchen 5-7, mit doppelten abstehenden Sägezähnen, rundlich- oder elliptisch; Kelchbltt. fiederspaltig, so lang als die Kronenbltt., zurückgeschlagen, gegen die Fruchtreife abfallend; Früchte rundlich aufrecht.

In Gebüsch an Wegen, Dämmen und Waldrändern, seltner als die vorige und folgende und nur in der Ebene. *Um Br.* am Wege nach *Neukirch*; am Damme von *Oswitz* nach der Schwedenschanze. *Schwoitsch, Treschen* etc. *Um Ohlau, Wohlau, Gröditz* bei *Bunzlau, Fürstenstein* und *Hohenfriedeberg, Cudowa, Troppan.* Juni, Juli. h.

Mannshoher Strauch, vielästig und dickbuschig, dichtbeblättert. Blättchen ins rundliche und oft stumpf, sattgrün, kahl oder unterseits weichhaarig und dasselbst stets mit Drüsen besetzt. Blumen einzeln oder meist 3-5 in einer Doldentraube. Kronen kleiner als an der vorigen, meist satt rosenroth. Stacheln an den alten Stämmchen sind mehr ungleich als an der vor. und mit vielen kleineren untermengt. Das Laub riecht besonders am Morgen und Abend nach Wein oder Obst. — Hierher *R. spinosissima* bei *Matt. Em.*

R. tomentosa Smith. *R. villosa* Matt. En. W. et Gr. Fl. sil. Stacheln stark, zusammengedrückt, fast gerade, an den Aesten sichelfg. mit doppelten abstehenden Sägezähnen; Kelchbltt. fiederspaltig, so lang als die Krone, bis gegen die Fruchtreife dauernd; Früchte rundlich aufrecht.

Wie die vorigen, häufig. Juni, Juli. h.

Höhe der vorigen. Diese Art ist durch die aschgrauen Bltt., sie mögen kahl oder behaart sein, kenntlich. Gewöhnlich sind die Bltt. mit einem feinen Seidenhaar über-

zogen und schimmern silbergran; die Unterseite mit oder ohne Drüsen, die Blumenstiele und der Grund der kugeligen Kelehe mit gestielten Drüsen besetzt, die Blumen zu 3-5 in Doldentrauben. Sie ändert ab mit dünnbehaarten oder sehr selten mit kahlen Bltt.; mit nackten Kelchen und Blumenstielen; mit Kelchen, an denen die Drüsen die ganze Röhre und den Saum bekleiden; mit eiförmigen Kelchröhren. Blumen ziemlich wohlriechend. Früchte sehr gross, scharlachroth. — Eine sehr ähnliche Art *R. pomifera* Herrmann, welche viele für die wahre Linnéische *R. villosa* halten, hat Kronenbltt. mit drüsigen Wimpern am Rande.

R. gallica L. *Zwergrose*. *R. pumila* Jacq. Matt. En. Die jährigen Stängel mit dichten ungleichen, grösseren breiten schwachsichel-förmigen und kleineren borstenförmigen Stacheln und Drüsenborsten besetzt; Blättchen elliptisch lederartig; Kelchbltt. fiederspaltig kürzer als die Kronenbltt. zurückgeschlagen, gegen die Fruchtreife abfallend; Früchte fast kugelig, aufrecht.

An grasreichen und buschigen Dämmen, in sonnigen Gebüsch, an buschigen sonnigen Hügeln, an grasreichen Ackerrainen, d. d. g. G. bis in das Vorgebirge, zerstreut. Um Br. bei *Rosenthal*, *Carlowitz*, *Grüneiche*, *Marienau*, *Treschen*, *Ransern*. *Canth. Ohlau*. *Wohltau*. *Beuthen a. O.* *Kupferberg*. *Schmiedeberg*. *Oppeln*. *Leobschütz*. *Troppau*. Juni, Juli. h.

Durch den niedrigen Wuchs, 4'' - 1' h., und meist niederliegende schwache Stämmchen, grosse lederartige, unterseits graue Blättchen, sehr grosse, flattrige, meist purpurrothe Kronenbltt. kenntlich.

Dryadeae Ventenat.

Kelch dauernd, mit ausgebreiteter oder krugförmiger Röhre; Saum 4-5 theilig, oft von wechselständigen Deckblättchen (äusserem Kelche) begleitet, mit klappiger Knospenlage. Kronenbltt. aus dem Kelchschlunde, zwischen den Kelchzipfeln, mit dachziegelförmiger Knospenlage. Staubgef. aus dem Kelchschlunde hinter den Kelchlappen. Eine unbestimmte Zahl freier Nüsschen mit je einem Ei sitzen in schraubenförmiger Anordnung auf dem kegelförmig erhobenen, oder in bestimmter Anzahl auf dem vertieften Fruchtboden. Eben so viele seitliche Griffel. Nüsse frei, trocken oder pflaumenartig. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Kräuter oder Stauden mit wechselständigen gestielten, gefiederten oder fingerförmigen, fiedernervigen Bltt. mit Stützbltt. am Blattstiel, mässig-grossen zahlreichen Blumen; einige nur in den höheren Regionen; viele Brombeeren vorzugsweise im Vorgebirge. In der Wurzel, den Bltt. und der Rinde herrscht zusammenziehender Stoff vor.

Rubus L. *Brombeere*. Kelch fast flach, dauernd, ohne Deckblätter. Fruchtknoten zahlreich, frei, auf einem kegelförmig-erhobenen schwammigen Fruchtboden, in Pflaumen über-

gehend, welche zu einer abfallenden nach unten hohlen Halbkugel verbunden sind. XII, 5.

Blumen meist in eadständigen rispigen Doldentrauben. Kronenbltt. hinfällig. Aus der Wurzel theils blüthentragende Stängel, theils bogenförmige nur beblätterte Jahrestriebe (*turiones s. flagelli*); beide so wie die Blattributionen und Blüthenzweige- und stiele mit Stacheln, Borsten, Drüsenborsten, Haaren und Filz auf das mannigfaltigste bekleidet. Die Früchte sind einer Maulbeerfrucht ähnlich, essbar. — In der Monographie dieser Sippe von Weihe und Nees ist ein Uebermaass von Arten aufgestellt; jedoch giebt es wirklich mehrere wahrhaft unterschiedene, als gewöhnlich, wie unter andern auch in Koch Synopsis, aufgeführt werden. Dass die folgenden Arten in der Natur begründet sind, davon habe ich mich durch eine fünfzehnjährige Beobachtung überzeugt. — Bei dem Einsammeln dürfen Stücke der Jahrestriebe mit den daran befindlichen Bltt., am besten aus der Mitte, nicht vergessen werden, da an diesen die Bekleidung, so wie die Blattform am gleichmässigen ist; auf diese wird daher im Folgenden Beziehung genommen. Die Bekleidung ist an ein und derselben Art sehr veränderlich, und die Arten schwer zu erkennen.

a. strauchartige drüsenlose. Die Triebe meist kantig, mit Stacheln von fast einerlei Gestalt und Grösse, und mit Haaren, selten mit einigen Drüsen bekleidet.

R. fruticosus L. Triebe kahl, kantig, mit zerstreuten, krummen, lanzettlichen Stacheln; Blätter fünfzählig, Bltt. eig.-rundlich, längs der Nerven gefaltet, oberseits kahl, unterseits feinhaarig oder sammtthaarig; Rispe weitläufig mit wenig Stacheln. Hierher *R. plitatus* Weihe W. et Gr. Fl. sil.

β. fastigiatus. Weitläufig, mit langgezogenen, fast ebenen Blättchen.

An Zäunen und Hecken, in Gebüsch; an Waldrändern, Dämmen in Haiden und Wäldern, an steinigen und unfruchtbaren, trocknen und feuchten Plätzen, die gemeinste und ausgebreitetste Art dieser Sippe, vorzüglich in der Ebene doch auch bis an das Hochgebirge, wo sie jedoch seltner und durch andere Arten ersetzt wird. *β.* an feuchten und schattigen Orten, Juni, Juli. h.

Laub dunkelgrün; Bltt. unterseits grün, regelmässig eirund, starkgesägt. Stängel stets kahl, meist röthlich. Kronenbltt. rundlich fleischroth oder weiss. Blüht früher als alle andere, ausser *R. caesius*. Früchte bluthroth-schwarz, ohne Reif, süssäuerlich, etwas hart, essbar.

R. thyrsoideus Wimmer Fl. v. Schles. *R. fruticosus* Smith. Fl. brit. Weihe et Nees l. l. W. et Gr. sil. Triebe kahl, eckig, mit zerstreuten, fast geraden Stacheln; Bltt. fünf- die unteren drei-zählig, länglich-eifg., zugespitzt, unregelmässig gesägt, schwach herzförmig, unterseits grau oder grau- oder weiss-filzig; Rispe länglich und schmal mit filzigen und rückwärts-stacheligen Stielen.

β. cordifolius. Triebe meist mit sparsamen Haaren und Drüsen; Bltt. breit, unterseits weichhaarig oder zottig; Bispentiele filzig mit Drüsen. — *R. silesiacus* Weihe.

γ. apricus. Triebe kahl mit krummen Stacheln; Bltt. breit, kurzspitzig, herzförmig spitz-gezähnt; Rispe pyramidalisch, beblättert. Hierher *R. Grabowskii* Weihe W. et Gr. Fl. sil.

Auf trocknen, sonnigen Waldplätzen, in Nadelwäldern und Heiden, an sonnigen Hügellehnen und Hauen, in der Hügellregion der Ebene und im Vorgebirge, zerstreut. Um Br. bei Mahlen, in der Trebnitzer Hügellkette um Skarsine, Totschen, Riemberg, Cudowa, Oppeln, Schmiedeberg. β . am Zobtenberge und bei Schmiedeberg. γ . Kieferhaue zwischen Riemberg und Hauffen. Juni. $\bar{z}$.

Ziemlich schlank; die gewöhnliche Form hat unterseits grau- oder weiss-filzige Bltt. mit groben Sägezähnen. Hauptmerkmal ist die schmale lange Rispe. Kronenbltt. weiss oder rosafarben. Die Bltt. werden später lederartig. — Da sowohl nach der Beschreibung als nach dem Zeugniß von Fries und Wahlberg der *R. plicatus* Weihe der wahre Linnéische *R. fruticosus* ist, so war ich genöthigt, dieser Art einen neuen Namen zu geben.

R. vulgaris Weihe. Triebe eckig, meist behaart, mit starken etwas gekrümmten Stacheln; Blätter 5-zählig, Blättchen regelmässig eig. zugespitzt, oberseits kahl, unterseits weichhaarig oder grau-zottig, mit stachelspitzigen Zähnen; Rispe weit ausgebreitet, Stiele derselben zottig und mit vielen grösseren und kleineren Stacheln.

α . *viridis*. Grün, Bltt. grün, unterseits weichhaarig; Triebe unbehaart mit dünneren Stacheln. *R. vulgaris* Weihe et N.

β . *mollis*. Bltt. unterseits grau- oder weissfilzig; Triebe haarig, auch zottig ohne Drüsen. *R. villicaulis* W. et Gr. sil.

γ . *glandulosus*. Bltt. unterseits grau- oder weissfilzig; Triebe, Rispenstiele und Kelche mit Drüsen besetzt. *R. villicaulis* d. W. et Gr. sil. *R. Radula* Weihe et N.

Auf trocknen sonnigen Waldplätzen, in Nadelwäldern, Haiden, Kieferhauen, an sonnigen Hügel- und Berglehnen, in der höheren Ebene und bis an das Hochgeb. sehr verbreitet und zahlreich. Um Br. besonders in der ganzen Trebnitzer Hügellreihe. Am Zobten. α . bei Ustron im Niedecker Schlage, um Schmiedeberg (Köhler). γ . bei Totschen, am Zobtenberge, um Schmiedeberg. Juni. Juli. $\bar{z}$.

Breitet sich weit aus. β ist die häufigste und Hauptform, mit haarigen oder zottigen meist rothen Trieben, starkzottigen Rispenstielen, und ausgebreiteter aber stumpfer Rispe, deren untere Aeste entfernt, verlängert und söhlig sind. Kronenbltt. rund, hohl, rosafarben, selten weiss. Auch die Früchte dieser Art sind essbar.

b. strauchartige drüsentragende. Die Triebe meist stielrund oder schwachkantig mit Stacheln von verschiedener Gestalt und Grösse, Borsten, Haaren und Drüsen besetzt. — Bei den ersten drei Arten fehlen oft die Haare und Drüsen.

R. nemorosus Hayne. Triebe kantig, schwach bereift, mit zerstreuten Haaren und priemlichen Stacheln; Bltt. 3- oder 5-zählig, rundlich mit kurzer Spitze, die seitlichen sitzend, eingeschnitten gesägt; Rispe doldentraubig mit behaarten auch filzigen Stielen; Kronenbltt. rund; Früchte schwarz ohne Reif.

β . *grandiflorus*. Kronen gross; Kelchzipfel blattartig-verlängert.

γ . *ferox*. Triebe mit vielen und vielerlei Stacheln; Rispenstiele mit söhligem Nadeln und Drüsenhaaren.

δ . *tomentosus*. Bltt. unterseits weissfilzig.

An Hecken, Dämmen, in feuchtem Gebüsch, an feuchten Waldplätzen, ziemlich verbreitet, doch nicht sehr zahlreich, bis in das Vor-

geb. β . bei *Pless* im Schlossgarten, und mit gefüllten Blumen häufig kultivirt. Auf Aeckern bei *Wohlau*. γ . um *Schmiedeberg* und in der *Gr. Glatz*. δ . um *Cudowa* und *Habelschwerdt*. Juni — Aug. $\frac{1}{2}$.

Durch die breiten gerundeten, meist 3fach-gesägten oder eingeschnitten-gesägten Bltt., weisse breite, am Rande einander berührende und zum Theil deckende Kronenbltt. kennlich. Gewöhnlich sind die Bltt. unterseits graugrün, sammethaarig. Früchte säuerlich, essbar. Manche Formen sind der folgenden Art ähnlich.

R. caesius L. Rahmbeere. Triebe dünn, stielrund, graubereift, mit verschiedenartigen feinen Stacheln und Nadeln; Blätter 3-zählig; Blüthen rauteneifg., feinspitzig-gezähnt, die seitlichen sitzend; Rispe armlüthig zerstreut; Kronenblatt. länglich ausgerandet; Früchte blauschwarz, grau bereift.

In Hecken, an Dämmen, in feuchten Gebüsch, an steinig und unfruchtbaren Plätzen, bis in das Vorgeb., gemein. Juni — Aug. am frühesten von allen. $\frac{1}{2}$.

Vielleicht kommt diese Art auch mit kantigen Stängeln vor. Von der vorigen unterscheidet man sie leicht durch die ausgerandeten Kronenbltt. Beide sind etwas bleichgrün, nur selten mit röthlichem Anflug. Die Früchte schmecken angenehm und sind weich.

R. Idaeus L. Himbeere. Triebe stielrund mit unten breiten gekrümmten Stacheln; Bltt. gefiedert, 3- oder 5-zählig; Blättchen breit eifg., unterseits schneewis-filzig; Rispenstiele filzig ohne Stacheln; Kronenbltt. klein, länglich; Früchte roth.

In Kieferwäldern und jungen Kieferhauen, in lichten Brüchen, an sonnigen Berglehnen, besond. in Waldhau, von der Ebene bis ins Hochgeb., sehr verbreitet und häufig. Mai, Juni. $\frac{1}{2}$.

Der Blütenstängel ist mit einer scherbraunen, sich abblättrenden Oberhaut bedeckt. Auch hier wird der Fils auf der Unterseite bisweilen sehr dünn und lässt die grüne Farbe durchschimmern. Wird in Gärten häufig gezogen; auch eine Var. mit gelben Früchten. Früchte weich, säuerlich-süss und aromatisch, woraus ein Syrup und Essig als kühlendes Mittel und Zusatz zu übel-schmeckenden Arzneien gebräuchlich sind.

R. Schleicheri Weihe u. Nees. Triebe stielrund, mit lanzettlich-pfriemlichen grösseren und kleineren Stacheln, geraden Nadeln, Drüsen und Maaren; Bltt. 3- und 5-zählig; Blättchen eifg., spitzig; Rispe länglich oben übergeneigt; Stiele derselben filzig und mit sparsamen Nadeln; Kronenbltt. elliptisch ausgerandet.

β . *aciculatus*. Rispenstiele ohne Fils mit vielen Nadeln und Drüsenhaaren.

Auf sonnigen Hügeln und Berglehnen, in steinig Wäldern und Haiden, zerstreut und seltner als die folgenden. Bisher nur bei *Militsch*, *Oppeln*, *Schmiedeberg*, *Zentner* bei *Neurode*, und β . um *Oppeln* und am *Mittelberge* bei *Zobten* gefunden. Juni, Juli. $\frac{1}{2}$.

Diese und die drei folgenden Arten bilden eine eigene Abtheilung, welche man wohl *Bubi glandulosi* vorzugsweise nennen kann. An vollständig entwickelten Exemplaren ist der Trieb mit zahlreichen grossen, an der Basis breiten und zusammengedrückten Stacheln besetzt, zwischen denen dann kleine ähnliche Nadeln, Borsten, Haare und gestielte Drüsen stehen. Hat man die Hauptform einmal wohl aufgefasst,

so kann man die Abänderungen leicht verfolgen. — Diese Art ist durch die längliche, oben Übergeneigte Rispe und die kleineren blaugrünen, sehr oft dreizähligen Bltt. von den folgenden leicht zu unterscheiden. Ob der *R. Schummei* Weihe. W. et Gr. sil., aus dem *Glaucher Walde bei Skarsine*, auch eine Abart dieser Art ist, kann ich noch nicht entscheiden.

R. hirtus Waldst. u. Kitab. Triebe stielrund oder schwachkantig, haarig, mit lanzettlich-pfriemlichen, geraden, schiefen Stacheln, Nadeln und Drüsen; Bltt. 3-zählig oder fussförmig-5-zählig, breit eifg., weichhaarig; Rispe länglich, Stiele derselben filzig und nebst den Kelchen mit schwarzrothen Drüsen dicht besetzt, abstehend; Kronenbltt. länglich.

In den Wäldern und Hauen des Vorgebirges und Gebirges die verbreitetste Art, bis auf das Hochgebirge reichend, mehr den Schatten liebend als die anderen Arten. Vom Zobtenberge an durch das ganze Vorgebirge bis an die Gränze des Baumwuchses im *Riesengeb.*, *Gr. Glaz*, *Gesenke* und *Klokaczgeb.* Juni, Juli. ♀.

Die Hauptform zeichnet sich durch grosse dichtblüthige, von vielen rothen Nadeln und Drüsen braunrothe Rispen, unterseits grangrün, meist dreizählige Bltt., und kleine Blumen mit kleinen Kronenblättern aus. Wuchs meist niedrig. Die nächsten Bltt. unter der Rispe oberseits mit gestielten Drüsen besetzt, dunkelgrün. Die Rispenäste sind entweder kahl mit vielen Stacheln, wenigen Drüsen und Haaren, oder filzig mit vielen Drüsen und wenigen Stacheln. — Die letztere Form vom *Stangenberge bei Stonsdorf* gab Günther in den Centurien als *R. glandulosus* aus, und nannte Weihe, der sehr oft seine eigenen Arten nicht wieder erkannte, *R. Güntheri*.

R. Bellardi W. u. N. Triebe stielrund, grau bereift, schwachhaarig, mit pfriemlichen etwas gekrümmten Stacheln, Nadeln, Drüsen; Bltt. dreizählig, elliptisch-länglich in eine plötzliche lanzettliche Spitze vorgezogen, unterseits kahl mit vortretenden Adern; Rispe viereckig-länglich, die Stiele dicht mit Drüsen und Nadeln sparsam mit krummen Stacheln besetzt, die unteren aufrecht-abstehend, die oberen söhlig.

Wie d. vorige und zum Theil an den genannten Orten, aber seltener, d. d. g. G. Juni, Juli. ♀.

Auch von niedrigem Wuchs. Bltt. hellgrün, fast immer gedreit, unterseits bisweilen schwach grangrün, durch die Gestalt und Zuspitzung leicht von der vorigen ähnlichen zu unterscheiden. Gewöhnlich ist die oberste Blume der Rispe auf sehr kurzem Stiel und steht tiefer als die nächst unteren. Auch an dieser sind die Drüsen an der Rispe bisweilen roth. Kronenbltt. eifg., weiss, grösser als an der vorigen.

R. Köhleri W. u. N. Triebe stielrund oder schwachkantig, mit starken lanzettlich-pfriemlichen grösseren oder kleineren Stacheln, Borsten, Drüsen und wenigen Haaren; Bltt. fünfzählig, Blättchen breit herzeifg., spitzig, oberseits kahl, schimmernd und lederartig; Rispe pyramidalisch, am Gr. beblättert mit dreispaltigen auch ungetheilten Blättchen; die Stiele abstehend zottig, mit Drüsen, Nadeln und Borsten; Kronenbltt. elliptisch ausgerandet.

Wie die vorige, steigt aber hie und da bis in die Ebene herab. Um Br. bei *Heydewilxen* und *Riemberg*. *Charlottenbrunn*, *Strie-*

gau am Streiberg. Rei Zuckmantel und Einsiedel im Gesenke. Juni, Juli. ♀.

Diese Art hat in ausgebildeten Exemplaren wohl die stärksten und dichtesten Stacheln, welche meist gerade, doch auch bisweilen gekrümmt sind, daher sie Köhler *R. horridus* nannte. Triebe meist roth. Die beblätterte Rispe, woran die Blätter dreispaltig oder eifg. und ungetheilt sind, und die dunkelgrünen, fast glänzenden lederartigen Bltt. machen diese Art leicht kenntlich.

c. Krautartige.

R. saxatilis L. *Steinbeeren*. Triebe kriechend; Blütenstängel stumpfeckig; Bltt. dreizählig, Blättchen rautenf. spitz, eingeschnitten gesägt; Kronenbltt. linealisch.

In Wäldern, an belaubten steinigen Hügeln u. Bergen, selten in der Ebene, durch das Vorgeb. bis in das Hochgeb., zerstreut. Um Br. bei *Mahlen von Schummel* gef. *Grüntanne* bei *Ohlau, Riemberg, Rummelsberg* bei *Strehlen, Fürstenstein, Zentner* bei *Neurode*, u. *Neumannskoppe* bei *Scharfeneck. Charlottenbrunn. Hirschberg, Gröditz* bei *Bunzlau. Oppeln. Leobschütz. Mai, Juni. ♀.*

H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Blumen klein. Früchte roth, angenehm säuerlich, aus 3 oder 4 Pflaumen, welche grösser sind, als an allen anderen Arten.

R. Chamaemorus L. *Torfbeere*. Stängel einfach mit zwei nierenförmigen rundgelappten Blättern und einer Blume.

Auf Sumpf- und Quell-Wiesen des Hochgeb. im Moose zwischen dem Knieholz. Im Riesengeb. auf der *Elbwiese* und auf der *Iserwiese. Mai, Juni. ♀.*

H. 2 - 4". Der Stängel trägt ein tutenförmiges Stützblatt, zwei rundlich-nierenförmige gefaltete und leicht gelappte Bltt. und eine grosse weisse Blume. Beeren gross, roth und wohlschmeckend. — Die Bltt. sind in Russland officinell gegen Lähmungen.

Fragaria L. *Erdbeere*. Kelch flach mit fünfspaltigem Saum und fünf kleineren Deckblättchen zwischen den Zipfeln. Griffel abfällig. Nüsschen zahlreich auf einem eiförmigen, zuletzt saftig-fleischigem vergrösserten vom Fruchtlager sich lösenden Fruchtboden. XII, 5.

Kronen weiss. Stängel fast blattlos. Blumen endständig, 2 - 7 in einer Doldentraube.

F. vesca L. *Wald-E.* Kelch bei der Fruchtreife abstehend; Blumenstiele mit abstehenden, Blattstiele mit angedrückten Haaren.

In Wäldern, Gehölzen, an grasreichen und steinigigen Stellen, an Berglehnen, d. d. G. bis an das Hochgeb., sehr häufig. Mai, Juni ♀.

H. 2 - 4". Bltt. dreizählig, längs der Nerven gefaltet. Kronenbltt. weiss, fast eben. Früchte roth von aromatischem Geruch und Geschmack. — Die Arten dieser Sippe treiben aus dem Wurzelhalse peitschenförmige Ausläufer, welche an den Spitzen wurzeln und knospen und so die Pflanzen vermehren. Die Früchte sind eine beliebte kühlende und erfrischende, aber nicht leicht verdauliche Speise, nach deren Genuss bisweilen ein rosenartiger Ausschlag über den ganzen Körper erfolgt. Die Bltt. gehörig zubereitet geben einen aromatischen Thee.

F. elatior Ehrhart. Kelch bei der Fruchtreife abstehend; Blumen- und Blattstiele mit abstehenden Haaren.

In Wäldern und Gehölzen, an steinigen Hügeln und schattigen Berglehnen, in der Ebene und dem Vorgeb. Um Br. bei *Ransern*, *Pilsnitz*, *Lissa*, *Skarsine*. *Ohlau*. *Wohlau*. *Bunzlau*. Im Vorgeb. bei *Charlottenbrunn*, *Fürstenstein*, *Kupferberg*, *Hirschberg*. Um *Neurode auf d. Zentner*, bei *Hausdorf*. *Cudowa*. *Gesenke*, *Trop.* und *Te.* Mai, Juni. 2.

H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Kronenbltt. nach unten gewölbt, mit getrennten Rändern. Entweder schlagen die Stängel oder die Staubgef. fehl; daher scheint sie getrennten Geschlechts zu sein. Früchte gross, auf einer Seite weiss, etwas hart und fade von Geschmack.

F. collina Ehrh. Kelch an die reife Frucht angedrückt; Blumenstiele mit angedrückten, Blattstiele mit abstehenden Haaren.

In Gebüsch und Hainen, an Dämmen, Hügeln und Berglehnen, d. d. g. G. häufig. Mai, Juni. 2.

H. 2 - 4'. Die Kronenbltt. fast flach, berühren oder decken einander mit ihren Rändern. Früchte nicht so schmackhaft als die der *F. vesca*. Man baut in Gärten *F. grandiflora*, *Ananas-E.*, mit oberseits kahlen, dunkler-grünen Bltt.

Potentilla L. Fünffingerkraut. Kelch flach mit fünf-spaltigem Saum und fünf kleineren Deckblättchen zwischen den Zipfeln. Griffel abfällig. Nüsschen zahlreich auf einem erhabenen trocknen Fruchtboden. XII, 5.

Kronen gelb oder weiss. Bltt. gefiedert oder drei-neunzählig. Stängel ästig mit endständigen zerstreuten Blumen. Lieben sonnige und die meisten trockene Orte. Zwei Arten nur auf dem Hochgebirge.

a. Wahre *F.* Kahle Früchte, haariger Fruchtboden.

α. Ein- oder zweijährige.

P. supina L. Stängel gestreckt oder aufsteigend; Bltt. gefiedert; Blumen einzeln in den Blattwinkeln; Fruchtstiele zurückgeschlagen.

Auf nassen sandigen und überschwemmt gewesenen Plätzen, an Abzugsgräben der Vorstädte und Dörfer, auf sandigen Ufern von Flüssen und Teichen nur in der Ebene. Um Br. zuerst von *Krocker* in der *Schweidnitzervorstadt* und an der *alten Oder*, um *Höfchen*. *Rosenthal*, *Polanowitz*, *Gr. Mochbern*, *Weigelsdorf*. *Ohlau*. *Wohlau*. *Kalichteich bei Oppeln*. *Tropp*. Juli — Septbr. ☉.

Stängel gabelspaltig, bis 1' lang. Kronenbltt. schwefelgelb, kleiner als der Kelch. Stützbltt. eifg., ganzrandig.

P. norvegica L. Stängel aufrecht, rauchhaarig; die unteren Bltt. zu fünf gefiedert, die oberen dreizählig; die unteren Blumen achselständig.

An sandigen Fluss- und Teichrändern, auf Dorfängern, zerstreut, aber an vielen Stellen des Geb., nur in der Ebene. Zuerst von *Matt*. bei *Gnadenfrei* und *Peilau* gef. Um Br. an der *alten Oder* zuweilen, bei *Lissa*. *Neuvorwerk* u. *Stanowitz bei Ohlau* n. *Beil-*

s chmied. *Baerzdorf bei Ohlau. P. Wartenberg n. Lessing. Kl. Kotzenau b. Bunzlau n. Schn. Briesnitz b. Frankenstein. Kalichtei*ch b. *Oppeln n. Grab. Thomasdorf u. Freiwaldau im Gesenke. Sommer u. Herbst.* ☉.

Stäng. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' hoch. Bltt. rauhaarig, mattgrün. Kronenbltt. schwefelgelb, kleiner als der Kelch.

β. vielköpfige. Wurzelstock ausdauernd, vielköpfig, treibt Blütenstängel und Blütenbüschel.

P. rupestris L. *Erdbeer-F.* Stängel aufrecht, oben gabelspaltig; Wurzelbltt. gefiedert; Stängelbltt. dreizählig; Blättchen rundlich; Stützblätter ungetheilt, Kronen weiss.

Auf steinigem und trockenem Waldplätzen und in Haiden in Hügellagen, nur hier und da, und nirgends häufig, in der Hügellagenregion der Ebene und dem Vorgeb. Um Br. bei *Lissa u. Goldschmiede, Mahlen, Totschen und Magnitz, Skarsine. Riemberg. Wohlau. Striegauer Berge. Um Hohenfriedeberg. Lissa Hora n. Kotschy.* Mai, Juni. ♀.

Stäng. 1 - $1\frac{1}{2}$ h. Klebrig, meist roth angelaufen. Blättchen weichhaarig, eingeschnitten-gezähnt.

P. Anserina L. *Gänserich.* Stängel kriechend; Blätter unterbrochen-gefiedert; Stützblätter vielspaltig; Blumenstiele einzeln.

Auf Dorfängern, an Wegen, Grabenrändern und sandigen Rändern von Gewässern, stets zwischen kurzem Grase heerdenweis. Im ersten Sommer und zum zweitenmale im Herbst. ♀.

Der Stängel kriecht in Gestalt von Wurzel sprossen. Bltt. oberseits grün, unterseits weiss-seidenhaarig, oder beiderseits weiss, oder beiderseits grün und schwach behaart. Kronen dottergelb.

P. reptans L. Stängel peitschenförmig-kriechend; Blätter fünfzählig; Blumenstiele einzeln; Nüsschen gekörnt.

Auf Grasplätzen, Wiesen, an Dämmen, Grabenrändern, Waldrändern, Ackerrainen, bis in das Vorgeb., häufig, d. d. g. G. Juni — August. ♀.

Stäng. kriechend, oft viele Fuss lang, in Absätzen wurzelnd und Bltt. nebst einem langen Blumenstiel treibend. Blättchen verkehrt-eiförmig., mit zerstreuten angedrückten Haaren, auch oberseits kahl, tief gelb. Kronen goldgelb.

P. nemoralis Nestler. *Tormentilla reptans* L. Stängel gestreckt, wurzelnd; Blättchen einzeln, drei- oder fünfzählig; Blättchen länglich an der Spitze gesägt; Kronenbltt. meist vier; Nüsschen runzlig.

In Hainen u. Wäldern besond. Kieferwäldern, im Moose. Um Br. bei *Skarsine. Garsuche b. Ohlau. Zeche und Heide b. Bunzlau. Am langen Berge b. Charlottenbrun. Um Oppeln u. Malapane.* Juni — Aug. ♀.

Findet sich, obwohl selten, mit fünf Kronenbltt. H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Stängel fädlich und dünn. Stützbltt. lanzettlich, ungetheilt oder 2-3spaltig. Kronen goldgelb, grüner als an der folgenden.

P. Tormentilla Schrank. *Tormentilla erecta*. L. Stängel aufsteigend oder aufrecht; Blätter dreizählig, die stengelständigen sitzend; Stützblätter fingerfg.-eingeschnitten; Blumenstiele einzeln winkelständig; Kronenbltt. stets vier.

Auf Wiesen, in Wäldern, Hainen, auf buschigen Hügeln, in Haiden auf trockenem und feuchten Grund, bis auf das Hochgebirge, d. d. g. G. sehr häufig. Juni — Aug. 2.

Wurzelstock verdickt und knotig-gekrümmt, aussen braun, innen rötlich-weiss, getrocknet ganz hart, von rein zusammenziehendem Geschmack, enthält eisengrünenden Gerbestoff, war sonst officinell, und findet jetzt bei der Gerberei Anwendung.

P. recta L. Stängel aufrecht von langen am Gr. verdickten und kurzen drüsentragenden Haaren rauh; Bltt. 5—7zählig, Blättchen länglich, gegen den Grund keilfg. verengt, grobgesägt, beiderseits grün mit grauschimmernden langen Haaren.

Auf waldigen und steinigen Hügeln, nur selten und stets sparsam. Um Br. bei *Lissa u. Magnitz b. Trebnitz* von Schummel gef. *Warteberg b. Riemberg. Kl. Oels b. Ohlau.* Auf dem *breiten u. Kreuz-Berge b. Striegau.* Am *Annaberge b. Leschnitz.* Um *Jägerndorf n. Wenck, Ostry b. Te. n. Kotschy.* Juni, Juli. 2.

Stäng. 1 — 1½' h., meist einzeln, oberhalb in Blütenäste getheilt. Grosse Kronen. Findet sich in zwei Formen mit kleineren zitronengelben Kronen und dichterem kürzerer Behaarung, seichteren Zähnen, und mit grösseren schwefelgelben Kronen und dünneren längeren Haaren, tieferen Zähnen.

P. inclinata Villars. *P. canescens*. Bess. W. et Gr. sil. Stängel aufrecht, am Gr. schwach aufsteigend, zottig und filzig; Bltt. 5zählig, unterseits grauwoilig oder filzig; Blättchen lanzettlich-spaltfg. tief gesägt, am Rande u. d. Ribben mit langen Haaren besetzt.

An grasreichen Dämmen und an sonnigen Hügeln, in der Ebene hie und da. Um Br. bei *Schwoitsch, Lanisch, Tschirna a. O. Maschwitz, Ransern, Lissa. Seyerswaldau b. Reichenbach.* Um *Levien. Oppeln b. Chroschwitz u. Grosstein. Mockwitz b. Grottkau.* Um *Katscher n. Wenck, Morawitz b. Tropp. n. Ens.* Juni, Juli. 2.

Stäng. oben rispig, 1' h. Von der folgenden durch stärkere Statur, am Gr. breitere Blättchen, und die langen Haare, welche ausser dem bald mehr grauen bald weissen Filze den Stäng. und die Bltt. bekleiden, kenntlich.

P. argentea L. *Silberkraut.* Stängel aufsteigend, filzig, oben doldentraubig-ästig; Bltt. fünfzählig; Blättchen aus schmalem ganz randigen Grunde verkehrt ei- oder spatelförmig, am Rande umgerollt, unterseits weissfilzig, oberhalb tief gesägt mit abstehenden Zähnen.

Auf sandigem und lehmigem Boden, an Wegen, Rainen, Dämmen, auf Sandplätzen und Mauern, d. d. g. G., bis in das Vorgeb., gemein. Juni, Juli. 2.

Ist nächst *P. cinerea* die häufigste Art aus dieser Sippe. Stäng. 1' h., bisweilen rötlich, am Gr. aufsteigend, dann aufrecht. Nach dem Standort ist die Frucht sehr verschieden. Die Bltt. sind bisweilen schlitzig-gesägt, dann unterseits mit schwachem grauen Filz; die Oberseite ist gewöhnlich kahl, aber bisweilen auch grau- oder weissfilzig.

P. Güntheri Pohl. *P. Wiemanniana* Günth. u. Schummel in Centur. sil. *P. opaca* Krock. sil. 2. t. 12. Stängel am Gr. niederliegend, zotten-filzig, schon von unten an rispig-ästig; Blätter fünfzählig, Blättchen spatel-keilförmig, am Rande eben, unterseits dünn-filzig, tief gesägt, mit nach vorn gerichteten Zähnen.

Auf sandigem Boden, auf Grasplätzen und Dämmen, an Grabenrändern, wahrscheinlich nur in der Ebene; zerstreut. Um Br. an den Dämmen um die *Oder*, *b. Scheitnich*, *Grüneiche*, *Karlowitz*, *Wildschütz*, *Paschkerwitz*. Um *Ohlau*, *Beuthen a. O.*, *Bunzlau*, *Oppeln*. Mai, fast 14 Tage früher als *P. argentea*. 2.

Wurde und wird für Abart der *P. argentea* gehalten, von der sie znerst Wiemann unterschied. Die dünneren niederliegenden oder bogig aufsteigenden Stängel mit fädigen Blumenstielen, die Bekleidung und besonders die aus der Mitte der Wurzel entspringenden Blätterbüschel, um die sich die Blütenstängel im Kreise herumbreiten, unterscheiden sie ausser der Blüthezeit hinreichend. Ob *P. collina* Wibel davon wirklich verschieden ist, weiss ich nicht mit Sicherheit.

P. cinerea Chaix. *P. verna* α et β W. et Gr. Fl. sil. *P. incana* Wimm. Fl. v. Schl. *P. verna* Matt. et Krock. Stängel aufsteigend mit grauem Filz und Haaren besetzt; untere Blätter 5- obere 3-zählig; Blättchen keilfg., a. d. Spitze gesägt, gegen den Grund verengert und ganzrandig, unterseits lineirt, von Sternhaaren graufilzig.

Auf sandigem Boden, auf Triften und Grasplätzen, an Dämmen, auf Sandhügeln, in Kieferwäldern und Hauen. Um Br. auf der Viehweide bei *Pöpelwitz* u. *Oswitz*, *Rosenthal*, *Scheitnich* u. m. In der Ebene d. d. g. G. obwohl nicht überall. März—Mai, 2.

Sehr verränderlich in der Grösse, gew. 2-3'' lang, aber auch fusslang. Kleine Exempl. von Zolllänge mit drei-zähligen Bltt. auf hartem Boden. In Kieferwäldern oft lang-gestreckt mit mehreren einfacheren Haaren und dünnerem Filz. Kronen schön goldgelb. Eine der ersten Frühlingszierden. — Die Abbildung bei Krock. sil. 2 t. 11. stellt *P. opaca* dar; er scheint aber beide Arten vermengt zu haben.

P. verna L. *P. verna* γ . W. et Gr. sil. Stängel aufsteigend rauhhaarig; Bltt. 5- und 3-zählig; Blättchen länglich keilfg. a. d. Spitze sägezählig getheilt, am Gr. verengert und ganzrandig, an den Nerven und Rande mit langen Haaren bekleidet.

Auf steinigen Grasplätzen, an steinigen Hügelwänden, bisher nur im Vorgeb. an einigen Stellen gefunden. Um *Cudowa am Schmelzberge* u. *am Grenzante nach Nachod* von *Grabowski*, um *Reinzerz* u. *bei Charlottenbrunn* von *Schummel*, und am *Kitzelberge b. Kauffung* von v. *Flotow* gef. April. 2.

Der vorigen durchaus ähnlich und nur durch die Bekleidung zu unterscheiden. Die Blättchen sind etwas schmaler und tiefer getheilt.

P. opaca L. Stängel im Bogen aufsteigend, fädlich, dicht-haarig; Blätt. 7- und 5-zählig, beiderseits mit langen abstehenden Haaren; Blättchen lanzettlich-keilfg., tief eingeschnitten-gesägt an der Spitze gestutzt oder eingedrückt.

Auf trocknen Hügelwänden, an sonnigen Dämmen, sandigen Grasplätzen, an Waldrändern, in Kieferhauen, in der Hügelgegend der

Ebene u. d. Vorgeb. Um Br. bei *Goldschmiede, Lissa, Arnolds Mühl, Herrnprotsch, Mahlen, im Kieferwalde vor Kottwitz b. Ohlau. Am Geiersb. Hartheb. b. Frankenstein, Klitschdorfer Haide bei Bunzlau. Breslau und Zöbelwitz bei Beuthen. Berge um Striegau, Hohenfriedeberg, Hirschberg, Malapane, Leobschütz, Trop. Mai 2.*

Den vorigen ähnlich. Die Blättchen sind bis unter die Mitte gesägt, in der Jugend zusammengefallen, mit weichen Haaren. Die Blumenstiele lang und fädlich. Im feuchten Moose sind die Bltt. fast kahl, an sonnigen Stellen von dichten Haaren grau. Kronen satt-goldgelb. — Unsere schlesische *P. patula*, von *Leobschütz*, W. et Gr. Fl. sil. ist eine Modification dieser Art; ob auch die ungarische?

P. salisburgensis L. Stängel aufsteigend, haarig; Bltt. 5zählig, Blättchen verkehrt-eif., kahl, am Rande und unterseits an den Nerven haarig, stumpf-gezähnt.

Auf steinigen Berggipfeln. Auf dem Gipfel der *Babia-Gora*. Juli. 2.

Von 2 - 6'' H. Die Bltt. etwas dick, fast lederartig. Kronenbltt. safrangelb, am Gr. mit dunkel-orangefarbenen Flecken, wie häufig auch bei den drei vorhergehenden.

P. aurea L. Stängel aus bogenförmigem Grunde aufrecht, mit angedrückten Haaren besetzt; Bltt. fünfzählig, Blättchen länglich kahl, am Rande und an den Nerven unterseits mit silberglänzendem Seidenhaar besetzt, an der Spitze scharf gesägt.

Auf den Triften und Wiesen der Hochgebirgskämme, auch zwischen dem Steingerölle der Kuppen, hin und wieder bis in das Thal herabsteigend. Auf dem *Riesengebirge* sehr verbreitet. Auf dem Gipfel des *Gl. Schneeberges*. Kämme des *Gesenkes*, am *Hockschar. Köpernick, Altvater, Janowitz Haide, Kessel. Babia-Gora*. Juni, Juli. 2.

H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Der Rand der Blättchen bildet einen Bogen, und die Zähne neigen sich gegen einander. Kronen gross, tief-goldgelb mit orangefarbenem Grundfleck.

b. Erdbeerartige. Behaarte Früchte, rauhaariger Fruchtboden.

P. alba L. *Weisses F.* Stängel aufsteigend, armlüthig; Blätter fünfzählig, Blättchen länglich, a. d. Spitze gesägt mit gegeneinander geneigten Zähnen, unterseits und am Rande silberglänzend-seidenhaarig.

In trocknen Laubwäldern, auf Waldwiesen, an belaubten Hügellehnen, in der Hügelregion der Ebene und im Vorgeb. zerstreut. Um Br. bei *Lissa* und im Walde zwischen *Tschechnitz u. Kottwitz. Am Geiersberge u. Hartheb b. Frankenstein. Grosstein b. Oppeln. Radosch b. Gnadenberg. Leobschütz*. Mai. 2.

H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Bltt. zierlich, auf langen Stielen, so lang als die Blütenstängel, oberseits dunkelgrün und mit schwachem Feitreif. Kronen gross, weiss.

Cómarum L. *Blutauge*. Kelch flach mit fünfspaltigem Saum und fünf kleineren Deckblättchen zwischen den Zipfeln. Griffel abfällig. Nüsschen zahlreich auf einem anschwellenden schwammigen bleibenden Fruchtboden. XII, 5.

Kelch gefärbt, Krone blutroth, Bltt. gefiedert.

C. palustre L. Bltt. zu fünf gefiedert.

Auf sumpfigen Moor- und Torfwiesen, in der Ebene und dem Vorgeb. ziemlich verbreitet. Um *Riemberg u. Wohlau. Militsch* nach *Matt. Garsuche b. Ohlau. Schlawa b. Beuthen a. O.* Um *Bunzlau b. Guadenberg u. m.* In *O. S. um Königshuld, Falkenberg u. a.* Auf dem *gr. See an der Heuscheuer. Olbersdorf u. Endersdorf bei Troppau.* Juni, Juli. 2.

Der kriechende Wurzelstock geht in einen aufsteigenden fusslangen Stängel über. Bltt. gestielt; Blättchen elliptisch-lanzettlich, lederartig, oberseits kahl und dunkelgrün, unterseits weissgrün mit angedrückten Haaren, scharfgesägt. Kelchzipfel eig. langspitzig, innen schmutzig blutroth. Eben so gefärbt die dreimal kürzeren Kronenbltt., die Staubgef. und Griffel.

Geum L. Nelkenwurz. Kelch flach- oder stark-gewölbt mit fünfspaltigem Saum und fünf kleineren Deckblättchen zwischen den Zipfeln. Nüsschen zahlreich auf walzenförmig sich erhebendem trockenem Fruchtboden von den stehenbleibenden Griffeln gekrönt. XII, 5.

Blätter leierförmig. Starker Wurzelstock.

a. mehrblumige; die Narbe durch ein Gelenk an den Griffel gefügt.

G. urbanum L. Benedictenwurz. Blumen aufrecht; Kronenbltt. verkehrt eig. söhlig; Kelch an der Frucht zurückgeschlagen; der untere Theil des Griffels am Gr. feinhaarig, viermal länger als der obere.

In Hainen und Gebüsch, an Herken und Zäunen, Mauern und Gärten, d. d. g. G., auch im Vorgeb., häufig. Juli. Aug. 2.

Wurzelstock kegelfg., schief, abgeissen. Stängel 1-1½' h., oben in weitabstehende Aeste zerfallend. Wurzelbltt. leierfg.-gefiedert, mit sehr grossem Endblatte und eingeschnitten gesägten Zipfeln; Stängelbltt. meist gedreit, oder dreispaltig. Kronenbltt. gelb, so lang oder kürzer als der Kelch. — Die Wurzel hat bittere nebst gerbestoffigen u. ätherischen Bestandtheilen, früher als *Rad. Caryophyllatae* in hohem Ansehn.

× **G. intermedium Ehrhart.** Blumen aufrecht und übergeneigt; Kronenbltt. rundlich mit kurzem Nagel, söhlig; Kelch an der Frucht abstehend; das untere Glied des Griffels behaart, viermal länger als das an seinem Grunde haarige obere.

In feuchtem Gebüsch, bisher nur im Walde bei *Arnoldsmühl* von Schummel entdeckt. Mai. 2.

Diese Art ist ein vollständiges Mittelding, u. wahrscheinlich ein Bastard, zwischen der vorhergehenden und folgenden, und man findet an angezeigten Standorte Exemplare, welche sich mehr dem *G. urbanum* nähern, so wie andere, welche dem *G. rivale* sehr nahe stehen. Die Kronenbltt. sind gelb, bisweilen auch rothgelb u. im letzteren Falle auch der Kelch braunroth angelaufen. Im Garten hielt sie sich durch mehrere Jahre unverändert.

C. rivale L. Blumen nickend; Kronenbltt. schaufelfg. mit langem linealischen Nagel, aufrecht; Kelch stets aufrecht; das untere am Gr. haarige Glied des Griffels eben so lang als das zottige obere.

An sumpfigen und wasserreichen Stellen in Wäldern und Vorhölzern, auf nassen Waldwiesen, in Erlenbrüchen, bis in das Hochgeb., d. d. g. G. häufig. Um Br. bei *Bischwitz a. W.*, *Wildschütz, Lissa u. m. Kesselgrube im Riesengeb.*, *Kessel im Gesenke*. April, Mai. 2.

H. 1'. Die Blättchen und Zipfel mehr genähert und weniger spitz als an *G. urbanum*. Kelch aussen braunroth. Kronenblt. vom geschlossenen Kelche verdeckt rothgelb oder blassgelb mit rosaf. Anhauch. — Nicht selten findet man eine Missbildung, indem der Kelch in grüne Bltt. verwandelt ist, welche zahlreiche verkehrt-eiförmige am Vorderende gezähnte gelblich-purpurfarbene Kronenblt. umgeben: diese ist *Aemone dodecaphylla* Krock sil. 2. t. 20.

× *G. pyrenaicum* Ramond. Blumen nickend; Kronenblt. rundlich mit kurzem Nagel; Kelch halb offen; Griffel zottig, das untere Glied doppelt so lang als das obere.

An Gebirgslehnen. Bisher nur an einigen Abhängen im *Riesengeb.*, namentlich am *Brunnenberge* von Tausch entdeckt, u. als *G. sudeticum* beschrieben. Juni. 2.

Stängel 1' h., 2-4blumig. Blumen grösser als an der vorigen, halboffen mit grünlich-braunrothen Kelchen. Diese Art scheint ein Bastard zwischen *G. rivale* und *G. montanum* zu sein.

b. einblumige; Griffel ohne Gelenk.

G. montanum L. *Berg-Benedictenwurz*. Stängel einblumig, ohne Ausläufer; Bltt. unterbrochen-gefiedert und leierförmig, der Endzipfel sehr gross mit stumpfen Lappen.

Auf Triften und zwischen den Steinen der Hochgebirgskämme. Nur im *Riesengebirge*, und daselbst sehr verbreitet und bis 3800' herabsteigend; und auf der *Babia Gora*. Mai, Juni. 2.

Wurzelblt. fast rosettenfg., mit schimmernden Haaren. Stängel einblumig, nur am Gr. mit wenigen Bltt. besetzt, $\frac{1}{2}$ ' später 1' h. Kelch grün, flach. Kronenblt. herzförmig-kreisrund, mit sehr kurzem Nagel, orangehell.

Agrimonia L. *Odermenig*. Kelch birnförmig, gefurcht, am Saum mit hakenförmigen an der Frucht vergrösserten Stachelborsten. Zwei vom verhärteten und durch die gegeneinander geneigten Saumlappen geschlossenen Kelche eingeschlossene Nüsschen. XI, 2.

A. Eupatorium L. Kelche bei der Fruchtreife verkehrt-kegelf. von oben bis unten tief gefurcht.

Auf Grasplätzen, trocknen Dämmen u. buschigen Hügeln. Um Br. besonders häufig in der Nähe der *Oder*. Sonst d. d. g. G. bis in das Vorgeb., doch nicht überall häufig. Juni—Aug. 2.

Stängel aufrecht, einfach, 1-2' h. Bltt. unten einander genähert, unterbrochen-gefiedert; Blättchen eig., unterseits grau-haarig. Kronenblt. eig., goldgelb. Blumen in endständiger Aehre. — Diese Sippe weicht im Character von den vorhergehenden bedeutend ab; die Hakenborsten am Kelchsaum vertreten die Stellen der Deckblt. War ehemals officinell.

Sanguisorbeae Lindley.

Kelch dauernd; Röhre an der Spitze zusammengezogen, Saum 3-5spaltig, mit klappiger Knospenlage. Krone fehlt. Staubgef. zwischen den Kelchzipfeln, oder weniger, oder unbestimmt viele, am Kelchschlund entspringend. Fruchtknoten 1, 2 oder 4, mit je einem Ei. Nüsse 1, 2 oder 4, trocken, von der verhärteten und am Rande zusammengezogenen Kelchröhre eingeschlossen. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Kräuter mit Stützbltt., mit gelappten oder gefiederten Bltt., bisweilen polygamisch.

Alchemilla L. *Sinai*. Kelch glockig, mit vierspaltigem Saum und vier kleineren Deckbltt. zwischen den Zipfeln. Vier Staubgef. zwischen den Kelchzipfeln. Griffel seitlich. Narbe köpfförmig. Ein Nüsschen. IV, 1.

Bltt. kreisfg., gelappt. Blumen klein, grün, in Doldentrauben.

A. vulgaris L. Wurzelbltt. nierenfg. kreisrund, in 7 — 9 ein Drittel der Blattlänge erreichende rundherum gesägte Lappen gespalten.

α. glabrata. Fast kahl und sattgrün.

β. pubescens. Durchaus weichhaarig und gelbgrün.

γ. subsericea. Bltt. mit langem seidenartigem Haar bekleidet.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen, an den Rändern der Quellen und Bäche im ganzen Vor- und Hochgeb., doch auch an vielen Stellen der Ebene. Um Br. bei *Marienu*, *Kl. Tschansch*, *Lissa*, *Domatschine*, *Guhwitz*. Um *Ohlau*, *Wohlau*, *Bunzlau* u. *Oppeln*. Bis auf den Gipfel der *Schneekoppe* u. *Babia Gora*. *α.* vorzüglich in den Gründen des *Riesengeb.* Mai. Juli. 2.

Schiefer Wurzelstock, mit einem oder mehreren am Gr. liegenden, dann aufsteigenden Stängeln. Bltt. gestielt; am Gr. der Stiele 2 verwachsene gesägte Stützbltt. Bltt. anfänglich gefaltet; die Berührungswinkel der Lappen sind spitz. Bltt. grünlichgelb. Die behaarten Formen sind die gewöhnlichen. Kraut und Wurzel sind adstringierend und waren officinell.

A. fissa Schumml. Wurzelbltt. nierenfg.-kreisrund, in 7-9 die Mitte der Blätter erreichende oben gesägte unten ganzrandige Lappen getheilt.

In den Gründen und Schluchten des *Riesengebirges* an quelligen Stellen und Bächen, namentlich in den *Schnee gruben*, *am kl. Teiche*, *in Melzergrunde*. Juli. 2.

Der vorigen sehr ähnlich. Stängel mehr aufrecht, 1' h. Kahl und von dunklerem Grün. Die Berührungswinkel der Lappen sind buchtig-gerundet.

Aphanes L. *Ohmkraut*. Kelch glockig mit vierspaltigem Saum und vier sehr kleinen oder undeutlichen Deckblätt-

chen zwischen den Kelchzipfeln. Ein Staubgefäß hinter einem der Kelchzipfel. Griffel seitlich. Narbe kopfförmig. Ein Nüsschen. IV, 2.

Blumen winkelständig in Knäueln, grünlich.

A. arvensis L. *Alchemilla* Aph. W. et Gr. sil. Blätter handfg. dreispaltig.

Auf trocknen und sandigen Aeckern u. Brachen in der Ebene und d. Vorgeb. Um Br. bei *Carlowitz*, *Mahlen*, *Wildschütz*, *Lissa* u. *m. Ohlau*, *Wohlau*, *Bunzlau*, *Oppeln*. *Hirschberg*. *Kunzendorf bei Neurode*. Juni, Juli. ☉.

Stängel 1 - 3' lang, niederliegend oder schief ansteigend. Bltt. am Gr. keilfg. von seidenartigen Haaren grau.

Sanguisorba L. *Wiesenknopf*. Kelchröhre viereckig; Saum viertheilig mit drei Deckblättchen. Vier Staubgef. hinter den Kelchzipfeln. Griffel endständig. Narbe pinselförmig. Ein oder 2 Nüsschen. IV, 1.

Blumen in Köpfen. Bltt. gefiedert.

S. officinalis L. Kopfförmige eirund-längliche Aehren.

Auf fruchtbaren etwas feuchten oder nassen Wiesen, besond. in Waldgegenden, in der Ebene u. d. Vorgeb., d. d. g. G., häufig. Juli, August. ♀.

Schlank, bis 3' h., oben ästig mit langen Blütenstielen. Bltt. gefiedert; Blättchen länglich, sähnig-gesägt. Die Stützbltt. fehlen meist. Kelchzipfel braunroth. Die Wurzel ist adstringirend und war als *R. Pimpinellae italicae* officinell.

Potérium L. *Becherblume*. Kelchsaum viertheilig; am Gr. der Röhre 2 - 3 Deckblättchen. Zwanzig - dreissig Staubgef. Griffel endständig. Narbe pinselfg. Zwei oder drei Nüsschen vom verhärteten Kelche eingeschlossen. XXI, 8.

Blumen in Köpfen, Bltt. gefiedert.

P. Sanguisorba L. Krautig, Kelchröhre bei der Fruchtreife beinhart, mit vier stumpfen Winkeln.

Auf trocknen Hügeln und hohen Wegrändern, an sonnigen und steinigen Rainen, im Vorgebirge, an einigen Stellen noch in der Ebene. *Herrnrotschelnitz b. Wohlau*. Am breiten Berge bei *Striegau*. *Gröditzberg*. *Nimptsch*. *Fürstenstein*. *Wartha*. *Neisse*. *Reinerz*. *Wünschelburg*. *Charlottenbrunn*. *Kupferberg*. *Hirschberg*. *Tropp*. Te. Juni, Juli. ♀.

Stängel aufsteigend oder aufrecht, 1 - 2' h. Blättchen rundlich, grobgesägt, hell- oder seegrün. Kelchsaum grünlich-purpurfarben. Narbe purpurroth. Gewöhnlich sind die Blumen in jedem Blütenkopf polygamisch. Das Kraut, sonst als *Hb. Pimpinellae italicae* officinell, hat einen erfrischenden Boretsch-Geruch.

Spiraeaceae Bartling.

Kelchsaum fünfspaltig ohne Deckblätter, mit dachziegel-förmiger Knospenlage. Fünf Kronenbltt. zwischen den Kelchzipfeln, am Kelchschlund eingefügt. Staubgef. ebenda entspringend, in unbestimmter Anzahl. Fünf freie oder verbundene Fruchtknoten, mit je mehreren Eichen, und je einem Griffel aus der Spitze. Trockne freie Schlauchfrüchte, gewöhnlich fünf, an der inneren Nath aufspringend, mit wenigen oder je einem Samen, ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Sträucher oder Stauden, ohne Dornen oder Stacheln, mit oder ohne Stützbltt., mit schwachem Blausäure-Gehalt.

Spiraea L. *Geisbart*. Drei bis fünf schlauchförmige Kapseln mit je 2-6 Samen. XII, 5.

† *Sp. salicifolia* L. Strauch; Bltt. länglich-lanzettlich, ungleich gesägt; Blättchen in endständigen dichten Trauben.

An Hecken und Gebüsch, besonders an Flussufern, in manchen Gegenden des Vorgeb. häufig verwildert, z. B. in *Gablau am Sattelwalde*, um *Schönau*, *Hirschberg*, *Bunzlau bei Krauschen*, *Thomaswaldau*, *Tiefenfurth*, im *Klessengrunde am Schneeberge*. Ob diese häufig kultivirte Art bei uns wirklich wild sei, ist fast zu bezweifeln. Juni, Juli. ♀.

H. 4-5'. Gelbbraune aufrechte Aeste. Kronenbltt. fleisch- und rosafarben.

Sp. Aruncus L. *Geisbart*. Staude; Bltt. fiederig-mehrfach-zusammengesetzt; Rispe aus ährigen Aesten zusammengesetzt; Stempelblüthen und Staubgefässblüthen getrennt.

In feuchten Wäldern, an Flussufern und Bächen im Vorgeb.. Am *Zobten b. Silsterwitz*. *Schlesierthal*. *Fürstenstein*. *Hohe Mense*. *Schneeberg*. *Sauerwitz b. Leobschütz*. Im *Gesenke bei Carlsbrunn*, *Ludwigsthal*, am *Leiterberge*. *Herlitz*, *Stiebrowitz b. Tropp*. An der *Weichsel* in *Oberweichsel*. Juni, Juli. ♀.

Stängel krautig, am Gr. fast holzig, 3-4' h. Bltt. untere dreifach, obere doppelt-gefiedert; Blättchen eig.-länglich, eingeschnitten-gesägt. Kronen gelblich-weiss.

Sp. Ulmaria L. *Mädesüss*. Bltt. unterbrochen-gefiedert, Blättchen eig. ungetheilt, das endständige dreilappig; Blüthen doldentraubig; Früchte sichelförmig, kahl.

α. Bltt. unterseits kahl, grün oder graugrün.

β. Bltt. unterseits grau- oder weissfilzig.

In feuchten Gebüsch, an Gräben, Ufern von Bächen und Teichen zwischen Schilf und Gestrüpp, auf sumpfigen Waldwiesen, in der Ebene und d. g. Vorgebirge sehr häufig und allgemein verbreitet. Juni, Juli. ♀.

Stängel kantig, 2-4' h., einfach. Einige Stiele der Doldentraube verlängern sich über die anderen Blumen und tragen selbst wieder eine kleinere Doldentraube. Blumen

weisslich von schwachem süslichem Wohlgeruch. Das Kraut ist adstringierend u. die Wurzel war als *R. Barbae caprinae* officinell. In Gärten mit röthlichen u. gefüllten Blumen.

Sp. Filipendula L. Haarstrang. Tropfquarz. Bltt. unterbrochen-gesiedert; Blättchen länglich, fiederspaltig-eingeschnitten, mit gesägten Lappen; Blättchen in Doldentrauben; Früchte gerade feinhaarig.

Auf Wiesen und Triften, an Rainen und Dämmen d. d. g. G. häufig. Juni, Juli, 2.

Die Wurzelfasern verdicken sich zu Knollen, deren oft mehrere an einander hängen. Stängel aufrecht, einfach, 1-2' h. Doldentraube wie bei der vorigen. Kronenblt. weiss, selten röthlich, in Gärten auch gefüllt. Die Wurzelknollen riechen angenehm, enthalten eisenbläuenden Gerbstoff, sind essbar. Blumen riechen süslich u. schmecken nach bitterm Mandeln.

Amygdaleae Jussieu.

Kelchsaum fünfspaltig, mit dachziegelförmiger Knospenlage. Fünf Kronenblätter aus dem Kelchschlunde mit gedrehter Knospenlage. Staubgef. etwa 20, frei, aus dem Kelchschlunde entspringend. Fruchtknote frei, einfächerig mit 2 hängenden Eichen; Griffel aus dessen Spitze. Frucht eine einsamige Pflaume mit beinhartem, zweiklappigem aber stets geschlossenem Kern und einem oder 2 Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim und fleischigen Keimblättern.

Bäume oder Sträucher mit wechselständigen, ungetheilten Bltt., abfälligen Stützblt. und reichem Gehalt an Blausäure.

Prunus L. Frucht eine saftige nicht aufspringende Pflaume mit glattem oder gefurchtem Kern. XII, 1.

Kronen weiss.

Pr. spinosa L. Schlehen. Blütenknospen mit je einer Blume Blumenstiele kahl; Zweige weichhaarig; Bltt. elliptisch; Pflaumen kugelig, aufrecht.

β. coactanea. Die Bltt. brechen mit den Blüten hervor.

In Gebüsch, an Waldrändern, Dämmen, an Wegen, d. d. g. G., bis in das Vorgeb. häufig. April, Mai. 2.

Strauch, mit grau- u. blau-schwarzer Rinde; die Aeste häufig in blattlose stehende Spitzen endigend. Pflaumen bereift, mit wenigem Fleische von herb-zusammenziehendem Geschmack. Blüten von schwachem Wohlgeruch, als Theeaufguss ein beliebtes Hausmittel. Officinell waren der eingedickte Saft der Früchte *Succus* und die *Flores Aca-*
ciae nostrae.

***P. insititia L. Kriecheln.** Blütenknospen mit je 2 Blumen; Blumenstiele weichhaarig; Zweige kahl; Bltt. elliptisch; Früchte kugelig überhängend.

Wird angebaut und findet sich hie u. da verwildert. Apr. Mai. $\frac{1}{2}$.

Niedriger Baum. Die Früchte dunkelviolett, bereift, 2 - 3mal so gross als die der vorigen, mit süsslich-säuerlichem Fleisch. Viele Cultur-Varietäten.

* *P. domestica* L. *Pflaume*. Blütenknospen mit je 2 Blumen; Blumenstiele weichhaarig; Zweige kahl; Bltt. elliptisch; Früchte länglich hängend.

Wird allgemein angebaut. Mai. $\frac{1}{2}$.

Mässiger Baum, bei uns stets krüppelig. Kronenbltt. wässerig-weiss. Früchte bereift. Viele Cultur-Varietäten.

† *P. avium* L. *Vogelkirsche*. *Süsskirsche*. Blumen in Schirmen; die Schuppen der Blütenknospen blattlos; Bltt. schwachrunzlig unterseits weichhaarig; Blattstiel mit zwei Drüsen; Wurzel ohne Ausläufer.

An Hecken und Zäunen der Dörfer, auch an Waldrändern und buschigten Dämmen verwildert, ausserdem in vielen Varietäten cultivirt. Wird zwar schon von Matt. als einheimisch betrachtet, mag aber doch wohl nicht ursprünglich wild sein. April, Mai. $\frac{1}{2}$.

Als Baum und Strauch. Früchte kugelig, röthlich. Von dieser Art stammen die kultivirten süssen Kirschenarten ab.

* *P. Cerasus* L. *Sauerkirsche*. Blumen in Schirmen; die inneren Schuppen der Blütenknospen an der Spitze blatttragend; Blätter glatt, glänzend, fast lederartig; Blattstiele ohne Drüsen; Wurzel mit Ausläufern.

Wird häufig angebaut und ist wahrscheinlich so wenig bei uns ursprünglich wild als die vorige. Mai. $\frac{1}{2}$.

Baum mit hängenden gertenartigen Zweigen. Früchte kugelig, röthlich. Von dieser Art stammen die kultivirten sauern Kirschen oder Weichseln. Auch giebt es Bastarde zwischen beiden. — Die Kirschen sind eine gesunde Frucht, die sauern kühlend, die süssen nährend. Kirschwasser u. Kirschsyrup sind officinell. Die Blätter werden als Thee benutzt und unter den Tabak gemengt.

P. Padus L. *Ahlkirsche*. Blumen in hängenden Trauben.

In feuchten Gebüsch und tieferen Wäldern, an Flussufern, bis in d. Vorgeb. nicht selten, sehr häufig angebaut. Mai. $\frac{1}{2}$.

Strauch- und baumartig, oft sehr hoch. Bltt. elliptisch, gesägt, weich und schwachrunzlig, brechen zeitig hervor. Blüten stark u. wohlriechend, doch betäubend. Pflaume schwarz, sehr herb, mit runzlichem Kern. Die Rinde ist adstringirend und enthält viel Blausäure.

An mkg. Ausserdem werden häufig angebaut *Persica vulgaris* Miller, die Pfirsiche, *Prunus Armeniaca* L. die Aprikose, *Pr. virginiana* in Parkanlagen, dem *Pr. Padus* sehr ähnlich, *Pr. Mahaleb*, wovon die bekannten Weichselröhre kommen.

Papilionaceae Linn.

Kelch fünfzählig, meist zweilippig; Oberlippe aus zwei, Unterlippe aus drei Blättchen, wovon das unpaare von der

Blüthenaxe abgewandt ist. Fünf Kronenblätter aus dem Grunde der Kelchröhre; das unpaare, oder die Fahne, ist der Blüthenaxe zugewandt, und umfasst in der Knospe die übrigen; die seitlichen, Flügel, decken mit ihrem Vorderrande die folgenden; die vorderen, Kiel genannt, sind am Gr. frei, mit den Platten gewöhnlich verwachsen. Staubgefässe meist vom Kiel verdeckt, entspringen aus dem Grunde der Kelchröhre: zehn; die Staubfäden selten frei, meist die 9 vorderen in eine häutige Scheide verwachsen, der zehnte hintere frei, oder alle in ein einziges oder in mehrere Bündel verwachsen. Fruchtknote frei einfächerig mit mehreren Eichen am inneren Winkel. Griffel aufsteigend. Frucht eine Hülse, nämlich ein in zwei Klappen sich öffnender ein- oder mehrsamiger Schlauch, selten ein einsamiges Nüsschen, oder eine Gliederhülse. Samen ohne Eiweiss mit gekrümmtem Keim und anliegenden fleischlgen oder mehltreichen Keimblättern.

Kräuter oder Stauden, auch Sträucher, mit wechselständigen, meist zusammengesetzten, d. h. gedreiten oder gefiederten Bltt.; und mit dem Blattstiel verwachsenen Stützbltt. Die Bltt. der meisten zeigen Erscheinungen der Reizbarkeit. Viele wichtige Nahrungs- und Arzneistoffe; Schleim, Stärkmehl und Zucker, gummihaltige Säfte, Farbstoffe, harzig-balsamische und drastische Bestandtheile. Durch zierliche Gestalt und bunte Blumen schmücken sie Wiesen, Wald und Aecker. Einige sind weit verbreitet und sehr zahlreich; mehrere vereinzelt; wenige im Hochgebirge. Sämmtliche bei uns heimische gehören bei Linné zu XVII, 2.

1. *Loteae.* Hülse ungegliedert, einfächerig oder der Länge nach zweifächerig. Die Keimblätter kommen über die Erde und färben sich grün.

a. Staubfäden sämmtlich in ein Bündel verwachsen.

Sarothamnus Wimmer Fl. v. Schles. *Pfriemen.* Kelch zweilippig. Fahne fast kreisrund. Kiel sehr stumpf, später niedergebogen und die Staubgef. freilassend. Griffel schneckenförmig-gewunden. Narbe klein kopfförmig.

S. vulgaris Wimm. *S. scoparius* Koch *Synops.* *Spartium scoparium.* *L. Besenstrauch.* Aeste ruthenförmig; Bltt. gedreit; Blumen winkelständig.

Auf Sandboden in Kieferwäldern und Haiden, meist gesellschaftlich, oft grosse Strecken bekleidend, in der Ebene und d. Vorgeb. zerstreut. Um *Br. bei Oswitz u. Leipe, Lissa, Riemberg, Heidewilxen.* Um *Ohlau, Wohlau, Beuthen, Bunzlau, Charlottenbrunn.* In *O. S.* häufig um *Oppeln, Falkenberg, Leobschütz, Neustadt, Zuckmantel, Jägerdorf, Grätz.* Mai, Juni. ♀.

Strauch von 2 - 4' H., dessen ruthenförmige grüne starre Aeste im Herbst bis auf den unteren Holzigen Theil absterben. Blättchen verkehrt eig., seidenhaarig. Krone gross, goldgelb. Hülse platt, am B. zottig. Die Aeste werden zu Besen benutzt. Die Rinde ist bitter und gerbestoffhaltig, und die Asche enthält viel Kali. — Der Trivialname *scoparius* konnte nicht beibehalten werden, da er dasselbe bezeichnet, was der gewählte generische Name besagt.

Genista L. Ginster. Kelch zweilippig. Fahne länglich-eifg. Kiel später niedergebogen, die Staubgef. nicht ganz einschliessend, stumpf. Griffel pfriemlich, aufsteigend. Narbe schief, nach innen gebogen.

Kronen gelb. Bltt. einfach.

G. tinctoria L. Färberginst. Stängel aufsteigend, ohne Dornen, oberhalb feinhaarig; Blumen in endständigen Trauben.

Auf trocknen Wiesen und Hügeln, an Waldrändern, in Haiden, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb., gesellschaftlich. Juni, Juli. h.

Stängel am Gr. verholzend, 1 - 2' h. Aeste stielrund. Bltt. länglich oder lanzettlich; breiter oder schmaler, kahl, am B. feinhaarig. Hülsen kahl. Die Blüten enthalten einen gelben Farbestoff und die Samen sind bitter und purgirend. Die Spitzen, *Summitates G. t.* sind officinell.

G. germanica L. Stängel dornig, am Gr. blattlos, oben ästig; Blumen in endständigen Trauben.

Auf trocknen Hügeln, in Nadelholzwäldern und Haiden, in der Hügelgegend der Ebene und im Vorgeb. zerstreut und vereinzelt, aber d. d. g. G. Um *Br.* zwischen *Tschechnitz* und *Kottwitz*. *Mariencranst. P. Tarnau b. Beuthen. Klitschdorf* und *Thomaswaldau b. Bunzlau. Zobtenberg. Rummelsberg. Kosemitzer B. Schobergrund b. Nimptsch. Hartheb. b. Frankenstein. Oppeln, Malapane, Kreuzburg, Leobschütz.* Häufig um *Troppau.* Juni, Juli. h.

II. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ '. Bltt. elliptisch, beiderseits haarig. Deckbltt. pfriemlich, kürzer als der Blumenstiel. Hülsen haarig-zottig.

G. pilosa L. Stängel niederliegend, ohne Dornen; Aeste haarig; Blumen seitlich von einem Blattbüschel umgeben; Fahne und Kiel seidenhaarig.

In sandigen Kieferwäldern. *Zeche und Klitschdorfer-Haide b. Bunzlau n. Schn. Rückerts u. Reinerz.* In *O. S. um Rosenberg, Oppeln, Kreuzburg, Kieferstädtel, Jacobswalde. Tschirn b. Troppau. Wendrin b. Te. n. Kotschy.* Juni, Juli. h.

Stäng. meist fusslang. Bltt. klein, länglich-lanzettlich, dunkelgrün, unterseits auch beiderseits grau-seidenhaarig.

Anmkg. Nach v. Mückusch soll *G. anglica* bei *Wüstpohlomb* nächst *Troppau* wachsen, wo wir die Pflanze vergeblich gesucht haben.

Cytisus L. Geisklee. Kelch zweilippig. Fahne eifg, Kiel sehr stumpf, die Staubgef. einschliessend. Griffel pfriemlich aufsteigend; Narbe schief nach aussen gebogen.

Kronen gelb. Bltt. gedreit.

C. Laburnum L. Goldregen. Kelchröhre kurz, Narbe gewimpert; Blumen in seitlichen hängenden Trauben.

Wächst in Krain und der Schweiz und wird bei uns in Gärten und Parkanlagen cultivirt. Mai. h.

In Gärten oft mit buchtig-ausgeschweiften Blättchen.

C. nigricans L. Kelchröhre kurz, Narbe gewimpert; Blumen in endständigen aufrechten Trauben.

In Haiden und trocknen Kieferwäldern im nordwestlichen und südöstlichen Theile d. G., meist gesellschaftlich. *Lüben, Bunzlau b. Klein Zeche* und in der *Klitschdorfer Heide, Sprottau. Ob. S.* um *Kreuzburg, Oppeln, Rosenberg, Leobschütz. Troppau b. Herlitz, Grätz und Jägerndorf.* Juni, Juli. h.

Stranch von 2 - 4' H. Die Zweige, Kelche und Halsen von seidenartigem Ueberzuge weissgrau. Lange Blüthenähren; Blumen ohne Deckblatt.

C. capitatus Jacquin. Kelchröhre walzig, mit Deckblättchen, Narbe kahl; Blumen in kopfförmigen Schirmen; Aeste fast aufrecht, rauhaarig.

In trocknen und lichten Birkengehölzen, Kieferwäldern, in Haiden, stets auf sandigem Grunde zerstreut. Um *Br. bei Lissa. Ohlau.* Hin und wieder im Vorgeb. um *Silsterwitz, Reinerz u. m. Oppeln, Leobschütz, Troppau.* Juni — Aug. h.

H. 1 - 1½'. Schmutzig-dunkelgrün. Blüthen in einem kopfförmigen Schirm endständig, bisweilen mit einigen seitlichen in den nächsten Blattwinkeln; auch die Nebenäste tragen an d. Sp. in den Blattwinkeln einzelne Blumen. Aeste, Bltt. u. Kelche von abstehenden Haaren rauh. Die Kronen gelb, mit der Zeit innen rothgelb.

C. biflorus l'Heritier. C. supinus W. et Gr. Fl. sil. Kelchröhre walzig mit Deckblättchen; Narbe kahl; Blumen seitlich gepaart in den Blattwinkeln; Stängel gestreckt, Aeste aufsteigend.

In Kieferwäldern im Moose. *Grüntanne und Weinberg b. Ohlau. Rückerts bei Reinerz.* Um *Oppeln b. Wienow, Wandwitz, Bladen, Bauerwitz, Troppau.* Juni—Aug. h.

Stängel fusslang. Kelche seidenhaarig-grau oder silberweiss. Blätter und Blüthen kleiner als an der vorigen.

Onónis L. Hauhechel. Kelch fast gleichmässig fünfspaltig, bleibend. Fahne breit, gestreift. Kiel in einen spitzen Schnabel endigend. Hülsen angeschwollen.

Bltt. theils gedreit, theils einzeln mit grossen Stützbltt.

O. hircina Jacquin. O. arvensis Matt. Weibekrieg. Stängel zottig; Blättchen elliptisch, spitz; Blüthen gepaart in den Blattwinkeln, bis an die Spitze der Aeste eine gedrungene Aehre darstellend.

Auf Grasplätzen an Wegen und Grabenrändern, auf Wiesen besond. im nördlichen und westlichen Theile des Gebiets, und hie und da häufig. Um *Br. b. Cawallen u. Schwoitsch, Gräbschen, Höfchen, Lambsfeld;* an den Landstrassen nach *Ohlau u. Trebnitz.* Um

Wohlau, Bunzlau bis gegen Hirschberg. In O. S. selten oder vielleicht gar nicht. **Zattig u. Zossen b. Tropp. u. b. Te.** Juli, Aug. 2.

Stängel 1 - 1½' lang, aufsteigend; zottig und drüsig, meist schmutzig-roth, von unten ästig. Bltt. gesägt, theils mit, theils ohne Drüsen auf den Flächen. Kronen rosa-purpurn. Samen fein gekörnt, meist zu zwei. Verbreitet einen unangenehmen Geruch. — Man findet eine Form mit mehr niederliegenden Stängeln, deren Aeste an der Spitze in Dornen endigen, und mit einzelnen Blumen in den Blattwinkeln, welche in W. et Gr. Fl. sil. als *O. procurrens* Wallr. aufgeführt ist. Ob diese eine eigene Art darstellt, oder als Form der vorigen oder der folgenden anzusehen ist, oder ob sie als ein Bindeglied zu betrachten, wodurch *O. hircina* und *O. spinosa* zu einer Art vereinigt würden, ist uns noch zweifelhaft. Wir fanden dergleichen an Wegen zw. *Sulau und Miltisch* und um *Oppeln bei Chroschitz*.

O. spinosa L. Stängel gerade, aufrecht oder schief, in einer oder zwei Längsreihen zottig; Blätter länglich stumpf; Aeste mit Dornen besetzt; Blüten einzeln in den Blattwinkeln.

An Wegen und Ackerrändern, auf unfruchtbaren Feldern und an Flussufern. Schon von Krockner um *Quaritz b. Glogau* gef. Um *Wölfelsdorf n. Seliger*. Häufig in O. S. um *Oppeln, Gnadenfeld, Trop. b. Grätz, u. um Ustron u. Skotschau*. Diese und die vorige Art scheinen nie mit einander vorzukommen. Juli, Aug. 2.

Hat etwas kleinere Bltt. und Blumen als die vorige, und gar keine oder sparsame Drüsen. Nach einigen Autoren sind hier die Hülsen länger als der Kelch, bei der vorigen aber kürzer, was vielleicht kein zuverlässiges Merkmal ist. Die Wurzel ist süßlich-scharf mit bitterem Nachgeschmack und war als *R. Ononidis* officinell.

Anthyllis L. Wundklee. Kelch walzenförmig, kurz fünfzählig, an der Frucht geschlossen und diese einhüllend. Kronenbltt. fast gleich lang. Staubfäden nach oben zu verbreitert.

A. Vulneraria L. Blätter gefiedert, Blättchen ungleich; Blumen in gepaarten endständigen Köpfen.

Auf trocknen Hügeln, an hohen Wegrändern und hügelichen Triften in der Hügelgegend der Ebene und im Vorgeb. Um *Br. b. Kletendorf und Lissa. Riemberg. Wohlau. Malschwitz b. Benthen. Zobten. Wünschelburg. Cudowa. Oppeln. Katscher. Friedek.* Juni, Juli. 2.

Stängel aus bögenförmigem Gr. aufrecht, meist 1' h., behaart. Bltt. unterseits haarig oder zottig; die allerersten einfach länglich, die späteren gefiedert, die Blättchen ungleich, das endständige viel grösser, länglich. Kronen citronengelb. Köpfe von fingerförmig-getheilten Deckbltt. gestützt.

Galega L. Geisraute Kelch glockig, gleichmässig-fünfzählig. Kiel stumpf. Der hintere Staubfaden bis zur Hälfte verwachsen. Hülse linealisch, schief-gestreift.

Bltt. gefiedert.

G. officinalis L. Blättchen lanzettlich stachelspitzig; Blumen in Trauben.

Auf feuchten Waldwiesen, nur im südöstlichen Schlesien, selten. Um *Bojanow b. Ratibor* von Kelch und um *Troppau bei Mellsch* von v. Mückusch gef. Auch zerstreut an der *alt. b. Br. v. Krause*, vielleicht aus Gärten verbreitet. Juni. 2.

Stängel aufrecht, röhrig, ästig, 3-4' h. Bltt. vielpaarig, Blättchen lineal-lanzettlich, bis 2" lang. Fahne blau, Flügel und Kiel weiss. Hülse stielrundlich, schwachwulstig. — *Sensu officinell.*

b. Neun Staubfäden, verwachsen, der stante-tere frei.

Medicago L. Schneckenklee. Kelch fünfzählig, fünfspaltig. Kiel stumpf. Fruchtknoten und Staubfädenröhre bogenförmig aufwärts gekrümmt. Hülse sichelfg. oder schneckenfg. gewunden.

Bltt. gedreit.

M. sativa L. Luzerne. Vielblumige längliche Blüthentrauben; Hülsen in fast drei Kreisen schneckenförmig gewunden.

An grasigen Dämmen, Hügeln, Wegrändern, zerstreut und durch Anbau verwildert. Soll aus Spanien stammen. Juni—Sept. 2.

Stängel 1-2' h., aufrecht. Blättchen länglich-verkehrt eiförmig. Stützbltt. a. Gr. schwachgesägt. Kronen lilaf. oder violett.

M. falcata L. Vielblumige kopfförmige Blüthentrauben; Hülsen sichelförmig.

Auf Grasplätzen, Wiesen, an Ackerrändern und buschigen Dämmen, in der Ebene häufig und meist gesellschaftlich, doch nicht überall. Juli—Sept. 2.

Stängel 1-1½' h., aufsteigend. Blättchen eifg.-länglich. Kronen heller oder dunkler gelb. — Zwischen dieser und der vorigen Art genau in der Mitte, bald der einen, bald der andern näher, steht die *M. media* Persoon, W. et Gr. sil., deren Blüthen anfangs gelblich, dann grün, zuletzt blaulich oder violett sind, und ist als ein wirklicher Bastard, weder als eigene Art noch auch als Abart der *M. falcata* zu bezeichnen.

M. lupulina L. Kleiner Hopfenklee. Vielblumige ovale Aehren; Hülsen nierenfg. an d. Spitze gewunden; Blättchen verkehrt-eiförmig.

Auf Triften, Wiesen und Aeckern, gemein. Mai — Herbst. ☉.

Stängel niederliegend, zoll-fusslang, v. d. Wurzel aus ästig. Bltt. lanzettlich, un-terseits schwach-seidenhaarig. Hülsen kahl oder behaart. Kronen blassgelb.

M. minima Lamarck. *M. polymorpha* η *minima* L. Blumenstiele 1-2-blumig; Hülsen stachlig, schneckenfg.-gewunden; Blättchen verkehrt-eifg.

Auf trocknen Hügeln. Am *Lachnhausberge* von Schneider gef. Juni, Juli. ☉.

Stängel zolllang, niederliegend oder aufrecht. Bltt. weichhaarig. Stützbltt. eifg., feingezähnt. Kronen gelb. Hülsen fast kugelig, mit 5 Windungen, am Bande mit zwei Reihen hakenförmiger Dornen.

Melilótus Tournefort. Steinklee. Kelch glockig fast gleichmässig-fünzfähig. Kiel stumpf. Fruchtknoten gerade. Hülse fast kugelig oder länglich mit Querrunzeln.

Blüthen in Ähren. Bltt. gedreht.

M. dentata Willd. M. Kochiana. W. et Gr. sil. Bltt. wimperig-gezähnt; Nebenblätter kämmig-gezähnt; Flügel so lang wie der Kiel; Hülsen netzaderig-runzlig, 2samig; Samen mit einem Höker.

An Grabenrändern in der Nähe von Dunghaufen. Um *Br.* hinter der *Ohlauer Vorstadt* u. *b. Gräbschen*. Juli. Aug. ☉.

Stängel aufsteigend, 2-3' h. Kronen klein und blassgelb. — Sämmtliche Arten sind schlank mit verlängerten Blütenähren, verkehrt-eiförmigen gezähnten Blättchen und länglichen Samen, und stehen bei Linné unter *Trifolium*.

M. officinalis Willd. Bltt. buchtig-gezähnt; Stützblatt ganzrandig; Flügel so lang wie der Kiel; Hülsen tiefgrubig-runzlich, schief eifg., 1-2-samig; Samen mit Hökern.

In Gestrüchen und Gebüschern, bisher nur von einigen Orten d. Ebene. Um *Br.* zwischen *Kapsdorf* und *Schön-Ellgut*, bei *Wirwitz* und in *Goi* bei *Kapsdorf*. Bei *Katscher* n. *Wenck*. Um *Trop-pau*. Juli, Aug. ☉.

H. 2-4'. Kronen grösser als an der vorigen, gelb. Samen olivengrün. — Die Blumen dieser und der zwei folgenden sind schleimig-bitterlich und von einem scharf-aromatischem Geruche, der von ätherischem Oel und Benzoesäure herrührt, und besonders beim Welken hervortritt. Man gebraucht sie zu Breiumschlägen und als Mischung zum Schnupftabak. Officinell sind die *Flores Meliloti*.

M. Petitpierreana Hayne. Bltt. buchtig-gezähnt; Stützbltt. ganzrandig; Flügel länger als der Kiel; Hülsen oval, querrunzlich, 2samig; Samen ohne Höker.

An trocknen steinigen Plätzen, Weg- und Ackerrändern, auf Brachen und Feldern, an mehreren Orten des Gebiets. Um *Br.* bei der *Hube*, *Gräbschen*, *Pilsnitz* und *Masselwitz* u. m. Um *Beuthen a. O.* *Hirschberg* auf Brachen, *Oppeln*. Juli—Sept. ☉.

Der vorigen durchaus ähnlich. Kronen gelb. Die unteren Bltt. verkehrt eifg., die oberen lanzettlich, welcher Unterschied bei dieser Art am meisten hervortritt. Samen olivengrün.

M. vulgaris Willd. Bltt. buchtig-gezähnt; Stützbltt. ganzrandig; Flügel länger als der Kiel; Hülsen verkehrt-eifg., tiefgrubig-runzlich, einsamig; Samen ohne Höker.

An trocknen und steinigen unfruchtbaren Plätzen, an Wegen, Ackerrändern, Dämmen, d. d. g. G. auch im Vorgebirge, gemein. Juli—Sept. ☉.

Stängel aufrecht. Kronen weiss. Samen braun.

Trifolium L. Klee. Krone mit stumpfem Kiel, nach dem Welken stehenbleibend. Staubläden nach der Spitze et was breiter, am Gr. mit der Krone ein wenig verwachsen. Grif-

fel glatt. Hülse eifg. 1-2samig, oder länglich 3-4samig, vom Kelch oder der welken Krone umschlossen.

Bltt. gedreit. Blumen in kopfförmigen Aehren.

a. Kelchschlund mit einem verdickten Ringe; Hülse vom Kelch umschlossen.

T. ochroleucum L. Kugelige meist von einer Hülle gestützte einzelne Aehren; Kelch feinhaarig, der unpaare Zahn so lang als die Röhre; Stützbltt. lineal-lanzettlich; Blättchen länglich die untersten ausgerandet; Stängel aufrecht oder schwach gebogen, haarig.

In trocknen lichten Gehölzen und Waldwiesen, bisher nur an einigen Stellen der Ebene. Um *Br. bei Lissa* und daselbst zuerst von Schummel entdeckt. *Weistritzthal. Bei D. Tscherbenev. Grosstein bei Oppeln.* Wird auch um *Salzbrunn* angegeben. Juli, Aug. 2.

Stängel 1 - 1½' h., meist in einem Bogen aufgerichtet. Kelch mit 10 Nerven. Kronen weisslich-gelb.

T. pratense L. *Wiesenklee.* Kugelige von einer Hülle gestützte gepaarte Aehren; Kelch feinhaarig mit fädlichen gewimperten Zähnen; Stützblätter eifg. mit pfriemlicher Spitze; Blättchen oval fast ganzrandig; Stängel aufsteigend.

Auf Wiesen, und allgemein angebaut. Mai, Juni. ☉.

H. ½ - 1½'. Kronen purpurf., rosaf., selten weiss. Blättchen weichhaarig. Kelch mit 10 Nerven. Gebaut wird er höher und ästiger. Var. mit röhrigen Stängeln und ausgerandeten Blättchen.

T. medium L. Kugelige einzelne Aehren ohne Hüllen; Kelch kahl, der unpaare Zahn verlängert; Stützbltt. lineal-lanzettlich mit lanzettlicher Spitze; Blättchen elliptisch, feingezähnt; Stängel bogig, weichhaarig.

In lichten Gehölzen und Laubwäldern in der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G., nicht selten. Um *Br. bei Oswitz, Pilsnitz, Schwoitsch u. m.* Juni, Juli. 2.

Stängel 1 - 2' h., meist hin und her gebogen. Blättchen bald breiter, bald schmaler, feinhaarig. Kelch mit 10 Nerven. Kronen dunkel-purpurroth.

T. alpestre L. Kugelige, eingehüllte, meist gepaarte Aehren; Kelch zottig, der unpaare Zahn verlängert; Stützbltt. lanzettlich-pfriemlich; Blättchen länglich-lanzettlich, fein gesägt; Stängel steif aufrecht, ohne Aeste.

Auf trocknen grasigen Waldplätzen in Hügelgegenden, daher bes. im Vorgeb., d. d. g. G., nicht selten. Um *Br. bei Oswitz, Lissa. Kottwitz bei Ohlau. Riemberg. Skarsine etc. Striegauer Berge.* Juni, Juli. 2.

H. 1'. Stängel feinhaarig, selten in der Mitte fast zottig. Bltt. stets lanzettlich. Selten einzelne Aehren. Kelch mit 20 Nerven. Kronen purpurroth.

T. rubens L. *Bergklee.* Länglich-walzige, fast eingehüllte, meist gepaarte Aehren; Kelch kahl, der unpaare Zahn verlängert; Stützblatt lanzettlich gesägt; Blättchen länglich-lanzettlich, feinstachelig-gesägt; Stängel steif-aufrecht, kahl.

Auf hohen trocknen Waldwiesen im Vorgeb., hie und da in der Ebene. Auf dem Mittelbg. b. Zobten, Geiersb., Harthebg., Georgenberg b. Striegau. Pölsnitzer Bg. Weistrizthal. Sakrauer B. b. Oppeln. Füllstein. Gr. Herliz, Saliswald, Jägerndf. und Grätz. Am Tul b. Ustron. Um Br. b. Lissa. Mai, Juni. 2.

Stängel einfach oder ästig, 1 - 2 $\frac{1}{2}$ ' h., Bltt. kahl. Kelch mit 20 Nerven, Zähne langgewimpert. Kr. purpurroth. Diese Art ist an grossen scheidenartigen Stützbltt. und den langen purpurrothen Blütenähren leicht kenntlich.

T. arvense L. Kätzelkraut. Ovale, dann walzige, freie einzelne, starkzottige Ähren; Kelchzähne abstehend durch die welkende Krone geschlossen; Stützbltt. eifg. zugespitzt; Blättchen lineal-länglich, zottig; Stängel aufrecht, ästig, zottig.

Auf Brachen, Aeckern und Sandplätzen, d. d. g. G., bis in das Vorgeb., gemein. Sommer. ☉.

Schmächtig, aufrecht, $\frac{1}{2}$ - 1' h., meist von unten an ästig. Die Kelche langzottig, daher die Ähren grauweiss, da die kleinen weisslich-fleischrothen Kronen wenig vorragen.

T. striatum L. Ovale, dann fast walzige, eingehüllte Ähren; Kelch rauhaarig mit aufrechten stachelspitzigen Zähnen; Stützbltt. eifg. mit feiner langer Spitze; Blättchen verkehrt-eifg. nach vorne zu fein-gesägt.

Auf trocknen Grasplätzen. Ehemals von Krockerb. Kl. Kletschkau, neuerdings von Letzner hinter dem Lehmdamm gefunden. Juni, Juli. ☉.

Stängel gestreckt und aufsteigend, fusslang, haarig. Bei der Fruchtreife ist der Kelch etwas aufgeblasen. Kronen blass-purpurroth.

b. Der Rücken und die Oberlippe des Kelches bei der Fruchtreife aufschwellend.

T. fragiferum L. Erdbeerklee. Kugelige Blütenköpfe auf winkelständigen Stielen, Kelchrücken zuletzt aufgeblasen; Stängel kriechend.

Auf feuchten Grasplätzen, an Grabenrändern, besonders in der Nähe von Dunghaufen und an Abzugsgräben. Um Br. häufig um Höfchen, Gräbschen, Gr. Rake, Lissa, Koberwitz. Ohlau. Beuthen a. O. Goslawitz b. Oppeln. Leobschütz. Te. Juni—Sept. 2.

Der Stängel kriecht und treibt in den Gelenken Wurzeln und nach oben Blätter nebst Blütenstielen. Blättchen verkehrt-eifg. Kronen fleischfarben. Blütenköpfe eibsgross; der Kelch schwillt in eine netzaderige häutige Blase auf. Fruchtköpfe so gross als eine Haselnuss.

c. Die Krone wird trockenhäutig und bleibt an der reifen Frucht stehen.

T. montanum L. Fahne gefaltet; Köpfe rundlich dann eifg. Blumenstielchen dreimal kürzer als die Kelchröhre, nach dem Blühen niedergebogen; Stützbltt. eifg.-pfeilförmlich; Blättchen länglich-lanzettlich, scharf gesägt, unterseits haarig, am Rande mit dichten verdickten Adern; Stängel aufsteigend.

Auf trocknen Wiesen, Triften, Dämmen in der Ebene u. d. Vorgebirge, gemein. Juni — Sept. 2.

Stängel steif, haarig, 1 - 1½' h. Kelchzähne ziemlich gleich, pfriemlich, gerade. Kronen weiss.

T. repens L. *Weisser Klee*. *Honigklee*. Fahne gefaltet; Köpfe rundlich; Blumenstiele so lang als die Kelchröhre, nach dem Blühen niedergebogen; Stützbltt. trockenhäutig mit abgesetzter feiner Spitze; Blüthchen verkehrt-eifg., fein gesägt, kahl; Stängel kriechend.

Auf Triften, Wiesen, Brachen, häufig, d. d. g. G., und überall angebaut. Mai—Sept. 2.

Vor allen durch den kriechenden Stängel kenntlich. Kronen weiss oder fleischfarben. Wo er in Menge wächst verbreitet er einen starken Honiggeruch. Nicht selten ist eine Missbildung, indem die Fahne in ein grünes gestieltes Blättchen verwandelt ist.

T. hybridum L. Fahne gefaltet; Köpfe rundlich; Blumenstielchen 2-3mal länger als die Kelchröhre, nach dem Blühen niedergebogen; Stützbltt. breit-lanzettlich-spitzig; Blättchen elliptisch-rautenfg, fein gesägt, kahl; Stängel aufsteigend, röhrig, kahl.

Auf feuchten Wiesen und an Waldrändern zw. Gebüsch, in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Mai — Herbst. 2.

Man unterscheidet eine Wiesenform mit niedrigem dichtästigem, ½ - 1' hohen Stängel, und eine höhere 2 - 3' h. kaum ästige zwischen Gebüsch. Die Kronen erst weisslich, dann fleischfarben, zuletzt braun.

T. spadicum L. Fahne concav; Köpfe endständig zuletzt walzig; Blumenstielchen nach dem Blühen niedergebogen; Stützbltt. länglich-lanzettlich; Blättchen auf kurzen gleichlangen Stielen.

Auf sumpfigen und Torf-Wiesen im Vorgeb., d. d. g. G., hie und da auch bis in die Ebene herabsteigend. Um *Br. bei Riemberg am Warteberge. Gröditz u. Spitzberg b. Bunzlau. Geiersberg. Salzbrunn. Um Neurode bei Kunzendorf am Zentner. Wünschelburg. Hirschberg*, und längs dem Hochgeb.'b. ins *Gesenke. Te.* Juli, August. ☉.

II. ½ - 1', einfach oder ästig, kahl. Blättchen länglich. Kronen erst gelb, dann braungelb, zuletzt kastanienbraun. Bei dieser und den folgenden Arten ist die Hülse innerhalb des Kelches kurzgestielt.

T. agrarium L. Fahne convex; Köpfe seitlich rundlich und elliptisch; Blumenstielchen nach d. Blühen niedergebogen; Stützbltt. länglich-lanzettlich; Blättchen sämmtlich sitzend.

Auf trocknen und buschigen Hügeln und Dämmen, in trocknen Gehölzen, d. d. g. G., in der höheren Ebene und d. Vorgeb. zerstreut. Um *Br. bei Oswitz, Lissa, Trebnitzer Hügel.* Juni, Juli. 2.

Stängel 1' h., wenig ästig, aufrecht, kahl. Blättchen länglich. Kronen goldgelb, später hellbraun.

T. procumbens L. *T. campestre* W. et Gr. sil. Fahne convex; Köpfe seitlich, rundlich und elliptisch; Blumenstiele nach dem Blühen niedergebogen; Stützblätter eiförmig; das mittlere Blättchen längergestielt.

Auf Grasplätzen, Wiesen, Aeckern, an Dämmen, d. d. g. G. bis ins Vorgeb., häufig. Juni — Aug. ☉.

Der vorigen Art sehr ähnlich, aber minder gedungen u. stark. Stängel meist vom Gr. an ästig, oft niederliegend, feinhaarig. Stützbltt. gewimpert. Kronen gelb.

T. filiforme L. Fahne convex; Köpfe seitlich langgestielt büschelförmig; Blumenstiele nach d. Blüten niedergebogen; Kelche kahl; Stützbltt. eiförmig.; Blättchen keilförmig, ausgerandet, fein gezähnt.

Auf Wiesen, Triften, Aeckern, Sand- und Steinplätzen gemein. Juni — Herbst. ☉.

Stängel dünn und fädlich, aufrecht oder niederliegend, kahl, $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ ' h. Kleine lockere Blütenköpfe mit etwa 10 Blumen. Kronen blass- oder gold-gelb, später hellbräunlich. Das mittlere Blättchen ist bald kürzer bald länger gestielt.

Lotus L. Hornklee. Krone mit aufsteigendem geschnäbeltem Kiel. Staubfäden wechselweise an der Spitze verbreitert. Griffel zugespitzt glatt. Narbe stumpf. Hülse leistenförmig ungeflügelt, in zwei schraubenförmig sich drehende Klappen aufspringend.

Kronen gelb. Blätter gedreit.

L. corniculatus L. Niederliegend; Blumen zu 5 in schirmförmigen Köpfen; Kelchzähne vor dem Blühen zueinandergeneigt; Fahne fast rautenförmig zwischen den Flügeln vorragend.

β. tenuifolius. Blättchen und Stützblätter länglich-lanzettlich.

Auf Triften und trocknen Wiesen, an Wegrändern, Dämmen und Ackerrainen, auf Sandplätzen, d. d. g. G., bis auf das Vorgeb. *β.* an grasreichen Rainen hie und da. Um *Br. bei Kleinburg.* Juni — September. ☿.

Stängel von unten ästig, $\frac{1}{2}$ - 1' lang. Blättchen verkehrteifg.-länglich, die seitlichen am inneren Rande hohl, am äusseren convex, oft dicklich und saftreich, kahl oder fein behaart. Die Form mit zottigen Bltt. und Stängeln ist bei uns noch nicht gefunden worden. Kronen gelb, bisweilen auf lehmigem und kalkhaltigem Boden orange und roth. *Var. β.* hat langgestreckte dünne Stängel.

L. major Scopoli. L. uliginosus Schkuhr. L. corn. β. uliginosus W. et Gr. sil. Aufrecht oder aufsteigend; Blumen zu 10 in schirmförmigen Köpfen; Kelchzähne vor dem Blühen zurückgeschlagen; Fahne in einen Schnabel verschmälert von den Flügeln bedeckt.

Auf feuchten und sumpfigen Plätzen, in Gräben, auf sumpfigen Wiesen, an Lachen und Teichrändern zwischen dem Grase, d. d. g. G. vielleicht nur in der Ebene, häufig. Juli, Aug. ☿.

Diese Art ist grösser, saftiger als die vorige, mit röhrigem Stängel, der zwar wegen Mangels an Steifheit oft umliegt, aber eine aufrechte Richtung hat. Da ich kennen muss, wirkliche Uebergänge zum vorigen nicht beobachtet zu haben, so trenne ich ihn wieder von jenem, obwohl er ihm sehr nahe steht.

Tetragonólobus Scopoli. Spargelbohne. Krone mit aufsteigendem geschnäbeltem Kiel. Staubfäden an der Spitze verbreitert. Griffel kahl oben verdickt; Narbe rinnenförmig. Hülse gerade mit vier geflügelten Rändern.

Kronen schwefelgelb. Bltt. gedreit.

T. siliquosus Roth. Lotus sil. Linn. Blumen einzeln.

An grasigen Weg- und Grabenrändern nur in einigen Gegenden der Ebene und des Vorgeb. Um *Br.* gegen Westen bei *Neukirch und Lissa*, gegen Süden um *Oltaschin, Lambsfeld, Koberwitz, Tinz, Zobten, Schweidnitz, Ohlau.* Juni, Juli. 2.

Stängel liegend und aufsteigend, von unten an ästig, $\frac{1}{2}$ - 1' lang, haarig. Bltt. gedreit, denen von *Lotus cor.* ähnlich, dicklich und hellgrün, fast graugrün. Krone schwefelgelb mit dunkleren Flecken.

Astrágalus L. Bärenschote. Krone mit stumpfem Kiel. Hülse rundlich, eiförmig oder walzig; die untere Nath eingeschlagen eine ganze oder halbe Scheidewand bildend, daher die Hülse halb- oder ganz-zweifächerig.

Bltt. gesiedert. Blumen in seitlichen gestielten Aehren.

A. glycyphyllos L. Wolfsschoten. Kahl niederliegend; Stützbtt. frei, oval und gespitzt; Bltt. 5-6 paarig; Hülsen linealisch gekrümmt.

Auf trocknen bebuschten Hügeln, buschreichen Waldplätzen, an Dämmen zwischen Gestrüppe, in d. Ebene u. d. Vorgeb., d. d. g. G., häufig, nirgends sehr zahlreich. Um *Br. bei Cawallen u. Schwoitsch, Lissa u. m. Trebnitzer Hügel.*

Stängel bis 3' lang, ästig, dick, oft rötlich. Blättchen eif., von sässlich-widrigen Geschmack. Die Blüthenstiele kürzer als die Bltt. Kronen schmutzig, blaugelb.

A. Cicer. L. Haarig, ausgebreitet, die oberen Stützbtt. verwachsen und den Bltt. gegenständig; Bltt. 8-12 paarig; Blättchen oval; Blumen in kopfförmigen Aehren; Fruchtknoten sehr kurz gestielt; Hülsen rundlich, aufgeblasen, fast sitzend.

An buschigen Dämmen und Hügeln, besonders in der Nähe tiefer Gräben, in der Ebene zerstreut. Um *Br. bei Gräbschen.* An der *Pelzbrücke, Lissa, Pürbischau, Kleinstein b. Oppeln, Gnadenfeld, Katscher, Kreisewitz b. Leobschütz.* Juni, Juli. 2.

Stängel meist 3-4', im Gebüsch emporsteigend. Bltt. elliptisch stachelspitzig. Kelche mit schwarzen Borsten besetzt. Kronen weissgelb. Hülsen zuletzt schwarz.

A. Hypoglottis L. Haarig, ausgebreitet; die oberen Stützbtt. verwachsen und den Bltt. gegenständig; Bltt. 8-10 paarig, Blättchen elliptisch, die unteren ausgerandet; Blüthen in eiförmigen kopfförmigen Aehren; Fruchtknote gestielt; Hülsen rundlich eiförmig, im Kelche gestielt.

An sandigen Grabenrändern, bisher nur um *Br. bei dem letzten Heller, und der Lohebrücke* von Zölffel entdeckt. Mai, Juni. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ h., dreikantig. Aehren langgestielt. Kelche mit weissen und braunen steifen Haaren besetzt. Kronen blau, am Gr. strohgelb.

A. arenarius L. Von anliegenden Haaren grau; die oberen Stützblt. verwachsen und den Bltt. gegenständig; Bltt. 3-4 paarig, Blättchen linealisch stumpf; Blüten in 4-8blumigen Trauben; Hülsen lineal-länglich.

Auf Sandboden, in sandigen und hügeligen Kieferwäldern, auf freien Sandplätzen und auf sandigen Aeckern, zerstreut in der Ebene. Um Br. bei Gr. Weigelsdorf u. Mirkau, Süßwinkel und Neudörfel hinter Lissa. Heydewilxen. Ohlau. Wohlau. Schönfeld u. Wehrau b. Bunzlau, B. Kreba u. Muskau. Rosenberg. Königshuld u. Grudschütz bei Oppeln. Fehlt in Oestr. Schl. nach R. und M. Juni. 2.

Stängel liegend, einfach oder vom Gr. ästig. Kronen blaviolett. Man unterscheidet zwei Formen, mit breit-linealischen, oberseits kahlen Bltt. und dünner grauer Behaarung, und mit ganz schmalen, fast fädlichen Bltt. und dichter, fast silberweisser Bekleidung.

Anmkg. *Oxytropis pilosa*, mit weissgelben Blumen, und einer Hülse, deren obere Nath eingeschlagen die Scheidewand bildet, ist nach v. Mückesch um Wagstadt bei Troppau gefunden worden.

2. Hedysareae. Hülse gegliedert, die Glieder einsamig, durch Einschnürungen getrennt. Die Keimblätter kommen über die Erde und färben sich grün. — Bisweilen besteht die Hülse nur aus einem Gliede.

Hedysarum L. Süßklee. Hülse aus mehreren zusammengedrückten rundlichen einsamigen Gliedern. Kiel schief gestutzt, länger als die Flügel.

H. obscurum L. Bltt. gefiedert, 5-9 paarig; Stützblt. verwachsen; Hülsen hängend.

An steilen und felsigen Gebirgslehnen, bisher nur an zwei Punkten des Hochgebirges, im *Teufelsgürtchen im Riesengebirge* zuerst von Ludwig (Krock. Suppl. 643), u. im *Kessel im Gesenke* von Grabowski gefunden. Juni, Juli. 2.

Aufrecht, $\frac{1}{2}$ - 1' h., einfach, mit 2-3 Bltt. Aus dem Wipfel des untersten ein langer Blütenstiel mit einer lockeren Aehre. Kronen ansehnlich, purpurf.-violett. Stützblt. trockenhäutig, bräunlich, den Bltt. gegenüber. Blättchen eifg.-länglich.

Onobrychis L. Esparsette. Hülsen aus einem rundlichen zusammengedrückten grubig-netzaderigem, mit Stacheln besetzten Gliede bestehend. Kiel schief gestutzt länger als die Flügel.

O. sativa Tournef. Hedysarum Onobrychis L. Stängel aufsteigend; Bltt. gefiedert, Blättchen elliptisch-lanzettlich unten mit anliegenden Haaren bekleidet.

Auf fruchtbaren Wiesen in hügeligen Gegenden, besd. im Vorgebirge. *Um Br. bei Koberwitz u. Hochkirch. Ohlau. Wohlau. Beuthen a. O. Gröditzberg. Um Rothschloss u. Mellendorf. Dittersdorf b. Jauer. Oppeln.* An mehreren dieser Standorte scheint es kaum zu bezweifeln, dass die Pflanze ursprünglich einheimisch sei, wenn sie auch vielleicht hie und da durch den früher häufigeren Anbau verwildert sein könnte. Mai, Juni. ♀.

Schwach mit anliegenden Haaren besetzt. H. 1 - 2'. Blüten in langgestielten länglichen Ähren. Kronen rosenroth mit dunkleren Strichen. Die Hülsen halbkreisrund, springen nicht auf, am Vorderrande gekielt, mit dornigen Zähnen besetzt. — Liebt kalkhaltigen Boden und ist daselbst ein sehr gutes Futterkraut.

Coronilla K. Kronenwicke. Kelch glockig, d. beiden oberen Zähne bis über die Mitte verwachsen. Kiel spitzig-geschnäbelt. Hülse lang, stielrund oder vierkantig, mit einsamigen Gliedern.

C. varia L. Bunte K. Schafinsien. Peltchen. Bltt. gefiedert, 10-paarig, Blättchen länglich, stumpf; Stützbltt. frei, lanzettlich; Blüten in vielblumigen Schirmen; Hülsen vierkantig.

An trocknen Weg- und Ackerrändern, Dämmen, Rainen, Triften, in d. E. und d. Vgb., d. d. g. G. häufig. Juni, Juli. ♀.

Krautlg. Stängel meist liegend, vielästig. Bltt. graugrün. Fahne rosaf. Flügel weiss. Kiel weiss mit dunkelrother Spitze. Hülse weiss mit schwachen Einschnürungen. Wirkt zwar nicht giftig, wie man glaubte, aber diuretisch.

Ornithopus L. Klauenschote. Kelch röhrig, die beiden oberen Zähne am Gr. verwachsen. Kiel stumpf. Hülse linealisch, zusammengedrückt, mit einsamigen Gliedern.

O. perpusillus L. Feinhaarig; Blütenstiele länger als d. gefiederten Bltt., 3-4blumig.

Auf Sandäckern und waldigen Sandplätzen, nur im nördlichen Theile des Gebiets, zerstreut. *Um Br. bei Lissa. Um Bunzlau n. Matt. genauer bei Drüssel, Birkenbrück, Klitschdorf, Wehrau, Tillendorf, Zeche u. m. n. Schneider. Malschwitz b. Beuthen a. O. Zauche b. Glogau n. Krockner.* Juni. ☉.

Niederliegend, von 1'' bis 1', ästig. Blättchen und Blüten sehr klein. Fahne und Flügel weisslich-fleischf., Kiel gelblich.

3. *Viciae.* Hülse ungegliedert, einfächerig oder mit feinen Querwänden aus lockerem Zellgewebe. Keimblätter dick und mehlig, färben sich nicht grün und bleiben unter der Erde. Bltt. paarig-gefiedert, der Blattstiel geht in eine Borste oder Ranke aus.

Faba Tournefort. Bohne. Die oberen Kelchzähne kürzer. Griffel fädlich, fast rechtwinklig gekniet, unter der Narbe

auswärts bartig. Hülse mit schwammigen Querwänden. Samen länglich, hängend, mit linealischem Nabel am Ende.

Bltt. meist 2paarig.

* *F. vulgaris* Mönch. *Vicia Faba* Lin. *Saubohne*. Blüten in winkelständigen 2-4blumigen Trauben; Blattstiel in eine Borste endigend; die oberen Blätter 2paarig.

Ist im Orient einheimisch und wird bei uns häufig gebaut. Juni, Juli. ☉

Stängel 2 - 3' h. Bltt. fast fleischig. Kronen weiss, die Kiele mit einem schwarzen Fleck.

Vicia L. Wicke. Die oberen Kelchzähne kürzer. Griffel fädlich. Hülse zweiklappig, ohne oder mit unvollständigen Querwänden. Samen länglich, sählig-angeheftet, mit linealischem oder ovalem Nabel an der Seite.

a. vielblumige Blütenstiele.

V. pisiformis L. Trauben kürzer als d. Blatt; Blätter 5-spaltig; Blättchen breit-eifg. mit zusammengezogener Spitze, stumpf, kahl, die untersten nahe am Stängel sitzend und die gezähnten halbpfeilförmigen Stützblätter verdeckend.

Auf sonnigen bewaldeten Berglehnen im Vorgebirge. *Kreuzberg b. Striegau* v. Schummel; *Spitzberg b. Probsthain* v. Göppert gef. *Rogauerbg. b. Camenz* n. Krock. *Kreiswitz b. Leobschütz*. Nach Schneider auch um *Charlottenbrunn u. Kupferberg*. Um *Grätz* n. Hochstetter. *Landskrone* n. Rabenhorst. Juni, Juli 2.

Kletternd, 3-4' h., kahl, blassgelbgrün. Bltt. meist 4paarig, im Herbst fast lederartig, unterseits etwas grau, am Gr. rundlich. Kronen weissgelblich.

V. sylvatica L. Trauben länger als d. Bltt; Bltt. 8 paarig; Blättchen elliptisch stumpf; Stützblatt halbmondförmig, borstlich-gezähnt.

An Waldrändern und in Gehölzen, an Hügel- und Berglehnen, in der Hügelgend d. Ebene und im Vorgeb. zerstreut. Um *Br. bei Skarsine* schon v. Krock. Am *Zobten-, Geiers- u. Gröditzberge. Hügel bei Habendorf u. Kleutsch. Annaberg. Leisnitz. Leobschütz. Ustron. Grätz b. Troppau*. Juni, Juli. 2.

Kletternd, schlapp, 3 - 4' h., kahl. Blütenähre locker. Kronen weisslich, Fahne lilaf-gestrichelt, Kiel an der Spitze violett. Hülse fast lineal-walzig.

V. dumetorum L. Traube so lang als d. Blatt; Bltt. 5-paarig, Blättchen eifg. stumpf, die untersten vom Stängel entfernt; Stützbltt. halbmondfg. gezähnt; Griffel bärtig.

In feuchten Waldgebüsch, an feuchten, waldigen Lehnen, in d. höheren Ebene u. d. Vorgeb. zerstreut. Um *Br. bei Lissa u. Kl. Tot-schen. Dalkau bei Beuthen a. O. Zobtenberg* am Gipfel. *Gröditzberg u. Hartmannsdorf b. Bunzlau. Streitberg bei Striegau. Zeiskenschloss u. Fürstenstein. Gr. Zlönitz bei Oppeln. Jägerndorf. Te.* Mai, Juni. 2.

Kletternd und schlapp, 3 - 4' h., kahl. Kronen matt-purpurf., mit Adern, Hülsen feinhaarig.

V. cassubica L. *V. militans* Crantz. Krock. sil. 1173. Trauben kürzer als d. Blatt; Bltt. vielpaarig; Blättchen länglich u. lanzettlich, stumpf, unterseits feinhaarig; Stützbltt. halbpfeilfg. ganzrandig; Griffel oben feinhaarig; Hülsen fast rautenfg.

In trocknen Gehölzen, auf buschigen Hügeln, auch in Kieferwäldern der Ebene nicht selten. Um *Br. bei Carlowitz u. Goldschmiede* n. Krock., um *Schwoitsch, Lissa, Heydewilzen u. Skarsine, Gröbelwitz, Mahlen, Riemberg. Orlau. Wohlau. Dalkau b. Beuthen. Zobtenb. Gröditz u. Eichberg b. Bunzlau. Oppeln. Troppau.* Juni, Juli. 2.

Stängel ziemlich einfach, aufrecht, 1 - 2' h., anfangs fast zottig, später kahl. Bltt. bis 15paarig, Bltt. gedrängt. Blütenstiele aufrecht. Kronen purpurroth u. blau. Hülsen kahl mit 2 Samen.

V. tenuifolia Roth. Trauben länger als d. Bltt.; Blätter vielpaarig; Blättchen linealisch, unterseits haarig; Stützbltt. halbpfeilfg. ganzrandig; die Platte der Fahne doppelt so lang als ihr Nagel; Hülsen lineal-länglich, spitz.

An Ackerrändern, auf Wiesen u. Brachen, zerstreut in d. Ebene. besond. gegen das Vorgeb. hin. Um *Br. bei Koberwitz, Bohrau, Strehlen. Bankwitz bei Zobten. Magnitz bei Trebnitz.* Um *Reichenbach. Oppeln. Gr. Herlitz und Camenz bei Troppau. Gröditz und Goldmühle bei Bunzlau* n. Schn. Mai, Juni. 2.

Stängel aufrecht, steif, oben knieförmig-gebogen, mit fast aufrechten Blütenstielen, durch welche Kennzeichen man diese Art stets von der folgenden unterscheiden kann. Blattstiele söhlig, die unteren auch niedergebogen. Blattrand geradlinig, Grund und Spitze oft gestutzt, letztere auch ausgerandet. Fahne und Kiel hellblau, Flügel weisslich.

V. Cracca L. *Vogelwicke.* Trauben so lang als das Blatt; Bltt. vielpaarig, Blättchen länglich oder lanzettlich weichhaarig; Stützbltt. halbpfeilfg. ganzrandig; die Platte der Fahne so lang als ihr Nagel; Hülsen lineal-länglich stumpf mit einem Haken.

In feuchten Gebüsch auf Wiesen an Dämmen und Waldrändern d. d. g. G. bis in das Vorgeb., gemein. Auch im *Kessel im Gessenke.* Juni, Juli. 2.

Stängel kletternd, schlapp, 2 - 4' h. Die Form der Blättchen ist veränderlich, bald eig. kürzer mit abstehenden Haaren, bald länglich-lanzettlich länger und spitzer mit anliegenden Haaren; aber stets bildet der Blattrand eine krumme Linie und sind die Bltt. kürzer als die der vorigen Art. Blütenstiele abstehend. Kronen blau-violett. Samen schwarz, auf einer Seite marmorirt.

V. villosa Roth. Kr. suppl. 639. Trauben von der Länge der Blätter, auch länger; Bltt. vielpaarig zottig; Stützbltt. halbpfeilfg. ganzrandig; Platte der Fahne kürzer als ihr Nagel; Hülsen länglich-rautenfg., a. d- Spitze hakenfg.

α. *breitblättrig*, mit elliptischen schwachzottigen Bltt.

β. *schmalblättrig*, mit lanzettlichen starkzottigen Bltt.

Unter d. Saat u. auf Brachen d. d. g. G. sehr häufig. Juni, Juli. 2.

Stängel mehr oder minder schlapp, oft vielästig, 2-3' h., zottig. Trauben fast einseitwendig, dicht. Kronen blau oder violett mit milchblauen oder weisslichen Flügeln.

b. armblumige Blütenstiele.

V. *hirsuta* Koch. *Ervum hirs.* L. W. et Gr. sil. Blütenstiele 4-6blumig; Blätter 6paarig; Hülsen zweisamig weichhaarig.

Unter der Saat, in Gärten und an Hecken, nicht selten d. d. g. G. Juni, Juli. ☉.

Dünn und zart. Bltt. weichhaarig. Kronen milchblau oder weisslich.

V. *tetrasperma* Koch. *Ervum tetr.* Linn. W. et Gr. sil. Blütenstiele meist einblumig; Blätter 3-4paarig; Hülsen viersamig kahl.

Wie die vorige, etwas häufiger. Juni, Juli. ☉.

Dünn und zart. Kronen aus weiss und blau gemischt. Hülsen länglich. — Diese und die vorige Art wurden sonst unter *Ervum* gerechnet, unterscheiden sich aber gar nicht von der Sippe *Vicia*. Der Griffel ist durchaus fädlich und nach oben zu gleichmässig behaart. Vgl. E. Meyer *Preussens Pflanzengattg.* p. 237.

b. Blumen kurzgestielt in den Blattwinkeln

V. *sepium* L. Blumen zu fünf auf ganz kurzem traubigem Stiel, Bltt. fünfpaarig; Blättchen breit oval; Stützbltt. gezähnt; Hülsen linealisch, kahl.

In Gebüsch und zwischen Gesträuch auf Waldwiesen und an Waldrändern, d. d. g. G. bis in das Vorgeb. gemein. April, Juni. 2.

Stängel schlapp, klimmend 2-3' h. Die unteren Blattpaare grösser als die oberen. Blättchen aus breitem Grunde eifg., vorn abgestutzt mit einem Eindruck und einer Stachelspitze. Kronen schmutzig-violett, am Gr. gelblich. Hülsen söhlig. Sa^men braunschwarz.

† V. *sativa* L. Blumen paarweis auf ganz kurzen Stielen; Bltt. 7paarig; Blättchen verkehrt eifg. vorn ausgerandet; Hülsen aufrecht⁴ länglich, weichhaarig; Samen schwach zusammengedrückt, glatt.

Auf Aeckern unter der Saat und auf Brachen, häufig angebaut, vermuthlich nicht ursprünglich wild, sondern mit dem Anbau verbreitet. Häufig d. d. g. G. Mai, Juni. ☉.

Aufrecht, 1-2' h., mehr oder weniger kurzzottig. Die Bltt. ändern in der Breite ab. Stützbltt. oft gezähnt, gefleckt. Fahne hell-purpurroth, Flügel violett, Kiel weisslich. Samen olivengrün, braun-marmorirt.

V. *angustifolia* Roth. Blumen einzeln oder paarweis auf sehr kurzen Stielen; Bltt. 5paarig, Blättchen der unteren verkehrt-eiförmig vorn ausgerandet, der oberen lineal-lanzettlich vorn stumpf oder abgestutzt; Hülsen abstehend linealisch, zuletzt kahl; Samen kugelig, gekrönt.

Auf Aeckern unter der Saat, häufig. Juni, Juli. ☉.

Stängel schwach, 1-3' h., feinhaarig. Stützbltt. feingezähnt. Kronen purpurroth Samen würfelig-kugelig, schwarz. Man findet Formen, welche zwischen dieser und

der vorigen Art in der Mitte stehen. Wahrscheinlich auch bei uns nur durch den Anbau verbreitet.

V. lathyroides L. Blumen einzeln in den Blattwinkeln fast sitzend; Bltt. 2-3paarig; Blattstiele in eine Spitze endigend; Blättchen verkehrt-eifg.; Hülsen linealisch kahl; Samen würfelig gekörnt.

Auf Triften und Wiesen, an grasigen Dämmen, in der Ebene nicht selten. Um *Br. bei Pöpelwitz, Oswitz, Rosenthal, an der Passbrücke u. in Ohlau, Wohlau, Bunzlau, Oppeln*. April, Mai. ☉.

Die kleinste Art dieser Sippe. 1-4' lang, am Boden im Grase liegend und versteckt. Aestig. Kronen klein, lila-violett.

Lens Tournefort. *Linse*. Griffel fädlich, nach vorn verbreitert, abgeplattet und zur Seite gedreht. Hülse einfächerig. Samen zusammengedrückt mit gewölbten Flächen, mit linealischem oder ovalem Nabel an der Seite.

***L. esculenta** Mönch. Blütenstiele 1-2blumig; Bltt. 6paarig; Hülsen rautenförmig, 2samig, kahl.

Wird häufig angebaut, und findet sich hie und da, wie in der Gegend von *Oppeln*, äusserst häufig unter der Saat und auf Waldplätzen verwildert. Juni, Juli. ☉.

Stängel aufrecht, 1' h. Blättchen elliptisch, auch linealisch. feinhaarig. Kronen blauschwarz. Samen schorbenbraun, geben ein bekanntes Nahrungsmittel.

Láthyrus L. Platterbse. Die oberen Kelchzähne kürzer. Griffel fädlich, nach vorn verbreitert abgeplattet und zur Seite gedreht, Hülse einfächerig. Samen fast kugelig mit linealischem oder ovalem Nabel an der Seite.

Begreift auch die Arten von *Orobus* Linné, die sich nur durch rankenlose Blattstiele unterscheiden. Auch durch die Tracht kann man *Orobus* und *Láthyrus* nicht unterscheiden, da sich *O. tuberosus* als ein völliger *Láthyrus* darstellt.

L. hirsutus L. Blütenstiele zweiblumig, länger als das Blatt; Blätter einpaarig; Blattstiele in Rankenendigend; Hülsen rauhaarig.

Unter der Saat nur im südlichen Theile des Gebiets. Bei *Ratibor* von Kelch gef. N. *Toschonowitz bei Teschen*. Juli ☉.

Stängel aufrecht, schwach, 2' h. Bltt. lineal-lanzettlich. Ranken 2theilig. Kronen blau, ziemlich klein. Haare der Hülsen am Gr. zwiebelig.

L. tuberosus L. *Erdnüsse, Erdmandeln*. Blütenstiele vielblumig, länger als das Blatt; Blätter einpaarig; Blattstiele in Ranken endigend; Blüten länglich; Hülsen kahl netzaderig; Stängel eckig.

Unter der Saat auf Lehm- und Kalkboden in der Ebene vorzüglich im östlichen Theile des Gebiets. Um *Br. gegen Mittag, um Höfchen, Ottaschín, Domslau, Koberwitz und bei Hühnern*. Um *Ohlau, Wohlau, Beuthen a. O., Oppeln, Leobschütz, Katscher, Ratibor, Troppau, Teschen*. Juni, Juli. ♀.

Klimmend, 2-3' h., kahl, etwas graugrün. Kronen rosa-purpurf. Die Wurzelfasern verdicken sich zu länglich dicken Knollen, welche stärkehaltig und süß, daher essbar sind und auch als Kaffeesurrogat empfohlen wurden.

L. pratensis L. Blütenstiele vielblumig länger als das Blatt; Bltt. einpaarig; Blattstiele in Ranken endigend; Blüthen lanzettlich; Hülsen kahl mit schiefen vorragenden Adern; Stängel eckig.

In Hecken und Gestrüch an feuchten Orten an Graben- und Bachrändern, auf feuchten Wiesen, d. d. g. G. bis ins Vorgeb., gemein. Juni, Juli. 2.

Liegend oder emporklimmend, 2-4' h. Bltt. eifg. oder lanzettlich; unterseits feinhaarig. Stützbltt. pfeilförmig. Kronen gelb. Stängel vielästig, weichhaarig.

L. sylvestris L. Blütenstiele vielblumig, länger als d. Bltt.; Bltt. einpaarig; Blattstiele in Ranken endigend; Blättchen dreinervig, länglich-lanzettlich, gespitzt; Stützbltt. lineal-lanzettlich; Hülsen lineal-länglich, glatt; Stängel und Blattstiele eckig-geflügelt.

An trocknen und sandigen Hügel- und Dammrändern zwischen Gebüsch oder in hohem Grase, besonders im Vorgeb., d. d. g. G. zerstreut und nicht sehr zahlreich. Um *Br. bei Kosel, Schwoitsch, Heydewilxen, Skarsine, Lissa. Um Ohlau, Wohlau, Hohenborau bei Beuthen, Zeche Goldmühle u. Gröditz bei Bunztau, Striegauer B., Charlottenbrunn, Fürstenstein, Mülk bei Neurode, Hirschberg, Troppau, Teschen.* Juni — Aug. 2.

Stängel ästig, kahl, schlapp und liegend oder klimmend. Bltt. blassgrün, kahl. Variirt mit breiteren und schmälern Blättchen. Kronen rosa-purpurfarben, die Fahne am Rücken grünlich. Hierher auch *C. heterophyllus* Krock. sil.

L. latifolius L. Blütenstiele vielblumig, länger als d. Blatt; Bltt. ein-zweipaarig; Blattstiele in Ranken endigend; Blättchen fünf-nervig, länglich-eiförmig, stumpf mit einer Stachelspitze; Stützbltt. breit-lanzettlich; Hülse lineal-länglich, glatt; Stängel und Blattstiele eckig-geflügelt.

Auf grasreichen und buschigen Hügellehnen. Sicherer Standort: *am Geiersberge.* Ausserdem wird er angegeben: auf dem *Mittelberg bei Zobten* von Matt., am *Gröditzberge, bei Gharlottenbrunn, Steinau a. O. (?)*, *Dirschel und Gr. Hertiz*, für welche ich nicht einsehen kann, da ich keine Exemplare sah. Juni, Juli. 2.

Der vorigen sehr ähnlich aber grösser, stärker, breitblättriger, obwohl auch von diesem Formen mit breiteren und andere mit schmälern Bltt. vorkommen. *C. heterophyllus* der Autoren ist von diesem schwerlich verschieden.

L. palustris L. Blütenstiele 3-6blumig, länger als d. Blatt; Bltt. 2-3paarig; Blattstiele in Ranken endigend; Blättchen lanzettlich stachelspitzig; Stützbltt. pfeilfg.; Hülsen lineal-länglich glatt; Stängel oben geflügelt, Blattstiele eckig gerandet.

Auf nassen und sumpfigen Wiesen auf fruchtbarem Boden, im Gestrüch an Grabenrändern und Flussufern, zerstreut in der Ebene. Um *Br. bei der Margarethenmühle, Scheitnich, Krittern, Bischwitz a. W. Schweinern u. m. Um Ohlau, Wohlau, Beuthen, um Bunztau bei Försterbach, Nischwitz, Drüsselbusch u. m.* Juli, Aug. 2.

Stängel auf Wiesen aufrecht, in Gebüsch schlapp und klimmend, 1-3' h., kahl. Kronen schönblau. Auch diese Art kommt schmal- und breitblättrig vor.

L. macrorrhizus nobis. *Orobis tuberosus* Linn. et Auctorr. omn. Blütenstiele 4-6blumig, länger als d. Blatt; Bltt. 2-3paarig, ohne Ranken; Blättchen länglich-lanzettlich; Stängel einfach, geflügelt.

In sonnigen Gehölzen besonders an Hügellehnen in der Ebene u. d. Vorgeb., nur an einigen Orten. Um *Br. bei Skarsine* am Buchenwalde und im *Glaucher* Walde von Schummel gef. *Deutschhammer*. Bei *Kl. Zeche im Drüsselbusche* (schon von Matt.) auf d. *Krauschner Hügeln* und bei der *Schauerermühle bei Bunzlau* n. Schn. In den *Seifen zw. Kynau und Charlottenbrunn*. Um *Troppau*. Mai, Juni. ♀.

H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Graugrün. Kronen rosa-purpurf. Wurzel faserig-ästig, in Absätzen in längliche Knollen verdickt, tiefgehend.

L. vernus nob. *Orobis vernus* Linn. Blütenstiele 4-6blumig, kürzer als das Bltt; Bltt. 2-3paarig, ohne Ranken; Blättchen eifg. zugespitzt; Stängel einfach, eckig.

In schattigen Gehölzen und Laubwäldern der Ebene und des Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Um *Br. bei Pilsnitz, Lissa, Mahlen, Skarsine*. Durch das ganze Vorgeb. bis in den *Sattler bei Hirschberg. Trop. Ustron b. Teschen*. April, Mai. ♀.

Stängel aufrecht, 1' h., kahl. Bltt. freudig-grün, breit-eifg. Kelche oft roth gezeichnet. Kronen purpurfarben, dann blau. Die Wurzeln auch dieser Art verdicken sich in Absätzen zu Knollen. Eine der ersten Waldzierden im Frühling.

L. niger nob. *Orobis niger* Linn. Blütenstiele mehrblumig; Bltt. vielpaarig, ohne Ranken; Blättchen eifg.; Stängel ästig, eckig.

In trocknen Laubwäldern und Vorgehölzen in der Ebene ziemlich verbreitet. Um *Br. bei Oswitz, Lissa, Althof. Trebnitzer Hügel. Ohlau. Wohlau. Bunzlau. Kreuzburg. Oppeln. Leobschütz. Troppau. Teschen*. Mai, Juni. ♀.

Steif, kahl, 2-3' h., oberhalb ästig, mit steifen absteheenden Aesten. Blättchen dicklich, werden beim Trocknen schwarz. Kronen schmutzig-purpurroth. Die Wurzel starkfaserig, ästig.

4. Phaseoleae. Hülse ungegliedert, einfächerig oder mit schwammigen Querwänden zwischen den Samen. Keimblätter mehrlreich, nie sich grün färbend, aber meist über die Erde gehen. Die untersten Blätter gegenständig.

Phaséolus L. Schminkbohne. Kelch glockig zweilipbig. Griffel sammt Staubgef. und Kiel spiralig gewunden. Fruchtknoten am Grunde von einer scheidenförmigen Drüse umgeben.

* **P. vulgaris L. Fasolen. Brechbohnen.** Blüthentrauben kürzer als das Bltt; Hülsen hängend, gerade.

β. nanus. Stängel niedrig, nicht windend. *Ph. nanus* L.

* *P. multiflorus* Willd. *Schwerdtbohne.* Blütentrauben länger als das Blatt; Hülsen hängend, sichelförmig.

Beide Arten, mit hohem windenden Stängel, werden häufig kultivirt. Die erste soll aus Ostindien, die zweite, welche auch der rothen Blütentrauben wegen als Zierpflanze gilt, aus *Sulamerica* kommen. Man unterscheidet noch mehrere Arten oder Spielarten.

Rhamnaceae R. Browa.

Kelch 4-5theilig, die Zipfel in klappiger Knospenlage; die Kelchröhre oft mit dem Fruchtknoten verwachsen. Kronenblätter klein, zwischen den Kelchzipfeln, mit eingeschlagener Knospenlage. Staubgef. hinter den Kronenbltt. und von denselben kappenförmig bedeckt. Fruchtknoten mit einem drüsigen Ringe umgeben, 2-4fächerig, mit je einem aufrechten Ei. Die Griffel ganz oder oberhalb verwachsen. Frucht 2-4- oder durch Fehlschlagen 1-fächerig, eine Pflaume oder eine Kapsel. Samen ohne Mantel, mit wenig Eiweiss und geradem Keim.

Sträucher mit ungetheilten gestielten Bltt., die meisten in wärmeren Gegenden, mit bitteren auch wohl scharfen Stoffen.

Rhamnus L. *Kreuzdorn.* Der Kelchsaum fällt nach dem Blühen umschnitten ab. Frucht eine fleischige oder lederhäutige, 2-4fächerige Pflaume. v, 1.

R. cathartica L. *Kreuzdorn.* Aeste gegenständig, dornig; Bltt. fein gesägt; Blumentheile zu vier; Blumen polygamisch.

In Hecken und Gebüsch, an Dämmen, Hügeln, Waldrändern, d. d. g. G., häufig. Mai, Juni. h.

Aufrecht, 4-6' h. Bltt. oval mit rundlichem Grunde, hellgrün. Blüten gebüschelt in den Winkeln. Kelchsaum zurückgeschlagen. Kronenbltt. linealisch, grüngelblich. Frucht erbsengross, schwarz mit grünlichem markartigem Fleische. — Die Früchte, als *Baccae Spinae cervinae* officinell, sind purgirend, und die Schale enthält einen violetten Farbestoff; man bereitet daraus das Saftgrün. — Auf trocknen sonnigen Bergen, z. B. bei *Striegau* und *Troppau* findet man Zwergformen mit elliptisch-lanzettlichen Bltt.: dazu gehört *R. saxatilis* W. et Gr. sil.

R. Frangula L. *Faulbaum.* Aeste wechselständig, ohne Dornen; Bltt. ganzrandig; Blumenstiele zu fünf; Blumen zwitterig.

In Hecken, feuchten Gebüsch und Wäldern, d. d. g. G., häufiger als d. vorhergehende. Mai, Juni. h.

Bltt. oval. Blüten winkelständig, einzeln oder gehäuft. Kronenbltt. lanzettlich, fleischfarben. Frucht beerenartig, erst roth, dann schwärzlich. Der Bast riecht und schmeckt widrig-bitter. Die Beeren beider Arten waren früher officinell.

Empetreae Hooker.

Kelch dreiblättrig, die Blätter mit den Kelchblättern wechselnd; beide mit dachziegelförmiger Knospenlage. Drei freie Staubgefässe zwischen den Kronenblättern. Staubbeutel 2 fächerig. Fruchtknoten frei, auf einer fleischigen Scheibe, 3-6-fächerig, mit dickem Griffel und 3-6strahliger Narbe. Frucht eine mehrfächerige Pflaume mit je einem Samen. Samen mit geradem Keim in der Axe des fleischigen Eiweisses.

Sträucher mit stumpf nadelförmigen Bltt. ohne Stützbltt. Blumen polygamisch oder zweihäusig.

Empetrum L. *Krähenbeere*. Blumen 2häusig. Griffel sehr kurz. Pflaume 6-9samig. xxii, 3.

E. nigrum L. *Krähenbeere*. Niederliegend; Bltt. linealisch mit umgerollten Rändern.

Auf moosigen und felsigen Stellen des Hochgeb. *Gr. Glaz: auf der Heuscheuer, hohen Mense und dem Schneeberge. Riesengeb. am grossen Teiche, Riesengrunde, an der Iser. Gesenke: am Hockschar, Köpernik, Altvater. Baranio b. Teschen.* Mai, Juni. ♀.

Niedriger vielästiger Strauch mit dachziegelförmigen Bltt. Blumen winkelständig. Frucht eine schwarze Beere. Sieht einer *Erica* ähnlich.

Euphorbiaceae Jussieu.

Blumen ein- oder zweihäusig. Blumenhülle einfach (oder doppelt, die innere gegen die äussere wechselständig) 4-6theilig oder 4-6blättrig. Staubgefässe frei oder in eine Säule verwachsen, in verschiedener Anzahl, von 1-8 (oder mehrere). Fruchtknoten frei sitzend oder gestielt, 3fächerig, mit je 1-2 hängenden Eichen. Griffel meist verwachsen, mit 3 Narben. Frucht eine 2-3fächerige Kapsel, die auf dem Rücken der Fächer in 3 Klappen aufspringt, mit freier Mittelsäule. Samen mit geradem Keim in fleischigem Eiweiss.

Diese Familie von sehr eigenthümlichem und schwer verständlichem Bau, hat die meisten und zum Theil durch eine sehr auffallende Tracht ausgezeichneten Formen in den tropischen Gegenden. Sie besitzen scharfe Milchsäfte mit Kautschuk von drastischen und giftigen Wirkungen, und die Samen fettes Oel. Der Milchsaft fiesst bei geringer Verwundung reichlich hervor.

Euphorbia L. *Wolfsmilch*. Blumen einhäusig. Um eine Stempelblume in der Mitte stehen ein oder mehrere Quirle Staubgefässblumen, von einer 4-5spaltigen Hülle umschlossen. Staubgefässblumen 4-5 in jedem Quirl, jede mit einem sehr

kleinen Deckblatt am Gr- des Stiels, ohne Blumenhülle, mit einem Staubgefäß. Stempelblume gestielt mit kleiner dreilappiger oder ohne Blumenhülle. Kapsel überhängend, 3 fächerig. XI, 3.

Viele der exotischen Arten haben dickfleischige, blattlose und stachelige Stängel; die unsrigen sind sämtlich beblättert, ohne Stützblätter. Die Mehrzahl wächst auf Feldern mit sandigem und kiesigem Grunde, einige in Wäldern, stets gesellschaftlich; auch heerdenweise.

a. die drüsigen Anhängsel der Scheibe rundlich oder oval.

E. Helioscopia L. Schirm 3 - 5strahlig, Stiele 3 theilig und gablig; Kapseln glatt; Samen netzig-zellig; Bltt. verkehrt eifg. nach vorn gesägt.

Auf Acker- und Brachland, d. d. g. G., gemein. März — Sept. ☉
Stängel 2 - 8" h. Etwas feist. Hüllchen verkehrt-eifg., gesägt.

E. platyphyllos L. Schirm 3-5strahlig, Stiele 3 theilig und gablig; Kapseln warzig; Bltt. lanzettlich fein gesägt, die untersten verkehrt-eifg.; Bltt. der ersten Hüllen dreieckig-eifg. feingesägt.

Auf Angern, Weideplätzen, an Dorfgräben und Lachen, in Ge-
sträuch, wohl nur in der Ebene, häufig. Um *Br.* bei *Oswitz*,
Schwoitsch, *Bischwitz a. W.*, *Bischofswalde etc. Te.* Fehlt aber um
Trop. nach R. u. M. Juni — Aug. ☉.

H. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ '. Erscheint in mancherlei Formen. Häufig ist eine Var. mit unterseits zottigen Bltt. in Dörfern, und eine Form mit schlankem hohen Stängel in Wäldern

E. dulcis L. Schirm 5strahlig, Stiele 2theilig; Kapseln haarig, später kahl, warzig; Bltt. länglich gegen den Grund etwas schmaler, stumpf, ganzrandig; Hülsen lanzettlich; Bltt. der 2ten Hüllen am Gr. gestutzt dreieckig-eifg., fein gesägt.

In schattigen Laubwäldern in der höheren Ebene und im Vorgeb.
d. d. g. G. verbreitet. Um *Br.* bei *Arnoldsmühl*, *Lissa*, *Schosnitz*.
Vom *Zobtenberge* d. d. g. Vorgeb. *Sattler* bei *Hirschberg*. *Trop-*
pau und *Teschen*. April, Mai. ♀.

Wurzelstock dick, söhlig. Stängel 1' h. Die unteren Bltt. verkehrt-ei-keilfg. unterseits graugrünlich und mit weichen Haaren besetzt. Die drüsigen Anhängsel gelb oder auch am Bande oder durchaus purpurroth.

E. palustris L. Schirm vielstrahlig, Stiele 3- und 2spaltig; Kapseln ellipg; Bltt. lanzettlich, fast ganzrandig, kahl; Bltt. der 2ten Hüllen elliptisch, stumpf, nach dem Grunde etwas schmaler.

Auf nassen und sumpfigen Waldplätzen, an Graben- und Fluss-
rändern zwischen Gebüsch, in der tieferen Ebene zerstreut. Häufig
um *Br.* bei *Scheitnich*, *Oswitz*, *Bischwitz a. W.*, *Schwoitsch*, *Ran-*
sern u. m. Wohlau. Oppeln. Juni, Juli. ♀.

Stängel dick, innen hohl, 2 - 3' h., im Herbst sammt den Bltt. gewöhnlich röthlich, meist mehrere buschförmig vereinigt. Nach der Blüthe treiben Blattäste aus den oberen Blattwinkeln. Drüsenanhängsel dunkelgelb.

E. pilosa L. Hierher auch *E. villosa* Waldst. et Kit., *E. procera* Marsch. Bieb. Schirm 5strahlig; Stiele 3- und 2spaltig; Kapseln glatt, kahl oder haarig; Bltt länglich-lanzettlich, nach vorn zu fein gesägt, unterseits haarig; Bltt. der 2ten Hülle oval, stumpf.

Auf sonnigen und steinigen Waldplätzen und Hügeln in der Ebene und dem Vorgeb. Um *Ohlan* bei *Seifersdorf* von *Beilschmied*, *Grudschütz* bei *Oppeln* von *Grabowski*, zuerst am *Geiersberge* von *Schummel* und *Treviranus* gef. Juni. 2.

Stängel am Gr. fast holzig und gew. purpurroth, etwas steif, in schwachem Bogen aufrecht, $1\frac{1}{2}$ - 2' h. Bltt. unterseits feinhaarig, auch fast seidenartig-zottig, auch oberseits bisweilen feinhaarig, selten fast kahl. Die Kapseln bald kahl, bald mit zerstreuten söhlig-abstehenden Haaren bedeckt. Die Form mit dichter behaarten Kapseln welche wir aus Sibirien sahen, fand sich bei uns noch nicht; jedoch ist diese, die eigentliche *E. pilosa* Linné, von unserer Pflanze nicht verschieden.

b. die drüsigen Anhängsel der Scheibe mondförmig oder zweihörnig.

E. amygdaloides L. *E. sylvatica* Jacquin. Schirm vielstrahlig; Stiele mehrmals 2spaltig; Kapseln glatt, fein-punctirt; Bltt. verkehrt-ei-lanzettlich, in einen Stiel verschmälert, weichhaarig; Bltt. der 2ten Hülle kreisförmig-verwachsen.

In schattigen Nadel- und gemischten Wäldern des Vorgeb. *Gr. Glaz* um *Nieder-Langenau*. *Landecke* bei *Hultschin*. Um *Tropau* bei *Eckersdorf*, *Braunsdorf* u. *Boidensdorf* nach R. u. M. Im *Klokaczgeb. um Ustron*, am *Palomb*, im *Lomnathale* u. m. Juni. 2.

Dunkelgrün. H. 1 - 2'. Stängel etwas aufsteigend, über dem Gr. mit genähereten grösseren Bltt. besetzt, welche eine Art Schopf bilden.

E. Cyparissias L. Schirme vielstrahlig, Stiele mehrmals zweispaltig; Kapseln fein körnig-punctirt; Bltt. linealisch, kahl, die Bltt. der blüthenlosen Aeste sehr schmal; Bltt. der 2ten Hüllen eirautenförmig.

Auf sandigen Plätzen, auf Sandfeldern und Triften, Brachen, an Wegen, auf sonnigen steinigen Hügeln in der Ebene und dem Vorgeb., gemein, hin und wieder grosse Strecken bedeckend, d. d. g. G. April - Juni, auch im Herbst. 2.

Wurzel kriechend; Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., oft mehrere aus einer Wurzel, am Gr. röthlich, dicht beblättert. Diese Art ist durch die vielen, nach dem Blühen aus den oberen Blattwinkeln entspringenden, mit sehr schmalen Bltt. dicht besetzten Aeste ausgezeichnet. Drüsenanhängsel gelb. Die Unterseite der Bltt. ist oft von einem Pilze, *Aecidium Euphorbiae* Persoon bedeckt, der die Entwicklung der Blüthe hindert und ein verändertes Aussehen der Pflanze bewirkt; diess ist die *E. degener* Krocker. Die Wurzel ist als *R. Esulae minoris* officinell. Das Vieh frisst die Pflanze nicht, und wenn es geschieht, nicht ohne Nachtheil.

E. Esula L. Schirme vielstrahlig, Stiele mehrmals 2spaltig; Kapseln fein körnig-punctirt; Bltt. linealisch, kahl, die unteren nach der Spitze keilfg. - verbreitert und nach dem Gr. verschmälert; Bltt. der 2ten Hülle eirautenförmig.

An Wegen, Gräben, um Gebüsch, auf Brachen, in der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig, doch nicht überall und etwas seltner als die vorige. Mai - Juli. 2.

Diese Art ist bei der ersten Entwicklung von der vorigen auffallend verschieden; gegen die Fruchtreife aber oft so ähnlich, dass man sie nur schwer unterscheidet. Dunkler grün. H. 1 - 1½'. Drüsenanhängsel gelb, bisweilen an der Frucht purpurroth.

E. lucida Waldst. u. Kit. Schirme vielstrahlig, Stiele mehrmals 2spaltig; Kapseln fein körnig-punctirt; Bltt. lanzettlich oder linealisch, oberseits glänzend, kahl; Blätter der 2ten Hüllen eirautenförmig.

α. latifolia. Bltt. länglich-lanzettlich, vorn gerundet und stumpf; 2 - 4' hoch.

β. salicifolia. Bltt. lineal-lanzettlich, spitzlich; 1½' h.

γ. linearifolia. Bltt. dicht, schmal-linealisch, spitzlich; 1' h.

Auf Angern, Weide- und Sandplätzen, zwischen Ufergebüsch, besonders in Weidengesträuch an den *Oderufern*, bisher nur in der tieferen Ebene beobachtet. Häufig um Br. bei *Pöpelwitz*, *Kl. Kletschkau*, *Oswitz*, *Kosel*, *Masselwitz*, *Scheitnich*, in der *Strachate*, bei *Sandberg* und *Margareth*. Um *Wohlau*, *Pasche* bei *Beuthen a. O.*, *Ohlau*. Juli, Aug. 2.

H. 1 - 3'. Die Höhe und die bedeutende Breite der oberseits glänzenden Bltt. sind die Hauptunterschiede von *E. Cyparissias*, welche übrigens fast in allen Kennzeichen übereinstimmt. Merkwürdig ist es, dass die *E. lucida* durch eine Reihe von Formen sich der *E. Cyparissias* nähert und zuletzt so in diese übergeht, dass man die äussersten Glieder nicht mehr von dieser zu unterscheiden im Stande ist, da doch beide unzweifelhaft verschiedene Arten sind. An der Mehrzahl der Standorte findet man nur die hohe breitblättrige Form mit geringer Variation; die vollständige Uebergangsreihe wurde bei *Margareth* und *Sandberg* bei Br. durch mehrere Jahre beobachtet.

E. Peplus L. Schirm 3strahlig, Stiele mehrmals 2spaltig; die Kapselfächer am Rücken mit zwei schwachgeflügelten Kielen; Bltt. gestielt verkehrt-eiförmig, ganzrandig; Blättchen der 2ten Hüllen eiförmig.

Auf Gartenland und Gemüsfeldern, d. d. g. G. gemein. Juni - September. ☉.

H. ½'; schwach graugrün. Blumen grünlich-gelb.

E. exigua L. Schirm 3strahlig, Stiele mehrmals 2spaltig; die Kapseln glatt, die Samen höckerig-runzlich; Bltt. linealisch; Bltt. der 2ten Hüllen aus herzförmigem Grunde linealisch, spitz.

Auf Aeckern und Brachen, besonders sandigen, in der Ebene zerstreut. Um Br. bei *Kleinburg* und *Krittern*, *Schwöitsch*, *Rake*, *Kl. Bischwitz*, *Lissa u. m. Wohlau*, *Beisch b. Beuthen a. O.* *Ohlau*, *Oppeln*, *Jägerndorf*, *Ustron*. Juli, Aug. ☉.

H. 1 - 6''. Stängel meist aufsteigend, bald einzeln, bald ein Hauptstängel mit mehreren kürzeren Nebenst. Bltt. vorn meist stumpflich und eingedrückt oder auch mit einer Stachelspitze.

* **E. Lathyris** L. *Springkörner*. Bltt. kreuzweis-gegenständig, linealisch, sitzend.

Einheimisch im südlichen Deutschland; bei uns durch Anbau hin und wieder verwildernd. Juni, Juli. ☉.

H. 1½ - 2'. Bltt. etwas glänzend, die oberen am Gr. herzförmig. Die Blättchen der zweiten Hüllen länglich-eiförmig, spitz. Schirm 4strahlig. Diese Art hat einen sehr scharfen blasenziehenden Milchsaft und die Samen, *S. Cataputiae minoris*, wirken stark drastisch.

Mercurialis L. Bingelkraut. Blumen zweihäusig oder einhäusig. Blumenhülle 3- oder 4theilig. Staubgefässbl. mit 8 Staubgef., in unterbrochenen Aehren. Stempelblumen in sitzenden Büscheln mit zwei Staubfäden ohne Staubbeutel. Kapsel 2fächerig, 2samig. XXII, 8.

M. perennis L. Stängel ohne Aeste; Bltt. länglich-eifg.; Stempelblumen lang-gestielt.

In schattigen Laubwäldern der höheren Ebene u. d. Vorgeb., d. d. g. G. verbreitet. Um Br. bei *Arnoldsmühl und Lissa, Kl. Tot-schen.* Vom *Zobtenberge* d. d. g. Vorgeb. April, Mai. 2.

Wurzel kriechend. Stängel 1' h. Bltt. gegenständig, kurzgestielt, mit Stützbltt., kerbig-gesägt. Kapseln borstig. Wird beim Trocknen blau und enthält Indigo. Das Kraut wirkt drastisch und betäubend.

M. annua L. Stängel ästig; Bltt. gestielt länglich- oder eifg.-lanzettlich; Stempelblumen sitzend.

Auf Kräutereien und Gemüseäckern, an Mauern, hie und da, vielleicht vom Anbau verwildert, gewiss wenigstens eingeführt. Um Br. bei *Gabitz und Gräbschen. Bunzlau in der Niedervorstadt.* Am fürstl. Schlosse in *Troppau* nach v. Mückusch. Aug. Sept. ☉.

Stängel 1' h., knotig-gegliedert. Bltt. gegenständig, elliptisch. Wirkt gelind eröffnend und ist ein Hauptbestandtheil des Gesundheits Syrups.

Celastreae R. Br.

Keleh 4-5theilig, mit dachziegelförmiger Knospenlage. Kronenbltt. zwischen den Kelchzipfeln aus einer mit dem Kelche verwachsenen Scheibe entspringend. Staubgef. zwischen den Kronenbltt., eben da entspringend. Fruchtknote frei 2-4fächerig, mit je 1 oder mehreren aufrechten Eichen am inneren Winkel. Frucht (and. unsrigen,) eine 2-5 fächerige Kapsel, mit Scheidewänden aus der Mitte der Klappen. Samen einzeln oder paarweis mit grossem fleischigem Samenmantel, fleischigem Eiweiss, geradem Keim.

Sträucher mit ungetheilten gestielten Blättern.

Euonymus L. Pfaffenhütchen. Der Kelch sitzt auf einer schildförmigen Scheibe. Vier oder fünf Staubgef. auf einer warzig-angeschwellenen den Stempel umgebenden Scheibe. Drei- bis fünfeckige Kapsel. v, 1.

E. europaeus L. Pfaffenrösel. Spindelbaum. Kronenbltt. länglich; Aeste vierkantig glatt; Kapseln ungeflügelt; der Mantel bedeckt den ganzen Samen.

In Hecken und Gebüsch, Waldrändern, Dämmen d. d. g. G. bis in d. Vorgeb. häufig. Mai, Juni. ♀.

H. 4 - 5'. Die jungen Aeste schlank und gerade mit kantiger grüner Bindendecke. Blüten doldentraubig, winkelständig. Kronenbltt. grün. Kapseln rosafarben, Mantel orangef., Samen weiss. — Holz gelb, hart und gleichförmig. Die ganze Pflanze ist bitter und scharf; die Samen wirken drastisch und enthalten ein dickflüssiges fettes Oel, früher officinell als *Fr. Tetragoniae*.

E. verrucosus L. Kronenbltt. rundlich; Aeste stielrund, warzig; Kapseln ungeflügelt; der Mantel deckt den halben Samen.

In Laubwäldern besd. in hügeligen Gegenden. Bei *Trebnitz* am *Donatusb. u. im Buchenwalde*. *Swibedove* bei *Militsch*. *Annaberg u. Wyssoka Hora* in *OS*. Mai, Juni. $\frac{1}{2}$.

Bltt. hellgrün, lang-gestielt. Zweige dicht mit schwarzgrauen Warzen besetzt.

Staphyleaceae Bartling.

Unterscheidet sich von der vorigen F. durch: Samen beihart, ohne Mantel und ohne Eiweiss. Blätter zusammengesetzt.

Staphyléa L. Kelch fünftheilig. Fruchtknote 2-3 lappig. Kapsel 2-3 fächerig, innenwärts aufspringend, mit wenigen Samen in jedem Fache. v, s.

S. pinnata L. *Pompelmuss*. Bltt. gefiedert; Blättchen länglich-lanzettlich; Blüten in Trauben; Kapseln aufgeblasen.

Wird in Parkanlagen cultivirt, und hie und da, z. B. um *Leob-schütz*, verwildert. Sie soll jedoch nach Scholtz im Gebirge bei *Schönau* wild vorkommen. Mai, Juni. $\frac{1}{2}$.

H. 4 - 6'. Blättchen 5 - 7, gesägt. Samen weiss, werden zu Rosenkränzen verwendet.

Loranthae Don.

Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen; Saum vierlappig oder undeutlich. Vier Kronenblätter, oft am Gr. verbunden, mit klappiger Knospenlage, aus dem Kelchrande. Vier Staubgef. hinter den Kronenbltt., oft ohne Staubfäden. Ein einfächeriger Fruchtknoten mit einem aufrechten Ei, und kopfförmiger oder sitzender Narbe. Frucht eine vom Kelchrand gekrönte einsamige Beere. Same mit fleischigem Eiweiss und umgekehrtem Keim.

Schmarotzende Strauchgewächse mit gegenständigen lederartigen Bltt. ohne Stützbtt. und mit klebrigem Saft in allen Theilen. In den tropischen Ländern Arten mit prachtvollen Blumen.

Viscum L. *Mistel*. Ein- oder zweihäusig. Vier Staubbeutel ohne Fäden mit vier fleischigen am Gr. verbundenen Kronenbltt. ohne Kelch verwachsen. Fruchtknoten mit sitzen-

der Narbe von vier freien Kronenbltt. und dem Kelche umschlossen, dessen Röhre verwachsen und dessen Saum un- deutlich ist. Einsamige Beere. XXII, 4.

V. album L. *Weisser M., Vogelleim*. Stängel gabelig-vielästig; Bltt. lanzett-spathelförmig.

Auf Aeaten und Zweigen von Kiefern, Eichen, Linden u. Pappeln schwarzrotzend, d. d. g. G., in der Ebene u. d. Vorgeb., hie und da in grosser Menge. Wald bei *Pilsnitz, Heydewilzen, Lissau. m. Trop. u. Te.* März, April, die Saunen reifen im Herbst und Winter. h.

Bildet ründliche Büsche. Die Wurzel dringt zwischen Rinde und Holz. Bltt. dick und lederartig. Beere schmutzig-weiss, voll klebrigen Harzsaftes, woraus man ehemals Vogelleim bereitete. Die Stängel waren als *Lignum St. Crucis* officinell. Bei den Druiden war die Pflanze heilig.

Grossulariae DC.

Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen; Saum 4-5 theilig. Kronenbltt. zwischen den Kelchzipfeln, am Kelchschlunde befestiget, welkend aber nicht abfallend. Vier oder 5 freie Staubgef. zwischen den Kronenbltt. Fruchtknote einfächerig mit zwei entgegengesetzten wandständigen Samenhältern und vielen Eichen. Zwei Griffel mit stumpfen Narben. Frucht eine vielsamige Beere; Samen an langer Schnur, wagsrecht, mit hornartigem Eiweiss und sehr kleinem Keim.

Sträucher mit büscheligen oder wechselständigen Bltt. und in Stacheln verwandelten Stützblättchen, oder ohne Stützblättchen. Eine einzige Sippe in mässig kalten Gegenden. Einige Arten im höheren Gebirge.

Ribes L. *Johannisbeere. Stachelbeere.* V, 1

* *R. Grossularia* L. *Stachelbeere, Christbeere*. Blütenstiele 1-3 blumig, mit 2-3 Deckblättchen; Kelch glockig mit zurückgeschlagenen Zipfeln; Blätterbüschel von dreitheiligem Stachel gestützt.

Wird in Gärten sehr häufig angebaut, und findet sich hie und da auch verwildert in Wäldern und auf Mauern. Ob sie bei uns vielleicht im Vorgebirge wirklich einheimisch sei, bleibt noch zweifelhaft. Apr. Mai. h.

H. 2-3'. Bltt. handfg., 3-5lappig. Beeren kugelig oder länglich, weisslichgrün oder röthlich. Die Bekleidung, sowohl der Bltt. und Kelche, als auch der Beeren, ist sehr veränderlich; letztere oft mit Haaren oder Drüsenborsten besetzt.

R. alpinum L. Trauben aufrecht drüsig-behaart; Kelch flach kahl; Kronenbltt. spatelfg.; Deckbltt. lanzettlich länger als der Blumenstiel.

An bewaldeten und felsigen Lehnen im Vor- und Hochgebirge bis in die Ebene herab. Um *Bunzlau b. Neuland u. Kinzendorf wnt. d.*

Walde n. Schn. Schlesierthal. Fürstensteiner Gr. Im Käthenloche bei Reimsbach. Riesengeb. am Zacken- u. Elbfalle u. b. d. Schlingelbaude. Waldenburg im Gesenke. Mai, Juni. h.

H. 3-4'. Rinde hellgrau, glatt. Aeste dünn. Bltt. 5lappig. Kronenbltt. gelblich-grün. Ist zweihäusig; die Staubfädenblumen stehen in langen vielblumigen, die Stempelblumen in kurzen, 3-5blumigen Trauben; letztere zwar mit Staubbeuteln, die aber leer sind.

R. nigrum L. Gichtbeere. Trauben weichhaarig hängend; Kelch weichhaarig drüsig-punctirt, glockig; Kronenbltt. länglich; Deckbltt. pfriemlich kürzer als der Blumenstiel; Bltt. unterseits drüsig-punctirt.

An Bachufern und Grabenrändern in niederen Waldgegenden, d. d. g. G. auch im Vorgeb. Um Br. bei Wildschütz hinter der Mühle, Sakerau, Lissa. Zw. Blössel und Wiesa. Waldmühle bei Kritschen. Dyhrenfurth. Ohlau. Wohlau. P. Tarnau b. Beuthen a. O. Sirkwitz b. Bunzlau. Charlottenbrunn. Hirschberg. Oppeln. Gr. Lassowitz in OS. n. Matt. Jägerndorf. Teschen. April, Mai. h.

H. 3-4'. Rinde granbraun, im Winter schwarz. Aeste dicklich. Bltt. 5lappig. Kronenbltt. weisslich-grün, innen roth. Riecht widerlich. Die Beeren sind schwarz, grösser als von den folgenden, ungeniessbar. Die Bltt. wirken schweisstreibend, und sind ein Hauptbestandtheil des Maiweines.

R. rubrum L. Trauben fast kahl übergeneigt, bei der Frucht-reife hängend; Kelch kahl fast eben; Kronenbltt. spatelfg.; Deckbltt. eifg. kürzer als der Blumenstiel.

In Wäldern, vorzüglich innerhalb grosser Laubwaldungen im dichten Gestrüpp an feuchten Orten wild, und höchst wahrscheinlich ursprünglich einheimisch, an vielen Orten durch den Anbau verwildert. Apr., Mai. h.

H. 3-4'. Rinde gran. Aeste dicklich, krumm. Bltt. in der Jugend unterseits schwach graufilzig. Kronenbltt. gelblich-grün. Beeren roth, süssäuerlich von kühlendem Geschmack, Aepfel- und Citronensäure enthaltend. — Varietät: Grund des Kelches braun-gesprenkelt, Kronenbltt. und Griffel sehr kurz; eine andere in Gärten mit gelben Beeren.

R. petraeum Wulfen. Trauben schwachzottig, erst aufrecht dann überhängend, zuletzt hängend; Kelch kahl, glockig mit gewimperten Zipfeln; Kronenbltt. spatelfg.; Deckbltt. eiförmig kürzer als d. Blumenstiel.

An steilen Gebirgslehnen, am Rande von Bächen. Auf dem Gl. Schneberge unter dem Gipfel. Am kt. Teiche im Riesengeb. Im Kessel im Gesenke; auch nach R. u. M. bei Carlsthal u. Einsiedel. Mai, Juni. h.

H. 3-4'. Sieht der vorigen sehr ähnlich; die Lappen der Bltt. sind aber viel spitzer. Blumen grün, dicht mit rothen Punkten gesprenkelt, daher zur Blüthezeit sehr zierlich.

B. DICOT. MONOPETALAE.

Die Blumendeckblätter doppelt: Kelch und Krone. Die Krone besteht aus einem einzigen am Grunde mehr oder weniger röhrenförmigen, nach vorn in gleichförmige oder seltner ungleichförmige Abschnitte (Zipfel, Lippen) getheiltem Blatte.

III. DICOT. MONOPET. PERIGYNAE.

Die Blumenkrone steht auf dem Kelche, und zwar entweder zugleich auf der Spitze des Fruchtknotens (*corolla epigyna*), wenn die Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen ist, oder um denselben (*corolla perigyna*) und dann gewöhnlich auf einer mit der Kelchröhre verwachsenen, den Fruchtknoten umgürtenden ringförmigen Scheibe, welche als Fortsetzung des Blumenbodens zu betrachten ist.

Zu dieser Abtheilung gehören fast die ganze neunzehnte, der grösste Theil der vierten, ein Theil der achten, zehnten und fünften Klasse Linné's.

Cucurbitaceae Jussieu.

Blumen meist ein- oder zweihäusig. Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen, Saum fünfzählig. Krone fünfspaltig, a. Gr. mit dem Kelchsaum verwachsen, trichter-glockenförmig. Fünf Staubgef. meist paarweise verbunden, das fünfte frei, oder in zwei Bündel verwachsen. Staubbeutel frei, seltner verwachsen, lang und gewunden. Fruchtknoten 1-5fächerig mit wandständigen Samenhältern. Frucht eine fleischige Beere, in der die Fächer verschwinden. Samen mit einem Mantel, ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Kräuter, in den wärmeren Gegenden heimisch, mit kletterndem Stängel durch spiralförmige Ranken, welche die Stützbll. vertreten, und grossen gelappten Blättern, Blüthen in den Blattwinkeln; mit bitterem Saft aber häufig essbaren Früchten. Bei uns kaum heimisch.

Bryonia L. *Zaunrübe*. Krone tief 5theilig. Drei Staubgefässe, zwei mit zweifächerigem und der dritte mit einfächerigem Staubbeutel. Kugelige dreifächerige Beere. XXI, 10.

B. alba L. *Gichtrübe*. Blumen einhäusig; Kelche an den Stempelblumen so lang als die Krone.

In Hecken und an Gartenzäunen, stets um menschliche Wohnungen d. d. g. G. nicht selten, wahrscheinlich durch Zufall eingeführt, aber schon seit langer Zeit verwildert. Juni, Juli. 2.

Windend bis 6 - 8' h. Bltt. fünfblappig, scharf. Bläthen gelbgrün in verlängerten Doldentrauben. Beeren schwarz. Wurzel rübenförmig, hat frisch einen widrigen Geruch und bitteren Geschmack, wirkt drastisch und röthet die Haut.

Viburneae Bartling.

Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen; Saum kurz, abfällig. Die Krone glockig oder radförmig, gleichförmig 5theilig, sitzt auf einem sehr kleinen Ringe an der Spitze des Fruchtknotens. Fünf freie Staubgef. in der Röhre oder dem Schlunde der Krone. Fruchtknoten dreifächerig mit je einem hängenden Ei. Drei sitzende Narben. Frucht beerenförmig, innen markig, mit 3 oder durch Fehlschlagen einem Samen, welche an der Spitze einer sädlichen Axe hängen, mit hornigem oder fleischigem Eiweiss und geradem Keim.

Sträucher mit gegenständigen getheilten Bltt., ohne Stützbltt., markigen Zweigen und Blumen in Aferdolden, in feuchten Waldgegenden.

Viburnum L. Schlinge. Beere einsamig mit bleibendem fünfzähligen Kelchsaum gekrönt. v. 1.

V. Opulus L. Kalinkebeeren. Massholder. Bltt. 3-5lappig; Doldentrauben endständig, die Blumenkronen am Rande grösser und unfruchtbar.

In feuchten Gebüschern, an Waldrändern, an Fluss- und Teich-ufern, d. d. g. G. häufig. Mai, Juni. 2.

II. 4 - 8'. Aeste aschgrau, ziemlich gerade. Blattzipfel spitz, gezähnt; Blattstiele drüsig, kahl. In Gärten ist häufig eine Form mit lauter vergrösserten, unfruchtbaren Blumenkronen, welche eine kugelige Aferdolde bilden, unter dem Namen *Schneeballen* bekannt. Beeren roth, ehemals wie auch Blumen und Binde officinell. — *V. Lantana* ist ein häufig angeplanzter Baum in Parks und Lustgängen, welche an eisförmigen, unterseits runzligen, mehlig-filzigen Blättern kenntlich ist.

Sambucus L. L. Holunder. Beere drei- bis fünfsamig mit undeutlichem Kelchsaum. v, 3.

Bltt. gefiedert.

S. nigra L. Flieder. Stamm baumartig; Trugdolde fünfspaltig; die Stützblätter fehlen oder sind durch Warzen angedeutet.

In feuchten Wäldern in der Nähe von Waldflüssen und Teichen, an Dörfern, Zäunen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juni, auch im September zum zweitenmale. 2.

Als Strauch und mässiger Baum. Binde gelbgrau mit Warzen; die jungen Aeste enthalten ein schönes Mark. Bltt. gefiedert, mit 5 eig.-gesägten Blättchen. Kronen

gelblich-weiss. Beeren blauschwarz. Die innere Rinde, Blätter und Beeren, unter d. Namen *Grana Actes* bekannt, wirken scharf und drastisch, von bitterem widrigem Geschmack. Die Blumen riechen süsslich und der Theeaufguss ist das gewöhnlichste Schwitzmittel.

S. racemosa L. Trauben-H. Stamm strauchartig; Blumen in eiförmigen Rispen.

In Waldgegenden, in feuchten Wäldern der Ebene und auf feuchten offenen Waldplätzen des Vor- u. Hochgebirges, meist gesellschaftlich. Bei *Marien-Cranst. Riemberg. Wohlau.* Bei *Sulau* in der *Wildbahn.* Vom *Zobtenberge* durch d. g. Vorgebirge und am Hochgebirge. Bei *Oppeln* und am *Annaberge* in *OS.* Im *Gesenke* u. um *Te.* April, Mai. ♀.

H. 4 - 5'. Blätter schmaler als an der vorigen. Kronen schmutzig-weiss. Beeren roth.

S. Ebulus L. Attich. Stängel krautig; Blumen in dreispaltigen Trugdolden; Stützblt. eig., gesägt.

An feuchten Waldplätzen, an Flussrändern u. Dorfzäunen. *Klein Oels bei Ohlau (Wichura) Kl. Silsterwitz, Manze. Ratibor und Leschnitz. Schlossberg* bei *Jägerndorf, Einsiedel* im *Gesenke*, bei *Strzebowitz, Lobenstein, Leitersdorf, Spachendorf, Benisch. Teschen.* Juni, Juli. ♀.

H. 4 - 6'. Blt. gefiedert, unterste Blättchen gedreit. Kronen weiss, aussen röthlich. Beeren schwarz. Blumen riechen stark und widerlich. Die Wurzel ist ekelhaft scharf und wirkt so wie die innere Rinde und Blätter drastisch.

Caprifoliaceae Jussieu.

Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen; Saum bleibend. Die Krone sitzt auf dem Fruchtknoten, röhrig oder trichterförmig, mit 5theiligem meist unregelmässigem Saum. Fünf oder auch vier paarige Staubgef. in der Kronenröhre entspringend. Fruchtknote 3-4 fächerig, mit je einem oder mehreren hängenden Eichen. Ein fädiger Griffel mit ungetheilter oder zweispaltiger Narbe. Frucht eine trockne oder saftige Beere, welche bisweilen durch Fehlschlagen einsamig ist. Samen mit fleischigem Eiweiss und geradem Keim.

Strauchartig mit gegenständigen ungetheilten Bltt. ohne Stützblt.

Lonicera L. Lonitzere. Kelchsaum kurz fünfzählig. Krone röhrig oder trichter-glockenfg., mit unregelmässig fünf-spaltigem Saum. Fünf Staubgef. Ein bis dreifächerige Beere mit wenigen Samen. v, 1.

Obere Bltt. oft verwachsen.

* *L. Caprifolium L. Je länger, je lieber.* Blüten in Quirlen und Köpfen; das endständige Köpfchen sitzend; die oberen Blätter durchwachsen - vereinigt.

Ist im südlichen Deutschland heimisch und wird bei uns in allen Gärten gezogen, daher hier und da scheinbar verwildert. Mai, Juni. ♀.

Die Zweige schlingen und winden sich. Die Oberlippe der Blume rollt sich nach aussen um. Die Beeren sind einzeln und vom bleibenden Kelchsaum gekrönt. Kronen weisslich oder fleischfarben, wohlriechend, besonders des Abends.

L. Periclymenum L. Blüten in gestielten Köpfen; sämtliche Blätter getrennt.

In Wäldern, zwischen *Skarsine* und *Glauche* kürzlich von Schummel gefunden, und am *Försterbache* bei *Bunzlau* nach Albertini. Ausserdem in Gärten oft angebaut und verwildernd. Juni, Juli. ♀.

Stimmt in den angemerkten Kennzeichen mit der vorigen überein. Kronen weisslich-gelb. Ehedem officinell.

L. Xylosteum L. *Heckenkirsche*. Blütenstiele zweiblumig zottig, so lang als die ovalen weichhaarigen Blätter.

In feuchten Gebüschern und Waldungen, an Bächen, in der Hügellage der Ebene und dem Vorgeb. Um *Br.* bei *Skarsine* am Bache und im *Glaucher Walde*. Am *Gröditzberge*. *Eichberg* bei *Briesnitz*. Bei *Charlottenbrunn* und *Kupferberg*. *Lähnhaus*, *Cudowa*. Um *Trop.* *Herlitz*, *Grätz*, *Teschen*. Mai, Juni. ♀.

H. 3 - 5', mit geraden gespreizten Aesten. Blumen winkelständig. Kronen feinhaarig, weiss mit einem grünen Kropf am Gr. der Böhre. Je zwei Fruchtknoten und später die Beeren sind am Gr. verwachsen, ohne Kelchkrone. Beeren roth, von purgirender Kraft. Das Holz wird zu Ladstöcken, Pfeifenröhren u. dgl. verarbeitet.

L. nigra L. Blütenstiele zweiblumig, kahl, länger als die länglich-elliptischen, anfangs weichhaarigen, später kahlen Blätter.

In Gebirgswäldern an feuchten und schattigen Stellen bis auf höhere Lehnen. Im Vorgeb. *Hirschfeld* bei *Briesnitz*, *Hochwaldgeb.*, an der *Eule*, *hohen Mense*, *Heuscheuer*, *Jauersberge* b. *Reichenstein*. Am *Gläzer Schneeberge*. Im Riesengeb. in der unteren Region, im *Elbgrunde*, am *Zacken* und *Kochelfall*. Gesenke im *Kessel*, um *Karlsthal*, *Kartsbrunn*. *Malinow* b. *Ustron*. Mai. ♀.

H. 2 - 4'. Aeste sehr bogig, sonst aufrecht und nicht windend. Bltt. dunkelgrün. Kronen fleischfarben. Beeren schwarz, paarweise verwachsen.

Anmkg. *Lonicera alpigena* soll nach v. Mückesch Angabe auf dem Gesenke wachsen, welche jedoch auf einer Verwechslung mit *L. nigra* zu beruhen scheint.

Linnaea Gronovius. *Linntia*. Kelchsaum fünfklappig, Lappen lang zugespitzt abfällig. Krone glockig mit fast gleichförmig 5-spaltigem Saum. Zwei längere und zwei kürzere Staubgef. Bere trocken, einsamig. XIV, 2.

L. borealis L.

Auf Moospolstern in Heidelöden. War von *Heyde* in *Oberschlesien* gefunden, Krock. sil. 1004; die anderen Angaben bei K. sind unsicher. Neuerdings im Knieholz am Eingange der *kl. Schneegrube* im *Riesengeb.* zuerst von *Riesenberger* gefunden. Juni, Juli. ♀.

Der fast holzige Stängel kriecht im Moose und treibt Blätter und aufrechte $\frac{1}{2}$ ' hohe Blüthenzweige. Blüthen söhlig, gepaart, auf oben blattlosen Stielen. Kronen weiss, innen roth-gestrichelt. Beeren schwarz, mit zwei vergrösserten Deckblät. verwachsen. Blüth. rundlich, immergrün.

Rubiaceae.

Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen aber an der reifen Frucht verschwindend; Saum 3-4theilig. Krone auf dem Fruchtknoten, der Saum mit klappiger Knospenlage. Staubgef. in der Kronenröhre entspringend, zwischen den Zipfeln der Krone. Fruchtknoten 2fächerig mit je einem aufrechten Ei. Zwei unten verwachsene Griffel. Die Frucht besteht aus zwei nicht aufspringenden verbundenen Nüsschen. Keim schwach gekrümmt in der Axe des hornigen Eiweisses.

Kräuter oder Stauden mit wirtelsindigen Blüth. ohne Stützblüth., knotig-gegliedertem Stängel, kleinen zahlreichen, meist rispig-endständigen Blumen, mit rothem Farbestoffe. Einige Arten sind sehr zahlreich und weit verbreitet, die Mehrzahl gehört der Ebene an. Zu einer anderen Abtheilung dieser Familie, mit gegenständigen Blüth., welche in den tropischen Gegenden einheimisch ist, gehören wichtige Arznei- und Nahrungspflanzen, z. B. *Cinchona*, *Coffea*.

Gálium L. *Sternkraut*. Kelchsaum undeutlich. Krone radförmig, mit 4- oder 3spaltigem flachem Saum. Griffel getrennt. Frucht: zwei verbundene Nüsschen ohne Kelchsaum. IV. 1.

Bei zwei Arten polygamische Blumen.

G. Cruciata Scopoli. *Valantia Cruciata* L. Blüth. zu vier; Blumenstiele winkelständig, ästig, mit Deckblättern; Früchte kahl; Stängel rauhaarig.

In feuchten Gebüsch an Grabenrändern und Bachufern im Vorgebirge zerstreut. Um *Charlottenbrunn* und *Salzbrunn*, *Nimptsch*, *Camenz*, *Reichenstein*, *Wartha*, *Kupferberg*, *Ketschdorf b. Hirschberg*, *Reinerz*, *Ustron b. Teschen*. Apr., Mai. 2.

Stängel von unten lang-ästig, 1' h. Blüth. elliptisch oder eiförmig, 3nervig, hellgrün. Blüthenstiele vielblumig, meist behaart. Kronen grünlich-goldgelb. Die Endblume ist zwittrig, die seitlichen tragen nur Staubgefässe.

G. vernum Scopoli. *Valantia glabra* L. Blüth. zu vier; Blumenstiele winkelständig, ästig, ohne Deckblüth.; Früchte und Stängel kahl.

An schattigen Dämmen und in feuchten Vorgehölzen in d. Ebene u. d. Vorgeb. zerstreut, meist sehr zahlreich. Um *Br.* bei *Pirscham* von *Krause* gef. Im *Hartebusch* zw. *Dürrhartau* u. *Jordansmühl*. *Bergel* u. *Seifersdorf* bei *Ohlau*. Im Riesengeb. um *Agnietendorf*, *Kupferberg*, *Schmiedeberg*. Gr. Glaz um *Reinerz* und *Wölfelsdorf*. *Neisse*. *Leobschütz*. *Herlütz*, *Grätz*, *Spachendorf*, *Jägerndorf*, *Czatory* bei *Ustron*. Mai, Juni. 2.

Stängel bis 1'. Mattgrün, kleiner und schwächer als die vorige. Bltt. lineal-elliptisch, am Rande feingewimpert. Blütenstiele arblumig; die Blumen polygamisch wie bei der vorigen. Kronen blassgrün.

G. Aparine L. Klebekraut. Zungenpeitsche. Bltt. zu sechs, lineal-lanzettlich, einnervig, am Rand und Kiel rückwärts-stachelig, Stängel vierkantig, rückwärts-stachelig; Blütenstiele winkelständig; zuletzt rispig; Früchte steifborstig oder kahl.

β. kleiner, Früchte um die Hälfte kleiner, steifborstig.

γ. kleiner, Früchte um die Hälfte kleiner, kahl. *G. spurium L.*

In Hecken, Gebüsch und Gestrüpp, an Zäunen, Mauern und β. u. γ. vorzüglich auf Feldern unter der Saat, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juni—Herbst. ☉.

Stängel schlapp und ausgebreitet, bis 5' lang. Ist leicht daran zu erkennen, dass sie vermittelst ihrer Stacheln an alle Gegenstände, selbst an die Hand, bei leiser Berührung sich anhakt. — Die Wurzel enthält rothen Färbestoff und die Früchte dienen in Irland statt Kaffeh.

G. uliginosum L. Bltt. zu sechs, lineal-lanzettlich, einnervig am Rand und Kiel rückwärts-stachelig; Stängel vierkantig rückwärts-stachelig; Blütenstiele kurz, rispig; Früchte kahl feinkörnig.

Auf Sumpf- und Moor-Wiesen, d. d. g. G., bis ins Vorgeb.; an geeigneten Stellen häufig. Um Br. bei *Friedewalde, Lissa, Riemberg* u. m. Juni, Juli. ♀.

Stängel schwach, gestreckt, fast fadenförmig, bald einfach, 2-3'' lang, bald vielästig, bis 1' lang, etwas starr und zerbrechlich. Kronen weiss, breiter als die entwickelte Frucht. Blütenstiele zum Theil rechtwinklig-abstehend. An kleinen Exemplaren sind die Blütenstiele winkelständig.

G. palustre L. Bltt. zu vier, lineal-länglich, stumpf, einnervig, am Rande rückwärts-scharf; Stängel viereckig; Blütenstiele weitläufig-rispig; Fruchstiele rechtwinklig-abstehend; Früchte kahl und glatt.

Auf feuchten Stellen, in Gräben, an Teichrändern, an Flussufern, auf sumpfigen Wiesen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Mai, Juli. ♀.

Stängel schlapp und schlaff, mit wenigen Aesten, meist 1' lang. Bltt. auch zu 5 und 6, selten ganz kahl. Kronen weiss.

G. rotundifolium L. Bltt. zu vier, oval, dreinervig; Stängel viereckig; Blütenstiele in endständiger arblättriger Rispe; Früchte steifborstig.

In trocknen Kiefer- und Laubwäldern der höheren Ebene und des Vorgebirges. Um Br. in den *Trebnitzer* Hügeln bei *Skarsine, Trebnitz* u. m. bis *Wohlau*. Vom *Zobtenberg* durch das ganze Vorgeb. *Sattler* bei *Hirschberg*. *Grosstein* bei *Oppeln*. *Trop. u. Te.* Juli, Aug. ♀.

Wurzel kriechend. Stängel schwach, flatterig, $\frac{1}{2}$ ' h., leicht zerbrechlich. Bltt. am Rande mit Borsten besetzt. Kronen weiss. — Hierher auch *Asperula laevigata* Krock. sil.

G. boreale L. Bltt. zu vier, lanzettlich, dreinervig; Stängel steif aufrecht, viereckig; Blütenrispe endständig; Früchte borstenfilzig.

Auf trocknen Wiesen, Waldwiesen, Haiden bis auf die Kämme des Hochgebirges, häufig d. d. g. G. Juli, Aug. 2.

Stängel 1' h., kahl oder feinhaarig. Bltt. kahl, mit unterseits vorragenden Nerven. In feuchten Gebüsch und moosigen grasreichen Kieferwäldern bisweilen mit grösseren sehr breiten Bltt. Fruchtstiele sühlig-abstehend. Früchte mit kurzen dichten hakenförmigen Borsten besetzt. Die Varietät mit kahlen Früchten ist bei uns noch nicht aufgefunden worden.

G. verum L. Labkraut. Wegstroh. Bltt. zu 8, linealisch, stachelspitzig, unterseits sammtfilzig, am Rande zurückgerollt; Stängel steif, stielrund mit vier Ribben; feinhaarig-schürflig; Rispenäste dickblüthig; Fruchtstiele rechtwinklig abstehend; Kronenzipfel stumpf mit ganz kurzer Spitze; Früchte kahl und glatt.

An Wegen, Rainen, Gebüsch- und Waldrändern, auf trocknen Wiesen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juni—Aug. 2.

Wurzel gelbroth. Stängel 1 - 2' h. Bltt. oberseits glänzend. Kronen goldgelb, von süsslichem Geruch, der sich nach Linné besonders bei bevorstehendem Regen verstärkt. *Summitates Galii lutei* waren officinell. Alle *Galia* werden gern von Hausthieren gefressen. Dass das Kraut die Milch gerinnen mache, wird jetzt als ein Irrthum bezeichnet. Die Blumen mit Alann dienen zum Gelbfärben der Wolle.

G. Mollugo L. Bltt. zu 8, lanzettlich, nach vorn etwas breiter, stachelspitzig, unterseits matt; Stängel viereckig; Rispe ausgebreitet, Fruchtstiele rechtwinklig-abstehend; Kronenzipfel feinspitzig; Früchte kahl schwach-runzlig.

An Hecken, Wegen, Waldrändern, in Gebüsch, auf Wiesen d. d. g. G., auch im Vorgeb. gemein. Juni. Juli. 2.

Stängel meist aufsteigend, an den Gelenken stark geschwollen, weisslich, mit ausgebreiteten Aesten. Bltt. oberseits schwach-glänzend, unterseits kahl und matt. Kronen stets weiss! — Diese und die vorige Art stehen einander so nahe und wachsen so häufig neben einander, dass die Entstehung von Bastarden fast unvermeidlich ist. Man findet diese in allerlei Formen, welche bald der einen, bald der anderen Art näher stehen (*Gal. ochroleucum* W. et Gr. sil.), und sich bald durch die weissgelben oder schwefelgelben Kronen ankündigen.

G. sylvaticum L. Bltt. zu 8, länglich-lanzettlich, stumpf mit einer Stachelspitze, am Rande scharf; Stäng. stielrund mit vier Ribben; Rispe weit; Blütenstiele vor der Blüthe nickend; Fruchtstiele aufrecht-abstehend; Früchte kahl schwach-runzlig.

In trocknen Laubwäldern der höheren Ebene n. des Vorgebirges d. d. g. G. häufig. Um Br. bei *Schwoitsch*, *Lissa*, *Trebnitzer Hügel*. *Zobtenberg* etc. Juni, Juli. 2.

Stäng. meist kahl, aufrecht, 2 - 4' h., weisslich mit stark geschwollenen Gelenken. Bltt. graugrün. Kronen weiss. Wird beim Trocknen leicht schwärzlich. — Hierher auch *G. montanum* und *G. glaucum* Krock. sil.

G. sylvestre Pollich. Bltt. zu 8, lineal-lanzettlich, vorn breiter, zugespitzt mit einer Stachelspitze, einernervig; die unteren verkehrt

ei-lanzettlich; Stängel niederliegend oder aufsteigend viereckig; Blüten in doldentraubigen Rispen; Kronenzipfel spitz; Früchte schwachgekörnt.

β. supinum. 2 - 3" hoch; endständige armlüthige Doldentraube.

Auf trocknen belaubten oder felsigen Hügeln, an sonnigen und steinigen Waldlehnen und in den Felsritzen des Vor- und Hochgebirges. *Geiersberg. Fürstenstein. Krauschner Höhen, Gröditzberg u. Warthe b. Bunzlau. Eulengeb. und Jänowitzer Berge bei Liegnitz. Charlottenbrunner Berge. Riesengebirge. Henschelkoppe bei Neurode. Gl. Schneeberg. Gesenke im Kessel, am Hockschar. β. kl. Schneegrube und Teufelsgärtchen im Rsgb. Juni, Juli. 2.*

Von 2" - 1 1/2" lang, meist rassenförmig-vielstänglig. Stängel liegend, kahl oder scharf. Bltt. bald kahl, bald am Rande schärflich. Kronen weiss. Var. *β.* ist eine Zwergform, an Felsen im Hochgebirge. Ausserdem giebt es noch andere Abänderungen. Hierher auch *G. pusillum* Krock. sil.

G. saxatile L. *G. hercynicum* Weigel. W. et Gr. sil. Krock. suppl. 216. Bltt. zu 6, einnervig, stachelspitzig, die unteren verkehrt eig., die oberen verkehrt-lanzettlich; Stängel viereckig, kahl, gestreckt, die blühenden aufsteigend; Blüten in doldentraubigen Rispen; Früchte gekörnt.

Auf trocknen und steinigen Plätzen an tieferen Stellen des Hochgebirges. Im *Hirschberger Thale* bei der *Drachenburg* und am *Hochsteine* von v. Flotow gef. Auf der *Iserwiese* und *hinter d. Iser am Wege nach dem Buchberge* nach N. v. E. *Tafelfichte* n. Rabenhorst. Juli, Aug. 2.

Von 3 - 12" lang, vielästig, dicht mit Blättertrieben besetzt. Wird beim Trocknen leicht schwarz. Kronen weiss.

Aspérula L. *Meyer.* Kelchsaum sehr kurz. Krone trichter- oder glockenfg., 3- oder 4theilig. Griffel theilweise verwachsen. Frucht: zwei verbundene Nüsschen ohne Kelchsaum. IV. 1.

Bei einigen Arten ändern die Blumenkronen mit langer und kurzer Röhre ab.

A. arvensis L. Bltt. unterseits scharf, die unteren zu 4 verkehrt-eiförmig, die oberen zu 6-8 lineal-lanzettlich; Blüten in endständigen Büscheln mit borstenhaariger Hülle; Früchte glatt.

Auf Sandplätzen. Ich sah lebende Exemplare, welche Günther aus der Gegend von *Riemberg* erhalten hatte: bisher gelang es mir noch nicht, die Pflanze in der bezeichneten Gegend wiederzufinden. Bei *Luck u. Fulnek* nach R. u. M.

Wurzel hell purpurroth. Stängel aufrecht; 1' h. Kronen blan.

A. tinctoria L. Aufrecht, mit aufrecht-abstehenden Aesten; Bltt. linealisch am Rande schärflich, unten zu 6, oben zu 4; Blüten in endständigen Doldentrauben mit eiförmigen Deckbltt.; Kronen glatt; Früchte glatt.

Auf trocknen sonnigen Hügeln und Haideplätzen, selten. Bisher nur auf dem Gipfel des *Geiersberges* von Schummel und um *Grosstein* bei *Oppeln* von Grabowski und um *Nimptsch* v. Wichura gef. Bei *Katscher* nach Wenck. Fehlt in *Oestr. Schl.* Juni, Juli. 2.

Wurzel kriechend, gelbroth. Stängel einzeln. Kronen weiss mit langer Böhre.

A. cynanchica L. Bltt. zu 4 linealisch, am Rande scharf; Stängel büschelig, aufsteigend mit vielen abstehenden Aesten, Blüten in doldentraubiger Rispe mit lanzettlichen stachelspitzigen Deckbltt.; Kronen schärflich; Früchte gekörnt.

Auf sonnigen und steinigen Plätzen, in Haiden, in hügligen Gegenden, zerstreut. Bei *Reinerz*. In *OS.* bei *Oppeln* am *Moritzberge* und bei *Grosstein*, um *Katscher* und *Dirschel*, *Gr. Herlitz*, *Eckersdorf*, *Hermersdf.* bei *Troppau*. *Gurek* bei *Te.* *Dankwitz* bei *Jordansmühl* nach Winkler. Juni, Juli. 2.

Vielstänglig und vielästig, 1' lang. Wurzel braunroth, stark. Blüten in dreigabligten Doldentrauben. Kronen weisslich, aussen fleischfarben, mit langer Böhre.

A. odorata L. *Waldmeister*. Bltt. zu 6 und 8, breit-lanzettlich, am Rande und Kiele scharf; Stängel einfach; Blüten in gestielten Doldentrauben; Früchte mit hakigen Borsten besetzt.

In schattigen Wäldern, besd. von *Fagus*, des Vorgebirges, bis in die Ebene herabsteigend, bisw. ganze Hügellehnen bedeckend, d. d. g. G. Um *Br.* bei *Schwoitsch*. Häufig in der *Trebnitzer* Hügelreihe. *Ohlau*. *Wohlau*. *Bunzlau*. *Oppeln*. Vom *Zobtenberge* durch das ganze Vorgebirge. Mai, Juni. 2.

Wurzel fädlich, kriechend. Stängel 4 - 8'' h. Bltt. oberseits glänzend. Kronen weiss, wohlriechend. Als *Matrisylvae Herba* officinell. Hat getrocknet einen starken angenehmen Geruch und ist besonders als Hauptbestandtheil des Maitranks (nebst Bltt. d. schwarzen Johannisbeere, Melisse und Pfeffermünze) wichtig. Wirkt tonisch.

A. Aparine Schott. *A. rivalis* Sibthorp. W. et Gr. sil. Bltt. zu 8, verkehrt-lanzettlich, am Rande und Kiel mit rückwärts gerichteten Stacheln besetzt; Blüten in weitläufiger Rispe; Früchte gekörnt.

In feuchten Gebüsch und zwischen Gestrüpp. Zuerst im J. 1818 am Ufer der Weistritz bei *Arnoldsmühl* von mir gef., dann an den *Oderufern* um *Br.* bei *Kl. Kletschkau*, *Grüneiche*, *Ottwitz*, in der *Strachate*. In O. S. um *Poln. Neukirch*, *Czenschkowitz* und *Sukkwitz* nach Wenck. *Trop. Stremplowitz* n. RM. Juli, Aug. 2.

Stängel scharf, wie die Bltt., kstig, ausgebreitet, 2 - 3', gewöhnlich zwischen Gebüsch emporsteigend, hängt an wie *Galium Aparinae*. Bltt. oberseits glänzend. Kronen weiss, bei uns mit sehr kurzer Böhre. In Mähren dagegen eine Form mit langer Blumenröhre, welche sich sonst in nichts unterscheidet.

Sherardia L. *Sherardie*. Kelchsaum vierzählig. Krone trichterförmig vierspaltig. Griffel oben kurz getheilt. Frucht: zwei verbundene Nüsschen, jede mit einem ganzen und zwei gespaltenen Kelchzähnen gekörnt. IV. 1.

S. arvensis L.

Auf Aeckern unter der Saat und auf Brachen d. d. g. G. zerstreut. Juni, Aug. ☉.

Wurzel kriechend, roth. Stängel aufsteigend, 4 - 6' h., mit zerstreuten steifen Haaren. Kronen satt lilafarben.

Rubia L. Röthe. Kelchsaum kurz, vierzählig. Krone glockig-trichterförmig, Griffel getrennt. Frucht: zwei saftige, pflaumenartige verbundene Nüsschen ohne Kelchsaum. IV. 1.

* **R. tinctorum L. Färberröthe. Krapp.** Bltt. zu vier, netzaderig.

Ist in Südeuropa und im Orient einheimisch, und wird bei uns, namentlich um *Breslau* und *Liegnitz*, häufig angebaut. Juli, Aug. ♀.

Wurzel vielästig, kriechend, rothbraun. Stängel 1 - 1½' h., an d. Kanten stachelig. Bltt. am Bande mit rückwärts-, gerichteten Stacheln, breit lanzettlich. Kronen grüngelb. Blütenstiele winkelständig, 3gblig. Die Wurzel enthält zugleich einen rothen und einen gelben Farbestoff, wirkt diuretisch und färbt bei anhaltendem innerlichen Gebrauche die Knochen roth.

Valerianeae De Cand.

Kelchröhre mit dem Fruchtknoten verwachsen; Saum entweder ungleichmässig 3-4zählig, aufrecht, oder haarförmig und eingerollt, nach dem Blühen in eine Federkrone sich ausbreitend. Krone auf dem Fruchtknoten mit ungleichmässig 3-5spaltigem Saum. Vier oder weniger Staubgef. aus der Kronenröhre. Fruchtknoten 3fächerig; 2 Fächer leer, im dritten ein hängendes Ei. Frucht eine einsamige Nuss. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Kräuter oder Stauden mit gegenständigen Bltt. ohne Stützbltt., zahlreichen kleinen Blumen in endständigen Trugdolden und meist mit aromatischen Wurzeln. Unsere Arten haben drei Staubgef. Nirgends sehr zahlreich, einige auch im Gebirge.

Valeriana L. Baldrian. Kelchsaum fiederhaarig, eingerollt, nach dem Blühen als Federkrone sich ausbreitend, dann abfallend. Krone trichterförmig am Gr. höckerig, mit fünfspaltigem Saum. III. 1.

♂ Stauden mit starkem Wurzelstock. Blumen bisweilen zweihäusig-polygamisch, in endständiger Doldentraube.

V. officinalis L. Aechter Baldrian. Bltt. gefiedert, 7 - 10paarig, Blättchen lanzettlich, gezähnt; Stängel aufrecht; Kronenröhre so lang als der Saum; Wurzel ohne Sprossen.

β. *angustifolia.* Kleiner und schmaler, mit lineal-lanzettlichen oder linealischen, oft ganzrandigen Blättchen.

In feuchten Gebüsch und Wäldern, an Flussufern, Bach- und Teichrändern, doch auch an Dächern, Mauern und trocknen Hügeln. D. d. g. G., häufig auch im Vorgebirge. β auf Mauern am *Matthias-thore in Br.* Auf den *Striegauer Bergen* und um *Reichenbach*. Juni, Juli. 2.

Wurzelstock schief mit langen dichten Fasern nach unten, frisch von aromatischem, trocken von starkem und widerlichem Geruch. Stängel 2-4' h., einfach. Blattstiele am Gr. breiter, verbunden. Kronen fleischfarben oder weisslich, anfangs wohlriechend, dann süßlich-widrig. Die Wurzel ist von unangenehm aromatisch-bitterm Geschmack, und eines der vortrefflichsten Arzneimittel bei Nervenleiden, schon im Alterthum bekannt, und als Thee aufguss ein übliches Hausmittel.

V. sambucifolia Mikan. Bltt. gefiedert; die Blättchen grobsägezählig, der unteren eigf., der oberen lanzettlich; Kronenröhre länger als der Saum; Wurzel sprossentreibend; Stängel gefurcht.

In feuchten Gebüsch und Wäldern, an Fluss- und Bachufern, Grabenrändern, zwischen Gebüsch, in der Ebene und dem Vorgebirge, auch in den Gründen des Hochgebirges. Um *Br.* bei *Pirscham*, *Tschechnitz* und *Althof*. *Gnadenberger W.* bei *Bunzlau* n. *Sch.* *Rümmelsberg* bei *Strehlen*. *Jauersberg*. *Charlottenbrunn*. *Freiburg* in der *Stadthaarte*. Am *grossen See* auf der *Heuscheuer*. *Cudowa*. Im *Elb-Aupengrunde* und den *Schnee gruben* im *Rieseng.*, *Moosebruch*, *Leiterberg* im *Gesenke* u. w. *Oppeln*. Mai, Juli. 2.

Der vorigen durchaus und wahrscheinlich auch in der Wirksamkeit ähnlich, etwas niedriger und der Blüthenstand mehr gedrungen. Blüht etwas früher als jene.

V. dioica L. Bltt. der Wurzelblatttriebe langgestielt, eigf.; untere Stengelbltt. elliptisch, obere fiederspaltig; Wurzel sprossentreibend.

Auf quelligen und sumpfigen Wiesen, im Vor- und h. auf d. Hochgebirge, hie und da auch bis in die Ebene herabsteigend. Um *Br.* bei *Andersmühl* und *Koberwitz*. *Goldmühle* bei *Bunzlau*. *Oppeln*. *Sch.* *W.* bei *Gnadenfeld*, *Gypsgruben* bei *Katscher*. Im Vorgebirge bei *Silsterwitz*, *Kynau*, *Hausdorf*, *Heuscheuer*, *Reinerz*. *Freiswaldau* u. s. w. *Te.* Mai, Juni. 2.

Stängel einfach, $\frac{1}{2}$ - 1' h. Bltt. bisweilen alle ungeheilt. Kronen blass, fleischfarben oder weiss, geruchlos. Die Pflanze ist polygamisch, wie die folgende Art; entweder trägt die Pflanze Zwitterblumen mit vorragenden Staubgef. und Griffeln, oder Stempelblumen mit vorragenden Griffeln und verkümmerten, in der Kronenröhre verborgenen Staubgefässen; im letzteren Falle sind sowohl die Kronen als auch die ganze Pflanze kleiner.

V. Tripteris L. Bltt. der Wurzeltriebe langgestielt, eihersfg.; Stängelbltt. gedreit; Wurzel vielköpfig.

An feuchten Waldplätzen, an Bächen und Quellen, im Vor- und Hochgebirge, im südöstlichen Schlesien. Im *Gesenke* bei *Carlsbrunn* und *Freiswaldau*, am *Hockschar* über dem *Bieberteiche*, zwischen dem *Altwater* und *Peterssteine*, im *Kessel*. Im *Klokacz-Geb.* häufig: *Czantory* bei *Ustron*, *Lomnathal* bei *Jablunka*, an d. *Baranio*. Mai, Juli. 2.

Die starke krummstäigige Wurzel treibt mehrere Blätterbüschel um den Blütenstängel; meist 1' h. Fast kahl oder mit zerstreutem Weichhaar. Bltt. schweifig-gezähnt. Kronen fleischroth.

Valerianella Tournefort. Rapunzel. Kelchsaum aufrecht, ungleich-gezähnt, bleibend. Krone trichterförmig mit fast gleichmässig-5spaltigem Saum. Nuss dreifächerig; zwei Fächer leer. III. 1.

Einjährige Kräuter auf Ackerland; mit winzigen doldentraubigen Blumen an den Gabelästen des Stängels. — Ungern behalte ich den unschicklichen Namen *Valerianella* bei, wofür ich *Olitoria* setzen möchte.

V. olitoria Mönch (besser *Olitoria verna*). Rapunzel. *Fedia olit.* W. et Gr. sil. *Valeriana Locusta olitoria* L. Matt. Kr. Kelchsaum schwach-3zählig; Früchte eifg.-rundlich zusammengedrückt, am Rande mit einer Furche und an jeder Seite mit zwei Riefen.

Auf Grasplätzen, an Hecken, buschigen Dämmen und Grasgärten, d. d. g. G. bis ins Vorgeb. häufig und stets in Menge. April, Mai. ☉.

II. 1/2'. Ganz kahl, saftgrün; Stängel schwach, von der Mitte an gabelig-ästig. Bltt. untere verkehrt-eifg. oder zungenf. Kronen milchweiss. Die jungen Bltt. werden als Salat gegessen. Eine Abart mit feinhaarigen Früchten ist bei uns noch nicht aufgefunden.

V. Auricula De Cand. Kelchsaum schief gestutzt, der hintere Zahn grösser, länglich und stumpf; Früchte fast kugel-eifg. mit einer Furche und fünf feinen Riefen.

Unter der Saat, häufig d. d. g. G., auch im Vorgebirge. Juli, Aug. ☉.

II. 1 - 1 1/2'. Bltt. meist fiederspaltig, länglich-lanzettlich, etwas schärlich. Frucht am Gr. banchig; die leeren Fächer sind eben so gross oder grösser als das den Samen enthaltende.

V. Morisonii De Cand. *Fedia dentata* W. u. Gr. sil. Kelchsaum schief gestutzt, spitz, feingezähnt; Früchte eikegelfg. mit drei Riefen auf der convexen Hinterseite, auf der Vorderseite flach.

β. mit weichhaarigen Früchten.

Unter der Saat, gemein d. d. g. G., auch im Vorgebirge. Juli, Aug. ☉.

Etwas schwächtiger als die vorige. Bltt. länglich-lanzettlich, bzw. die oberen fiederspaltig, schärlich. Frucht schmaler; die beiden leeren Fächer sind ganz dünn, nur in Gestalt einer fädlichen Röhre.

Dipsaceae De Cand.

Die Blumen stehen auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden, durch Haare oder Spreublättchen gesondert, in endständigen Köpfen, welche von Deckblättern gestützt sind. Kelch doppelt; der äussere mit trockenem Saum und gefurchter Röhre,

die reife Frucht eng umschliessend; der innere mit der Röhre ganz oder nur oben mit dem Fruchtknoten verwachsen, der Saum kurz ungetheilt, gezähnt oder in Borsten verlängert. Krone entspringt am inneren Kelchsaum, meist unregelmässig 4-5spaltig. Vier freie Staubgef. aus der Kronenröhre. Ein Griffel. Fruchtknoten einfächerig mit einem hängenden Ei. Frucht eine häutige Nuss vom inneren Kelchsaum gekrönt und vom äusseren Kelch umgeben. Same umgekehrt mit geradem Keim in der Axe des Eiweisses.

Kräuter oder Stauden mit gegenständigen Bltt., deren Zertheilung veränderlich ist, ohne Stützbltt. Das Aufblühen beginnt bei *Dipsacus* in der Mitte der Köpfe, bei manchen *Scabiosae* in der Mitte und am Rande zugleich. Werden die tetraedrischen Pollenkörner angefeuchtet, so treten aus den Winkeln walzige Verlängerungen hervor. Sie enthalten keine wirksamen Stoffe.

Dipsacus L. *Karden*. Blumenboden mit Spreublättern. Die äusseren Deckbltt. sehr lang. Aeusserer Kelch vierkantig, 8furchig, mit kurzem gekerbten oder gezähnten Saum; innerer K. ganz verwachsen mit vielzähniem oder ungetheilten Saum. Kronensaum viertheilig. Narbe ungetheilt. IV, 1.

Starkhaarige oder kahle und dann stachelige Gewächse.

D. sylvestris Miller. *Wilde K.* Bltt. sitzend, kerbig-gesägt, am Rande kahl oder hin und wieder stachelig, die mittleren am Stängel breit-verwachsen, ungetheilt oder fiederspaltig; die Hüllbltt. im Bogen aufsteigend; die Spreubltt. biegsam, länglich-verkehrt-eifg. mit feiner Grannenspitze, gerade, länger als die Blumen.

β. laciniatus. Die mittleren Stängelblätter fiederspaltig.

An unbebauten, trocknen und steinigen Plätzen, an Wegen, Waldrändern, an Flussufern, auf Dorfangern, zerstreut und nirgends in grosser Menge. Um *Br.* hin und wieder um *Bischwitz*, *Kletten-dorf*, *Schliesa* und überhaupt an den Strassen gen *Schweidnitz*, *Nimptsch* und *Strehlen*. *Ohlau*. *Wohlau*. *Ottendorf* bei *Beuthen a. O.* Häufig in *Oberschlesien*. *β* einmal bei *Koberwitz*. Juli, Sept. ☺.

Stängel 2 - 3' h., mit unregelmässig zerstreuten, rückwärts-gekrümmten, weisslichen Stacheln. Wurzelbltt. länglich, nach unten verschmälert, kahl mit starken Stacheln, welche aus einer halbkugeligen Blase entspringen. Die Stängelbltt. bilden mit ihrem verwachsenen Grunde eine Bucht, worin sich das Regenwasser sammelt. Blüthenkopf länglich, oft an der Spitze schopfig, indem die obersten Spreubltt. sich verlängern. Kronen lilafarben.

D. laciniatus L. *Schlitzblättrige K.* Bltt. sitzend, am Rande mit Borsten gewimpert; die unteren ganz, nach unten verschmälert, lappig-gekerbt, die mittleren am Gr. breit-verwachsen, fiederspaltig;

die Hüllbltt. starr, im Bogen aufsteigend; die Spreubltt. biegsam, länglich mit feiner Grannenspitze, gerade, länger als die Blumen.

Auf Angern und in Dörfern, an Grabenrändern, an steinigem Flussufer. Zuerst von Schummel am Oderufer zwischen Ransern und der Gucke bei Br. gef., dann in Dörfern O. S., *Karbischau* bei Oppeln u. m. von Grabowski. Nach Krockner auch bei Ohlau und *Polnisch-Steinau* bei Brieg. Juli, Aug. ☉.

Höhe und Gestalt d. vorigen. Wurzelbltt. oberseits mit Haaren, Borsten oder sehr feinen Stacheln besetzt. Hüllbltt. kürzer und breiter. Kronen blass, lilafarben.

* *D. Fullonum* L. *Weber-K.* Bltt. sitzend, kerbig eingeschnitten; Stängelbltt. breit verwachsen, ungetheilt; Hüllbltt. söhlig-abstehend; Spreubltt. starr, länglich, mit feiner zurückgekrümmter Grannenspitze, so lang als die Krone.

In Südeuropa (Istrien) einheimisch; wird bei uns angebaut. Juli, Aug. ☉.

Wie die vorigen, leicht durch die umgebogenen Spitzen der Spreubltt. zu erkennen. Zum besseren Gedeihen soll man die Blätterbuchten aufschlitzen, damit das Regenwasser ablaufen könne. Die Köpfe nach dem Blühen werden von den Tuchbereitern zum Tuchkratzen gebraucht.

D. pilosus L. Bltt. gestielt; Hüllbltt. niedergebogen; Spreubltt. verkehrt-eifg., borstig-gewimpert, mit einer Grannenspitze, gerade.

In feuchten Waldungen, buschreichen Erlensümpfen. Im *Goi* bei *Kapsdorf* von Neubeck gef. *Park* bei *Koberwitz*. Im *Sukkwitzer Walde* in O. S. nach Wenck. Nach Matt. auch bei *Schweiniern* an der *Weide*. Juli, Aug. ☉.

Haarig. Bltt. gross, breit-eifg., mit ohrförmigen Anhängen an der Spitze der Blattstiele. Köpfe fast kugelig. Kronen satt lilafarben.

Knautia L. Coulton. *Knautie.* Blumenboden haarig. Hüllblätter in einer oder zwei Reihen. Der äussere Kelch kurz gestielt, zusammengedrückt, mit vier Gruben unter dem mit 4 kurzen ungleichen Zähnen besetzten Saume; der innere K. ganz verwachsen mit becherförmigem in 8-16 lanzettlich-borstliche Zähne endigenden Saume. Narbe ausgerandet oder zweilappig. IV, 1.

K. arvensis Coulton. *Scabiosa arv.* Linné. W. et Gr. sil. Stängel rauhaarig; Bltt. eifg., ganz oder fiederspaltig.

Auf trocknen aber fruchtbaren Wiesen, an grasreichen Weg- und Ackerrändern, auf Brachen, in lichten Wäldern, d. d. g. G., auch im Vorgebirge häufig. Um *Br. bei Oswitz*, *Schwöitsch* u. a., häufig um *Pollentschine*. Juli, Aug. 2.

Stängel 1 - 1½' h., einfach oder oben dreigabelig, mit einblüthigen Aesten. Bltt. meist die unteren ganz, eifg.-länglich, die oberen fiederspaltig, aber auch alle ganz oder alle fiederspaltig. Köpfe flach-gewölbt; die Bandblumen grösser. Kronen violett-lila, lilaf., fleischf., im Schatten oft weiss.

Succisa Koch. *Abiss.* Köpfe fast kugelig. Blumenboden mit Spreublättern. Hüllblätter dachziegelförmig. Der äussere Kelch mit 8 vollständigen Furchen mit viertheiligem krautartigem Saum: der innere verwachsen, mit schildförmigem Saum. Kronensaum viertheilig. Narbe ausgerandet. IV, 1.

S. pratensis Mönch. *Scabiosa Succ.* Linné. W. et Gr. sil. Der Saum des inneren Kelches in fünf Borsten auslaufend.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen, Waldwiesen, in der Ebene und dem Vorgeb., häufig d. d. g. G. Aug., Sept. 2.

Wurzelstock kurz, abgeissen mit langen Fasern. Stängel kahl, aufrecht, 1 - 2', dreigabelig, 3 - 7 Köpfe tragend, mit 2 - 3 Blätterpaaren. Untere Bltt. länglich-eifg., gestielt, obere lanzettlich, spitz, verwachsen bisw. am Gr. gezähnt; bald haarig, bald kahl. Kronen blau, selten weiss. Die Wurzel schmeckt stark bitter und war sonst als *R. Morsus diaboli* officinell.

Scabiosa L. *Skabiose.* Köpfe gewölbt oder flach. Blumenboden mit Spreublatt. Hüllbltt. dachziegelfg. Der äussere Kelch mit 8 ganzen oder halben Furchen, oder ohne Furchen aber mit 8 Riefen, mit trockenhäutigem Saum; der innere schildförmig, der Saum in fünf scharfe Borsten endigend oder ganzrandig. Narbe ausgerandet. IV, 1.

Randblumen grösser.

S. Columbaria L. Wurzelbltt. länglich, gestielt, gekerbt, ungetheilt oder leierfg.; die unteren Stängelbltt. leierfg., die übrigen bis auf die Mittelrippe fiederspaltig; die Kelchborsten am Gr. zusammengedrückt, ohne Nerv, 3 - 4mal länger als der Saum des äusseren Kelches.

α. mit blau-rothen, oder röth-violetten Kronen. *S. Columbaria* L.

β. mit weisslich-gelben Kronen. *S. ochroleuca* L. Matt. et Krock. und *S. Columbaria* derselben.

An Wegrändern, Ackerrainen, auf trocknen sonnigen Hügeln, an Hohlwegen, auf hohen Triften, d. d. g. G. häufig. α auf buschigen Hügeln, am *Fuchsberge bei Schwöitsch*, und auf Moorwiesen zw. *Riemberg und Hasfen und um Wohlau bei Petranowitz*. Bei *Krummhübel* nach N. v. E. Juli, Aug. 2.

Stängel 1 - 1½' h., kahl, dreigabelig-nag. Die Bltt., auch die unteren Wurzelbltt., so wie die an den Büscheln, welche neben dem Blütenstängel aus der mehrköpfigen Wurzel treiben, sind bald ungetheilt, bald leierfg., bald fiederspaltig, und eben so ist die Theilung der Stängelbltt. sehr mannigfaltig. Die gewöhnliche Form ist die mit weissgelben Kronen; die andere mit röthlichen oder violetten ist auch nicht im mindesten verschieden, und verdankt die abweichende Farbe wahrscheinlich der Beschaffenheit des Bodens.

S. lucida Villars. *S. norica* Vest. Wurzelbltt. länglich, gestielt, ungetheilt oder leierfg.; die unteren Stängelbltt. ungetheilt oder am Gr. fiederspaltig, die oberen fiederspaltig; die Kelchborsten a. Gr.

breit und platt auf der Innenseite mit einem Kielnerven, 3-4mal länger als der Saum des äusseren Kelches.

An felsigen Lehnen und Abhängen des Hochgebirges. Im Riesengeb. im *Riesengrunde* und unterhalb des *Teufelsgärtchens am Bibernellfleck*. Im Gesenke am *Peterssteine*, *Köpernik* und im *Kessel*. Juli, Aug. 2.

Der vorigen ähnlich, doch niedriger, 1' h., und gedrungener, meist nur 3blüthig; die Bltt. weniger getheilt und die Abschnitte breiter. Kronen purpurfarben, ein wenig in das violette ziehend.

S. suaveolens Desfontaines. *S. canescens* W. et Kit. Wurzel- und untere Stängel-Bltt. länglich oder lanzettlich ungetheilt u. ganzrandig; die übrigen fiederspaltig mit linealen ganzrandigen Abschnitten; die Kelchborsten anderthalb mal so lang als der Saum des äusseren Kelches.

In Haide-Wäldern. Zuerst bei *Rosenberg* von Fuchs, dann zwischen *Chromstau* u. *Malapane* von Grabowski gef. *Liptin b. Trop.* n. R. u. M. Juli, Aug. 2.

Die Wurzelköpfe verlängern sich in kurze fadenförmige Sprossen, auf denen die Blätterbüschel sitzen. Schlank, bis 2', bei uns fast kahl. Kronen blassblau.

Compositae Linné.

Blumen in Köpfe vereinigt, (welche an den Enden der Zweige stehen, und von einer Hülle unterstützt sind, die aus einer oder mehreren Reihen dachziegelförmig an einander liegender Deckblätter gebildet ist.) auf einem gemeinschaftlichen Blumenboden. Kelchröhre mit dem Fruchtknoten vollständig verwachsen, bisweilen über denselben hinaus in einen geschlossenen Stiel verlängert; der Saum entweder undeutlich oder ein schmaler ungetheilter Rand oder in schuppenförmige Lappen getheilt, oder in Borsten verlängert, welche später der Frucht als Federkrone aufsitzen. Krone sitzt auf der Kelchröhre; der Saum meist 5theilig, mit klappiger Knospenlage, bald gleichmässig, bald ungleichmässig, oder auch ein an der Spitze gezähntes zungenförmiges Blättchen bildend. Fünf Staubgef. in der Kronenröhre; die Staubbeutel in eine Röhre verwachsen, nach innen sich öffnend, oben in eine Haut unten bisweilen in Borsten sich fortsetzend. Fruchtknoten einfächerig mit einem aufrechten Ei. Ein Griffel, in zwei Narben gespalten. Frucht ein einsamiges Nüsschen. Same ohne Eiweiss, mit geradem Keim, mit einer doppelten Nath.

Die Blumen in jedem Köpfschen sind entweder gleichförmig, alle röhrenförmig oder alle zungenförmig, oder die inneren sind gleichmässig röhrenförmig und heissen zusammen die Scheibe, *discus* die äusseren am Bande sind zungenförmig und heissen der

Strahl, *radius*. Ausserdem sind aber die Blumen entweder sämmtlich zwittrig, oder polygamisch, indem die Staubgefässe bald in den Strahlenblumen, bald in den Scheibenblumen fehlen; darauf gründete Linné die Ordnungen der *neunzehnten* Klasse, deren grössten Theil diese Familie bildet. Linné nannte den Blütenkopf *Blume flos*; die Blumen *Blüthchen, flosculi*; die Deckblätterhülle *allgemeinen Kelch, calyx communis*; den Kelch *besonderen Kelch, calyx proprius*. Stätzblt. fehlen. Blattstellung mannigfaltig. Bei uns nur Kräuter und Stauden; alle Grünsäure und Inulin, und eine verschiedenartige Mischung aus Gerbestoff mit bitterem Extractivstoff, Harz und ätherischen Stoffen enthaltend, häufig einen bitteren harzigen Milchsaft führend. Die Pflanzen dieser Familie sind über die ganze Erde verbreitet, und machen bei uns Ein Dreizehntheil aller Phanerogamen aus; viele sind in grosser Menge und gesellschaftlich vorhanden und mehrere dem Hochgebirge eigenthümlich.

1. *Cichoraceae*. Der Griffel ungegliedert. Sämmtliche Blumen zungenförmig und zwittrig. Linnés erste Ordn.: Polygamia aequalis.

a. *Phylloappi*. Der Kelchsaum an der Frucht in Form eines häutigen Kränchens oder spreuartiger Schuppenblättchen.

Lápsana L. *Warzenkraut*. Kopf enthält 8-12 Blumen. Hüllblätter 8-10 in einer Reihe, aufrecht, mit 2-3 kürzeren Blättchen am Grunde. Nüsse ohne deutlichen Kelchsaum, zusammengedrückt, fein gestreift. Blumenboden kahl.

L. communis L. *Hasenkohl*. Bltt. gezähnt, die unteren leierfg. In Gebüsch und an Hecken und Zäunen, auf Gartenland, an Mauern und Schuttplätzen, d. d. g. G., auch im Vorgeb. gemein. Jul. Aug. ☉.

Stängel 2-3' h., aufrecht, oben rispig-ästig. Bltt. mit grossen eifg.-rundlichen Endlappen, die oberen eifg. Köpfe klein. Kronen blassgelb. Samen abfällig. Das Kraut enthält bitteren Milchsaft und war ehemals officinell.

Arnóseris Gärtner. *Sandwien*. Kopf vielblumig. Hüllblätter in einer Reihe, mit einigen kürzeren am Rande. Nüsse fünfkantig mit ungetheiltem häutigem Kelchsaum. Blumenboden ohne Spreu.

A. minima L. *Hyoseris min.* Linn. Stängellos; Schaft 1-3 blumig, Stiele keulenfg. verdickt.

Auf sandigen Aeckern, in der Ebene zerstreut. Um Br. b. *Goldschmiede, Lissa, Riemberg* u. m. *Ohlau, Wohlau, Beuthen, Bunzlau, Oppeln, Trop.* Juni, Juli. ☉.

H. $\frac{1}{2}$ '. Bltt. an der Wurzel rosettenfg., spatheifg.-länglich, feingezähnt, dicklich und saftig. Ein oder mehrere Blüthenschäfte, am Gr. ziegelroth. Kronen zitronengelb.

Cichórium L. *Wegwarte*. Köpfe vielblumig. Hüllbltt am Gr. verwachsen, in zwei Reihen, 5 äussere, 8-10 innere.

Nuss gestreift mit vielen kurzen spreuartigen Schuppen gekrönt.

Kronen blaß.

† *C. Intybus* L. *Cichorien*. Zwei und mehrere theils sitzende theils gestielte Köpfe gehäuft; die oberen Bltt. aus breitem umfassenden Grunde lanzettlich.

An Wegen und Rainen auf festem und trockenem, besonders lehmigem Boden, vielleicht nur durch den Anbau bei uns verbreitet. Nach Schneiders Angabe soll die weitere Verbreitung namentlich über das *Hirschberger Thal* beobachtet worden sein. *Trop.* und *Te.* Juli, Aug. 2.

Wurzel spindelfg., besonders an der gebauten Pflanze. Stängel steif, sparrig-ästig; scharf. Wurzelbltt. schrot-süßfg. Die äusseren Hüllbltt. sparrig-zurückgebogen. — Die Wurzel der wilden Pfl. ist officinell als *R. Cich. sylvestris*, enthält einen bitteren Milchsaft und wirkt ähnlich wie *Taraxacum*. Die W. der gebauten Pfl. ist ein bekanntes Kaffeesurrogat. — Das einjährige *C. Endivia* mit breit-herzförmigen Bltt. unter den Blüten wird häufig angebaut und liefert einen gesunden Sallat.

β. *Pteropappi*. *Der Kelchsaum auf allen oder wenigstens an den Nüssen der Scheibe eine gefiederte Federkrone.*

Oporina Don. Die inneren Hüllbltt. von einer bis zwei Reihen äusserer kürzerer umgeben. Die Nüsse in einen Schnabel verschmälert, querrunzelig, mit gleichförmigen gefiederten Federkronen, deren Strahlen am Grunde breiter und gesägt sind. Blumenboden kahl.

O. autumnalis Don. *Leontodon a. L. Apargia a.* Willd. W. et Gr. sil. Stängellos; Schaft 2-5blumig, Stiele nach oben verdickt u. mit Schuppen besetzt; Bltt. schrotsüßfg.-fiederspaltig.

Auf Wiesen, Triften, Waldplätzen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juli—Sept. 2.

Wurzel abgebißen. Schaft gabelig, meist 2- oder 3köpfig, $\frac{1}{2}$ - 1' h., schief-aufrecht. Bltt. fast kahl, bisweilen nur fiederspaltig-gezähnt. Kr. gelb, die des Randes aussen grünlich-röthlich.

Leontodon L. *Löwenzahn*. Die inneren Hüllbltt. von einer bis zwei Reihen äusserer kürzerer umgeben. Die Nüsse in einen Schnabel verschmälert, querrunzelig. Federkronen zweireihig; die inneren Strahlen gefiedert, am breiteren Grunde gesägt, die äusseren kurz, scharf. Blumenboden kahl.

L. hastilis L. Stängellos; Schaft einköpfig, nach oben verdickt; Bltt. länglich in den Stiel verschmälert, gezähnt oder fiederspaltig.

α. *vulgaris*. Die Bltt., bisweilen auch Stängel und Hüllen, mit kurzen Gabelhaaren bekleidet. — *L. hispidum* L. *Aparg. hisp.* Willd. W. et Gr. sil.

β. glabratus. Bltt., Stängel und Hüllen kahl, oder fast kahl.

γ. opimus. Kurzhaarig; Bltt. breit; Schaft stark verdickt; Hülle schwarzhaarig; Blumenköpfe grösser.

Auf Wiesen, besd. Waldwiesen, fruchtbaren Grasplätzen, d. d. g. häufig, bis auf die Wiesen der Hochgebirgskämme, wo *γ* vorkommt: *Riesengeb., Gl. Schneeberg, Gesenke.* Juni—Sept. 2.

Einfach und einblumig, 1 - 1½' h. Zwischen der kahlen und haarigen Form, welche man früher als Arten trennte, giebt es keinen wahrhaften Unterschied; die erstere ist seltner, gewöhnlich im Schatten, in feuchtem Waldboden. Kronen gelb, bei *γ* tief goldgelb.

Picris L. Bitterig. Hüllblätter in zwei Reihen, die äusseren abstehend. Nüsse kurz geschnäbelt. Federkronen zweireihig; die inneren Strahlen gefiedert, die äusseren haarig, am Grunde in einen Ring verwachsen. Blumenboden kahl.

P. hieracioides L. Steifhaarig; Stängel doldentraubig-ästig; Bltt. länglich-lanzettlich buchtig-gezähnt.

Auf Grasplätzen an Graben- und Waldrändern, zerstreut in der Ebene. *Um Br. bei Marienau, Oswitz, Krittern, Koberwitz u. in Ohlau, Wohlau, Bunzlau, Oppeln.* Juli, Aug. 2.

Stängel 2 - 3' h., aufrecht. Die Stängelbltt. am Gr. umfassend, bisw. spießsf. Kronen gelb. Nüsse unter der Federkrone eingeschnürt, querrundlich. Kommt auch mit ganzrandigen Bltt. und einfachem Stängel vor.

Tragopogon L. Bocksbart. Haferwurzel. Hüllblätter am Gr. verwachsen, in einer Reihe. Nüsse in einen stiel-förmigen Schnabel verschmälert. Federkrone vielreihig, fiederhaarig; die Fiedern des Randes verwoben. Blumenboden kahl, grubig.

Die Randblumen viel grösser und länger. Bltt. linealisch, häufig spiralig-gerollt. Kahl und schwach bereift.

† *T. porrifolius L. Haferwurzel.* Blütenstiele allmählig nach oben keulenfg.-verdickt; Hüllbltt. zu 8, länger als die Blumen; Köpfe flach; die Nüsse am Rande schuppig-gekörnt, so lang als der Schnabel.

Hie und da *auf den Kräutereien um Br.* zumal vor dem *Ohlauer- und Schweidnitzer Thor*, an grasigen Grabenrändern, zuerst von Kirschstein, dann von Krause gef. und vielleicht von angebauten Expl. stammend. Juni, Juli. ☉.

Stängel 1½ - 2' h. Bltt. aufrecht, lineal-lanzettlich, langspitzig, flach. Kronen purpurviolett. Die spindelige Wurzel milcht und ist essbar.

T. major L. Blütenstiele allmählig nach oben keulenfg.-verdickt; Hüllbltt. zu 12, länger als die Blumen; Köpfe oben hohl; die Nüsse am Rande mit schuppenförmigen Weichstacheln besetzt, so lang als der fädliche Schnabel.

Auf Grasplätzen. Wurde nach *E ndlers* Angabe ehemals häufig auf den *Festungswällen von Breslau* gef., und jetzt noch einzeln da-

selbst von Krause bemerkt; einmal von mir hinter *Wirrwitz bei Koberwitz*. Juni. ☉.

Niedrig von Wuchs und gedrungener als der folgende, 1' h. Bltt. der vorigen Art. Kronen gelb. Nüsse mit scharfen Ecken.

T. pratensis L. *Habermankeln*. *Morgenstern*. Blütenstiele gleichf., unter dem Kopfe ein wenig verdickt; Hüllbltt. zu 8, so lang als die Blumen; die Nüsse am Rande körnig-scharf, so lang als der fädliche Schnabel; Bltt. gekielt.

β. micranthes. Hüllbltt. länger als die Blumen.

γ. tortilis. Bltt. wellig, an der Spitze spiralig-gewunden.

Auf Grasplätzen an Dämmen, Rainen, Grabenrändern, auf Wiesen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. Um *Br.* bei *Scheinich*, *Pöpelwitz*, *Oswitz*, *Pilsnitz* u. m. Mai, Juli. ☉.

Stängel 2 - 4' h., bisw. purpurf. angelaufen, ästig. Kronen goldgelb, selten blassgelb. Die Köpfe öffnen sich nach Sonnenaufgang und schliessen sich zwischen 9 und 10 Uhr Vormittags. Die Wurzel enthält bitteren Milchsaft.

T. orientalis L. Blütenstiele gleichmässig, unter dem Kopfe ein wenig verdickt; Hüllbltt. zu 8, so lang als die Blumen; die Nüsse am Rande mit schuppigen Weichstacheln besetzt, länger als der fädliche Schnabel.

Auf fruchtbaren etwas feuchten Wiesen, besd. im Vorgeb. hier und da auch in der Ebene. Um *Br.* bei *Lissa*, *Schweinern*, *Koberwitz*. Um *Nimptsch* bei *Diersdorf*, *Vogelgesang*. *Niklasdorf* bei *Strehlen*. Am *Geiersberge*. Um *Oppeln*, *Kalscher*, *Hultschin*. Mai, Juni. ☉.

Stängel 2 - 3', stärker als an der vorigen. Bltt. sehr oft an der Spitze spiralig-gerollt. Köpfe doppelt so gross als an der vorigen, erst um Mittag geschlossen. Bei dieser und der vorigen haben die Hüllbltt. gegen den Grund einen schwachen Eindruck.

Scorzonera L. *Nattermilch*. Hüllbltt. dachziegelsg. Nüsse in einen kurzen Schnabel verschmälert, am Gr. mit einer kleinen Schwiele. Federkrone vielreihig, fiederhaarig, die Fiedern des Randes verwoben. Blumenboden kahl.

S. humilis L. *Schlangenkraut*. Stängel wollig, 1-3köpfig 2-3blättrig; Hüllbltt. kürzer als die Blumen; Nüsse gestreift, kahl; Wurzel schopfig.

α. mit linealischen oder lineal-lanzettlichen Wurzelbltt.

β. mit lanzettlich-eiförmigen oder länglich-eiförmigen Wurzelbltt.

Auf feuchten und sumpfigen, Moor- und Torf-Wiesen, besd. in Haidegegenden, in der Ebene und dem Vorgebirge d. d. g. G. Um *Br.* bei *Pirscham* u. *Althof*, *Radwanitz*, *Lissa*, *Schriegwitz*. *Riemberg*. *Silsterwitz*. *Berge* b. *Strehlen*. *Ohlau*. *Wohlau*. *P. Tarnau* b. *Beuthen* a. O. *Schönfeld* u. *Klitschdorf* bei *Bunzlau*. In O.S. um *Königshuld*, *Malapane*, *Rosenberg*, *Gleiwitz*, *Leitsnitz*. *Trop.* Mai, Juni. 2.

Wurzel von Schuppen schopfig, milchig. Stängel 1/2' h. einköpfig. oder bis 2' h. 2 - 3köpfig, mit lockerer löslicher Wolle bekleidet. Aeusserer Hüllbltt. eilanzettlich.

zugespitzt, mit stumpfem Ende. Kronen schwefel-goldgelb, aussen schwach-röthlich. Die Köpfe werden oft vom Brande (einem Staupilze) zerstört.

S. purpurea L. Bltt. linealisch oder lanzettlich; Stängel beblättert ein- oder mehrköpfig; Hüllbltt. so lang als die Blumen; Wurzel schopfig.

Auf trocknen Hügeln. Bei *Wohlau* von Güntzel und auf dem *Kupferberge* bei *Danckwitz* von Winkler gef. Um *Gottesberg* nach Matt. Mai, Juni. 2.

H. 1'. Wurzel mit fädigem Schopf. Kronen rosa-purpurf. Die äusseren Hüllbltt. grünlich-purpurf., die inneren sternförmig.

Anmkg. Nach Matt. wächst *Sc. laciniata* um den *Gröditzberg*, und nach Albertini bei Schneider Fl. v. Bunzlau, dieselbe um *Hartmannsdorf* bei *Bunzlau*.

Hypochoeris L. Ferkelkraut. Hüllblätter dachziegel-förmig. Nüsse weichstachelig, alle oder nur die in der Mitte geschnäbelt. Federkrone fiederhaarig. Blumenboden mit Spreublättern besetzt.

Stängel ohne Bltt. oder nur am Gr. beblättert, einfach oder mit 1 - 2 Aesten.

H. glabra L. Die Nüsse am Rande ungeschnäbelt; Hüllbltt. so lang als die Randblumen; Stängel blattlos, ästig, kahl.

Auf sandigen Aeckern und Brachen, kiesig-sandigen Grasplätzen, in der Ebene zerstreut. Um *Br. bei Weide*, *Lissa*, *Riemberg*. *Garsuche* bei *Ohlau*. Am *Hartheberge* bei *Frankenstein*. *Schönfeld* b. *Bunzlau*. In O.S. bei *Malapane*, *Falkenberg*, *Birawa*. *Troppau* b. *Erbersdorf* und *Brätersdorf*. Juli, Aug. ☉.

H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Kahl. Bltt. nur an der Wurzel, länglich, stumpf, buchtig-gezähnt. Köpfe klein. Kronen gelb, aussen grünlich.

H. radicata L. Sämmtliche Nüsse lang-geschnäbelt; Hüllbltt. kürzer als die Randblumen; Stängel blattlos 2-5köpfig, kahl.

Auf etwas feuchten und sandigen Grasplätzen, auf Wiesen, in Hauen und lichten Waldstellen d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juni—Aug. 2.

Stängel 1 - 2' h., steif-aufrecht, gabelig-2köpfig, oder mehrgabelig und mehrblumig. Bltt. nur an der Wurzel, schrotsägef., stumpflich, steifhaarig. Kronen gelb, aussen grünlich.

H. maculata L. Geflecktes F. Sämmtliche Nüsse lang-geschnäbelt; Hüllbltt. am Rande ungetheilt; Blütenstiele fast gleich-dick; Stängel einblättrig, steifhaarig, 1-3köpfig.

Auf grasigen und bewaldeten Hügeln, an Hohlwegrändern, in Haidewäldern, in der Ebene und dem Vorgeb. hin und wieder. Um *Br. bei Neukirch*, *Lissa*, *Muckerau*, *Trebnitz*, *Riemberg* u. m. *Fürstenstein*. *Zeiskenberg*. *Trop. Te. Sandhübel* b. *Freiwaldau*. Juni, Aug. 2.

Stängel $1\frac{1}{2}$ - 2' h., steifhaarig, meist einblumig. Wurzelbltt. eif.-länglich mit breiter Mittelrippe, meist oberseits mit streifig verlaufenden blutrothen Flecken bald dicht, bald sparsam gezeichnet, selten ungefleckt; bisweilen schrotsägef. Kronen goldgelb. Stärker und steifer als die vorige.

H. uniflora Villars. H. helvetica Jacq. W. et Gr. sil. Sämmtliche Nüsse lang-geschnäbelt; Hüllbltt. am Rande rissig-gefrantzt; Stängel einköpfig, steifhaarig, am Gr. beblättert; nach oben allmählig verdickt.

Auf den Kämmen und Lehnen des Hochgebirges. Im Riesengeb.: an den Teichrändern, dem Brunnenberge, Aupagrunde, an der Kesselkoppe u. m. Gl. Schneeberg. Im Gesenke am Altwater, Petersstein, im Kessel, am Hockschar. Juli, Aug. 2.

Stängel steif, dick, 1 - 1½ h. Bltt. länglich-lanzettlich, fein-gezähnt, rauhaarig. Hülle von schwarzen Haaren ranh. Blüthenkopf dick. Kronen goldgelb.

γ. Trichopappi. Der Kelchsaum auf den Nüssen eine haarige Federkrone.

Taraxacum Jussieu. Maiblume. Die inneren Hüllbltt. einreihig; die äusseren dachziegelfg. Blumen in mehreren Reihen. Nüsse an den Ribben weichstachelig, geschnäbelt. Kelchsaum vielreihig glatthaarig. Blumenboden kahl.

Stängellos; Blumenschäfte einköpfig.

T. officinale Wiggers. Leontodon Taraxacum L. W. et Gr. sil. Löwenzahn, Butterblume, Pfaffenröhlein. Bltt. schrotsägefg.; äussere Hüllbltt. lanzettlich, zurückgeschlagen.

β. palustre. Bltt. lineal-länglich, gezähnt; äussere Hüllbltt. eifg., an die inneren angedrückt.

Auf Wiesen, Gras- und Rasenplätzen aller Art, auf trockenem und feuchtem Boden, d. d. g. G. gemein, und bis auf die Kämmen des Hochgebirges. April oder Mai bis Sept. 2.

Wurzelstock spindelig, schief. Bltt. an der Wurzel rosettenförmig, meist länglich, schrotsägefg., mit ganzrandigen oder gezähnten Zipfeln, aber auch mit kämmig-gezähnten und fiederspaltigen Zipfeln; bisweilen sind die Bltt. bis an die Mittelribbe zerschlitzt und die Zipfel zerrissen-fiederspaltig, mit linealischen Abschnitten. Andererseits giebt es Formen, wie **β**, mit ungetheilten, nur gezähnten, fast schmal-linealischen Bltt. Einköpfige röhrige, am Gr. mit lockerer Wolle bekleidete, meist aufsteigende, dann aufrechte Blütenstiele, bald einzeln, bald viele. Die äusseren Hüllbltt. sind schmaler oder breiter, theils alle, theils einige zurückgeschlagen, und an manchen Orten kann man es verfolgen, wie diese allmählig bis zu der Form übergeht, wo alle Hüllbltt. an den Kopf angedrückt sind. Eben so ändern auch alle Theile in der Grösse ab, und nach dieser mannigfaltigen Gestalt haben die Autoren viele unhaltbare Arten aufgestellt. Die Hülle ist kurzwalzig. Die Var. **β** wächst neben anderen Formen auf Sumpf- und Torfwiesen, z. B. im Walde bei Lissa, Koberwitz, Riemberg u. m. — Die ganze Pfl. enthält einen bitteren Milchsafft, und ist eines der kräftigsten auflösend-bittern Arzneimittel; besonders ist der Genuss der jungen Bltt. im Frühjahr als Sallat zu empfehlen und in Frankreich längst beliebt.

Chondrilla L. Sonnenwirbel. Hüllblätter fast zwei-reihig; die inneren zu 8, die äusseren kurz. Blumen 8-12 in zwei Reihen. Nüsse stielrund geschnäbelt, oben stachelig, am Gr. des Schnabels mit einem Kranze häutiger Schuppen.

C. juncea L. Stängel von unten in ruthenförmige Aeste getheilt; Wurzelbltt. schrotsägefg.; Stängelbltt. linealisch.

Auf Sandboden, sandigen Hügeln, an Dämmen, Kieferwaldrändern, in der Ebene zerstreut. Um *Br. bei Lilienthal, Schweinern, Lissa, Neukirch, Schwoitsch u. m. Ohlau, Wohlau, Eckersdorf bei Bunz-lau, Malschwitz u. Carlsberg bei Beuthen a. O. Um Oppeln häufig. Drahomischl b. Teschen.* Juli, Aug. ☺.

Wurzelbltt. oft an der Rippe unterseits stachelig. Stängel unten meist stachelig, eckig, 2-3' h., znerst mit lüslichem Wollfilz bedeckt. Stängelbltt. lineal-lanzettlich, ganzrandig oder am Rande stachelig. Bluthenköpfe zur Seite der Aeste einzeln oder zu 2-3. Hülle walzig. Kronen schwefelgelb.

Phoenicopus Cassini. Waldlattig. Hüllbltt. fast 2-reihig; die inneren zu 8, die äusseren kurz. Blumen 5 in einer Reihe. Nüsse flach zusammengedrückt in einen fädlichen Schnabel endend.

P. muralis Koch. *Prenanthes muralis* Linn. W. et G. sil. Bltt. leierförmig-fiederspaltig; Blüten in einer Rispe.

In trocknen Birken-, Buchen- und Nadelwäldern, an Lehnen und Hauen, auf Mauern und Felsen in Waldgegenden, vorzüglich in der Hü-gelregion d. Ebene u. im Vorgebirge, d. d. g. G. häufig und sehr zahl-reich. Um *Br. b. Lissa u. in d. Trebnizer Hügelreihe.* Juli, Aug. ☺.

Stängel aufrecht, 1½-3' h., mit bläulichem Reif. Bltt. kahl, unterseits grau-grün, zart und schnell welkend. Kronen gelb. Den von Cassini gegebenen sinnlosen Namen *Phoenicopus* habe ich wenigstens in *Phoenicopus* umgeändert.

Prenanthes L. *Berglattich.* Hüllbltt. zweireihig; die inneren zu 8, die äusseren kürzer dachziegelfg. Blumen 5 in einer Reihe. Nüsschen zusammengedrückt; ohne Schnabel. Blumenboden kahl.

Kronen purpurfarben.

P. purpurea L. Bltt. länglich-lanzettlich, winkel-buchtig; die oberen lanzettlich ganzrandig,

In schattigen und feuchten Laubholzwäldern des Vorgebirges bis an das Hochgebirge, d. d. g. G. häufig. *Zobtenberg, Eichberg bei Briesniz, Satzgrund, Eulengebirge, Charlottenbrunner Berge, Heuscheuer u. m. Schneeberg, Leiterberg u. Carlsbrunn in Gesenke, Czantory u. Baranio bei Ustron.* Juli, Aug. 4,

Stängel 2-4' h., oben in eine Rispe traubiger Blütenstiele ausgehend. Bltt. am Gr. stängelumfassend, kahl, zart und schnell welkend.

Lactuca L. *Lattich.* Hüllbltt. dachziegelfg. Blumen in 2 oder 3 Reihen. Nüsse zusammengedrückt in einen fädlichen Schnabel ausgehend. Blumenboden kahl.

Blüthen klein, gelb, in Rispen.

* **L. sativa** L. *Speise-L., Kopfsalat.* Bltt. am Kiel glatt oder stachelig, am Gr. herz-pfeilfg., umfassend, gezähnt, ungetheilt oder schrotsägefg.; Rispe ausgebreitet, gleichpfeilig.

Stängel 2 - 3' h. Zum Sallat benützt man eine Abart mit kopfförmig-gehäuften Wurzelbltt. Alle Theile enthalten einen bitteren, schwach-narkotischen Milchsafte, welcher eingedickt unter dem Namen *Lactucarium* oder *Thridace* ein früher sehr übliches, dem Opium in den Wirkungen ähnliches Heilmittel abgiebt.

† *L. virosa* L. *Gift-L.* Bltt. am Kiel stachelig, länglich-eifg., pfeilfg., am Rande mit stachelspitzigen Zähnen, ungetheilt oder buchtig; Nüsse breit-gerandet, nach oben kahl.

Einheimisch im südlichen Deutschland. Bei uns hie und da verwildernd, z. B. um *Br.* in der *Schweidnitzer Vorstadt* von Krause, um *Löwen* bei *Brieg* von Werneck gefunden. Juli, Aug. ☉.

Die Nüsse sind schwarz, mit weissem Schnabel. Die Pfl. hat einen widrig-narcotischen Geruch und scharfen bitteren Geschmack, reichlichen Milchsafte, und besitzt ähnliche Wirksamkeit, wie das Opium, wird jedoch wenig angewandt.

L. Scariola L. *Wilder L.* Bltt. am Kiel stachelig, länglich-eifg., pfeilfg., am Rande mit stachelspitzigen Zähnen, meist schrotsägefg. oder fiederspaltig; Rispe pyramidal; Nüsse schmal-gerandet, nach oben mit Borsten besetzt.

An Wegen, Dämmen, Grabenrändern, Schuttländ, in der Ebene zerstreut. Um *Br.* bei *Scheitnich*, *Marienau*, *Neudorf*. *Ohlau*. Am Wall bei *Beuthen a. O.* *Wohlau*. *Bunzlau* nach Albertini. *B. Görlicz*. *Drahomischl* b. *Teschen*. Juli, Aug. ♀.

Die Nüsse graubraun mit weissem Schnabel. Stängel etwa 2' h., bleich, stark Kronen schwefelgelb. Besitzt ähnliche Eigenschaften, wie die vorige.

Sonchus L. *Saudistel.* Hüllbltt. dachziegelfg. Blumen in mehreren Reihen. Nüsse zusammengedrückt ohne deutlichen Schnabel. Blumenboden kahl.

S. alpinus L. *Mulgedium alp.* Cassini. Blüthen in endständiger Traube mit drüsig-haarigen Stielen u. Hüllblättern; Bltt. leierfg., der Endzipfel sehr gross, dreieckig-spiessfg., lang-spitzig, die oberen in den geflügelten Blattstiel verlaufend stängelumfassend; Nüsse gestreift.

An feuchten Stellen in Wäldern und Waldwiesen des Vorgebirges, und an feuchten und pflanzenreichen Lehnen und in den Gründen des Hochgebirges. Auf d. *spitzigen B.* und *Heidelberge* bei *Charlottenbrunn*. *Heuscheuer*, *hohe Mense*, *Schneeberg*. *Riesengeb.* und *Gesenke* häufig. *Czantory* u. *Baranio* n. Kotschy. Juli, Aug. ♀.

Stängel aufrecht, 2 - 4' h., einfach, unten ganz kahl. Bltt. gross, kahl, unterseits matt- oder grau-grün, zart und schnell welkend. Kronen blau. Blüthen in endständiger Traube, die am Gr. oft in eine Rispe übergeht, indem die Stiele ästig werden.

S. oleraceus L. *Gänse-distel.* Stängel ästig; die Blüthen in schirmartigen Doldentrauben; Bltt. länglich, ungetheilt oder fiederspaltig, die Stängelbltt. umfassend mit spitzen Ohren; Nüsse quer-rundlich, auf beiden Flächen mit drei Streifen.

Auf bebautem und unbebautem Lande, auf Aeckern, Gartenland, Dung- und Schuttplätzen, in der Ebene d. d. g. G. gemein. Juni bis Oct. ☉.

Durchaus kahl, nur die Blumenstiele wollig; H. 1 - 3'. Die Zertheilung der Bltt. ist sehr veränderlich; meist sind sie schrot-sägefg., aber auch ungetheilt, oder leierfg. mit grossem Endspfel, oder durchaus fiederspaltig mit lanzettlichen gleichgrossen Abschnitten; von weicher Substanz und oberseits meist matt. Blumen hell-, schwefel- oder weissgelb. Enthält Milchaft.

S. asper Villars. Stängel ästig; die Blüten in schirmartigen Doldentrauben; Bltt. länglich ungetheilt oder schwach-schrotsägefg., dornig-gezähnt; die Stängelbltt. umfassend mit stumpfen Ohren; Nüsse glatt, gerandet, auf beiden Flächen mit drei Streifen.

Wie der vorige, aber etwas seltner, doch d. d. g. G. in der Ebene. Juni—Oct. ☉.

Durchaus kahl. Die Bltt. sind häufiger ungetheilt, seltner schrot-sägefg., steifer als an der vorigen, oberseits glänzend. Kronen saugelb.

S. arvensis L. Stängel einfach; Blüten in endständiger Doldentraube; Bltt. länglich-lanzettlich, seicht schrotsägefg.; die obersten ungetheilt; Nüsse gestreift, die Streifen querrunzlig.

β. *glabrescens*. Die Blütenstiele und Hüllbltt. kahl.

Auf Aeckern und Brachen, nicht überall, aber häufig durch das ganze Gebiet. β. bei *Reinerz*, *Oppeln*, im Gesenke bei *Einsiedel*, *Jägerndorf* u. a. Juni; Aug. 2.

Wurzel kriechend. Stängel 2 - 4' h. Bltt. gewöhnlich oberseits glänzend. Bltzenstiele und Hüllbltt. meist mit gestielten goldgelben Drüsen dicht besetzt.

Barkhausia Mönch *Barkhausie*. Hüllbltt. dachziegelfg., die äusseren kürzer, abstehend. Blumen in mehreren Reihen. Nüsse stielrund, mit vielen Streifen, in einen fädlichen Schnabel ausgehend. Blumenboden kahl.

B. setosa DeCandolle. *B. hispida* Kit. W. et Gr. sil. Stängel ästig, beblättert; Bltt. schrotsägefg.; Hüllbltt. und Blütenstiele mit steifen Borsten besetzt.

Auf Brachen. Bei *Oppeln zwischen Grosstein u. Kleinstein* von *Grabowski* und *Fincke* entdeckt. Juli, Aug. ☉.

Stängel aufrecht, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h., borstenhaarig. Bltt. ungetheilt, gezähnt, oder schwach-schrotsägefg., ebenfalls borstenhaarig. Nüsse scharf. Federkrone schneeweiss. Kronen zitrongelb.

Crepis L. *Grundfeste*. Hüllbltt. dachziegelfg. die äusseren oft abstehend. Blumen vielreihig. Nüsse stielrund oder schwach zusammengedrückt, mit 10-30 Streifen, an der Spitze verengert oder verschmälert aber nicht geschnäbelt. Strahlen der Federkrone feinhaarig.

Es scheint keine festen Gränzen, zwischen dieser Sippe und der folgenden, wie auch der vorhergehenden zu geben. Unter den hier folgenden Arten sollten die drei ersten die Sippe *Crepis*, die 4te und 6te eine besondere Sippe, etwa *Homalocline* Cass., und die 5te und 7te wieder eine eigene, etwa *Catonia* Mönch. bilden, wofür in Zukunft vielleicht Unterscheidungsmerkmale gefunden werden dürfen.

a. Die Federkröhen weiss.

C. biennis L. Stängel aufrecht, rispig, gefurcht, etwas steifhaarig; Bltt. schrotsägefg. oder fiederspaltig; Hüllbltt. graubehaart, die äusseren abstehend; Nüsse glatt, mit 10 Ribben, nach oben zusammengezogen.

α. runcinata. Bltt. gleichmässig-schrotsägefg., nach vorn ungetheilt. *C. todomiensis* Besser.

β. lacera. Bltt. ungleich-fiederspaltig, oft zerrissen.

γ. dentata. Untere Bltt. buchtig-gezähnt, obere ganzrandig.

Auf Wiesen, an Weg- und Ackerrändern, an Waldrändern, in Gebüsch u. Obstgärten, d. d. g. G., auch im Vorgeb. häufig. Um Br. bei Höfchen, Kansern, Cawallen, Sandberg, Pollentschine u. a. Juni—Aug. ☉.

Stängel 2-4' h. Hüllbltt. aussen meist borsthaarig. Griffel gelb. Kronen sattgelb. Die Gestalt der Bltt. ist veränderlich, worauf man unhaltbare Arten gründete.

C. virens Villars. *C. pinnatifida* Willd. W. et Gr. sil. Stängel aufsteigend oder aufrecht, kahl; Bltt. kahl, buchtig-gezähnt oder schrotsägefg. oder fiederspaltig; die Stängelbltt. am Gr. pfeilfg.; Hüllbltt. weichhaarig, die äusseren anliegend; Nüsse glatt, mit 10 Ribben, nach oben ein wenig schmaler.

Auf Grasplätzen, Wiesen, Triften, Brachen und Sandplätzen. Juni—Aug. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ h., kahl, bald einzeln aufrecht, bald viele, wovon die seitlichen aufsteigen, was auf freien Sandplätzen der Fall ist. Die Bltt. sind in der Zertheilung eben so veränderlich, wie an der vorigen Art. Hüllbltt. bisweilen weichstachelig. Griffel gelb. Blütenköpfe halb so gross als die der vorigen.

C. tectorum L. *Pipau.* Stängel aufrecht, ästig, mit grauer Bekleidung; Bltt. buchtig-gezähnt oder fiederspaltig; Hüllbltt. grau, die äusseren anliegend; Nüsschen mit 10 Ribben, nach oben verschmälert und scharf.

Auf Sandplätzen, Aeckern und Brachen, Triften, Mauern und Dächern, d. d. g. G. gemein. Juni—Septbr. ☉.

Stängel 1 - $1\frac{1}{2}$ ', stets aufrecht, einfach oder oben oder von unten ästig. Bltt. veränderlich, wie bei den vorigen. Kronen schwefelgelb; Griffel braun.

C. succisifolia Tausch. *Hieracium succ.* Allione W. et Gr. sil. Stängel oberhalb ästig; Bltt. länglich undeutlich gezähnt, die untersten in einen Stiel verschmälert, stumpf; Blumenstiele und Hüllbltt. kurzhaarig und drüsig, die äusseren kürzer, angedrückt.

α. molle. Stängel und Bltt. kurzhaarig. *Hierac. molle* Jacq.

β. integrifolium. Stängel und Bltt. kahl. *Hierac. integrifol.* Hoppe.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen, Waldwiesen, besonders im Vorgebirge bis an das Hochgeb., hin und wieder auch in der Ebene. Um Br. bei Lissa u. Riemberg. Wohlau. Strehlen. Silsterwitz. Charlottenbrunn. Reinerz u. Cudowa. Riesengeb. und Gesenke. Hirschwiesen. Leiterberg, Wiedergrün. *β.* besonders in niederen Gegenden. Juli, Aug. ♀.

Stängel aufrecht; 1 - 2' h. Aeste doldentraubig. Stängelbltt. am Gr. umfassend. Kronen schmutzig gelbroth.

C. grandiflora Tausch. *Hieracium gr.* Allione. W. et Gr. sil. *H. amplexicaule* et *H. Sprengerianum* Krock. sil. Stängel im Bogen aufsteigend, meist 3-5köpfig; Bltt. drüsig-weichhaarig, gezähnt, die unteren länglich-lanzettlich in einen breiten Stiel verschmälert, die Stängelbltt. pfeilfg.; Hüllbltt. rauhaarig, die äusseren kürzer, spitz und locker; die Nüsse nach oben etwas verengert.

Auf den Wiesen und Graslehnen des Hochgebirges bis gegen 3000' herab. Im Riesengeb. am *Brunnenberge*, *Elbwiese*, *Kesselkoppe*, bei den *Kessel- u. Schüsselbauden*, *Schlingelbaude*, *Baberhäuser*, *Brückenberg bis Arnsdorf* herab. *Gläzer Schneeberg*, auch hier in den *Wölfels- und Klessengrund* herabsteigend. Auf den Kämmen und Lehnen des Gesenkes sehr häufig bis gegen *Waldenburg u. Carlsbrunn* herab. Juli, Aug. 2.

Stängel stark und dick, eckig, einfach oder oben gabelförmig-getheilt, 1 - 5blättrig. Bltt. $\frac{1}{2}$ ' lang, die Zähne meist rückwärts gekehrt, bisweilen fast federspaltig. Blüthenköpfe dick, fast von 1" im Durchmesser. Kronen sattgelb.

b. Die Federkronen schmutzig-weiss, unten bräunlich, zerbrechlich.

C. paludosa Mönch. *Hieracium pal.* L. W. et Gr. sil. Stängel aufrecht, ästig; Bltt. kahl, die unteren länglich spitz schrotsägefg.-gezähnt, die oberen eifg., herzfg.-umfassend, mit lang vorgezogener Spitze; Hüllbltt. drüsig behaart, die äusseren viel kürzer; Nüsse mit 10 Streifen.

Auf sumpfigen Wiesen, in sumpfigen Wäldern und Brüchen d. d. g. G. von der Hügelgend der Ebene bis auf das Hochgeb. Um *Br.* bei *Lissa*, *Kapsdorf*, *Trebnitz*, *Riemberg* u. m. Riesengeb.: *Elbgrund* und *Elbwiese* etc. *Trop. Te.* Juli, Aug. 2.

Stängel aufrecht, $1\frac{1}{2}$ - 3' h., oben doldentraubig-ästig. Die Wurzelbltt. verlaufen in einen geflügelten Stiel. Kronen schmutzig-rothgelb.

C. sibirica L. Stängel aufrecht, steifhaarig; Bltt. elliptisch-länglich, grob-gezähnt, die unteren in einen schrotsägefg.-geflügelten, am Gr. stängelumfassenden Stiel verlaufend, die oberen eifg.-länglich umfassend; Hüllbltt. rauhaarig, die äusseren etwas kürzer und locker; Blüthen in endständiger Doldentraube; Nüsse oben zusammengezogen mit 30 Streifen.

An kräuterreichen buschigen Lehnen des Hochgebirges. Wurde im J. 1833 im *Kessel im Gesenke* von mir entdeckt. Vielleicht schon früher von v. Mückusch entdeckt, aber irrthümlich als *Cineraria sibirica* angegeben, welche bisher im Gesenke vergeblich gesucht wurde. Juli, Aug. 2.

Stängel 3 - 4', kantig-gefurcht, steif aufrecht, oben mit wenigen Aesten, und selbst, so wie die Aeste mit längeren blassen Borsten, schwärzlichen krausen Haaren und krausem weissen Flaum bekleidet, 3 - 6köpfig. Die unteren Bltt. bilden ein Oblongum von 5 - 6" Länge und 3 - 4" Breite, unterseits mit kleinem krausen Haar besetzt. Hüllbltt. schwarzgrünlich mit weissen und schwarzen Haaren besetzt. Blüthenköpfe fast 1" im Durchmesser. Kronen gelb.

Intybus Fries. Hüllbltt. walzig; äussere sehr kurz, angedrückt. Blumen in mehreren Reihen. Nüsse gestreift, oben etwas verengert. Strahlen der Federkrone ganz glatt.

Stängel blattlos.

I. praemorsus Fries. *Hieracium pr.* Linn. Krock sil. *Crepis pr.* Tausch, Koch Syn. Blüten in endständiger Traube auf einem blattlosen Stängel.

Auf Waldwiesen in der Ebene und dem Vorgeb. zerstreut. Um Br. an der *Chaussée nach Lissa*, und bei *Riemberg. Seifersdorf bei Ohlau. Wohlau. Reinerz. Leobschütz. Grossstein bei Oppeln.* Bei *Katscher nach Wenck. Trop., Malinow b. Ustron.* Mai, Juni. 2.

Wurzel abgebissen. Bltt. fast rosettenförmig, länglich, am Gr. verschmälert, stumpf. Stängel 1' h. Die unteren Blumenstiele ästig, 2-3blumig, die oberen einblumig. Zwei Varietäten, welche unter einander wachsen: mit kahlen, am Rande gezähnten Bltt. und kahlem Stängel, und mit weichhaarigen ganzrandigen Bltt. und weichhaarigem Stängel. Kronen schwefelgelb.

Hieracium L. *Habichtskraut. Mausöhrlein.* Hüllbltt. dachziegelförmig. Blumen in mehreren Reihen. Nüsse mit 10 Streifen, stielrundlich oder prismatisch, gleichbreit. Strahlen der Federkrone feinhaarig. zerbrechlich. Blumenboden kahl, zellig.

Eine Sippe, deren Arten häufig und weit verbreitet sind; mehrere bewohnen die höheren Regionen in grosser Anzahl. Gestalt und besonders die Bekleidung ist sehr veränderlich, und die richtige Begränzung der Arten erfordert eine lange und sorgfältige Beobachtung.

a. *Piloselloidea.* Der Stängel gleicht einem Schaft; die Wurzel abgebissen.

H. Pilosella L. Stängel durchaus blattlos, einblüthig; Hüllbltt. kurzwalzig; Bltt. verkehrt-ei-lanzettlich, borstenhaarig unterseits grau- oder weiss-filzig. — Hierher *H. Pil. genuinum* W. et Gr. sil.

Auf Sandboden, auf Triften, an Dämmen, Hügeln, in Kieferwäldern u. Haiden, d. d. g. G. fast bis an das Hochgebirge, gemein. Mai bis Sept. 2.

Von 1-6'', gewöhnlich 4-5'' hoch. Treibt meist lange und viele Ausläufer Wurzelbltt. am Boden liegend mit mehr oder weniger, kürzeren oder längeren, zerstreuten blossen Borsten, entweder beiderseits oder nur oberseits oder nur am Rande besetzt. Eben so veränderlich ist die Borstenbekleidung des Stängels; dieser ist stets mit dünnerem oder dickerem Sternfilz besetzt. Kronen schwefelgelb, die äussersten unterseits mit einem hellrothen Mittelstreif. Köpfe sind Nachmittags geschlossen. Var. mit zwergigem Stängel von $\frac{1}{2}$ -1'' H., ferner mit sehr schmalen lineal-lanzettlichen Bltt.; auch zweiblüthig mit zweiter kurzgestielter Blüthe an der Spitze oder länger-gestielter am unteren Theile des Stängels.

H. bifurcum Marschall v. Bieberstein. *H. Pilosella bifurcum* W. et Gr. sil. *H. stoloniflorum* Willd. und *H. bifurcum* MB. b. Koch Syn. *H. collinum* Besser Prim. galic. Stängel am Gr. mit wenigen

Blättern, arnblüthig, 1-3mal gabeltheilig, mit sparsamen weichen Borsten besetzt; Hüllbltt. am Gr. bauchig; Bltt. verkehrt-eifg.-länglichlich oder lanzettlich, mit weichen Borsten unterseits mit dünnerem oder dichterem Sternfilz besetzt.

α. minus. $\frac{1}{2}$ - 1' h., 2 - 3blumig, ohne Ausläufer oder mit kurzen Ausläufern.

β. majus. 1-2' h., 3-5blumig, mit vielen aufsteigenden blüthentragenden Ausläufern.

γ. hirsutum. Bltt. u. Stäng. mit vielen langen weichen Borsten.

Auf Grasplätzen, an Graben- und Ackerrändern, frischgeschütteten Dämmen, an sonnigen Hügeln, meist in lockerem und etwas sandigem Boden, d. d. g. G. auch im Vorgebirge, nicht selten. Um Br. bei Scheitnich, Oswitz, Schottwitz, Ransern, Althof, Koberwitz, Skarsine, Mirschelwitz, Zobten, Charlottenbrunn, Cudowa, Oppeln, Neisse, Troppau, Ustron b. Teschen. Mai, Juli. 2.

Stellt sich wie eine vergrösserte Form der vorigen dar, ist aber eine selbstständige Art, wie ich mich nunmehr überzeugt habe. Nie einblumig; der Stängel meist in der Mitte oder bei $\frac{2}{3}$ in zwei lange Blüthenstiele getheilt; davon ist häufig der obere noch einmal oder beide getheilt, selten geht die Theilung weiter. Stängel meist 1' h., unten mit mehreren, oben mit wenigen oder gar nicht mit blossen weichen Borsthaaren besetzt, ausserdem durchaus und oben dichter mit weissem Sternfilz, oben auch noch mit Drüsen besetzt. Die Bltt. ändern in der Breite ab, unten mit Sternfilz, doch minder dicht als bei der vorigen Art, bekleidet, die untersten stumpf, die nächsten spitz, bisw. etwas ins graugrüne ziehend, doch immer von blassgrüner Farbe. Köpfe gross; meist grösser als an der vorigen. Kronen schwefelgelb, die äussersten unterseits mit hellrothem Mittelstreif, der jedoch auch nicht selten fehlt. Die oben angeführten Varietäten geben nur die extremen Formen an.

H. floribundum Wimm. et Grab. Flor. sil. emendat. Stängel am Gr. mit wenig Blättern, 1-3mal gabeltheilig oder eine traubige Trugdolde tragend, mit langen steif abstehenden Borsten besetzt; Hüllbltt. a. Gr. schwach bauchig; Bltt. länglich-verkehrt-lanzettlich mit steifen Borsten, unterseits mit verlorenen Sternhaaren besetzt.

α. pedunculare. Stängel 1' h., gabelig-2blüthig; Köpfe langgestielt. Hierher *H. pedunculare* Wallr. Sch. crit. *H. Pilosella pedunculare* W. et Gr. sil.

β. furcatum. Stängel 1 - 1 $\frac{1}{2}$ ' h., gabelig-4blüthig, Köpfe langgestielt. — Hierher *H. floribundum β furcatum* W. et Gr. sil.

γ. subcymosum. Stängel 1 - 1 $\frac{1}{2}$ ' h., oben eine traubige Trugdolde tragend, Köpfe kurzgestielt. Hierher *H. floribundum α subcymosum* W. et Gr. sil.

Auf Grasplätzen, Wiesen u. Ackerrändern in der Ebene und dem Vorgebirge bisher nur an wenigen Orten. *α.* an Grabenrändern um Oltaschin b. Br., Bladen bei Leobschütz und am Schmelzberge bei Cudowa (Grabowski). *β.* Mehltheuer bei Strehlen, und zwischen Bankwitz und Silsterwitz. *γ.* ebenda und an der alten Oder b. Scheitnich. Park bei Koberwitz. Reimswaldau bei Charlottenbrunn. Mai, Juni. 2.

Diese Art, wovon die beiden Var. *α* und *β* eine grosse Aehnlichkeit mit der vorigen haben, unterscheidet sich von jener durch dunkle Farbe des Krautes, sowohl im Leben als auch an trocknen Exemplaren, durch zahlreiche söhlig-abstehende, gerade und steife Borsten, die am Stängel nach oben zu-, nicht abnehmen, unterhalb sternhaarlosen und kahlen Stängel, eben so steife Borsten an den Bltt., deren Unterseite

nur wenige zerstreute oder gar keine Sternhaare zeigt, durch schmalere Bltt., kleinere Köpfe, dunklere Kronen und endlich dadurch, dass sie eine vielblättrige Form bildet welche den Uebergang zu den unten folgenden, in Trugdolden blühenden Arten macht, was bei der vorigen nie vorkommt. Man erkennt indess den Zusammenhang der Form γ mit den anderen daran, dass die unteren Blütenäste tiefer stehen, auch wohl einer 1-2" von den anderen entfernt, so dass die Trugdolde traubenartig erscheint. Die Bltt. spielen bisweilen ein wenig in das Graugrüne, am Rande zuweilen schwach-wellig. Hüllbltt. wie die Stiele schwarzborstig mit Sternfilz und gestielten Drüsen. Kronen doppelt so lang als die Hüllbltt., goldgelb, bisweilen die äusseren unterseits mit rötlichen Mittelstreifen. — Von den Formen der folgenden Art ist diese durch die grösseren Blumen und die bauchige Hülle zu unterscheiden.

H. Auricula L. *H. dubium* Smith und Willd. Stängel mit einem oder keinem Bltt., mit 2 oder mehreren Köpfen, und fast stets mit Ausläufern am Grunde; Bltt. graugrün zungenfg., mit Borsten besetzt, übrigens ganz kahl; Hüllbltt. kurz-walzig.

Auf Wiesen, Triften, Gras- und Rasenplätzen, an Wegrändern, auf trocknen Hügeln, d. d. g. G. auch im Vorgeb. sehr häufig. Mai, Juni. 2.

Stängel meist $1\frac{1}{2}$ ', auch bis 1' h., unten ganz kahl, oben mit Sternhaar u. schwärzlichen Drüsen besetzt, meist 2-3blütig, selten einblumig mit einer verkümmerten Kopfknospe darunter, selten 5- und mehrblumig. Bltt. besonders nach unten am Rande mit langen weissen Haaren gewimpert, seegrün, fast gleich-breit. Hüllbltt. mit Drüsen und Sternhaar besetzt. Kronen zitrongelb. Köpfe halb so gross als an der vorigen.

H. praealtum Villars. W. et Gr. sil. Koch Syn. Stängel fast blattlos, kahl oder mit zerstreutem Borstenhaar und Sternhaar bekleidet, mit einer vielköpfigen, gleichgipfligen, lockeren Doldentraube; Blütenstiele und Hüllbltt. mit Haaren und Sternhaar besetzt; Bltt. graugrün lanzettlich, mit steifen Borsten nur am Rande oder auch auf den Flächen besetzt, übrigens kahl.

α . *verum*. Stängel fast ganz kahl; Bltt. am Rande und unterseits an der Mittelrippe borstig gewimpert. — Hierher *H. florentinum* Willd. *H. Bauhini* Schultes und Besser.

β . *fallax*. Stängel kahl oder mit sparsamen Borsten, Bltt. oberseits oder beiderseits mit langen Borsten besetzt. *H. fallax* De Cand. und Koch.

γ . *hirsutum*. Stängel mit Borsten und Sternhaar, Bltt. unterseits mit Sternhaar besetzt.

Auf Grasplätzen, Triften, Dämmen und auf Mauern, Sandplätzen und steinigen Hügeln, d. d. g. G. häufig auch im Vorgeb. β . um Br. bei Masselwitz und Trebnitz. γ . bei Gnadenfeld in O. S. von Hasse mitgetheilt. Mai, Juni. 2.

Meist $1\frac{1}{2}$ ', aber auch nur 1' und bis 3' h., schlank. Kleine Köpfe, zitrongelbe Kronen, meist grauschwärzliche Hüllbltt., lockere Doldentraube, so dass der Stängel bisweilen gabelig-getheilt und die unteren Aeste verlängert sind, kahle, graugrüne, schmale, lanzettliche oder länglich-lanzettliche Bltt. sind dieser Art eigen. Der Stängel ist bald ganz borstenlos, bald mit weissen steifen Borsten, denen nur selten kürzere schwärzliche untermengt sind. Gewöhnlich hat sie lange Ausläufer, die sich nach emporrichten und Blüten tragen, wo sie dann in der Gestalt von Nebenstängeln auftreten; meist sind sie aber blüthenlos und oft fusslang; eben so oft aber fehlen sie auch ganz.

H. echioides Waldst. und Kitaibel. Stängel beblättert, mit Sternfilz und steifen Borsten besetzt; Blt. lanzettlich, graugrün, unterseits mit Sternfilz, beiderseits mit weissen Borsten besetzt; Doldentraube vielköpfig, gleichgipfelig, etwas locker; Stiele und Hüllblt. haarig und weissfilzig.

Im Vorgebirge. Bei *Fürstenstein* von Kaiser entdeckt. Juni. 24.

Diese Art konnte ich noch nicht lebend beobachten. Sie kommt ebenfalls in mehreren Modificationen vor. Durch die striegelige Bekleidung, die weissfilzigen Hüllblt und Stiele, und zumal den beblätterten Stängel ist sie von den ähnlichen Formen der vorigen zu unterscheiden.

H. Nestleri Villars. *H. cymosum* Reichenbach. W. et Gr. sil., nicht Linné. Stängel unterhalb beblättert, mit Sternhaaren und zerstreuten kürzeren oder längeren Haaren besetzt; Blt. lanzettlich-zungenf., beiderseits mit dünnen Sternhaaren u. kurzen Haaren besetzt; Doldentraube vielköpfig gedrängt.

α. pubescens. Blt. mit sehr kurzen Haaren; Stängel mit ganz kurzen oder ohne Haare.

β. hirtum. Blt. beiderseits kurzhaarig; Stängel leicht-, oben dünner behaart.

Auf fruchtbaren Wiesen, Waldwiesen, grasigen Hügeln, Berglehnen besd. im Vorgebirge, aber auch in der Ebene, jedoch nur zerstreut und nirgends sehr zahlreich. Um Br. bei *Kosel*, *Krittern*, *Wirrwitz*, *Riemberg*, *Charlottenbrunn*, *Langenbielau*, *Schoberggrund* bei *Nimptsch*, *Geiersberg*, *Strehlen*, *Schlackenthal* bei *Reichenstein*, *Schmiedeberg*, *Cudowa*, *Zentner b. Neurode*, *Wilhelmsthal*, *Czantory bei Ustron*. Mai, Juni. 24.

H. $\frac{1}{2}$ - 3'. Meist ohne Ausläufer. Kronen goldgelb. Die Blüthenköpfe stehen gewöhnlich nicht alle in gleicher Höhe. Schmalblättrige Exemplare sehen dem *H. praealtum* oft sehr ähnlich. Die sternförmigen Haare am Stängel und beiden Blattflächen und die kurzen Haare, so wie der zungenförmige Zuschnitt der Blt. machen diese Art leicht kenntlich.

H. collinum Gochnat. *H. dubium* Linn. suc. *H. pratense* Tausch. W. et Gr. sil. *H. cymosum* Willdenow Sp. pl. Stängel unterhalb beblättert, mit langen weichen Haaren, oben filzig, drüsig und schwarzhaarig; Blt. länglich-lanzettlich mit weichen weissen langen Haaren. ohne oder mit geringen Sternhaaren auf der Unterseite; Doldentraube vielköpfig, gedrängt.

β. campestre. Blt. kurz, schmal, steif, unterseits dünnfilzig; Stängel steif, oben schwärzlich.

γ. glabratum. Blt. sehr weich, auf den Flächen fast kahl, am Rande und der Mittelrippe haarig.

Auf Grasplätzen aller Art, auf Wiesen, an Waldrändern, Dämmen, Ackerrainen, in Obstgärten, auf Mauern; *β.* auf sandig-kiesigen Stellen, an Flussufern z. B. an der *Weistriz bei Burkersdorf*; *γ.* im Schatten und feuchtem Waldboden. Diese Art ist unter den nächstähnlichen in der Ebene u. dem Vorgebirge die gemeinste u. d. d. g. G. verbreitet. Mai, Juni. 24.

H. 1 - 3'. Meist stärker und dicklicher als die vorigen, auch die Bltt. etwas grösser. Die Stiele und Hüllbltt. fast immer schwärzlich. Die langen, dabei weichen Haare an Bltt. und Stängel zeichnen diese Art aus; sie sind weiss aus schwärzlichem Grunde; höher oben am Stängel werden sie schwarz und es treten grauer Filz und Drüsen hinzu. Kronen goldgelb. Die Bltt. sind häufig gezähnt. — Nur einer besonderen Form dieser Art gab Tausch den Namen *H. pratense*. Man muss daher den älteren Namen Gochnats, unter welchem sie auch ausser Deutschland bekannt ist, wieder aufnehmen.

H. aurantiacum L. Stängel unterhalb beblättert, von weichen Haaren rauh, oben drüsig und schwarzhaarig; Bltt. verkehrt eiförmlich oder lanzettlich, mit langen weichen Haaren besetzt, ohne Sternhaare; Doldentrauben mehrköpfig, etwas locker.

Auf tiefer liegenden Wiesen des Hochgebirges. Im Riesengeb. am kl. Teiche, bei der Schlingelbaude, Grenzbauden, häufiger auf der böhmischen Seite z. B. bei St. Peters, Kesselbauden u. m. Saalwiesen bei Landeck. Gl. Schneeberg. Im Gesenke am Leiterberge, Altvater, im Kessel, an der Hungerlehne. Auf den Beskiden bei Teschen u. n. Kotschy a. d. Baranio. Juni, Juli. 2.

H. 1'. Meist ohne Ausläufer. Blüten satt-orangefarben. Die Varietät mit lauter gelben Kronen, und eine andere mit orangef. Rand- und gelben Scheibenblumen sind bei uns noch nicht gefunden worden.

b. *Pulmonariae*. Der Stängel mehr oder weniger beblättert. Die Wurzel bildet einen ästig-vielköpfigen Stock.

H. villosum L. Stängel beblättert, 1-3köpfig, mit langen Wollhaaren bekleidet; Bltt. grau-grün-zottig, länglich-lanzettlich, die oberen am Gr. breit und halb umfassend; Hüllbltt. mit langen weissen Wollhaaren, am Gr. eiförmig, spitz, die äusseren weit abstehend.

An felsigen Abhängen des Hochgebirges. Im Kessel im Gesenke von Grabowski i. J. 1834 gefunden. Juni, Juli. 2.

H. 6 - 8''. Meist mit einem Kopf. Kronen goldgelb. Bltt. auch lanzettlich, mit entfernten Zähnen, mit langen weissen Zottenhaaren besetzt. Ausser der langzottigen Bekleidung, welche doch veränderlich ist, lässt sich diese Art von den starkzottigen Formen des *H. alpinum* dadurch unterscheiden, dass die äusseren Hüllbltt. weit abstehen, sehr spitz und grün sind, da sie ausser den langen Zotten weder mit Drüsen noch mit Sternhaaren bekleidet sind.

H. alpinum L. Stängel 1-3köpfig zottig und mit Sternhaar besetzt, oben und die Hüllbltt. mit langen weissen am Gr. schwarzen u. m. schwarzen drüsentragenden Haaren besetzt; d. Blütenstiele aufrecht abstehend; Bltt. spatelförmig oder länglich-lanzettlich, in den Stiel verschmälert ganzrandig oder gezähnt, eins oder wenige am Stängel sitzend. Die ausgezeichnetsten Formen sind folgende:

a. *villosissimum*. Stängel niedrig, einblättrig, armbättrig, zottig; Bltt. zottig, spatelförmig; Hüllbltt. von dichten langen Zotten graubärtig. — Diess gilt bei den meisten Autoren für das *H. alpinum*, wie es auf den höchsten Kämmen, besd. zwischen Steinen und an Felsen vorkommt. Der Stängel ist meist dick bekleidet, und zwar vierfach: mit langen weissgrauen, am Gr. schwärzlichen Zottenhaaren, mit anliegenden Sternhaaren, mit schwarzen steifen Borsten und nach oben mit schwarzbraunen gestielten Drüsen. Im Riesengebirge an der Koppe.

auf dem *Koppenplane* und mehreren Punkten des Kammes, am *hohen Rade* u. s. w. Selten im *Gesenke*, am *Altwater*, *Peterstein*, *Hochschar*, im *Kessel* Gipfel der *Babia Gora*.

- β. *pumilum*. Stängel niedrig, einblüthig, armlättrig, schwachzottig; Blt. schwachzottig, lanzettlich, bisweilen gezähnt; Hüllblt. mit sparsamen Zotten, aber dicht mit schwarzen Borsten und Drüsen besetzt. *H. pumilum* Hoppe. Auf den Kämmen des *Riesengebirges* u. *Gesenkes*. *Gl. Schneeberg*.
- γ. *inapertum*. Stängel einblüthig, armlättrig, zottig; Blt. zottig, länglich und länglich-lanzettlich; Hüllblt. dichtzottig; Blumen mit eingerollter Zunge, Köpfe nie ausgebreitet. — Kommt der ersten nahe, aber vom üppigerem Wuchs; die Wucherung des Krautes hat die vollständige Entwicklung der Blüten gehemmt. An grasreichen Plätzen im *Riesengb.*, am Rande des *gr. Teiches*, und die *Dreisteine*.
- δ. *stylosum*. Stängel 1 - 2blüthig, beblättert, zottig; Blt. zottig, länglich-lanzettlich; Hüllblt. zottig; die Zunge der Blumen verkümmert; Griffel weit hervorragend; Köpfe geschlossen. — Diese ist eine weitere Entwicklung der vorigen, noch höher, bis 1', etwas minder zottig; die Zungen sind bisweilen ganz klein. — Stellenweise in grossen Gruppen auf den Kämmen des *Riesengb.*, namentlich auf dem *Koppenplane*.
- ε. *latifolium*. Stängel niedrig, einblüthig; Blt. eifg.-länglich, beiderseits spitz nebst Stängel und Kelch grauzottig. — Ziemlich stark und steif; Stängel oft bogig, die Zotten fast borstenartig. Hierher *H. Halleri* γ *spurium* W. et Gr. sil. Hin und wieder auf den Kämmen des *Riesengeb.* und *Gesenkes*.
- ζ. *sudeticum*. Stängel höher, 2 - 3blüthig, mehrblättrig, zottig; Blt. lanzettlich-gezähnt, zottig; Hüllblt. grauzottig. — Meist mit sehr grossen Köpfen, stärker und feister als die vorigen; eine grosse Form aus besserem Boden. Selten im *Riesengebirge*, vorherrschend auf den Kämmen des *Gesenkes*, am *Hochschar*, *Altwater*, auf der *Hungerlehne*. Hierher gehört auch eine Form, als *glossophyllum* in der Fl. sil. beschrieben, mit länglich-lanzettlichen stumpflichen Blt., von der *Elbwiese* im *Riesengebirge*, wozu *H. sudeticum* Sternberg zu gehören scheint. Uns wenigstens ist kein dergleichen *Hieracium* vom *Riesengebirge* bekannt, das sich von den von uns zu *H. alpinum* gezogenen Formen als Art unterscheiden liesse.
- η. *oblongifolium*. Stängel ein- und mehrblüthig, kurzhaarig oder rauhaarig; Blt. länglich-eifg., am Gr. schwach-herzfg., meist gezähnt; Hüllblt. schwärzlich-rauhaarig. Hierher *H. Halleri* Villars. *Riesengeb.* und *Gesenke*.
- θ. *nigrescens*. Stängel höher, ästig-mehrblüthig, schwachhaarig; Blt. eifg.-länglich oder lanzettlich, die oberen spitzig, buchtig-gezähnt, schwachhaarig; Hüllblt. schwarzhaarig, etwas zottig. Hierher *H. nigrescens* Willd. — Diese Form entfernt sich sehr weit von den ersten, hängt aber durch Mittelformen damit genau zusammen. Am Stängel sitzen gewöhnlich 1 - 2 Blätter. Sie hat eine Aehnlichkeit bald mit *H. murorum*, bald mit *H. sylvaticum*, unterscheidet sich aber durch die schwarzen Hüllblt. und die fast aufrechten Blütenstiele. — Hierher *H. villosum* Kr. sil.

Auf den Kämmen und Kuppen, an den Lehnen und auf den Wiesen des Hochgebirges oft ganze Strecken bedeckend, kaum unter 4000'. Juli, Aug. 24.

Die ausserordentliche Veränderlichkeit und der auf den Boden und andere Ursachen gegründete Wechsel der Gestalt, wodurch diese Pflanze in den vielen oben angezeigten Formen, welche viele Autoren für verschiedene Arten ansehen, erscheint,

machen die Beobachtung derselben interessant und belehrend. — Die Kronen goldgelb. Samen schwarz. Die ersten Wurzelblt. sind stets spatel- oder keilförmig, mit abgerundeter Spitze, die späteren meist lanzettlich, spitzig. Die grauen Wollhaare werden an alten trocknen Exemplaren rostgelb.

H. pallescens Waldst. u. Kitaib. *H. Schmidtii* Tausch. W. et Gr. sil. Koch Sym. Stängel unterhalb mit 1 - 2 Bltt., armblüthig, mit 2-6 doldentraubigen Köpfen, haarig; Bltt. eifg.-länglich und lanzettlich, gestielt, bläulich-grau, am Rande und unterseits mit zerstreuten bogigen Borstenhaaren besetzt.

An Felsen und felsigen Abhängen am Fusse des Hochgebirges bis auf dessen Höhen. Am *Prudelberge bei Stonsdorf* zuerst von Günther gef. Am *Gröbelberge, Kitzelberge*, an der *Kesselkoppe*, unter dem *Teufelsgärtchen* und auf den *Falkenberg* nach Elsner bei N. v. E. An Felsen *unter dem Hockschar* im Gesenke nach Krause. Juni, Juli. 2.

H. 1 - 1½. Wurzelblt. ausgebreitet, fast dicklich und lederartig, bald nur unterseits, bald beiderseits borstig. Stängel bisweilen gabelig-Blüthig. Kronen gross, sattgoldgelb; an den von mir gesehenen Exemplaren vom *Prudelberge* sind die Stiele und Hüllblt. mit Drüsen besetzt, was nach Koch am *H. pallescens* W. u. Kit. nicht der Fall ist. Dennoch lässt sich unseres von diesem nicht trennen; das ächte *pallescens* stellt eine Form dar mit mehreren stark-gezähnten Bltt. An unseren Expl. sind die Bltt. nur bisweilen am Gr. gezähnt.

H. murorum L. *Buchlattig. Gelb Lungenkraut.* Stängel unterhalb mit 1-2 Bltt., doldentraubig-mehrblumig; Bltt. grün kurzhaarig, die untersten ei-herzfg., am Gr. gezähnt; Blütenstiele weit abstehend sternfilzig u. kurzhaarig; Hüllblt. angedrückt mit grauem Sternfilz mit oder ohne schwarze Borstenhaaren.

β. *sylvaticum.* Bltt. am Gr. eingeschnitten-gezähnt.

In Wäldern, Laub- und Nadel-W., Haiden, auf Mauern in der Ebene u. d. Vorgebirge bis an das Hochgebirge, d. d. g. G. sehr häufig. Juni—Aug. 2.

H. 1½ - 2", auch kleiner. Die Blüthenstiele gehen armförmig unter stumpfen Winkeln ab. Wurzelblt. oft eifg., stumpf, und unterseits roth, mehr oder minder behaart. Hüllblt. nie mit Zotten besetzt, in der Mitte grau oder schwärzlich, am Rande grün. Bisweilen ist der Stängel gabelig, wo jeder Ast eine Doldentraube trägt. Bis 20 Köpfe. Kronen zitron-goldgelb. Selten sind die Blüthenstiele mit schwarzen Borstenhaaren und Drüsen besetzt.

H. sylvaticum Florae Danicae. *H. vulgatum* Fries, W. et Gr. sil. Stängel gleichmässig beblättert, mehrblumig rispig-doldentraubig; Bltt. grün, haarig, ei-lanzettlich, beiderseits verschmälert, buchtig-gezähnt, die unteren gestielt; Blütenstiele abstehend sternfilzig und kurzhaarig; Hüllblt. angedrückt weichhaarig.

α. *littigiosum.* Stängel niedriger, doldentraubig, einfach mit 2-3 seicht-gezähnten Bltt.

β. *latifolium.* Stängel rispig, mit mehreren breit-eiförmigen grobgezähnten Bltt.

γ. *angustifolium.* Stängel rispig, mit mehreren länglich-lanzettlichen, buchtig-gezähnten, kahlen oder behaarten Bltt.

In Laubwäldern, Vorhölzern, an sonnigen Hügeln, an Hauen und sonnigen Waldlehnen, in der höheren Ebene und dem Vorgeb. bis an das Hochgebirge. Um *Br.* bei *Bletschwitz* und *Lissa*, sehr häufig in den *Trebnitzer Bergen*. Gemein vom *Zobten* durch d. g. Vorgebirge und am Fusse des Hochgebirges. *Trop. Te.* Mai, Juni.

H. 2 - 4'. Stängel am Gr. oft zottig. Die allerersten Wurzelbltt. unterseits roth, ganzrandig. Kronen goldgelb. Die var. α ist der vorigen Art sehr ähnlich und schwer zu unterscheiden. Auch giebt es Formen, welche sich der folgenden nähern.

H. boreale Fries. *H. sabaudum* Matt. Krock. Stängel steif-aufrecht, beblättert; Bltt. ei-lanzettlich oder lanzettlich, buchtig-gezähnt, die oberen fast halbumbfassend; Wurzelbltt. fehlen; Blüthen-äste doldentraubig; Hüllbl. fast kahl, vielreihig, zuletzt abstehend.

β . *lacerum*. Fast kahl; Bltt. ungleich fiederspaltig-zerrissen.

In Laubwäldern und Nadelwäldern der höheren Ebene und des Vorgebirges häufig. Um *Br.* bei *Goldschmiede*, *Lissa*, *Gr. Rake*, *Skarsine* und den *Trebnitzer Hügeln*. β . im *Sattler bei Hirschberg* (v. *Flotow*) und am *Stangenberge bei Stonsdorf*. *Trop. Te.* Juli bis Sept. 2.

H. 2 - 4'. Stängel meist dicht beblättert, unten rauhaarig oder auch kahl. Die oberen Bltt. sind oft breit, fast rundlich-eifg. Gegen das Ende der Blüthe stehen die Hüllbltt. ab. — Wahrscheinlich kommt auch *H. laevigatum* Willd. bei Koch. Syn., kennlich dadurch, dass die äusseren Hüllbltt. an den Blüthenknospen sich über derselben bogenfg. in Gestalt eines Krönchens zusammenneigen, bei uns vor; doch mangeln noch genaue Beobachtungen. Vielleicht ist es auch nur eine Form des vielgestaltigen *H. boreale*.

H. umbellatum L. Stängel steif, beblättert, oben ästig, die obersten Aeste fast schirmfg.; Bltt. lanzettlich oder linealisch, gezähnt, selten ganzrandig; Wurzelbltt. fehlen; Hüllbltt. fast kahl, vielreihig, an der Spitze zurückgebogen.

β . *angustifolium*, mit sehr schmal-linealischen Bltt.

Auf Waldwiesen, an Waldrändern, in Gebüsch und an schattigen Dämmen, an buschigen Wegrändern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juli—Sept. 2.

H. 2 - 3'. Meist kahl, zuweilen mit dünnen Haaren besetzt, selten rauhaarig. Kronen goldgelb. Bisweilen auf Wiesen einblüthig, wenn der Stängel abgehauen ist. Aus dem *Sattler bei Hirschberg* theilte v. *Flotow* eine Form mit linealischen, fiederspaltig-gezähnten Bltt. mit.

H. prenanthoides L. Stängel beblättert, unten weichhaarig, oben rispig-ästig; die Aeste mehrblüthig; Bltt. herzfg.-umfassend, eifg.-länglich oder länglich-lanzettlich, gezähnt, haarig und feingewimpert; Blumenstiele und Hüllbltt. drüsenhaarig, schwärzlich.

α . *lanceifolium*. Stängelbltt. länglich-lanzettlich, spitz.

β . *bupleurifolium*. Stängelbltt. breit-eifg.-länglich, untere am Gr. fast geöhrt.

Auf Wiesen und grasreichen Lehnen des Hochgebirges, bis in die Region des Vorgebirges herab. Im Riesengeb. am *kl. Teiche*, in den *Schnee gruben*, *Kesselkoppe* und *Kesselgrube*, um die *Pudelbaude*, auf der *Elbwiese*, im *Riesengrunde* u. m. *Hohe Mense*. *Gl. Schnee-*

berg. Gesenke: am Leiterberge, Altwater, Kessel, Hungerlehne, wo besonders β , was im Riesengeb. seltner ist. Baranio n. Kotschy. Juli, Aug., später als die ähnlichen Formen von H. alpinum. 2.

Stängel 1 - 2' h. Bltt. bisweilen unterseits schwach-seegrün. Hüllbltt. nicht zottig, grauschwarz. Die Aeste an der Spitze meist dreiblühig. Kronen sattgoldgelb.

2. Corymbiferae. Der Griffel ungegliedert. Sämmtliche Blumen röhrig, oder die des Strahles zungenförmig. —

Die Unterabtheilungen gründen sich auf An- oder Abwesenheit der Granne am Gr. der Staubbeutel, auf die Gestalt, Bekleidung und Lage der Narben (*crura styli* bei Decand u. a.), auf den Kelchsaum an der Frucht und die Polygamie der Blumen.

a. Eupatorieae. Staubbeutel ohne Granne. Narben verlängert, vom Gr. an behaart. Alle Blüten zwittrig. Nüsse gestreift. — Kronen gelb. XIX, 1.

Eupatorium L. Wasserdosten. Königundenkraut. Hüllbltt. dachziegelfg., walzig. Wenige, sämmtlich röhrig-trichterförmige Blumen. Kelchsaum eine haarige Federkrone.

Bltt. gegenständig.

E. cannabinum L. Bltt. gestielt 3-5theilig, mit lanzettlichen gesägten Zipfeln, wovon der mittlere länger ist.

An feuchten Plätzen, an Bächen, Teichen und Gräben in Wald- und Haide-Gegenden, d. d. g. G., auch im Vorgeb., nicht selten. Um *Br. bei Gr. Rake, Wildschütz u. Bischwitz a. W., Goi bei Kapsdorf. Trebnitz. Riemberg u. m. Trop. Te. Juli, Aug. 2.*

Stängel 3 - 4' h., aufrecht, dick, schmutzig-roth. Köpfe klein gedrängt in endständigen rispigen Doldentrauben. Kronen rosa- oder hell-purpurf. — Hat schwache drastische Eigenschaften, Wurzel schmeckt bitter und scharf, und bisw. statt *R. Valerianae* gesammelt. War officinell.

Adenostylium Cassini. Hüllbltt. die inneren in einer Reihe, die äusseren kürzer. Sämmtliche Blumen röhrig mit glockig-erweitertem Saum. Kelchsaum eine haarige Federkrone.

Bltt. fast kreisrund.

A. albifrons Koch. Alpen-Pestwurz. Cacalia a. L. W. et Gr. sil. C. alpina Matt. u. Krock. Bltt. gestielt herz-nierenfg. ungleich groß-doppelt-gezähnt, unterseits schwachfilzig; Köpfe 3-6blumig.

Auf feuchten und sumpfigen Waldstellen, an Bächen und feuchten Lehnen und Gründen des Hochgebirges, meist in grosser Menge. Im *Riesengeb., am Gl. Schneeberge, im Gesenke* durchgängig. Bei *Teschen im Bielitzer Gebirge* und am *Malinow n. Theodor Kotschy. Steigt bis in die zweite Region herab. Juli, Aug. 2.*

Stängel 2 - 4' h., mit 1 - 2 kurzgestielten oder sitzenden, bisweilen gekrümmten Bltt. Wurzelbltt. oft 1 - 1½' breit, mit weisgraumem Filz auf der Unterseite, der oft unscheinlich wird. Blüten in rispig-zusammengesetzten, endständigen, fast gleichgipfligen Doldentrauben. Kronen rosa-purpurfarben. — Die fehlerhafte Endung des Sippen-Namens habe ich verbessert.

β. Tussilagineae. Staubbeutel ohne Grannen. Narben vom Gr. an haarig. Blumen polygamisch. Nüsse undeutlich-gestreift. — Wurzelbltt. rundlich. Stängel mit schuppenförmigen Blättern. XIX, 2.

Homogyne Cassini. Hüllbltt. in einer Reihe mit sehr kurzen äusseren. Am Rande wenige fadenfg., schief-gestutzte, undeutlich-gezähnte Stempelblumen, in der Scheibe viele, glockig-röhrige, 5zählige Zwitterblumen.

Kronen röthlich. Bltt. lederartig.

H. alpina Cassini. *Tussilago a. L. W. et Gr. sil.* Bltt. herznierenfg., kerbig-gezähnt, kahl.

Auf sumpfigen, moorigen Wiesen des Hochgeb. bis gegen 2000' herab und auch hie und da im Vorgeb. in Menge, auf den Kämmen meist heerdenweis über grössere Strecken verbreitet. Im *Riesengeb. Gesenke, Baranio, Babia Gora, Gl. Schneeberg, Hohe Mense, Heuscheuer, Sonnenkoppe u. Eule, Charlottenbrunner Berge, Vogelkuppe b. Altwasser.* Mai, Juni. 2.

Stängel am Gr. mit 2-3 kreisnierenförmigen, oberseits glänzenden Bltt., aufsteigend-aufrecht, bis 1' h., schwach wollig, etablätzig. Hüllbltt. bräunlich-blutbroth.

Tussilago L. Hufattig. Hüllbltt. in einer Reihe mit sehr kurzen äusseren Blättchen. Am Rande mehrere Reihen zungenförmiger Stempelblumen; Scheibenblumen röhrig, 5zählige, zwitterig.

Kronen gelb.

T. Farfara L.

Auf feuchtem lehmigem u. thonigem Boden, an Gräben, in Hohlwegen und auf feuchten Aeckern und Brachen, nicht überall, aber d. d. g. G. auch im Vorgeb. zerstreut. *Um Br. bei Hühnern, Doms-lau, Koberwitz u. m. Trebnitzer Hügel.* März, April. 2.

Im Frühling erscheinen die blattlosen, mit schuppenfgn. Deckbltt. besetzten, einblättrigen, bis 1' hohen, Blütenstängel; später die Wurzelbltt. welche im Umfang kreisfg. aber winklig-gezähnt, herzf., unterseits weichhaarig oder grau-filzig, zuletzt fast lederartig sind, bis 1' im Durchmesser. Federkrone haarig. Officinell sind *Hb. et Fl. Farfarae*; sie sind von schleimig-fadem schwach bitterlichem Geschmack und sind als Theesufguss ein übliches Hausmittel bei Lungen-Catarrhen.

Petasites Tournefort. Neunkraft. Pestwurz. Hüllbltt. in einer Reihe mit einigen kurzen äusseren Blättchen. Köpfe fast zweihäusig. Auf dem einen Stocke haben die Köpfe viele

Stempelblumen im Umfange, mit wenigen zwittrig-unfruchtbar in der Mitte; auf dem anderen haben die Köpfe in der Mitte zwittrig-unfruchtbar und am Rande wenige Stempelblumen in einer Reihe. Die Stempelblumen fädlich, schief-gestutzt oder zungenfg., mit reichhaarigem Kelchsaum. Die Zwitterblumen röhrig, 5zählig, mit armhaarigem Kelchsaum.

Blüthen in Sträussen.

P. officinalis Mönch. *Tussilago Petasites* L. W. et Gr. sil. Bltt. unterseits feinwollig-grau; Blütenstrauss länglich; Narben der Zwitterblumen kurz-eifg.; Kronen purpurfarben.

An Bächen und an quelligen Wiesen im Vor- und am Fusse des Hochgebirges, hie und da auch in der Ebene, d. d. g. G. nicht selten. Um *Br. zw. Bischwitz u. Paschkerwitz*. Um *Schleibitz n. Krause*. Um *Trebnitz*. Bei *Ohlau. Wohlau. Schauer-mühle u. N. Tüllendorf bei Bunzlau*. Am *Zobtenberge u. Geiersberge*, um *Charlottenbrunn* und d. d. g. G. bis zur *Babia Gora*. März, April. 2.

Wurzel stark, ästig, faserig. Bltt sehr gross, bis $1\frac{1}{2}$ im Durchm., langgestielt, herzfg.-kreisrund, buchtig-gezähnt. Stängel blattlos mit Schuppen besetzt, $\frac{1}{2}$ -1' h., stark wollig. Die Traube der Zwitterbl. eifg., die Traube der Stempelblüthen länglich, mit um die Hälfte kleineren Köpfen. Die Wurzel schmeckt scharf aromatisch-bitter, aussen grau innen weislich marmorirt, wurde als eröffnend und schweisstreibend bei Fiebern und in der Pest gerühmt.

P. albus Gärtner. *Tussilago alba* L. W. et Gr. sil. Bltt. unterseits feinwollig-filzig; Blütenstrauss eifg., auch gleichgipflig; Narbe d. Zwitterblumen lineal-lanzettlich, spitz; Kronen gelblich-weiss.

Wie die vorige, aber nicht in der Ebene, dagegen steigt sie bis in das Hochgeb. z. *B. die Teiche, Schneegruben, Kesselgrube im Riesengeb.* und den *Peterstein, Kessel im Gesenke hinauf*. Am *Geiersberge*, um *Charlottenbrunn* und d. d. g. Vorgeb. *Messersdorf. Herlitz. Czantory*. April, Mai. 2.

Etwas niedriger als die vorige. Stängel weisswollig. Die Traube der Zwitterblüthen eifg. fast gleichgipflig, die Tr. der Stempelbl. länglich-eifg.

γ. Astereae. Staubbeutel ohne Granne. Narben nach oben zu behaart, verschmälert, zur Blüthezeit gegeneinander geneigt. XIX, 2.

Chrysócoma L. *Goldhaar*. Hüllbltt. dachziegelfmg. Sämmtliche Blumen zwittrig, röhrig. Nüsse zusammengedrückt mit haarigem Kelchsaum. XIX, 1.

C. Linosyris L. *Gold-Leinkraut*. Stängel einfach, dicht mit linealischen kahlen Bltt. besetzt; Blüthenköpfe in endständiger Dolentraube.

Auf bewaldeten sonnigen Hügeln, auf Sandboden. Am *Fuchsberge bei Schwöitsch*. Um *Gnadenfrei* nach *Matt*. Bei *Weidenau n. v. Mückusch*, Aug.—Oct. 2.

Stängel dünn. $1\frac{1}{2}$ -2' hoch. Blauhenköpfe fast kreisfg. Hüllbltt. locker. Kronen goldgelb.

Aster L. Aster. Hüllbltt. dachziegelfg. Strahlblumen mit Stempeln, zungenförmig; Scheibenblumen zwitterig, röhrig. Nüsse zusammengedrückt mit haarigem Kelchsaum.

A. alpinus L. Bltt. ganzrandig, die unteren spathelfg., die oberen lanzettlich; Hüllblätter lanzettlich, locker; Stängel einblumig. An felsigen Gebirgsabhängen. Im *Kessel im Gesenke* von Krause und Fincke i. J. 1834 entdeckt. Juni, Juli. 2.

Wurzel vielköpfig. Stängel aufsteigend, 4-6'' h. Bltt. fein behaart. Hüllbltt. gegen die Spitze röthlich. Scheibe goldgelb. Strahl violett-blau. Nüsse kurz-borstig.

A. Amellus L. Bltt. länglich-lanzettlich, spitz, schwach gesägt oder ganzrandig, von feinen Haaren scharflich; Blüthen in endständiger Doldentraube; Hüllbltt. stumpf abstehend.

Auf sonnigen Waldhügeln. Am *Sakrauer Berge bei Grosstein* von Fincke 1832 entdeckt, doch nur wenige Exemplare. Schon Krocker hatte ihn aus der Gegend von *Oppeln*. Aug., Sept. 2.

Wurzel stark, Istig. Stängel etwa 1' h. scharflich. Scheibe gelb, Strahl blau.

A. salignus Willd. Stängelbltt. lanzettlich beiderseits verschmälert und vorn spitzig, am Rande scharflich, in der Mitte schwach-gesägt; die an den Aesten lineal-lanzettlich ganzrandig; Blüthen traubig zu einer Rispe vereinigt; Hüllbltt. locker.

An Flussufern, auf sandig-kiesigem Grunde zwischen Weiden und anderem Gebüsch. An der *Weistritz bei Sandberg* truppweise in dichten Büschen von Schummel 1836 entdeckt. Aeltere Standorte, wo er zum Theil nicht mehr gefunden wird: *Wölfelsdorf*. Um *Br. b. Pilsnitz, Lissa, Kl. Kletschkau*. Aug., Sep. 2.

H. 3-4'. Bltt. dunkelgrün, nach beiden Enden stark verschmälert. Stängel meist röthlich. Blütenstiele nicht von Blättern gestützt. Scheibenblumen gelb, dann röthlich; Strahlenblumen wässerig-blass-lilafarben. So die Expl. vom ersten der genannten Standorte. Von den folgenden hatte ich keine Exemplare selbst gesehen. Die aber von *Kl. Kletschkau* dicht bei Br. wo ich ihn durch mehrere Jahre beobachtete, wo er aber jetzt ausgerottet ist, unterscheiden sich nicht allein in der Tracht, sondern auch durch einige Merkmale: die Bltt. sind längs des ganzen Randes mit feinen Borsten gewimpert, am Gr. weniger verschmälert, heller grün und die Blumenstiele von Blättern gestützt daher winkelständig, übrigens eben so vertheilt. Die Scheibenblumen sind hellröthlich später fast purpurroth, die Zungenblumen rein weiss und breiter. Ich möchte diese Art, wenn nicht Abart, unter dem Namen *Aster frutetorum* der ferneren Beobachtung empfehlen.

Bellis L. Masslieben. Hüllbltt. gleichförmig in zwei Reihen. Zungenförmige Stempelblumen bilden den Strahl; röhriche Zwitterblumen d. Scheibe. Nüsse flach zusammengedrückt, gerandet, ohne Kelchsaum.

B. perennis L. Gänseblümchen. Wurzel kriechend; Bltt. spaltelfg., gekerbt; Hüllblättchen stumpf.

Auf Grasplätzen, d. d. g. G. gemein. Blüht fast das ganze Jahr hindurch. 2.

Wurzelbltt. rosettenfg. Stängel blattlos; beblättert kommt er nur selten vor. Scheibe gelb, Strahl weiss oft unterseits purpurroth. Variet. ohne Strahlblumen fand Beilachmied bei *Cudowa*. In Gärten mit lauter röhrenförmigen rothen Kronen die eine stark gewölbte Scheibe bilden.

Erigeron L. Dürrwurz. Hüllbltt. dachziegelfg. Stempelblumen bilden den Strahl in mehreren Reihen und sind entweder sämmtlich zungenfg., oder die inneren fadenfg.; röhriige Zwitterblumen die Scheibe. Kelchsaum haarig.

E. canadensis L. Stängel steif-aufrecht, rispig; Bltt. kurzhaarig lineal-lanzettlich borstig-gewimpert, die Wurzelbltt. länglich an der Spitze 3-5zählig.

Auf sandigem Boden besonders an Flussufern, an Waldrändern, in Hauen und a. Brachen stets heerdenweis u. in unermesslicher Menge, sehr verbreitet, doch nicht überall. Soll aus Amerika stammen, ist aber jetzt wie als ursprünglich einheimisch anzusehen. Juni—Sep. ☉.

Stängel mit abstehenden Haarborsten, 1-2' h. Blütenköpfe klein, sehr zahlreich. Strahlblumen winzig, gelblich-weiss.

E. acris L. Stängel traubig oder doldentraubig, Aeste 1-3blüthig; Bltt. lineal-lanzettlich rauhhaarig; die inneren Strahlblumen fadenförmig.

Auf trocknen sandigen Plätzen, Triften, Sandhügeln, in Haiden d. d. g. auch im Vorgeb. häufig. Juli—Sept. 2. oder ☉.

Stängel meist braunroth, $\frac{1}{2}$ -1' h. Blütenköpfe von der Grösse einer Erbse. Kronen lilafarben oder hellviolett.

Solidago L. Goldruchte. Hüllbltt. dachziegelfg. Zungenförmige Stempelblumen bilden den Strahl, röhriige Zwitterblumen die Scheibe. Nüsse stielrundlich mit haarigem Kelchsaum.

Scheibe und Strahl von gleicher Farbe.

S. Virga aurea L. St. Peterstab. Heidenwundkraut. Stängel oben traubig oder traubig-rispig; Bltt. eilanzettlich in einen geflügelten Stiel verschmälert.

β. alpestris. Niedrig, mit schmalen, fast kahlen Bltt. und grösseren Blumen. Hierher *S. alpestris* W. Kit. und *S. minuta* Krock. sil.

In trocknen und lichten Laubwäldern, auf waldigen Hügeln in der höheren Ebene und d. Vorgeb. häufig d. d. g. G., bis auf die Kämmen des Hochgebirges wo die Pflanze zahlreich in der Var. *β.* erscheint. Um *Br. bei Schwöitsch, Lissa, Skarsine, Trebnitz u. m.* Juli, August. 2.

Stängel meist 2' h., mit ruthenförmigen Aesten, var. *β* 1' h., einfach. Bltt. etwas schärflich, gesägt, die unteren schwach-behaart. Kronen goldgelb. Die Strahlblumen bald nach dem Blühen umgerollt. Ist etwas bitter, aromatisch und die Bltt. galten sonst als Wundkraut.

δ. *Heliantheae*. Staubbeutel ohne Grannen. Narbe nach oben verschmälert und behaart, zur Blüthezeit auseinandergehend. Strahlblumen leer. Nüsse fast vierkantig. Blumenboden mit Spreublatt besetzt.

Bidens L. *Wasserdost*. Hüllblätter in zwei Reihen. Sämmtliche Blumen zwittrig und röhrig, oder die randständigen zungenfg. und leer. Nüsse mit 2-5 mit Widerhaken versehenen Grannen.

Bltt. gegenständig.

B. tripartita L. Bltt. dreitheilig.

α. *discoidea*. Ohne Strahlblumen.

β. *radiata*. Mit Strahlblumen.

γ. *minima*. Zwergig, einfach, oft einblüthig, mit ungetheilten Bltt.

In feuchtem und wasserhaltigem Boden, in Gräben, an Lachen, Teich- und Flussrändern, auf nassen Sandplätzen, γ. besonders auf torfigen Wiesen und magerem Boden, vorzüglich in der Ebene d. d. G.; hie und da auch im Vorgeb. Juli—Oct. ☉.

Stängel von 1' - 1' und darüber, fast kahl. Kraut dunkelgrün, im Herbst oft röthlich. Kronen schmutzig-dunkelgelb. Blattzipfel lanzettlich, gezähnt. Nüsse verkehrt-eifg. Die Var. β ist selten. Aeusserer Hüllblatt länger als der Blütenkopf.

B. cernua L. Bltt. lanzettlich, zum Theil am Gr. verwachsen.

α. *discoidea*, ohne Strahlblumen.

β. *radiata*, mit Strahlblumen. Hierher *Coreopsis Bidens* L. Matt. und Krock.

γ. *minima*, ohne Strahlblumen, zwergig; Bltt. linealisch. Hierher *B. minima* L. Matt. und Kr.

Auf derselben Stelle wie die vorige, minder häufig; β. in wasserreichen Gräben, γ. auf Torfwiesen. Juli—Oct. ☉.

Höhe der vorigen. Kraut lebhaft grün. Aeusserer Hüllblatt länger als der Blütenkopf. Nüsse verkehrt-eikeifg. Die var. β kommt häufig vor, und hat ansehnliche lange Strahlblumen; man findet aber auch dergleichen mit kürzeren und ganz kurzen Strahlblumen als deutlichen Uebergang zur var. α. Beide Arten enthalten einen gelben und einen grünen harzigen Farbstoff und erregen Speichelabsonderung.

Helianthus L. *Sonnenrose*. Hüllbltt. dachziegelfg. Strahlblumen zungenfg., leer; Scheibenblumen röhrig, zwittrig. Nüsse mit einem abfälligen aus Spreublättchen gebildeten Kelchsaum.

* *H. annuus* L. *Sonnenrose*. Alle Bltt. herzfg.; Blütenstiele verdickt; Blüten überhängend.

Stammt aus Peru und wird als Zierpflanze und wegen der ölhaltigen Samen angebaut. Juli—Sept. ☉.

* *H. tuberosus* L. *Erdäpfel*. Die unteren Bltt. herzeifg., die oberen länglich-eifg. und lanzettlich.

Stammt aus Brasilien und wird der Wurzelknollen halber, welche zum Viehfutter dienen, häufig angebaut. Sept., Oct. 2.

ε. *Inuleae*. Staubbeutel am Gr. mit grannigem Fortsatz. Narben stumpf. Scheibenblumen samentragend. XIX, 2.

Inula L. Alant. Hüllbltt. dachziegelfg. Zungenförmige Stempelblumen bilden den Strahl, röhrige Zwitterblumen die Scheibe. Kelchsaum haarig. Blumenboden kahl.

Blumen sowohl im Strahl als in der Scheibe gelb.

† *I. Helenium L. Aechter Alant*. Bltt. unterseits filzig, die stengelständigen herz-eifg. umfassend, die inneren Hüllbltt. spatelfg.; Nüsse kahl.

Auf Waldwiesen. Als Standorte werden angegeben: um *Nams-lau*. *Leobschütz im Stadtwalde* und *b. der Hospitalmühle. Füllstein*. Um *Troppau bei Gr. Herlitz, Wiedergrün, Jägerndorf*. Ob die Pflanze als wild zu betrachten sei, darüber habe ich keine eignen Beobachtungen. In den Grasgärten mancher Dörfer vorzüglich im Gebirge ist sie von altem Anbau her verwildert. Juli, Aug. 2.

Stängel 3 - 5' h. Eine ansehnliche Pflanze mit grossen Bltt. und Blüten. Die frische stark-ästige fleischige Wurzel riecht stark, kamferartig-aromatisch und schmeckt scharf-bitter und ist ein wirksames Arzneimittel.

I. salicina L. Bltt. länglich-lanzettlich, die oberen herzfg.-umfassend, kahl, am Rande scharf; Stängel armbüthig; Hüllbltt. gewimpert; Nüsse kahl.

Auf feuchten Wiesen auch im Vorgebirge, d. d. g. G. häufig. Juli, Aug. 2.

Stängel 1' h., 1- auch mehrblumig. Bltt. steiflich, mit schwachem Glanz, an der Spitze zurückgebogen. Zungenblumen sehr schmal und lang.

I. hirta L. Bltt. länglich, rauhhaarig; Stängel einblüthig; Hüllbltt. steifhaarig; Nüsse kahl.

Auf sonnigen Hügeln im Vorgebirge. Bisher sah ich sie nur auf dem *Kreuz- und Georgenberge bei Striegau*. Nach *Schneider* soll sie auch *b. Charlottenbrunn, Salzbrunn, Kupferberg u. Hirschberg*, nach *Wenck b. Katscher und Wronin*, und nach *Kotschy am Tul und bei Oldrzychowitz* vorkommen. Mai, Juni. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., rauhhaarig. Bltt. ändern in der Breite vom ei- zum lanzettförmigen ab. Hüllbltt. sehr lang.

I. britannica L. Stängel wollig-zottig, 2-5blumig; Bltt. unterseits wollig, lanzettlich, die oberen herzfg.-umfassend; Nüsse kurzhaarig.

Auf feuchten Wiesen und Waldplätzen, an Gräben, Teichrändern, Flussufern d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juli, Aug. 2.

Stängel 1' h. Bltt. bisweilen unterseits nur sehr dünnwollig, am Rande dreisigfeinzählig. Blüten ansehnlich. Strahlenbl. lang und schmal. — Hierher gehören *I. Oculus Christi, I. dysenterica* und *I. hirta* bei *Blatt. sil.* und *Enum.*

Pulicária Gärtner. Flöhhkraut. Hüllbltt. dachziegelfg. Zungenförmige Stempelblumen bilden den Strahl, röhrige Zwitterblumen die Scheibe. Kelchsaum zweireihig: die äussere aus einer gezähnten Haut, die innere aus scharfen Haaren bestehend. Blumenboden kahl.

P. vulgaris Gärtner. Christinenkraut. Strahlblumen ganz kurz; der äussere Kelchsaum häutig in borstige Zähne zerrissen.

Auf feuchten unfruchtbaren Plätzen, Angern, an Fluss- Teich- und Lachenrändern in der Ebene verbreitet und häufig. Juli—Sept. ☉.

H. 3'' - 1', liegend oder aufsteigend, selten aufrecht, meist von der Mitte in Aeste verlaufend, schwachwollig. Bltt. länglich-lanzettlich, wellig, halbumbfassend, zottig. Blüthenköpfe theils seitlich, theils endständig. Von trübem und schmutzigem Ansehen. Blumen schmutzig-gelb. Riecht etwas widrig.

Conyza L. Hüllbltt. dachziegelfg. Sämmtliche Blumen röhrig. Die Stempelblumen in mehreren Reihen am Rande dreizählig, die Zwitterblumen in der Mitte fünfzählig. Kelchsaum haarig.

C. squarrosa L. Grosse Dürnwurz. Stängel ästig, Aeste doldentraubig; Bltt. elliptisch-lanzettlich, die unteren in einen Stiel verschmälert.

Auf trocknen und steinigen Waldplätzen im Vorgebirge zerstreut. Am Gröditzberge n. S. ch. Lähnhaus (Matt.) Um Charlottenbrunn. Streitberg b. Striegau. Eichberg b. Briesnitz. Fürstenstein. Landskrone. Hessberg b. Jauer. Kupferberg. Im Sattler b. Hirschberg. Cudowa. Leobschütz. Füllstein. Gr. Herlitz. Jägerndorf. Juli, August. 2.

Stängel 2 - 3' h. Bltt. feingezähnt, weichhaarig. Hüllbltt. locker, die inneren an der Spitze violett. Blumen gelblich.

Filago L. Schimmelkraut. Köpfe aussen fünfkantig. Hüllbltt. dachziegelfg. Blumenboden keulenförmig mit Spreu- oder Deckblättern besetzt, welche den äusseren Hüllbltt. gleichen. Die Scheibenblumen zwitterig, röhrig vierzählig; die randständigen sind fadenförmige zwischen den äusseren Deckblättern versteckte Stempelblumen. Kelchsaum an den inneren haarig bleibend, an den äusseren meist fehlend. XIX, 4.

Durchaus weisswollig.

F. germanica L. Stängel gabelspaltig-ästig, Köpfe in end- u. achselständigen Knäueln; Hüllbltt. stachelspitzig.

α. albidum. Bltt. linealisch, wollig, aufrecht, weissfilzig.

β. virescens. Bltt. spathelfg., abstehend, dünnfilzig, graugrün.

Auf dünnen Aeckern, Brachen, Sandplätzen und kiesigen Waldplätzen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. nicht selten. Um Br. bei Kar-

lowitz, Althof, Schwoitsch, Lissa, Riemberg u. s. w. Juli — September. ☉.

Stängel meist $\frac{1}{2}$ - 1' h., einfach, oben ästig oder vom Gr. mit aufsteigenden Aesten. Die Knäuel sind kugelig. Die Spitzen der Hüllbltt. weiss oder röthlich.

F. arvensis L. *F. montana*. Wahlenb. suéc. Dicht wollig; Stängel rispig, die Köpfe in seiten- und endständigen Knäueln; Hüllbltt. stumpf, wollig.

Auf sonnigen Aeckern und Brachen und Sandfeldern d. d. g. G. häufig. Juli—Sept. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1', von der Mitte an ästig. Bltt. lineal-länglich. Die Hüllbltt. werden späterhin gegen die Spitze etwas kahler.

F. montana Linné Sp. plant. Filzig; Stängel mit gabligen Aesten, die Köpfe in achsel- seiten- und endständigen Knäueln; Hüllbltt. stumpflich an der Spitze kahl.

Auf dünnen sandigen Hügeln, Brachfeldern, d. d. g. G. nicht selten. Juli—Sept. ☉.

Fast pyramidal. Dünner und mit dünnerem Wollfilz als die vorige.

Gnaphálium L. *Ruhrkraut*. Hüllbltt. dachziegelfg. trockenhäutig. Am Rande mehrere Reihen fädiger gezählter Stempelblumen; in der Scheibe röhrige 5zählige Zwitterblumen. Kelchsaum aus einer Reihe fast glatter Haare bestehend. Blumenboden flach, kahl.

Köpfe walzig. Hüllbltt. weiss oder rauchbraun.

G. sylvaticum L. Krock. sil. *G. sylv. a pediophilum* W. et Gr. sil. *G. rectum* Smith. Stängel aufrecht, mit Köpfen in einer Aehre; Bltt. lanzettlich, die oberen allmählig kleiner linealisch, unterseits weisfilzig oberhalb zuletzt kahl werdend.

In trocknen Kiefer- und Laubwäldern, Haiden, in der Ebene bis gegen das Hochgeb., häufig. Juli, Aug. ♀.

H. 1 - $1\frac{1}{2}$ '. Stängel wollfilzig. Die Bltt. unterseits beinahe seidenartig-wollfilzig. Die Köpfe sitzen einzeln oder paarweis, kurzgestielt oder auf ästigen, 3 - 4blüthigen Stielen in den Blattwinkeln bis unter die Hälfte des Stängels. Hüllbltt. grünlich und oft gegen die Spitze hellbraun.

G. norvegicum Gunner. *G. sylvaticum* β . *oreophilum* W. et Gr. sil. *G. sylvaticum* Wimm. Fl. v. Schls. Stängel aufrecht mit Köpfen in einer Aehre; Bltt. lanzettlich, sämmtlich von gleicher Grösse oder die mittleren grösser, dreinervig, beiderseits wollig.

In den Waldungen und auf den fruchtbaren Lehnen des Hochgeb. bis in das Vorgebirge herab. Im Riesengeb. meist in der tieferen Region, um den Zackenfall, Agnetendorfer Schneeegrube, Elbgrund u. a. Auf d. Gl. Schneeberge. Im Gesenke am Leiterberge, Hock-schar, rothen Berge. Nach Schneider auch bei Kupferberg und Charlottenbrunn. Juli, Aug. ♀.

Sieht zwar der vorigen ähnlich, da sie aber bisweilen mit ihr in Gesellschaft gefunden wird, muss sie als eigene Art betrachtet werden. Ist etwas stärker; Bltt. wol-

lig, bisweilen auch oberseits fast glatt, breiter und die mittleren und oberen mit langer Spitze. Hüllblt. rauchbraun, fast schwärzlich. Auf höheren Stellen kommt sie niedrig mit kurzer Aehre, beiderseits dichtwolligen und fast linealischen Blt. vor.

G. supinum L. *G. pusillum* Hänke Reise in d. Rsgb. *G. alpinum* Krock sil. Stängel fadenförmig, mit kriechenden Ausläufern an der Wurzel; Blt. lineal-lanzettlich; Köpfe in kurzen Aehren oder Trauben, auch einzeln, an der Spitze des Stängels.

Auf kiesigen und steinigen Plätzen der Gebirgskämme, besd. zw. dem Knieholz. Im *Riesengeb.*, *Gesenke am Hockschar*, *Babia Gora*. Juli, Aug. 2.

Stängel meist 1" hoch, auch niedriger, 1 - 3blüthig, seltner 2 - 3" lang und mehrblüthig. Hüllblt. am Bande braun.

G. uliginosum L. *G. ulig.* und *G. glomeratum* Krock sil. Stängel vom Grunde an in Aeste zertheilt; Blt. grauwoilig; Köpfe winkel- und endständig in Knäueln; Nüsse glatt.

Auf überschwemmt gewesenen Plätzen, in Gräben, an Lachen- u. Flussrändern, in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Juli—Oct. ☉.

Stängel 1/2 - 1' h., selten einfach. Blt. lineal-lanzettlich, grauweiss, selten grünlich mit dünnerem Ueberzuge. Hüllblt. grünlich-braun.

G. luteo-album L. Stängel fast einfach, Köpfe endständig-gehäuft; Blt. lanzettlich umfassend, die unteren nach vorn breiter und stumpf; Nüsse fein-gekörnt.

Auf feuchten sandigen Plätzen und Aeckern, an Teich- und Flussufern nur in der Ebene. Zuerst von Krock an der *alten Oder*, bei *Schlansdorf*, um *Hirschberg* und bei *P. Rassewitz* in OS. gef. Um *Br.* bei *Kosel*, *Gr. Rake*, *Leuthen*, *Prausnitz*, *Trachenberg*, *Militsch*, *Ohlau*, *Wohlau*, *Bunzlau*, *Oppeln*, *Kreuzburg*, *Rybnik*. Um *Teschen*. Juli, Sept. ☉.

Stängel 1' h., einfach oder von unten mit aufsteigenden Aesten, nach oben oft blattlos. Blüten in endständigen Knäueln, wovon die unteren oft kurz gestielt sind. Die Hüllblt. gelblich-weiss oder strohfarben fast durchscheinend.

Anmkg. *G. margaritaceum* wurde von Neumann im *Klessengrunde am Gl. Schneeberge* gefunden, wo die Pflanze aus Gärten gekommen und sich ein wenig verbreitet zu haben scheint.

Antennaria R. Brown. *Katzenpfötchen*. Hüllblt. dachziegelg., trockenhäutig. Blumen fünfzählig, röhrig. Stempelblumen und Zwitterblumen auf verschiedenen Individuen. Die Stempelblumen bringen vollkommene Samen, der Kelchsaum aus fadenförmigen Haaren. Die Zwitterblumen mit un ausgebildeten Narben und Samen und einem Kelchsaum aus keulenförmig-verdickten Haaren. Blumenboden gewölbt, grubig.

A. dioica RBrown. *Gnaphalium dioic.* L. W. et Gr. sil. Mit kriechenden Ausläufern; Wurzelblt. spatelfg.; Stängel einfach mit endständiger Doldentraube.

In Haiden, auf trocknen Hügeln, trocknen Waldplätzen, in Kieferhauen, d. d. g. G., anch im Vorgeb., häufig, meist gruppen- oder heerdenweis. Juli—Sept. 2.

Stängel 4 - 10" hoch. Die Ausläufer bilden Rosetten von Wurzelblit. Bltt. unterseits wollig, die am Stängel linealisch, angedrückt. Köpfe gedrängt. Hüllbltt. weiss, rosa- oder purpurfarben.

Elichrysum Gärtner. Immerschön. Hüllbltt. dachziegelfg., trockenhäutig. Blumen entweder alle zwittrig oder einige Stempelblumen am Rande, sämtlich röhrig fünfzählig. Kelchsaum aus einer Reihe schärflicher Haare. Blumenboden flach, nackt oder kurz gewimpert.

E. arenarium De Cand. *Gnaphal. aren.* L. W. et Gr. sil. Krautig; Bltt. filzig; Köpfe in endständiger zusammengesetzter Doldentraube.

Auf Sandboden, in Haiden, Kieferwäldern, auf sandigen Birkenhügeln, an Hügel- und Wegrändern in Sandgegenden, d. d. g. G., auch im Vorgeb. häufig. Juli—Sept. 2.

Stängel 1' h., oft rasenfg., aufsteigend. Untere Bltt. spathelförmig, obere lineal-lanzettlich. Hüllbltt. zitronengelb, auch mit orangef. Spitze. Wird wie die vorige zu Immortellen-Kränzen gebraucht. Hierher auch *G. Stoechas* Krock. sil.

§. *Anthemideae.* Staubbeutel ohne Grannen. Narben halbrund vorn gestutzt und behaart. Kelchsaum: ein häutiges Kränchen, oder fehlt ganz. XIX, 2.

Artemisia L. *Beifuss.* Blumenkronen stielrund. Blumen entweder alle zwittrig, oder fädige dreizählige Stempelblumen am Rande und 5zählige Zwitterblumen in der Scheibe. Nüsse verkehrt-eifg., ohne Kelchsaum. Blumenboden nackt oder zottig.

Köpfe klein, eifg., in Blasen. Hüllbltt. grünlich. Blumen gelb.

† *A. Absinthium* L. *Wermuth. Grabekraut.* Bltt. seidenartig-grau, 3-2fach-fiederspaltig mit lanzettlichen Abschnitten; Köpfe fast kugelig, nickend; Blumenboden haarig.

In Dörfern auf Angern und an Zäunen, hin u. wieder d. d. g. G., auch im Vorgeb. Um Br. in *Oswitz, Gr. Masselwitz, Paschkerwitz.* Häufig in *OS. Benisch bei Troppau.* Wird im südwestl. Deutschland u. d. Schweiz als wild angegeben; ist nunmehr bei uns durch Verwilderung als eingebürgert anzusehen. Juli, Aug. 2.

Stängel 1 - 2' h., oben rispig-kästig. Durchaus von Seidenhaar grau. Hüllbltt. grau, die inneren stumpf, am Rande trockenhäutig, die äusseren linealisch, an der Spitze trockenhäutig. Die Bltt. und Blüthen, *summitates*, sind officinell. Hat einen starken widerlich-aromatischen Geruch und anhaltend bitteren Geschmack, und ist ein gebräuchliches bitter-ätherisches Arzneimittel zur Stärkung der Verdauungs-Organen, und wird auch von Bierbauern und Bienenwärlern gebraucht.

A. vulgaris L. *Beifuss*. Bltt. unterseits weissfilzig, fiederspaltig mit lanzettlichen zugespitzten Abschnitten; Köpfe eigf.; Blumenboden kahl.

In Gesträuch und Waldgestrüpp, an Flussufern, in Hecken und an Zäunen d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juli—Sept. 2.

Stängel eckig, aufrecht, 2-4' h., oft schmutzig-röthlich. Halbbltt. filzig. Scheibenblumen röthlich. — Kraut und Blüthen haben einen bitterlichen Geschmack und schwach-aromatischen Geruch, und werden als Gewürz bei Speisen angewandt.

A. campestris L. *Wilde Stabwurz*. Bltt. seidenartig-grau oder kahl, 2-3fach-fiederspaltig mit linealischen feinspitzigen Abschnitten; Köpfe eigf.; Blumenboden kahl.

Auf trockenem, besonders sandigen, Triften u. Dämmen, Hügeln, Weg- und Ackerrändern, d. d. g. G. in der Ebene gemein. Aug., Sept. 2.

Stängel 1-1½' h., aufsteigend; die blüthenlosen Stängel tragen Blätterbüschel. Köpfe klein, grünlich; die Scheibenblumen röthlich.

Anmkg. In Gärten wird oft *A. Dracunculus*, Estragon, mit linealischen, fast glänzenden Bltt. von aromatischem Geschmack, und *A. Abrotanum* mit sehr feinen, in schmale linealisch-fädliche Zipfel zertheilten, wohlriechenden Bltt. gebaut. *A. maritima* Krock. sil. gehört zu *A. campestris*.

Tanacétum L. *Rainfarn*. Köpfe halbkugelig. Blumen entweder alle zwittrig röhrig 5zählig, oder dreizählige fädliche Stempelblumen am Rande. Nüsse kantig, ohne oder mit einem kurzen häutigen Kelchsaum.

T. vulgare L. *Wurmfarn*. Bltt. doppelt-fiederspaltig mit gesägten Zipfeln.

An Weg- und Ackerrändern, an Gebüsch, häufig in Weidengebüsch an Flussufern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juli bis Sept. 2.

Stängel aufrecht, 2-3' h., an der Spitze eine pyramidale Doldentraube tragend, eckig, oft roth. Bltt. kahl. Blumen gelb. Die Bltt. und noch mehr die Blüthen haben einen starken widrig-aromatischen Geruch und sehr bitteren scharf-gewürzhaften Geschmack und gehören zu den flüchtig-reizenden, aber wenig angewandten Arzneimitteln. — In Gärten wird häufig *T. Balsamita*, mit elliptischen gesägten weichhaarigen und wohlriechenden Wurzelbltt., gebaut.

Achilléa L. *Garbe*. Köpfe eiförmig. Stempelblumen vier bis zwanzig, mit zusammengedrückter Röhre und kurzer breiter Zunge. Zwitterblumen in der Scheibe mit oben zusammengedrückter Röhre, fünfzählige. Nüsse zusammengedrückt ohne oder mit sehr kurzem randförmigem Kelchsaum. Blumenboden mit Spreublättern.

A. Ptarmica L. *Weisser Dorant*. Bltt. linealisch, gesägt; Strahlblumen gegen zehn.

An feuchten Orten zwischen Gesträuch, an Graben- und Flussrändern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. nicht selten. Um *Br.* bei *Scheitnich*, *Marienau*, *Bischwitz a. W.*, *Bischofswalde* u. a. Juli, Aug. 2.

Stängel 2 - 3' h., einfach, aufrecht, doldentraubig. Bltt. am Gr. fast eingeschnitten-, durchaus scharf- und stachelspitzig-gesägt. Zungen breit-eifg., weiss. Die getrocknete Wurzel ist scharf und erregt Niesen.

A. Millefolium L. Schafgarbe. Bltt. doppelt-fiederspaltig, Zipfel 2-5 spaltig mit linealischen oder eiförmigen Abschnitten; Strahlblumen bis vier.

β. lanata. Das Kraut dicht-wollig.

γ. alpestris. Die unteren Bltt. dreifach-gefiedert, Hüllbltt. schwarz-gerandet.

Auf Wiesen, Triften, an Weg- und Ackerrändern, in Gebüsch u. Gehölzen von der Ebene bis auf das Hochgebirge, d. d. g. G. in mancherlei Formen, gemein. *γ.* Im *Riesengeb. am kl. Teiche*, in den *Schneegruben*, *Riesengrunde*. Im *Kessel* u. am *Peterssteine im Gesenke*. Juni—Novbr. 2.

Stängel aufrecht, 1' h., auch höher. Bltt. in der Zertheilung und Gestalt veränderlich, gewöhnlich mit lineal-länglichem, bei *γ* mit breiterem Umkreis, und bald freier, bald mit Blatzzähnen besetzter Mittelribbe, die Abschnitte spitz oder feinspitzig; bald fast kahl, bald feinhaarig bis in das wollige. Zungen sehr kurz, weiss, oder schwachgelblich, häufig bei allen Formen rosenroth. Köpfe in pyramidaler zusammengesetzter Doldentraube. *Herba et Flores Millefolii* sind officinell, schmecken aromatisch-bitter und sind besonders als Theeaufguss ein geschätztes Arzneimittel.

Anthemis L. Gille. Stempelblumen am Rande, mit länglicher Zunge, bisweilen leer. Zwitterblumen in der Scheibe, mit flach zusammengedrückter Röhre und 5zähigem Saum. Kelchsaum nur ein vorragender Rand oder fehlt ganz. Blumenboden gewölbt mit Spreublättern.

Die Köpfe oben flach, stehen einzeln am Ende der Aeste.

A. tinctoria L. Färber-G. Blumenboden fast halbkugelig mit lanzettlichen stachelspitzigen Spreublättern; Nüsse vierkantig-zusammengedrückt mit einem scharfen Rande gekrönt.

Auf trocknen steinigen Hügeln, Brachfeldern, an Wegrändern, in der Ebene u. d. Vorgeb. zerstreut. Um *Br.* bei *Kleinburg* und *Ottaschin*. *Schlesierthal*. *Fürstenstein*. *Neumanns-Koppe* bei *Scharfeneck*. *Mittelberg am Zobten*. In *Wölfelsdorf*. *Schellenbg. u. Herlitzer Schlossbg. b. Troppau*. Tul bei *Ustron*. Juni, Juli. 2.

H. 1 - 2'. Stängel graubehaart, einfach oder ästig, aufrecht. Bltt. graubehaart, doppelt fiederspaltig mit gezählter Ribbe, Fiedern kammartig-gesägt. Scheiben- und Strahlblumen pomeranzengelb.

A. arvensis L. Acker-G. Blumenboden kegelfg., mit lanzettlichen stachelspitzigen Spreublättern; Nüsse stumpf-viereckig, die äusseren mit einem wulstigen die inneren mit einem scharfen Rande gekrönt.

Auf Aeckern, Brachen und Sandplätzen, d. d. g. G., auch im Vorgeb., gemein. Juni—Sept. ☉.

Der Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., verliert sich in Aeste, unten oft niederliegend und roth. Bltt. wollig-weichhaarig, 2fach-fiederspaltig, mit lineal-lanzettlichen gezähnten Fiedern. Aeusserer Hüllbltt. am Rande rissig. Strahlblumen weiss, Scheibenblumen gelb. Von sehr schwachem bitter-aromatischem Geruche.

A. Cotula L. Stink-G. Blumenboden kegelfg., mit linealisch-horstlichen Spreublättchen; Nüsse fast rund mit einem gekerbten Rande gekrönt.

Auf Acker-, Brach und Gartenland, wie die vorige, aber weniger häufig und zahlreich. Juni—Sept. ☉.

Stängel 1' h., meist aufrecht, von unten ästig. Bltt. der vorigen aber fast kahl oder unterseits weichhaarig. Scheibe erhaben, gelb. Strahlblumen weiss. Hat einen durchdringenden widrig-aromatischen Geruch.

Matricaria L. Kamille. Stempelblumen am Rande mit oben zusammengedrückter Röhre und länglicher Zunge. Zwitterblumen in der Scheibe mit zusammengedrückter Röhre und 5zähni gem Saum. Kelchsaum fehlt oder als kurzer Rand oder häutiges Krönchen vortretend. Nüsse gleichförmig, vierkantig, gerandet. Blumenboden walzig-kegelfg., nackt.

M. Chamomilla L. Feld-K. Riemerey. Bltt. doppelt-gefiedert, mit lineal-fädlichen Abschnitten; Hüllbltt. stumpf.

Auf Aeckern und Brachen, d. d. g. G., selten im Vorgeb. Diese sonst sehr häufige Pflanze ist wenigstens an mehreren Orten dadurch, dass sie in Menge für den Gebrauch eingesammelt wurde, selten geworden. *Troppau, Golleschau b. Ustron.* Mai—Juli. ☉.

Stängel 1' h., meist in Aeste auseinandergehend. Kraut kahl. Scheibe gelb. Strahlblumen weiss, zuletzt zurückgeschlagen. Ist von allen ähnlichen Pflanzen, z. B. *Anthemis Cotula* und *Chrysanthemum inodorum*, durch den innen hohlen Blumenboden, so wie durch den angenehm-aromatischen Geruch zu unterscheiden. Die Blumen, welche ein blaues ätherisches Oel enthalten, sind besonders als Theeaufguss ein treffliches, zunächst auf die Unterleibsnerven wirkendes, Haus- und Arzneimittel.

Chrysanthemum L. Wucherblume. Blumen mit Kelchsaum wie bei *Matricaria*. Nüsse gleichförmig, stielrund oder kantig. Blumenboden flach oder halbkugelig, nackt.

C. Leucanthemum L. Johannisblume. Köpfe einzeln am Ende des Stängels oder der Aeste; untere Bltt. lang-gestielt verkehrt-ei-spaltfg., obere lineal-länglich, gesägt; Nüsse ohne Kelchsaum.

Auf Wiesen und Triften, Waldplätzen und Aeckern d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juni, Juli. ♀.

Stängel aufrecht, 1 - $1\frac{1}{2}$ ' h., meist einfach, oder mit 1 - 3 Aesten, bald kahl, bald kurzhaarig. Köpfe gross, flach; Scheibe gelb, Strahlblumen weiss, linealisch. Hüllbltt. am Rande meist schwärzlich. Hierher auch *C. montanum* Matt. und Krock.

? **C. segetum L.** Köpfe einzeln auf der Spitze der Aeste; Bltt. länglich-lanzettlich, eingeschnitten-gezähnt, vorn breiter, a. Gr. umfassend, graugrün; Nüsse mit kurzem Rande.

Auf Aeckern in manchen Gegenden Deutschlands eine Landplage. Bei uns wurde die Pflanze nur einigemal in einigen Exemplaren von Schummel in den Umgebungen von Breslau gef. Juni. 2.

Stängel 1 - 2' h., ästig. Bltt. kahl. Scheibe- und Strahlblumen sattgelb.

† *C. Parthenium* Persoon. Blüten in Doldentrauben; Bltt. weichhaarig, gefiedert, die Fiedern länglich, stumpf, fiederspaltig mit schwachgezähnten Abschnitten; Nüsse mit kurzem Hautrande.

An Zäunen, Hecken und in Gärten in Städten und Dörfern, hie u. da durch d. g. G., wahrscheinlich durch den Anbau verbreitet. Juli, Aug. 2.

Stängel ästig, 2' h. Die Blättzähne fast stumpf. Hüllbltt. lineal-länglich, hohlkielig. Scheibe gelb, Strahlblumen weiss, verkehrt-eifg. — Die Blumen haben einen stark gewürzhaften Geruch und erwärmenden bitteren Geschmack und sind ein den Kamillenblumen ähnliches Arzneimittel.

C. corymbosum L. Blüten in Doldentrauben; Bltt. gefiedert, die Fiedern der unteren fiederspaltig mit spitzen gesägten Zipfeln; Nüsse mit häutigem Rande, der an den äusseren so lang als die Kronenröhre ist.

Auf sonnigen und bewaldeten Hügeln, besonders auf Kalkboden, im Vorgeb. seltner in der Ebene. Zuerst von Matt, um Liebau u. den Pass bei Schmiedeberg angegeben. Geiersberg, Rummelsberg bei Strehlen und Kreuzberg bei Striegau. Harthebg. b. Frankenst. Moritzberg bei Oppeln n. Grabowski. Katscher und Dirschel. Um Friedeck n. Kotschy. Juni, Juli. 2.

Stängel oben ästig, 2 - 3' h., kahl oder behaart. Bltt. unterseits bisweilen seidenartig-gran. Doldentraube gleichgipflig. Hüllbltt. am B. braun. Scheibe erhaben, gelb; Strahlblumen weiss, elliptisch.

C. inodorum L. Bltt. 2-3fach fiederspaltig, mit linealisch-fädlichen Zipfeln; Nüsschen mit häutigem Rande; Blumenboden halbkugelig.

Auf Acker-, Garten- und Brachland, d. d. g. G., auch im Vorgeb. gemein. Juni - Sept. ☉.

Weitschweifig-ästig, $\frac{1}{2}$ - 1' h. kahl. Köpfe etwa zollzeit. Scheibe gelb, Strahlblumen lineal-länglich, weiss. Fast geruchlos.

η. *Senecioneae*. Staubbeutel ohne Grannen. Narben halbrund, vorn gestutzt und behaart. Kelchsaum haarig. — Blumen gleichfarbig, gelb. XIX, 2.

Doronicum L. *Gemswurz*. Hülle flach oder gewölbt aus 2-3 Reihen gleichförmiger Blättchen. Narbe der Zwitterblumen abgesetzt. Nüsse gefurcht, in der Scheibe mit haarigem, im Strahl ohne Kelchsaum.

D. austriacum Jacquin. *D. scorpioides* W. et Gr. sil. *D. Paldianches* Krock. sil. Untere Bltt. gestielt, fast herzförmig mit Oh-

ren am Blattstiel; die oberen länglich umfassend; Wurzel abgebissen ohne Ausläufer und Wurzelblätter.

Auf den kräuterreichen Lehnen und in den Schluchten des Hochgebirges in der östlichen Hälfte. *Gl. Schneeberg* bis in den *Klessengrund* und *Wölfelsgrund* herab. Im *Gesenke* am *Altwater*, *Leiterberge*, im *Kessel*. *Baranio* n. *Kotschy*. *Babia Gora*. Nach *Krock* auch im *Riesengeb.* Juli, Aug. 2.

Stängel 3 - 4' h., oben ästig mit einblüthigen Stielen. Bltt. gross und breit, die unteren am Gr. in nierenförmige Ohren erweitert, oberseits fast kahl, unterseits weichhaarig. Hüllbltt. lang und feinspitzig. Blumen goldgelb, die Zunge sehr lang und schmal.

Arnica L. Wohlverleih. Hülle walzig, aus 2 Reihen gleichförmiger Blättchen. Narbe nach vorn verdickt flaumhaarig. In den Strahlblumen Staubfäden mit Spuren von Staubbeutel. Nüsse gestreift; Kelchsaum aus einer Reihe schärflicher Haare bestehend.

Bltt. gegenständig.

A. montana L. Wurzelbltt. länglich-verkehrt eifg.; Stängel armbüthig.

Auf fruchtbaren Waldwiesen, hauptsächlich im Vorgebirge, steigt aber sowohl bis an das Hochgebirge hinauf als auch bis in die Ebene herab, zerstreut, stets gesellschaftlich. Um *Br.* bei *Lissa*. In *OS.* um *Proskau*, *Königshuld*, *Jacobsdorf*, *Chrzelitz*. Um *Bunzlau* bei *Gnadenberg*, *Zeche*, *Neuwarthe*, *Birkenbrück*, *Tiefenfurth*, *Gruulich*. Im Vorgeb. bei *Fürstenstein*, *Waldenburg*, *Hochwald*, am langen Berge bei *Donnerau*, *Fichtich*, *Sonnenkoppe*, um *Reinerz*, *Cudowa*. Im *Riesengeb.* bei den *Baberhäusern*, am *Fuchsberge*, am *kleinen Teiche* etc. Fehlt bei *R. u. M.* Juni, Juli. 2.

Stängel 1 - 1½ h., meist gablig-Sblättrig. Bltt. am Boden ausgebreitet, stumpf, nervig, weichhaarig, am Stängel nur 1 - 2 Paar. Hüllbltt. röthlich-grün, spitz, lanzettlich. Blumen pomeranzengelb, Strahlblumen lang, lineal-elliptisch. Wurzel, Bltt. und Blüten sind officinell, als ein kräftiges Reizmittel, und enthalten neben einem ätherischen Oel eine eigenthümliche Scharfe.

Cineraria L. Aschenpflanze. Hülle kegelförmig aus einer Reihe gleichförmiger Blättchen. Narben gestutzt pinselförmig. Nüsse gefurcht. Kelchsaum haarig, an den randständigen Nüssen abfällig.

C. crispa Jacquin. *C. alpina* *Matt* u. *Krock*. sil. u. *C. palustris* *Krock*. sil. Bltt. herzeiförmig, die mittleren auf einem breitgefügelten Stiele.

α. *genuina*. Bltt. kraus-gezähnt; Blattstiele der Stützbltt. breitgefügelt und kraus-gezähnt. Hoch, dick und saftig.

β. *rivularis*. Stiele oder Stängelbltt. gezähnt oder ganzrandig; Hüllbltt. grün. *C. rivularis* *W. Kit.*

γ. sudetica. Stiele der Stängelbltt. gezähnt [oder ganzrandig; Hüllbltt., besonders oberhalb, rothbraun. *C. sudetica* Koch.

δ. crocea. Hüllbltt. rothbraun, Blumen orangefarben. *C. crocea* Trattinick.

Auf quelligen Stellen, moosigen Sumpf- und Waldwiesen, an Bächen im Hoch- und Vorgebirge zerstreut, in O. S. auch bis in die Ebene herab. O. S. um *Rosenberg, Lublinitz, Slavenczicz, Beuthen, Charlottenbrunn am Lorbeerberge und langen Berge, Reichenau am Sattelwalde. Reinerz. Gl. Schneeberg. Riesengebirge und Gesenke* häufig, wo besonders *α* und *δ* vorkommen. *Baranio. Babia Gora.* Juni, Juli. ♀.

Stängel 1 - 4', meist 2' hoch, aufrecht, einfach, an der Spitze doldentraubig, mit bald kürzeren, bald längeren Blumenstielen. Alle Theile des Krautes bis auf die Hüllbltt. mit spinnwebenartiger Wolle, die bald dünner, bald dichter, bisweilen fast fehlt. In der Blattform ist viel Mannigfaltigkeit, doch ein und dieselbe Grundform. Der Stiel der Wurzelbltt. meist ungeflügelt oder nur gerandet; die oberen Bltt. lanzettlich, fast ganzrandig. Strahlblumen linealisch. Blumen hellgelb, goldgelb oder orangefarben. Nüsse kahl.

C. palustris L. Bltt. länglich-lanzettlich halbumbfassend, die unteren buchtig-gezähnt.

Auf Sumpf- und Moorwiesen, in Sümpfen, in Torfbrüchen in der Ebene zerstreut. Um *Br. bei Kadlau* und in den trocknen Sommern 1822 und 23 auf dem trocknen Sandbette der *alten Oder. Kl. Jeseritz b. Jordansmühl. Ohlau. Wohlau. Guhrau. Slava, P. Tarnau und Neusatz bei Beuthen. Bei Fraustadt. Dembio bei Oppeln. Czenschkowitz, O. Glogau, Ratibor.* Juni, Juli. ☉.

Stängel 1 - 3' h., zottig, oben ästig. Bltt. zottig, die ersten Wurzelbltt. kahl, fast fleischig. Blüten doldentraubig. Blumen schwefelgelb. — Gehört nach E. Meyer unter *Senectio*.

Senécio L. Kreuzkraut. Baldgreis. Hülle walzig oder kegelförmig, aus einer Reihe gleichförmiger Blättchen mit einer zweiten äusserer kürzerer Blättchen. Die zungenförmigen Strahlblumen fehlen bisweilen. Narben gestutzt pinselförmig. Kelchsaum haarig an den randständigen Nüssen abfällig.

a. Zungenblumen fehlen oder sind sehr kurz und umgerollt.

S. vulgaris L. **Kreuzkraut.** Bltt. kahl oder mit Spinnwebenwolle, fiederspaltig, die oberen am Gr. geöhrt umfassend; äussere Hüllbltt. mit schwarzer Spitze; Zungenblumen fehlen; Nüsse weichhaarig.

Auf Acker- und Gartenland d. d. g. G., fast durch d. g. Jahr. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., aber auch einfach. Blattspizel stumpf, gezähnt, in der Breite veränderlich. Endständige gedrängte Doldentrauben. Kraut und Blüthe ist eine Speise der Singvögel.

S. viscosus L. Bltt. fiederspaltig, klebrig-behaart, mit lanzettlichen buchtig-gezähnten Zipfeln; äussere Hüllbltt. locker; Zungenblumen zurückgerollt; Nüsse kahl.

Auf Sandplätzen, in sandigen Hauen, auf Bächern und Mauern, d. d. g. G., auch im Vorgeb. häufig. Juni—Aug. ☉.

Stängel 1' h., oben ästig, durchaus von feinen Drüsenhaaren, wie auch die Bltt., klebrig. Scheibe blaugelb, Strahl goldgelb.

S. sylvaticus L. Bltt. tief fiederspaltig, mit feinem Spinnwebhaar, mit linealischen gezähnten Zipfeln; äussere Hüllbltt. sehr kurz und angedrückt; Zungenblumen zurückgerollt; Nüsse grauhaarig.

Auf sandigen Waldplätzen besd. in Hauen, und da wo gerodet worden ist, stets in Menge erscheinend, d. d. g. G. häufig und heerdenweis. Juni, Juli. ☉.

b. Zungenblumen söhlig-abstehend; Bltt. getheilt.

S. vernalis Waldst. u. Kitaibel. Bltt. länglich, buchtig-fiederspaltig, wollhaarig, kraus; äussere Hüllbltt. mit schwacher Spitze; Nüsse grau-weichhaarig.

Auf Lehmboden in Waldgegenden und auf Feldern. Zuerst im J. 1822 von Fuchs bei *Rosenberg*, dann von Mayer um *Gr. Herlitz* u. *Stremplowitz bei Troppau* gefunden. Nachdem im Jahre 1834 im Herbst lange Zeit hindurch Ostwinde geherrscht hatten, erschien die Pflanze im J. 1835 zum Theil zahlreich an verschiedenen Punkten, z. B. bei *Pöpelwitz* und *Sibyllenort* um *Br.* und an 5-6 Orten um *Oppeln* und *Ober-Glogau*, zeigte sich aber seither nicht wieder. Wahrscheinlich war der Same aus Gallizien und überhaupt den östlich-angrenzenden Ländern herübergekommen. Mai. ☉.

H. meist 1'. Stängel wollig. Die Stängelbltt. am Gr. umfassend. Lockere Doldentraube. Sieht dem *S. vulgaris* ziemlich ähnlich.

S. erucifolius L. *S. squalidus* Krock sil. Bltt. fiedertheilig, die Fiedern linealisch gezähnt oder fiederspaltig; äussere Hüllbltt. halb so lang als die inneren; Nüsse sämmtlich scharfhaarig, mit gleichförmigen Federkronen; Wurzel kriechend.

Zwischen Gebüsch an Wald- und buschigen Graben-Rändern, an etwas feuchten Orten. Bisher nur am Park bei *Koberwitz*, wo ich sie 1826 fand, früher schon von Krock sil. nr. 1388 entdeckt. Nach demselben auch zwischen *Gr. Mochbern* und *Kammchwitz*. Vielleicht auch von Starke bei *N. Tschirnau* gef. Juli, Aug. ☿.

Stängel 2-4' h., meist mit abfälliger Wolle besetzt. Die Bltt. ändern in der Tiefe der Zerkheilung und zugleich in der Breite der Abschnitte; die ersten länglich, buchtig-gesähnt; meist unterseits mit abfälliger Wolle. Doldentraubige Rispe. — Nach der Beschreibung scheint auch *S. erucifolius* Krock. sil. Nr. 1394 hierher zu gehören, aber der Standort von *Grüneiche* gehört nicht dazu, den er von Matt. aufnahm.

S. Jacobaea L. *Spinnenkraut*. Untere Bltt. verkehrt-eiförmig-länglich am Gr. leierförmig, die oberen fiedertheilig am Gr. mit vieltheiligen Ohrchen umfassend; Aeste der Doldentraube fast aufrecht; äussere Hüllbltt. sehr kurz; die Nüsse der Scheibe scharfhaarig, die des Strähles kahl und mit wenigen abfälligen Haaren gekrönt; Wurzel abgebissen faserig.

β. discoidens. Strahlblumen fehlen.

Auf Wiesen, freien Waldplätzen, auf Dämmen und Triften, Wegrändern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juli, Aug. ☉.

Stängel 1 - 2' h. Bltt. unterseits und gegen den Grund bisw. schwach-wollig, sonst kahl. Selten sind alle Bltt. leierig-fiederspaltig. — Der wahre *S. aquaticus* Hudson ist vielleicht eine Varietät dieser Art oder ein Bastard von dieser und der folgenden, bei uns aber noch nicht aufgefunden.

S. barbaraeifolius Krockers sil. nr. 1397. *S. erraticus* Bertoloni! Koch Syn. *S. crucifolius* Matt. En. *S. aquaticus* W. et Gr. sil. Wimm. Fl. v. Schles. Blätter leierförmig, die unteren gestielt, die oberen am Gr. mit getheilten Ohrchen umfassend, der Endzipfel sehr gross, an den unteren herzeifg., an den oberen keilförmig; Blütenäste weit-abstehend und ausgesperrt; äussere Hüllbltt. sehr kurz; die Nüsse der Scheibe scharfhaarig, die des Strahles kahl und mit wenigen abfälligen Haaren gekrönt.

Auf feuchten Wiesen, Angern, am Rande feuchter Gebüsch, stets auf kurzgrasigem unfruchtbarem Boden, zerstreut in der Ebene, besonders in den Odergegenden. Um *Br. bei Bischofswalde* u. *Schwoitsch*, *Schottwitz*, im *Pilsnitzer Walde*, an der *Lohe bei Masselwitz* u. m. OS. um *Oppeln* und *Sukowitz*. *Ohlau*. *Wohlau*. Juli, Aug. ☉.

Stängel 1 - 3' h. Von trübem und schmutzigem Ansehen, oft mit abfälliger Wolle besetzt. Selten sind die unteren Bltt. ungetheilt; doch ist diese Art von der vorigen stets durch die ausgesperrten Blüthenäste zu unterscheiden. Die Strahlblumen elliptisch, breiter als an der vorigen. Der Krockersche Name muss als der ältere beibehalten werden. Uebrigens ist der *S. erraticus* Bertoloni genau dieselbe Pflanze.

S. subalpinus Koch. *S. alpinus* W. et Gr. sil. Bltt. gestielt, herz-eifg., ungleich gezähnt, ungetheilt oder am Gr. leierförmig; die oberen mit Ohrchen umfassend, die unteren mit glattem, die oberen mit geflügeltem Blattstiel; Nüsse kahl.

α. cordifolius. Stängelbltt. alle oder grösstentheils herzeifg., ungetheilt.

β. auriculatus. Grösser; Stängelbltt. meist am Gr. leierfg., geöhrt.

Auf sumpfigen Wiesen und in Waldsümpfen im südöstlichen Theile. An der *Baranio bei Teschen*: am *Czorno-Vyssula* und an *d. Dominowka*. Auf der *Babia Gora* ungefähr in einer Höhe von 2800-4000'. Juli, Aug. ☿.

Stängel 1 - 2' h., einfach, oben doldentraubig-ästig, 4 - Sblüthig, aufrecht. Bltt. unterseits an den Adern kurzhaarig, und oft, besonders bei α , sammt dem Stängel, schmutzig-purpurroth. Scheibe gelb, Strahlblumen pomeranzengelb. Hüllbltt. am Gr. mit Spinnwebenwolle.

c. Zungenblumen söhlig-abstehend; Bltt. ungetheilt.

S. nemorensis L. *Mägdehülle*. Hüllbltt. walzig; Bltt. elliptisch-lanzettlich oder eifg., zugespitzt, sägezähmig mit gerader Zahnschuppe; vielköpfige pyramidale Doldentrauben; Strahlblumen zu fünf; Nüsse glatt.

In Wäldern, auf Waldwiesen, auf feuchten und kräuterreichen Waldplätzen und Lehnen, besonders in Hauen an Berglehnen durch das ganze Vor- bis auf das Hochgebirge, und hie und da bis in die

Ebene herab. Um *Br.* im Park bei *Koberwitz*, bei *Lissa*. *Ohlau*. *Grosse Zeche* u. *Warthe bei Bunzlau*. *OS. b. Rosenbergu. Rackau*. Vom *Zobten* d. d. g. Vorgeb. u. Hochgebirge z. B. bis auf die *Elbwiese*. *Troppau* und im ganzen *Gesenke*. *Czantory*. Juli, Aug. 2.

Stängel aufrecht, 2 - 4' h., beblättert, oben ästig mit pyramidaler Doldentraube, kahl, seltner mit kleinen krausen Haaren bekleidet. Bltt. vom lanzettlichen bis zum eiförmigen, mit verschiedenen Veränderungen in der Zuspitzung, Einzahnung und Bekleidung; bisweilen unterhalb fast von feinen Haaren grauschimmernd (um die Pudelhaude.) Stets 5 Strahlblumen. Hierher gehört auch *S. Doria* Krock. sil. und vermuthlich *S. paludosus* bei *Matt.* und *Krock.*

S. saracenicus L. Hüllbltt. walzig; Bltt. länglich-lanzettlich, spitz, am Gr. keilförmig. gezähnt mit eingekrümmter Zahnspitze; vielköpfige pyramidale Doldentraube; Strahlblumen zu 7 oder 8; Nüsse glatt.

Zwischen Gesträuch an Flussufern auf kiesig-sandigem Grunde. Um *Br.* an den Oderufern bei *Oswitz*, *Zedlitz*, *Bischofswalde*, *Bartheln* bis nach *Ohlau*, *Brieg*, *Oppeln* in den *Pascheken* u. auf *Bolko*. *Ellgut* in *OS.* n. *Wenck.* *Beuthen a. O.* am Walle. Wird bei *Schneider* auch um *Charlottenbrunn*, *Salzbrunn* und *Kupferberg* angegeben. *Troppau*. Juli, Sept. 2.

Stängel 3 - 5' h., aufrecht, kahl. Wurzel kriechend. Bltt. weniger nach beiden Enden verschmälert, als bei der vorigen.

3. *Cynareae*. Der Griffel an der Spitze gegliedert. Sämmtliche Blumen röhrig oder die des Strahls zungenförmig. Die Köpfe meist fast kugelig, Blumen sehr häufig purpurroth, Stängel und Bltt. mit Stacheln oder Stachelborsten besetzt. XIX, 1.

Cirsium Tournefort. *Kratzdistel*. Hüllbltt. dachziegelfg., lanzettlich, zugespitzt oder stachelspitzig. Sämmtliche Blumen zwitterig, röhrig, fünfspaltig. Kelchsaum scharfhaarig, unten mit einem fleischigen Ringe verbunden. Nüsse zusammengedrückt. Blumenboden mit Borsten besetzt.

Sämmtliche Arten bei *Linné* unter *Carduus*.

C. lanceolatum *Scopoli*. Bltt. herablaufend, oberseits mit steifen Stacheln, unterseits mit dünner Spinnwebenwolle besetzt, tief fiederspaltig mit 2spaltigen stachelig-gespitzten Zipfeln; Köpfe einzeln mit Spinnwebenwolle; Hüllbltt. abstehend, lanzettlich, in einen Stachel ausgehend.

An Wegrändern, auf Brachen, auf Schuttplätzen und unbebauten Orten, d. d. g. G. gemein. Juni—Sept. ☉.

Stängel aufrecht mit abstehenden Aesten, 2 - 4' h. Blattabschnitte lanzettlich, ganzrandig mit weissgelblichen Stacheln. Blumen blass-purpurroth.

C. eriophorum *Scopoli*. Bltt. umfassend, nicht herablaufend, oberseits stachelig, unterseits weissfilzig, tief-fiederspaltig mit 2 thei-

ligen stachelig-gespitzten Zipfeln; Köpfe einzeln mit dicker Spinnwebenwolle; Hüllbltt. abstehend, lanzettlich, vorn breiter, dann in einen Stachel ausgehend.

Auf waldigen Bergen im Vorgebirge. An der *Jablunkaer Schanze* bei *Teschen* von *Kotschy* 1832 gefunden. Juli, Aug. 2.

H. 3 - 4'. Ausgezeichnet durch grosse kugelige Köpfe mit dicker Spinnwebenwolle und dunkel-purpurrothen Blumen. Blattschnitt der vorigen, die Bltt. sind aber steifer und dicker mit grösseren Stacheln.

C. palustre Scopoli. Bltt. durchaus herablaufend, mit zerstreuten Haaren, tief fiederspaltig, mit 2spaltigen stachelig-gespitzten Zipfeln; Köpfe an den Enden der Aeste traubig-gehäuft; Hüllbltt. stachelspitzig, angedrückt.

Auf sumpfigen, moorigen, torfigen Wiesen, besd. Waldwiesen, in Brüchen und sumpfigen Haiden, d. d. g. G.; von der Ebene bis auf das Hochgeb. häufig. *Troppau*, *Bielitz b. Teschen*. Juli, Aug. 2.

Stängel 2 - 3' h., steif-aufrecht, einfach, häufig röthlich, durch die herablaufenden Bltt. geflügelt. Wurzelbltt. rosettenf. Blütenstiele weisswollig. Blumen purpurf.

× *C. tataricum* L. W. et Gr. sil. Bltt. länglich-lanzettlich dornig-gewimpert, gezähnt, ungetheilt oder die unteren buchtig-fiederspaltig; die Stängelbltt. kurz herablaufend; Stängel einblüthig oder in einige lange einblüthige Stiele getheilt; Köpfe oft von einigen linealischen am Rande dornigen Deckblättern gestützt; Wurzelstock schief mit fadenförmigen Fasern.

Auf sumpfigen Wiesen hie und da in der Ebene zerstreut. Um *Br. bei Höfchen*, *Hundsfeld*, *Koberwitz* von *Krause*, *Danckwitz bei Iordansmühl* von *Wichura* gef. Um *Oppeln*. *Leobschütz*. *Dirschel*. *Cudowa*. Juli, Aug. 2.

Kommt einzeln in Gesellschaft von *C. canum* und *C. oleraceum* vor, von denen er als Bastard zu betrachten ist; daher erscheint er nur spärlich an wenigen Orten und bleibt sich nie ganz gleich. — H. 2 - 3'. Blumen blassgelblich, bisweilen in das röthliche spielend. Hierher gehört vermuthlich *C. defloratus* bei *Matt.* und *Krock.* und *C. flavescens* *Krock.*

C. canum Allione. Bltt. länglich-lanzettlich, dornig-gewimpert, schweifig-gezähnt oder buchtig-fiederspaltig, mit dreieckigen meist 2lappigen Zipfeln, die unteren Stängelbltt. herablaufend; Stängel einblüthig oder in einige lange einblüthige Stiele getheilt; Köpfe ohne Deckbltt.; Wurzel büschelig mit spindelförmig-verdickten fast knolligen Fasern.

Auf feuchten Wiesen, auf fettem und schwarzem Boden, d. d. grössten Theil des Gebiets; fehlt aber im nördlichen Theile, wo sandiges und lehmiges Alluvium die Decke bildet. Um *Br. bei Höfchen*, *Kapsdorf*, *Sakerau*, *Paschkerwitz*, *Skarsine*, *Lissa* u. v. a. Auch im Vorgeb. häufig. Juli, Aug. 2.

H. 1 - 3'. Stängel nur am Gr. beblättert, 1 - 3blüthig. Bltt. zuweilen unterseits grau- oder weissfilzig. Blütenköpfe halbkugelig. Blumen purpurfarben, selten weiss. Eine ausgezeichnete Varietät mit lauter fiederspaltigen Blättern, die bis über die Mitte des Stängels hinaufreichen, fand *Grabowski* bei *Oppeln*. Hierher gehören *C. tuberosus*, *canus* und *serratuloides* bei *Matt.* und *Krock.*

C. pannonicum Gaudin. *C. serratuloides* Scop. Wimm. Fl. v. Schles. Bltt. eifg.- oder länglich-lanzettlich ungetheilt ganzrandig oder feinzählig, dornig-gewimpert, die unteren in einen Stiel verengert, die oberen kurz-herablaufend halb umfassend; Stängel von der Mitte ab blattlos, 1-3 blüthig; Köpfe ohne Deckbltt.; Wurzelstock achsel mit fadenförmigen Fasern.

Auf Wiesen im Vorgebirge. Um *Dirschel bei Leobschütz* von Mayer gefunden und mitgetheilt. Juni, Juli. 2.

Stängel 1 - 1½' h., aufrecht. Hellgrün. Die Bltt. meist mit weissem Spinwebfilz. Blumen blass, purpurfarben. Die Spitze der Hüllbltt. dornig, etwas umgebogen.

C. heterophyllum Allione. Bltt. oberseits kahl, unterseits schneeweiss-silzig, dornig-gewimpert, umfassend, elliptisch-lanzettlich langspitzig, ungetheilt oder die mittleren nach vorn zu buchtig-eingeschnitten; die unteren Stängelbltt. mit Ohren; Stängel beblättert oben blattlos 1-3 blüthig, Köpfe ohne Deckbltt.; Hüllbltt. angedrückt.

α. *integrifolium*. Alle Bltt. ungetheilt.

β. *diversifolium*. Die unteren Bltt. ungetheilt, die mittleren buchtig-eingeschnitten.

Auf feuchten und fruchtbaren Wiesen des Vorgebirges und an feuchten Lehnen und Sumpfwiesen im Hochgeb., zerstreut an vielen Punkten. Um *Charlottenbrunn am Freudenschlosse*. Am *Fichtich b. Königswalde*. Am *hohen B. bei Conradswaldau*. Auf Wiesen zw. *Schmiedeberg und Liebau*. *Riesengeb. im Elbgrunde*, im *Melzergrunde*, *Barberhäuser*, auf der *Brandkoppe*, im *Teufelsgärchen* und vorzüglich an der *Iser*. Im *Gesenke bei Neu-Erbersdorf*, unter dem *Peterssteine* und im *Kessel*. Juni, Juli. 2.

Eine der ansehnlichsten und schönsten Arten. H. 2-3'. Stängel oben wollig. Durch die schneeweiss-silzige Unterseite der Bltt. ist diese Art vor allen kennlich. Blumenköpfe gross, dunkel-purpurfarben. Die beiden Varietäten kommen fast gleich häufig, seltener aber unter einander wachsend, vor.

× **C. praemorsum** Michx. Bltt. fiederspaltig, umfassend, dornig-gezähnt, die unteren in einen geflügelten gezähnten am Gr. verbreiterten Stiel zusammengezogen, Zipfel lanzettlich spitzig hie und da gezähnt; Köpfe 2-4 endständig-geläuft von lanzettlichen gezähnten Deckbltt. gestützt; Hüllbltt. oben abstehend.

Auf Waldwiesen. Bei *Karlsbrunn* im *Gesenke* von Grabowski i. J. 1837 gefunden. Juni, Juli. 2.

H. 2-4'. Blumen weissgelblich. Wächst zwischen *C. rivulare* und *C. oleraceum* von denen es ein Bastard ist. Auch diese zeigt ihre hybride Natur durch ihre schwankende Form und das seltene Vorkommen an.

C. rivulare Jacq. (unter *Carduus*) W. et Gr. sil. *C. Erisithales* Krock sil. Bltt. dornig-gewimpert, fiederspaltig, umfassend, die unteren in einen flügelig-gezähnten am Gr. verbreiterten Stiel zusammengezogen, Zipfel lanzettlich hie und da gezähnt; Stängel oben blattlos, mit 2-4 gehäuften Blüthenköpfen und linealischen ganzrandigen Deckbltt.; Hüllbltt. angedrückt.

Auf feuchten und fruchtbaren Wiesen im Vorgebirge bis an das Hochgebirge, hie und da auch in die Ebene herabsteigend. Im *Sep-*

pauer Garten b. Beuthen a. O. In *OS.* um *Oppeln, Sukkowitz, Slavencziz, Geiersberg, Charlottenbrunn, Gr. Glaz b. Reinerz, Cudowa, Wilhelmsthal u. Schreckendorf, Hausdorf, Riesengebirge um Lomnitz, Schmiedeberg, Gesenke b. Carlsbrunn u. m. Ustron n. Kotschy.* Juni, Juli. ♀.

Stängel 1 - 3' h., oben wollig. Bltt. bald seichter, bald tiefer getheilt. Blumen purpurfarben.

C. oleraceum Scopoli. Wiesen Kohl. Bltt. dornig-gewimpert, umfassend, die unteren fiederspaltig, mit lanzettlichen gezähnten Zipfeln, die oberen ungetheilt umfassend; Köpfe endständig-gehäuft von grossen eiförmigen Deckblättern umgeben; Hüllbltt. oben abstehend.

Auf feuchten und sumpfigen Waldwiesen, auch in brüchigen Wäldern und Haiden, in schwarzem und fettem Boden d. d. g. G. bis an das Hochgebirge, häufig. Um *Br. b. Neudorf u. Hüschen, Grübchen, Kapsdorf, Lissa, Koberwitz u. v. a.* Juli, Aug. ♀.

Stängel 1 - 2' h., aufrecht, einfach. Bltt. gross, fiederspaltig, selten ungetheilt. Die grossen misfarbigen Deckbltt. machen diese Art leicht kenntlich. Kronen weisslich-gelb.

C. acaule Allione. Bltt. kahl lanzettlich, buchtig-fiederspaltig, mit eiförmigen winkelig-3spaltigen bedornen Zipfeln; Stängel ganz kurz einblüthig.

Auf trocknen Wiesen und Triften, bisher nur an wenigen Punkten der Ebene. Um *Br. zwischen Bischwitz a. W. und Paschkerwitz* und bei *Schweinern.* Um *Landeshut.* Um *Reichenbach* nach Krockner. *Trop. u. Te.* häufig nach *R. u. M. Gr. Hennersdorf* n. *Rabenhorst.* Aug., Sept. ♀.

H: 2 - 6". Der Stängel fehlt ganz, so dass der Blüthenkopf unmittelbar zwischen den rosettenf. Bltt. auf der Wurzel aufsitzt, oder er erhebt sich in geringe Höhe und ist dann beblättert. Blumen purpurfarben.

C. arvense Scopoli. Futterdistel. Serratula arvensis L. Bltt. ein wenig herablaufend, länglich-lanzettlich, dornig-gewimpert, ungetheilt oder buchtig-fiederspaltig, an den Enden der Zipfel dornig; Köpfe in rispigen Doldentrauben; Wurzel kriechend.

α. *horridum.* Bltt. wollig-fiederspaltig mit starken Dornen.

β. *mite.* Bltt. buchtig-fiederspaltig, Astbltt. ungetheilt, mit weniger und schwächeren Dornen.

γ. *integrifolium.* Sämmtliche Bltt. f. ach, ganzrandig, oder gezähnt, am R. borstig-gewimpert. *Serratula setosa* Willdenow.

δ. *vestitum.* Sämmtliche Bltt. (flach, ganzrandig) unterseits weissfilzig.

Auf Aeckern, Brachen, Schuttplätzen und in Gestrüpp auf sandigem Boden gemein. Juli, Aug. ♀.

Stängel 2 - 4' h., oben ästig. Die Abarten γ und δ sind selten. Blüthenköpfe fast kugelig. Kronen schmutzig rosa-purpurfarben, selten weiss.

Anmkg. In Günther's Sammlung sah ich ein Exemplar von unbekannter Hand an den *Baberhäusern* gesammelt, welches unbedenklich zu *C. bulbosum* De Cand. (siehe Koch Synops. p. 399) gehörte; von demselben Standorte führt Krockner seinen *Carduus pannonicus* Nr. 1348 auf, und die Beschreibung

stimmt überein: ich suchte an dem angegebenen Orte die Pflanze vergeblich. — *C. rigens* Wallroth (*C. decoloratum* Koch Syn.) wird bei Nees v. R. am Ufer des Rothwassers zwischen Seydorf und Giersdorf angeführt; ich sah die Pflanze noch nicht. — *Silybum Marianum* sonst öfter gebaut und daher bisweilen verwildert nach Krockner und Endler wird jetzt kaum angetroffen.

Carduus L. Distel. Hüllblätter, Blumen, Blumeoboden und Nüsse wie bei *Cirsium*. Kelchsaum fiederhaarig unten durch einen fleischigen Ring verbunden.

C. a canthoides L. Wegdistel. Bltt herablaufend, länglich-lanzettlich buchtig-fiederspaltig dornig-gewimpert, Zipfeln in Stacheln endigend; Stängel ästig; Blüthenköpfe einzeln, Stiele dornig u. kraus-geflügelt.

An Wegen und Ackerrändern, auf Brachen und anderen unbebauten Plätzen d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juli—Sept. ☺.

Stängel 2 - 4' hoch, vielästig. Die ersten Wurzelsbltt. ganz kahl und den Bltt. von *Acanthus mollis* nicht unähnlich. Köpfe übergeneigt. Blumen purpurroth, seltner rosenroth oder weiss.

C. crispus L. Bltt. herablaufend unterseits wollfilzig, länglich, buchtig-fiederspaltig, mit dreilappigen und gezähnten Zipfeln, fein dornig-gewimpert; Köpfe theils gehäuft, theils einzeln; Stiele kurz, filzig, dornig.

In feuchtem Gebüsch, an Gräben, Flusarändern, in feuchten schattigen Wäldern zwischen Gestrüpp. in der Ebene und im Vorgeb. zerstreut. Um *Br. b. Hasenau. Ohlau. Kascherey b. Strehlen. Zobtenberg. Muhrau am Striegauer Wasser. Sohnelles Deichsel am Spitzbg. b. Bunzlau. Neisse im Wallgraben. Leobschütz. Waldenburg im Gesenke.* Juli, Aug. 2.

Stängel 2 - 4', oben ästig. Die oberen Bltt. sind bisweilen ungetheilt, buchtig-gezähnt. Blüthenköpfe wie an *Cirsium palustre*, purpurroth.

C. Personata Jacquin. Arctium P. L. Bltt. herablaufend, unterseits spinnwebenfilzig, dornig-gewimpert, die oberen ungetheilt eier- oder lanzettförmig, sägezählig, die unteren breit-eiförmig bis auf die Mittelrippe fiederspaltig; Köpfe gehäuft.

In feuchten Wäldern an Bächen und sumpfigen Waldstellen im Vor- und Hochgebirge. Im *Riesengeb. vom Sattler b. Hirschberg* bis auf die Gebirgshöhen, um die *neue Schl. Baude, Elb- und Riesengrund u. m. Hohe Mense. Schneeberg. Gesenke am Leiterberge, der Gabel, b. Carlsbrunn.* Juli, Aug. 2.

Stängel 2 - 4'. Von der vorigen, womit ich diese ehemals verband, fast nur durch die Blattform verschieden. Die Bltt. sind unterseits bisweilen fast kahl. Hüllbltt. mit umgebogener Spitze. Blumen purpurfarben.

C. nutans L. Bisamdistel. Bltt. herablaufend tief fiederspaltig, mit dreispaltigen Zipfeln, dornig-gewimpert und in Dornen endigend, Köpfe einzeln nickend; Hüllbltt. dreispaltig, abstehend.

Auf Brachen und an Wegen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. hin u. wieder häufig und meist heerdenweis. Juli—Sept. ☺.

Stängel 2' h., bisweilen einfach, oder oben mit kurzen Aesten, welche 1 - 3 lange einblüthige filzige Stiele tragen. Köpfe mit Haargewebe. Hüllblt. meist purpurf., die mittleren aus eiförmigem Grunde lanzettlich mit einer Einschnürung in eine weissdornige anwärtsgerichtete Spitze endigend. Blumen purpurfarben mit schwachem Honiggeruch.

Onopordon L. Krebsdistel. Hülle, Blüten, Nüsse und Kelchsaum wie bei *Cirsium*. Blumenboden zellgrubig mit häutig-gezähnten Rändern.

O. Acanthium L. Bltt. elliptisch-länglich, buchtig, spinnwebenwollig; Hüllblt. aus eiförmigem Grunde pfriemlich, die untersten weit abstehend; Stängel ästig, mit breitgeflügelten Aesten.

An Wegen und Mauern, auf Schutt- und sandigen Plätzen um Städte und Dörfer in der Ebene, doch nur in einigen Gegenden. Um *Br.* häufig. *Ohlau. Wohlau. Beuthen a. O. Oppeln.* Juni—Aug. ☉.

Stängel 3 - 5' h., durchaus gefügelt. Aeste an den Spitzen einblüthig. Bltt. breit, uneben und bisweilen kraus. Blumen rosa- und hellpurpurfarben.

Lappa Tournefort. Klette. Hüllblt. dachziegelfg., in eine hakenförmige Spitze ausgehend. Sämmtliche Blumen röhrig und zwitterig. Kelchsaum aus mehreren Reihen unten nicht verwachsener Haare gebildet.

Unter *Arctium* bei Linné. W. et Gr. sil.

L. major Gärtner. Hüllblt. fast kahl, sämmtl. hakenfg. und gleichfarbig; Blütenköpfe in Doldentrauben.

An kiesigen und steinigen Plätzen zwischen Gebüsch an Flussufern, an Hecken, Zäunen und Mauern zwischen struppigem Gesträuch um die menschlichen Wohnungen, d. d. g. G., auch im Vorgeb., verbreitet aber seltner als die beiden folgenden. Juli, Aug. ☉.

Stängel 2' h., ästig mit längeren Blütenstielen und grösseren Blütenköpfen. Bltt. gross, breit-eifg., am Gr. rundlich, schwach-herzfg. Hüllblt. grün. — Die Wurzel dieser und der beiden folgenden Arten ist officinell als *R. Bardanae*, schleimig von süsslichem, dann bitterlichem Geschmack und gehört zu den auflösenden bitter-schleimigen Arzneien. Die Samen enthalten viel fettes Oel.

L. minor De Cand. Hüllblt. schwach spinnwebenhaarig, sämmtlich hakenfg., die inneren gefärbt; Blütenköpfe traubig.

Wie die vorige, häufiger. Juli, Aug. ☉.

Niedriger als die vorige, Blütenköpfe halb so gross. Bltt. seicht-herzförmig.

L. tomentosa Lamarck. Hüllblt. spinnwebenwollig, die äusseren hakenfg., die inneren gefärbt mit gerader stumpfer Spitze; Blütenköpfe in Doldentrauben.

Wie die vorige, häufig. Juli, Aug. ☉.

Stängel hin und wieder wollig. Bltt. unterseits fein-graufilzig, breit-eifg., tief-herzförmig. Blumen bei allen drei Arten rosa- oder purpurroth, selten weiss.

Carlina L. Eberwurz. Hüllblt. dachziegelförmig, die äusseren gleichen den Stängelblt., die inneren sind trocken-

häutig, gefärbt, und strahlig-ausgebreitet. Blumen sämmtlich röhrig und zwittrig. Kelchsaum aus am Gr. verbundenen, ästigen Haaren, die Aeste fiederhaarig. Blumenboden zellig mit zerschlitzen Zellenrändern.

C. acaulis L. Stängel einblumig, kurz oder sehr kurz.

Auf trocknen und steinigen Hügeln, an Dämmen und hohen Wegrändern im Vorgebirge, hie und da auch bis in die Ebene herabsteigend. *Tarnast b. Trebnitz. Klein Oels b. Ohlau. Um Zobten, Strehlen, Münsterberg, Charlottenbrunn, Bolkenhain, Kupferberg, Salzbrunn, Hirschberg.* Bei *Wohlau* u. in *OS.* um *Oppeln, Tarnowitz, Leobschütz, Neustadt. Trop. Te.* Juli, Aug. ☉.

Wurzelbltt. rosettenfg., fiederspaltig mit eckig-gelappten Zipfeln, stachelig, unterseits oft spinnwebenwollig. Der Blumenkopf, von 2-4" im Durchmesser, sitzt entweder auf oder erhebt sich auf einem kurzen Stiele. Die inneren Kelchschuppen sind in weisse linealische zungenförmige Strahlen verlängert, so dass sie die Zungenblumen anderer *Compositae* nachahmen.

C. vulgaris L. Stängel aufrecht, beblättert, oben ästig, ein- oder mehrblüthig.

Auf trockenem, steinigem und unfruchtbarem Waldboden, in trocken Kieferwäldern und auf steinigen Hügeln an Waldrändern, in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Juli—Sept. ☉.

Stängel 1 - 1½' h., steif, oben doldentraubig-ästig, selten einfach. Bltt. länglich-lanzettlich, buchtig, gezähnt, unterseits etwas spinnwebenwollig, dornig. Die äusseren Hüllbltt. blattartig, die inneren mit braunen Dornen, die innersten in linealische pergamentartige weissgelbliche Zungenblättchen verlängert.

Serrátula L. Scharte. Hüllbltt. dachziegelförmig, die inneren länger an der Spitze trockenhäutig. Stempelblumen und Staubfädenblumen auf einer Pflanze in verschiedenen Blüthenköpfen (oder lauter Zwitterblumen).

S. tinctoria L. Färber-S. Bltt. schärflich, scharf-gesägt, eigf., ungetheilt leierfg. oder fiederspaltig; Blüten in Doldentrauben.

Auf feuchten Wiesen zwischen Wald und Gebüsch, vorzüglich u. vielleicht nur in der Ebene, häufig d. d. g. G. Juli, Aug. ♀.

Stängel aufrecht, oben ästig-doldentraubig, 1 - 2' h. Die Bltt. ändern ab; bald sind alle ungetheilt, bald die oberen, bald alle auf die angegebene Art getheilt. Hüllbltt. röthlich. Kronen purpurfarben. Kelchsaumbaare röthlich. Die Wurzel enthält einen schönen gelben Farbestoff.

Centaurea L. Flockenblume. Hüllbltt. dachziegelfg. Blumen sämmtlich röhrig mit erweitertem Saum; die der Scheibe zwittrig mit gleichmässig 5spaltigem Saum; die des Strahles grösser leer, mit verlängertem schief und ungleich 5spaltigem Saum. Kelchsaum mit mehreren Reihen borstenförmiger Haare, die der innersten Reihe kürzer; seltner feh-

lond. Nüsse zusammengedrückt. Blumenboden mit Borsten besetzt. XIX, 3.

C. Jacea L. Die Anhängsel der Hüllbltt. oval, ganzrandig, zerrissen oder die der äusseren kämmig-gefrant; Kelchsaum fehlt; Bltt. länglich, die oberen lineal-lanzettlich, ungetheilt oder buchtig oder fiederspaltig.

Auf Wiesen, an Dämmen, auf Triften, in Gebüsch und an Wald-rändern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juni—Sept. 2.

Blumen purpurfarben. Diese Pflanze ist in ihrem Aussehen sehr veränderlich. Stängel meist 1-2' h., aufsteigend, in längere Aeste zertheilt, aber auch einfach, nur einige Zoll hoch und bisw. einblüthig, oder aufrecht mit fast aufrechten gleichpfligen Aesten. Bltt. grünlich, weichhaarig, bisweilen von dünner Spinnwebenwolle weissgrau. Hüllbltt. von verschiedener Gestalt und Farbe, wovon man zwei Hauptformen unterscheiden kann, eine mit vorn abgerundeten, zerrissenen und eine mit spitzen gewimperten Anhängseln, beide bald weisslich, oder blaugrün; bald braun oder rostfarben. Hierher auch *C. amara* und *C. alba* Krock. sil.

C. phrygia L. C. austriaca W. et Gr. sil. Die Anhängsel der Hüllbltt. pfriemlich zurückgekrümmt, fiederig-gefrant, die der inneren rissig-gezähnt; Kelchsaum dreimal kürzer als die Nuss; Bltt. länglich elliptisch oder eig., ganzrandig oder gezähnt.

β. austriaca. Die Anhängsel der drei inneren Reihen von Hüllbltt. rissig-gezähnt, länger als die nächstäusseren.

Auf fruchtbaren Wiesen und an grasigen Wegrändern im Vorgebirge und daselbst bis in die benachbarte Ebene herabsteigend. Um *Charlottenbrunn b. Donnerau, Bärengrund u m., Salzbrunn, Bolkenhain, Warmbrunn, Schreibershau, Schmiedeberg, Reinerz, Wölfelsdorf, Zuckmantel, Einsiedel, Neustadt. Ustron. OS. b. Rosenberg.* Juli—Sept. 2.

Stängel stark, scharflich, wenig ästig, oft einblüthig, 1-2' h. Bltt. scharflich, oder rauhaarig, die unteren kurzgestielt, die oberen halbumbfassend. Anhängsel rostfarben oder schwärzlich. Man beobachtet mehrere Uebergänge, indem die fiederkämmige Zertheilung bald nur an den äusseren Reihen stattfindet, bald bis auf die innerste Reihe. Die letztere Form, meist mit schwärzlicher Färbung der Anhängsel, ist den höher liegenden Standorten, die erstere mit rothbraunem Anhängsel, den niederen eigen. In *Lehmwasser* bei *Charlottenbrunn* sahen wir eine Form, welche zwischen *C. phrygia* und *C. Jacea* genau das Mittel hielt. Hierher auch *C. nigra* und *C. pectinata* Krock. sil.

C. montana L. Hüllbltt. schwarz-gerandet, gefrant; Bltt. herablaufend länglich-lanzettlich ungetheilt.

Auf Bergwiesen. Auf der Südseite des *Baranio* nach *Jaworzinka* zu, von *Kotschy* gef. und mitgetheilt. Nach *Krock* bei *Fürstenstein, Schreibershau* und *Flinsberg.* Juli, Aug. 2.

Stängel 1-1½' h., einfach, einblüthig oder mit wenigen Aesten. Bltt. mit dünner Spinnwebenwolle besetzt, unterseits bisweilen weissgraufilzig. Scheibenblumen blau-roth, Strahlblumen himmelblau.

C. Cyanus L. Kornblume. Hüllbltt. schwarzbraun-gerandet, gefrant; Bltt. lineal-lanzettlich, die unteren am Gr. gezähnt, d.

Wurzelbltt. verkehrt-ei-lanzettlich am Gr. fiederspaltig; Kelchsaum so lang als die Nuss.

Unter der Saat gemein. Juni, Juli, auch später. ☉.

Stängel 1 - 1½' h. mit einblüthigen Aesten. Bltt. unterhalb schwachwollig. Scheibenblumen röthlichblau, Stralblumen himmelblau; in Gärten auch mit weissen, rosenrothen etc. Blumen.

C. Scabiosa L. *Eisenwurzel*. Hüllbltt. rundlich mit schwarzem dreieckigem spitzen gefranzten Anhängsel; Kelchsaum so lang als die Nuss; Bltt. einfach oder doppelt-fiederspaltig mit lanzettlichen Zipfeln; Stängel ästig.

Auf sonnigen Hügeln und Dämmen, an Wegrändern, an Sandgruben, d. d. Ebene u. das Vorgeb. zerstreut und nirgends sehr zahlreich. Um *Br. b. der Hube, Höfchen, Gräbschen, Mahlen, Skarsine, Riemberg* etc. *Steine und Jordansmühl, Harthebg. b. Frankenstein. Opjuli*—Juli—Sept. 2.

Stängel 2' h., dick und stark. Die Bltt. meist kurzhaarig, schärflich, bisweilen fast kahl, dicklich und fast lederartig; die unteren nach vorn bisweilen ungetheilt. Blüthenköpfe dick, doppelt so gross als an der folgenden. Blumen purpurfarben.

C. paniculata L. *Knopfwurzel*. Hüllbltt. eiförmig mit braunem dreieckigem gefranzten Anhängsel; Kelchsaum halb so lang als die Nuss; Bltt. untere doppelt, obere einfach-gefiedert mit linealischen Zipfeln; Stängel rispig-ästig.

An trocknen Weg- und Ackerrändern, auf sandigen Hügeln und Haideplätzen d. d. g. G., vorzugsweise in der Ebene. Um *Br. bei Kleinburg, Gräbschen, Pöpelwitz, Fuchsberg b. Schwoitsch* etc. Juli, Aug. ☉.

Stängel 1 - 2' h., oft roth und mit abfälligen Wollflocken besetzt, meist von unten an ästig. Blumen rosaf. oder hellviolett.

? *C. solstitialis* L. Hüllbltt. mit 3 Stacheln, der mittlere länger; Köpfe endständig; Bltt. linealisch, herablaufend.

Auf Brachen. Diese Art fand ich nur einmal auf einem Brachfelde bei *Gr. Rake b. Br.* Aug. ☉.

Aeste abstehend. Wurzelbltt. leierfg. Blumen strohgelb.

Ambrosiaceae Link.

Staubgefässblumen in einem Kopfe mit vielblättriger oder vieltheiliger Hülle, fünfzähliger Krone mit klappiger Kuospenlage, fünf verwachsenen Staubfäden und freien Staubbeuteln, einem verkümmerten Fruchtknoten mit fädigem Griffel und stumpfer Narbe. Stempelblumen gesondert, einzeln oder paarweis, in einer aussen borstlichen Hülle; ohne Krone, mit einem freien Fruchtknoten, einem Griffel und zwei verlängerten Narben. Die Hülle wächst mit der Frucht fest, verhärtet und

schliesst in besonderen Höhlen die zusammengedrückten Nüsse ein. Kelchsaum fehlt.

Xanthium L. Spitzblatt. Einhäusig. Staubgefässblumen röhrig, durch Spreublätter getrennt, von einer vielblättrigen Hülle umschlossen. Stempelblumen paarweise von einer einblättrigen, zweischnäbligen, verhärtenden Hülle umgeben. XXI, 5.

X. strumarium L. Ohne Dornen; untere Bltt. herzfg., dreilappig.

An Wegen, Zäunen, Mauern, auf Schutthaufen und ungebauten Orten in der Nähe der Städte und Dörfer, nur in der tieferen Ebene. Um *Br.* in den Vorstädten und nächsten Dörfern. *Ohlau. Oppeln.* Selten um *Trop.* u. *Te.* Juli—Oct. ☉.

Stängel 1' h., stielrund, dick, ästig. Bltt. mit striegligen Haaren besetzt, unterseits grau. Blütenköpfe in den Winkeln. Früchte mit hakenförmigen Stacheln.

Anm. g. *Xanth. spinosum* mit gelben dreispaltigen Dornen, wurde von Weimann bei Grünberg häufig verwildert beobachtet.

Campanulaceae Jussieu.

Kelchröhre mit dem unteren Theil des Fruchtknotens oder mit dem ganzen verwachsen; Kelchsaum 5spaltig, oder 10spaltig, mit 5 aufrechten und 5 zurückgeschlagenen Zipfeln, klappiger Knospenlage. Krone glocken- oder röhrenförmig aus einem mit dem Kelch verwachsenen Ringe entspringend, mit fünf Zipfeln. Fünf freie Staubfäden zwischen den Kronenzipfeln, am Gr. meist breiter und den Fruchtknoten deckend; Staubbeutel oft am Gr. verwachsen. Fruchtknote 2-8fächerig, mit je vielen Eichen. Ein Griffel mit 2 bis 5 Narben. Kapsel- frucht.

Stauden oder Kräuter mit meist wechselständigen Bltt. ohne Stützbltt., einfachen Stängeln und ansehnlichen Blumen. Sie enthalten einen Milchsaft und sind schwach bitter und schleimig. Wald- und Wiesenpflanzen, wovon einige in allen drei Regionen vorkommen, mit mehrentheils blauen Kronen.

1. Blumen in Köpfe vereinigt mit einer Deckblätterhülle.

Iasione L. Iasione. Krone 5theilig mit linealischen anfangs vereinigten dann von unten nach oben sich lösenden Zipfeln. Staubfäden pfriemlich; Staubbeutel am unteren Theile zusammenhängend. Kapsel 2fächerig, an der Spitze zweiklappig. XIX, 6.

J. montana L. Schafrapunzel. Wurzel ohne Ausläufer.

Auf trocknen Sandplätzen, in Kieferhauen, Haideplätzen, Brachen, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Juni, Juli. ☉.

Stängel 1 - 1½' h., von unten mit langen Aesten, oder einfach einblumig. Köpfe platt, endständig. Bltt. meist kurzhaarig, linealisch, wellig-kraus. Kronen blau oder weiss. Sieht einer *Scabiosa* ähnlich.

Phyteuma L. Teufelskrallen. Krone 5theilig mit linealischen anfangs vereinigten dann von unten nach oben sich lösenden Zipfeln. Staubbeutel frei. Kapsel 2-3fächerig, in seitlichen Spalten sich öffnend. v, 1.

P. orbiculare L. Blütenkopf kugelig; die äusseren Deckbltt. eilanzettlich schwach-gesägt.

Auf grasreichen Wiesen im Vorgeb. hin und wieder. Bei *Reinerz*, *Bauerwitz* und *Katscher* in OS. *Kessel* im *Gesenke*. Um *Herlitz*, *Erbersdorf* u. *Zossen* nach R. u. M. *Deutschweichsel* n. *Kotschy*. *Babia Gora*. Juni, Juli. ♀.

Schiefer walziger Wurzelstock. Stängel ½ - 1' h., einfach, aufrecht. Untere Bltt. gestielt, herzf.-länglich, gekerbt, obere linealisch. Kronen dunkelblau, vor dem Blühen einwärts gekrümmt.

P. spicatum L. Rapunzel. Blütenkopf länglich; Bltt. doppelt kerbig-gesägt.

In lichten Wäldern und Gebüsch, auf Waldwiesen, in Hohlwegen und Gebirgsschluchten, in der Ebene hie und da, häufig im Vorgeb. bis in das Hochgebirge. Um *Br.* in der *Müncher Haide bei Bischwitz*. Laubwald zw. *Gr. Rake* und *Mahlen*, *Goi bei Kapsdorf*. *Kl. Totschen*. *Heydewilzen*, *Riemberg*. Vom *Zobtenberge* durch das ganze Vorgeb. Im *Riesengeb.* in den *Schnee gruben*, am *kl. Teiche*. *Gesenke* im *Kessel* u. m. OS. bei *Proskau* und *Slavenczicz*. Um *Ohlau*. *Wohlau*. *Bunzlau*. *Trop.* u. *Te.* Juni, Juli. ♀.

Bübenförmiger Wurzelstock. Stängel 1 - 3' h., einfach, kahl, oben blattlos. Untere Bltt. tief-herzförmig, rundlich-eiförmig; die nächsten dreieckig-langspitzig, die obersten linealisch, ganzrandig. Der Blütenkopf kegelförmig, später länglich und sich sehr verlängernd. Kronen schwefelgelb. Was in W. et Gr. Fl. sil. als *P. Halleri* aufgeführt ist, gehört zu der im Gebirge gewöhnlichen Form dieser Pflanze, welche sich durch robuste Tracht, dicken Stängel, breite, dickliche Bltt. auszeichnet. Die jungen Triebe sind essbar.

2. Blumen einzeln oder gehäuft ohne Deckbltt.

Campánula L. Glockenblume. Kelchröhre kreiselförmig. Krone glockig, mit offenem 5spaltigem Saum. Die am Gr. erweiterten und halbkugelig-zusammenliegenden Staubfäden verschliessen den Grund der Krone. Kapsel 2-3fächerig, öffnet sich in seitliche Spalten. v, 1.

Kronen blau oder weiss.

a. Kelchbuchten ohne Anhängsel, daher der Saum 5spaltig. Blumen gestielt.

C. rotundifolia L. Milchglöckel. Wurzelbltt. gestielt, nierenförmig-rundlich, oder herz-eifg.; Stängelbltt. lanzettlich oder linealisch; Stängel rispig-ästig; Kelchzipfel pfriemlich.

β. grandiflora. Mit 1-5 grösseren, tiefglockigen Blumen, niedrigem, fast einfachem Stängel, und gekerbten lanzettlichen unteren Stängelbltt. *C. Scheuchzeri* Villars Koch Syn.

γ. pusilla. Mit 1-3 halbkugelig-glockigen Blumen, zwergigem einfachem Stängel und elliptischen unteren Stängelbltt. *C. pusilla* Hänke.

Auf trocknen Triften, Waldplätzen, Haiden, Kieferwäldern, Wegrändern. *β.* und *γ.* auf dem Hochgebirge an sonnigen Lehnen und zwischen Felsen im Riesengebirge und Gesenke. Juni, Juli. ♀.

Stängel meist 1' h., vielblumig. Die rundlichen Wurzelbltt. vertrocknen meist bis zur Blüthezeit. An der gewöhnlichen Form sind die Kronen eifg., kurzglockig, blasshimmelblau. Dass die Varietäten *β* und *γ* nur Formen dieser Art sind, lässt sich durch Uebergänge nachweisen.

C. patula L. Bltt. gekerbt; Wurzelbltt. länglich-eifg. in einen Stiel verengert, Stängelbltt. lineal-lanzettlich, sitzend; Rispe weit-schweifig fast doldentraubig; Kelchzipfel pfriemlich; Kronensaum auswärts-abstehend.

β. hirta. Stängel und Bltt. unterhalb kurzhaarig.

Auf Wiesen, in Gebüsch, an Waldrändern, auf Brachäckern d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein und in grosser Menge, so dass bisweilen Wiesen und Brachen in der Ferne violett leuchten. Mai, Juni. ☺.

Stängel schwach, aufrecht, 1' h., oben in dünne 1-4blüthige Aeste getheilt. Kronen röthlich-blau oder violett, seltner weiss.

C. Rapunculus L. Bltt. gekerbt; Wurzelbltt. länglich-eiförmig in einen Stiel verengert, Stängelbltt. lineal-lanzettlich, sitzend; Rispe ährenförmig mit am Gr. getheilten Aesten; Kelchzipfel pfriemlich; Kronensaum aufrecht.

Auf Grasplätzen, an Dämmen und in Gebüsch in der Ebene u. im Vorgeb. zerstreut. Bisher nur an wenigen Orten; vielleicht aber häufiger, nur übersehen. Um *Br. bei Grümeiche* v. Krause gef., *Kl. Tschansch u. Wirwitz. Kirschberg b. Lissa. Bei Silsterwitz* und in den Bergen bei *Strehlen*. Mai, Juni. ☺.

Stängel 2-3' h., ziemlich steif, aber dünn, meist kurzhaarig. Diese Art ist der vorigen sehr ähnlich, aber am Blüthenstand beim ersten Blick zu unterscheiden. Kronen blau.

C. persicifolia L. Waldglöckel. Bltt. mit feinen entfernten Sägezähnen; Wurzelbltt. länglich-lanzettlich in einen Stiel verlaufend, Stängelbltt. lineal-lanzettlich; Blumen in arnblüthiger Traube; Kelchzipfel lanzettlich.

β. eriocarpa. Kelchröhre von weissen Borsten bärtig.

Auf Waldboden in trocknen Gehölzen, auf sonnigen bewaldeten Hügeln, in Kieferhauen, an sonnigen Berglehnen d. d. g. G. zumal im Vorgeb. häufig. Juni, Juli. ♀.

Stängel steif aufrecht, 2-3' h., einfach. Kronen am Gr. halbkugelig, blass-himmelblau oder weiss. Es giebt eine seltene Missbildung, an welcher der Kelch sich vergrössert hat bis zur Grösse der Krone.

C. bononiensis L. Bltt. kerbig-gesägt, unterseits grau-filzig; untere herzfg., lang gestielt, obere eiförmig zugespitzt sitzend; Traube endständig, einfach oder rispig; Kelchzipfel aufrecht; Stängel stielrund, weichhaarig.

Auf waldigen sonnigen Hügeln. An den *Gypsgruben bei Dirschel und Katscher* in OS. von Schramm gef. Juli, Aug. 2.

Blütenstand bisweilen pyramidal. Kronen blau, fast kegelfg.-glockig. In der Tracht der folgenden ähnlich.

C. rapunculoides L. Hasenohren. Bltt. ungleich-gesägt, kurzhaarig, untere lang-gestielt länglich, obere lanzettlich; Blumen in endständigen unbeblätterten, einseitwendigen Aehren; Kelchzipfel lanzettlich, zuletzt zurückgeschlagen; Stängel stumpfkantig.

Auf Aeckern und Gartenbeeten, in Grasgärten, ein schwer zu tilgendes Unkraut, durch d. g. G. gemein. Juli, Aug. 2.

Wurzel kriechend. Stängel 1-3' h., unten kahl. Kronen kegelfg.-glockig, blass violett.

C. Trachelium L. Bltt. grob doppelt-gesägt, kurz steifhaarig, die unteren lang-gestielt ei-herzfg., obere länglich sitzend; die Blütenstiele 1-3blumig winkelständig, eine Traube bildend; Kelchzipfel ei-lanzettlich; Stängel scharfeckig.

In Gebüsch und Vorholzern, Wäldern, an buschigten Dämmen u. Waldrändern, von der Ebene bis auf das Hochgebirge (z. B. *Kessel im Gesenke*) häufig. Juli, Aug. 2.

Scharflich und rauh. Stängel 1-4' h., starr und steif, dicklich. Die mittleren Stängelbltt. fast Seckig. Blütenstiele bisweilen alle einblumig. Kronen länglich-glockig, blau-violett; oft weiss.

C. latifolia L. Bltt. eifg.-lanzettlich langgespitzt, grob doppelt-gesägt, weichhaarig, kurz gestielt; Blumenstiele winkelständig einblumig in einer Traube; Kelchzipfel-ei-lanzettlich; Stängel mit undeutlichen Ecken.

In Wäldern besonders des Vorgebirges zerstreut, auch bis in die Region des Hochgebirges und andererseits bis in die Ebene hinabsteigend. Um *Br. im Goi bei Kapsdorf* von Krause gef. Am *Lorbeerberge und langen Berge* bei *Donnerau*. *Grunwalder Thal* bei *Reinerz. Gl. Schneeberg*. Bei *Lomnitz* und *Schreibershau. Kl. Schnee-grube. Leiterberg u. Bründelhaide* im *Gesenke u. bei Würbenthal u. Ludwigsthal*. Juli, Aug. 2.

Stängel 2-4' h. Kronen gross, violettblau, länglich-glockig, mit langspitzigen gefranzten Zipfeln.

b. Kelchbuchten ohne Anhängsel; daher der Saum 5spaltig; Blumen sitzend.

C. Cervicaria L. Steifhaarig; Bltt. feingekerbt, die unteren lanzettlich in einen Stiel verschnälert, die oberen lineal-lanzettlich, umfassend; Blumen in winkel- und endständigen Köpfen.

Auf trocknen hohen Waldplätzen, Waldwiesen, sonnigen bewaldeten Hügeln und buschigen Dämmen in der Ebene und dem Vorgeb. zerstreut über d. g. G. Um Br. bei *Arnoldsmühl, Lissa, Skarsine, Wohlau, Jordansmühl. Am Rummelsb., Geiersberge, Striegauer B., um Polsnitz, Sattler bei Hirschberg. OS. bei Proskau, Leobschütz. Trop. Te.* Juli, Aug. 2.

Stängel 1 - 3' h., mit weissen steifen Haaren. Hellgrün. Kronen länglich-glockig, hellblau.

C. glomerata L. Büschelglocken. Bltt. fein-gekerbt. die untersten eifg. oder eifg.-lanzettlich am Gr. gerundet oder herzfg., die oberen sitzend herzfg.-umfassend; Blumen in winkel- und endständigen sitzenden Köpfen.

Wie die vorige, aber häufiger, besonders auch an grasigen Hohlwegrändern im Vorgeb. Um Br. bei *Zimpel u. Grüneiche, Oswitz, Lissa u. m. Trebnitzer Höhen.* Juni, Juli. 2.

Stängel 1 - 3' h. Dunkelgrün. Kronen länglich-glockig, meist sattblau. Bei einerlei Tracht ändert diese Pflanze in vielen Stücken; mit kahlem, behaartem, weich- und scharfhaarigem Stängel und Bltt., sitzenden und gestielten, eifg., länglichen und lanzettlichen Bltt.

c. Kelchbuchten mit zurückgebogenen Anhängeln, daher der Saum 10theilig.

C. barbata L. Rauhhaarig; Bltt. länglich, Blumen gestielt winkelständig in kurzer Traube, nickend; Kelchzipfel ei-lanzettlich; Krone vorn bärtig.

Auf Wiesen und fruchtbaren Graslehnen im östlichen Theile des Hochgebirges häufig. Gipfel des *Gl. Schneeberges.* Gesenke: am *Hockschar, Altvater, Peterssteine, Bründelhaide, im Kessel.* Juli, Aug. 2.

Stängel 1' h., aufsteigend-aufrecht, arnblättrig, 3 - 5blumig. Wurzelbltt. rosettenfg., fast zungenfg., in den Stiel verschmälert. Blumenstiele bogig. Kronen länglich-glockig, satthimmelblau. Eine schöne Varietät mit *aufrecht-abstehenden, violett-braunen Blumen* fand Grabowski nur einmal am Altvater.

C. sibirica L. Kurzhaarig; Bltt. lanzettlich, wollig; Blumen gestielt nickend traubig oder rispig; Kelchzipfel lanzettlich-pfriemlich; Krone vorn glatt.

Auf trocknen Hügeln auf Kalkboden. Am *Moritzberge* und am *Grosstein* bei *Oppeln* von Grabowski gef. Juni. ☉.

Stängel steif-aufrecht, $\frac{1}{2}$ - 1' h., unten röthlich, mit kurzen weisslichen Borsten. Krone kugelfg.-glockig, blau.

Adenóphora Fischer. Schellenblume. Kelchröhre kreiselfg. Krone glockig, mit offenem 5-spaltigem Saum. Der aus dem Blumenboden entspringende Ring in eine Röhre verlängert welche den Grund des Griffels umgiebt. Kapsel 2-3fächerig, in seitliche Spalten sich öffnend. V, 1.

A. suaveolens Fischer. *Campanula lilifolia* W. et Gr. sil. Bltt. länglich, die unteren kurzgestielt, gesägt; Blumen in weitläufiger Rispe; Kelchzipfel drüsig-gesägt, Griffel über die Krone vorragend.

Auf waldigen Bergen. Am *Getersberge* an der Südostseite (von Albertini und Schummel) und auf den *Bergen bei Strehlen* von Schummel gef. Juli, Aug. 2.

Stängel 1-3' h. Kronen hellblau.

Anmkg. Nach Matfuschka sollen auch *Primatocarpus Speculum* bei *Pitschen*, und *P. hybridus* bei *Schweidnitz* vorkommen; die erstere nach Krocker auch bei *Polnisch-Neudorf*, *Treschen* und *Althof*. An den letzteren Orten haben wir vergeblich darnach gesucht.

Ericineae Jussieu.

Kelch 4-5theilig frei oder mit der Röhre dem Fruchtknoten angewachsen. Krone 4-5theilig oder 5-blättrig. Staubgefäße doppelt (oder eben) so viel als Kelchzipfel, zwischen den Kronenzipfeln, aus einer unter oder auf dem Fruchtknoten stehenden Scheibe oder aus dem Fruchtknoten entspringend; Staubbeutel in hornförmige Fortsätze verlängert, die sich an der Spitze rund öffnen, oder ohne diese Fortsätze eben so (oder der Länge nach) aufspringend. Fruchtknoten 4-5fächerig mit einer an die Scheidewände angewachsenen Mittelsäule, und je vielen Eichen. Narbe 4- oder 5lappig, kugelig oder trichterfg. Frucht eine freie oder von der Kelchröhre umgebene Beere oder Kapsel mit mehreren Fächern und Samen. Samen mit umgekehrtem Keim in der Axe des fleischigen Eiweisses.

Sträucher und Stauden von trockenem Ansehen mit wechsel- oder wirtelständigen, meist immergrünen Bltt. ohne Nebenblätter, gesellschaftlich und heerdenweise, ganze Strecken steiler, sandiger und torfgrundiger Gegenden und der nach ihnen benannten Haiden überziehend und Begleiter der Nadelhölzer. Alle sind von adstringirend-bitterer, einige auch von narcotisch-scharfer Beschaffenheit.

1. *Vaccinieae*. *Narbe kugelig. Beere von der verwachsenen Kelchröhre bedeckt. Samenschale anschliessend.*

Vaccinium L. Kelchsaum 4-5zählig. Krone 4-5spaltig oder zählig. Beere kugelig. VIII, 1.

V. *Myrtillus* L. *Heidelbeere. Blaue Beeren.* Staubbeutel mit Grannen, Kronen kugelig-krugfg.; Bltt. eiförmig feingesägt, häutig; Blumen einzeln nickend winkelständig auf kurzen Stielen.

In Nadelwäldern und Haiden besd. an unfruchtbaren Berglehnen, von der Ebene bis auf das Hochgebirge, meist grosse Strecken bedeckend. April, Mai, Frucht reift im Juli, Aug. h.

Strauch von $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' H., mit grünen eckigen ruthenförmigen Aesten. Krone weiss-grünlich, nach oben fleisch- oder rosaf. Beere schwarzblau mit graublauem Reisse und violettrothem Fleisch, von säuerlich-süßem, etwas herbem Geschmack, mit violetttem Färbestoff, der zur Färbung der Weine angewandt wird, ein gelind adstringirendes Mittel. Die jungen Bltt. können als Thee gebraucht werden.

V. uliginosum L. Rauschbeeren. Staubbeutel mit Grannen; Krone eig.-krugfg.; Bltt. verkehrt-eig., ganzrandig, häutig; Blumen gehäuft nickend.

Auf Moorbrüchen, in Moorwaldungen und in sumpfigen Haidegegenden, von der Ebene bis auf das Hochgebirge. Um *Wohlau, Ohlau, Bunzlau* an vielen Stellen, *Sprottau, Charlottenbrunn*. Am *hohen B. b. Conradswaldau. Seefelder b. Reinerz. Heuscheuer*. Moore des *Riesengebirges* und *Gesenkes*. In *OS. Dombrowka bei Creuzburg, Königshuld, Jacobswalder Haide*. Bei *Troppau*. Mai, Juni. h.

Strauch, wie der vorige, mit stielrunden Aesten. Krone weiss-fleischfarben. Bltt. schmutzig-grün. Beeren blauschwarz, grösser als die der vorigen. Die Angabe, dass die Beeren giftig seien, scheint unbegründet zu sein.

V. Vitia idaea L. Preusselbeere. Staubbeutel ohne Grannen; Krone glockig; Bltt. verkehrt-eig., immergrün, unterseits punctirt, lederartig; Blumen in endständigen nickenden Trauben.

In Nadel- und Rothbuchen-Wäldern und auf sonnigen bewaldeten sandigen Hügeln in der Ebene bis an das Hochgebirge, oft ganze Berglehnen überziehend. D. d. g. G. Mai, Juni, Früchte reifen im September. h.

Die Bltt. sind unterseits punctirt und enthalten eisengrünenden Gerbestoff. Der Aufguss der Blumen giebt einen angenehmen Thee. Die eingemachten Beeren sind eine angenehme und gesunde Speise.

V. Oxycoccus L. Moosbeere. Schollera O. Willd. Stängel kriechend, Aeste fädlich gestreckt; Bltt. eig., spitzlich, unterseits aschgrau; Blüten lang-gestielt, nickend; Krone radförmig.

In Torf- und Moorbrüchen meist auf Rasen oder Polstern von Torfmoos (*Sphagnum*) von der Ebene bis auf das Hochgebirge. *Riemberg. Wohlau. Birnbäumel bei Sulau. Deutschhammer. Creuzburg. Hirschberg*. Am *hohen Berge b. Conradswaldau*. Moore des *Riesengeb. u. Gesenkes. Seefelder bei Reinerz. Heuscheuer*. In *OS. bei Königshuld, Malapane* etc. Juni, Juli. h.

Weithin kriechend. Kronen weiss und blaspurpurroth. Beeren kugelig, gross, roth, von säuerlichem Geschmack und essbar.

2. Ericaceae. Narbe 4-5lappig. Kapsel oder Beere frei. Samenschale anschliessend.

Arctostáphylos Adanson. Bärentraube. Kelch 5spaltig. Krone eig. mit 5spaltigem Saum. Zehn Staubgefässe; Staubbeutel oben in Löcher sich öffnend. Frucht eine fünf-samige Beere (oder Pflaume mit einsamigen Kernen)- X, 1.

A. officinalis W. et Gr. Fl. sil. *Arbutus Uva ursi* Linne.
Bltt. länglich-verkehrt-eifg. ganzrandig, immergrün, netzaderig.

In Kieferwäldern und Haiden in der Ebene nur in einigen Gegenden. *Trachenberg und Sulau. Klitschdorfer Haide bei Bunzlau. Sprottau. Niesky. Rückerts bei Reinerz. OS. um Oppeln, Königshuld, Jacobswalde.* Mai, Juni. ♀.

Stämmchen gestreckt, an den Spitzen aufsteigend, sehr ästig. Bltt. lederartig, oberseits glänzend. Blüten in kurzen endständigen Trauben. Kronen blass, fleischfarben. Die Bltt. sind officinell, gehören zu den auflösend-adstringirenden Mitteln und enthalten eisenbläuenden Gerbestoff.

Andrómeda L. *Grünke*. Blumentheile wie bei *Arctostaphylos*. Frucht eine 5fächerige 5klappige Kapsel. x, 1.

A. polifolia L. *Torfhaide*. Blumenstiele schirmförmig; Bltt. lineal-lanzettlich, am Rande zurückgerollt, unterseits graugrün.

Auf Torfmooren in Wäldern und Haiden, von der Ebene bis auf die Moore des Hochgebirges. *Birnbäumel bei Sulau. Deutschhammer. Um Bunzlau häufig, b. Ochsenkopf, Tiefenfurth, Birkenbrück. Muskau, Niesky und Wehrau. Ohlau. Creuzburg. Rosenberg. Königshuld. Jacobswalde. Seefelder bei Reinerz* und an der *Heuscheuer. Hochmoore des Gesenkes, Riesen- und Isergebirges. Lomnitz b. Hirschberg.* Juni, Juli. ♀.

Stamm $\frac{1}{2}$ - 1' h., aufsteigend. Bltt. lederartig, oberseits glänzend. Blumenstiele und Kelche rosafarben. Kronen länglich-krugfg., fleischfarben. Die Bltt. enthalten einen schwarzen Färbestoff.

Calluna Salisbury. *Haide*. Kelch 4blättrig länger als die Krone. Krone 4spaltig. Acht Staubgef. Vierfächerige und 4klappige Kapsel: die Scheidewände lösen sich von den Klappen, bleiben mit der Mittelsäule verbunden und stehen den Näthen gegenüber. VIII, 1.

C. vulgaris Salisb. *Haidekraut. Erica v.* Linn.

In Nadelwäldern und auf sandigen Flächen, oft grosse Strecken dicht überziehend, in der Ebene und durch das ganze Vorgebirge bis auf die Gebirgshöhen. Juli—Sept. ♀.

H. 1 - 2'. Bltt. dachziegelfg., dreieckig. Kronen rosenroth, auch weiss. Trägt zur Erzeugung des Torfes bei.

Erica L. Kelch 4-blättrig oder 4 theilig. Kronensaum 4spaltig. Acht Staubgef. Kapsel 4fächerig, 4klappig, mit Scheidewänden auf der Mitte der Klappen. VIII, 1.

E. Tetralix L. Staubbeutel mit Grannen; Kronen krugförmig; Blätter linealisch zu 3 oder 4 wimperig-borstig, Blüten endständig in kopfförmigen Schirmen.

In Torfbrüchen. *Tiefenfurt bei Sprottau v. Göppert, und Paritz b. Bunzlau* von Schneider gef. Jnli, Aug. ♀.

Niedriger Strauch, 4 - 8' h. Bltt. wirtelständig. Blumenstiele filzig. Kronen rosafarben.

Anmkg. Nach v. Mückusch Angaben soll *E. herbacea* bei *Einsiedel* im Gesenke und *Azalea procumbens* auf dem *Hochschar* im Gesenke vorkommen. Gegen beides hegen wir begründete Zweifel.

Ledum L. *Porst.* Kelch sehr klein, 5zählig. Krone 5blättrig. Staubbeutel oben in Löcher sich öffnend. Kapsel 5fächerig, von unten nach oben in 5 Klappen aufspringend, mit Scheidewänden die aus den eingeschlagenen Klappenrändern gebildet sind. X, 1.

L. palustre L. *Gränze, Kienporst, Wilder Rosmarin.* Zehn Staubgef.; Bltt. linealisch am Rande zurückgeschlagen, unterseits so wie die jungen Zweige mit rostrothem Filz bedeckt.

In Torfmooren und sumpfigen Waldmooren in der Ebene und dem Vorgebirge. *Riemberg, Birnbäumel, Ohlau, Polgsen bei Wohlau.* Um *Bunzlau bei Greulich, Kotzenau, Klitschdorf* stellenweise ganze Strecken überziehend. Um *Muskau, Rothenburg u. Niesky.* In OS. um *Creuzburg, Königshuld, Malapane, Jacobswalde, Rosenberg etc.* Auf dem *grossen See an der Heuscheuer, Lomnitz, Stonsdorf u. Petersdorf. Reiwiesen im Gesenke. Te.* Mai, Juni. h.

II. 2 - 5'. Blüten endständig, in schirmähnlichen Doldentrauben, auf feinen langen Stielen. Kronenbltt. länglich, weiss. Die getrockneten Bltt. sind von starkem, nicht unangenehmem Geruch und bitter-aromatischem Geschmack, von scharf-narcotischen Wirkungen, leider als Würze zum Bier, welches dadurch stark berauschende Kraft bekommt, nur zu bekannt, als *Hb. Rosmarini sylvestris* officinell.

3. *Pyroleae.* Narbe 5lappig. Kapsel frei. Samenschale locker. Staubgef. stehen auf dem Fruchtboden.

Pyrola* L. *Wintergrün. Kelch 5theilig. Krone 5blättrig. Kapsel 5fächerig, in 5 Spalten sich öffnend, indem die Klappen oben und unten mit der Mittelsäule verbunden bleiben; Scheidewände aus der Mitte der Klappen. X, 1.

Die beiden letzten Arten weichen von den fünf ersten ab, und können als Typen besonderer Sippen betrachtet werden.

P. rotundifolia* L. *Steinpfanze. Staubgefässe nach oben gekrümmt, Griffel niedergebogen nach vorn bogenförmig; Kelchzipfel lanzettlich halb so lang als die Krone; Blüten in gleichmässiger Traube.

In Nadel- und Laub-, besonders Buchen-Wäldern, d. d. g. G. in der Ebene und dem Vorgeb. nicht selten. Um *Br. bei Lissa, Mahlen, Skarsine, Koberwitz u. m.* Juni. 2.

Stängel 1' h., nur am Gr. mit fast rosettenförmig-gestellten, gestielten, fast kreisrunden gekerbten, oberseits glänzenden Bltt. und einer endständigen, ährenförmigen Traube, indem die kurzen Blüthenstiele von lanzettlichen kleinen Deckblättchen unterstützt werden. Kronenbltt. verkehrt-eiförmig, hohl, weiss. — Diese und die 4 folgenden

Arten haben pfriemliche Staubfäden und die Ränder der Kapselspalten durch Wollfilz verbunden.

P. chlorantha Swartz. Staubgef. nach oben gekrümmt, Griffel niedergebogen nach vorn bogenförmig; Kelchzipfel eiförmig dreimal kürzer als die Krone; Blüten in gleichmässiger Traube.

In Nadelwäldern der Ebene und des Vorgeb. zerstreut. Um Br. bei *Mahlen u. Heydewilzen. Wohlau. Schönfelder Wald bei Bunzlau. Gröditzberg. Geiersberg. Rummelsberg. Charlottenbrunn. Volpersdorf. Agnetendorf. Cudowa. Oppeln. Herlitz, Jägerndf.* Juni. 2.

Stängel 6 - 8" h. Bltt. klein. Kronenbltt. gelblich-grün. Wuchs der vorigen.

P. media Swartz. Staubgef. gegen einander geneigt; Griffel gerade etwas schief, der obere Ring desselben breiter als die Narbe.

In Nadel- und Laubholzwäldern, auf bewaldeten Hügeln im Vorgeb. und der Ebene. *Geiersberg. Am Zentner b. Hausdorf. Cudowa. Schmiedeberg. Am Gröditz- und Spitzberge n. Schneider. Am Herdberge und bei Agnetendorf n. Elsner. Im Walde zw. Proskau und Dombrowka v. Grabowski gef. Gesenke b. Thomasdorf* und im *Kessel.* Juni. 2.

Stängel 1' h. Bltt. gross. Kronenbltt. weiss.

P. minor L. Staubgef. gegeneinander geneigt; Griffel gerade, senkrecht; Narbe 5 zählig doppelt so breit als der Griffel.

In Nadelwäldern und Laubwäldern bis an das Hochgebirge. Um Br. bei *Mahlen u. Lissa. Ohlau, Wohlau, Bunzlau, Lüben.* Im ganzen Vorgeb. zerstreut. Bei *N. Berbisdorf, Stonsdorf* u. im *Riesengrunde* nach N. v. E. Im *Kessel im Geseuke.* Um *Trop.* u. *Te.* Juni. 2.

Stängel 6 - 8" h. Blätter kleiner als an der vorigen. Blüten klein, Kronen weisslich oder blass-fleischfarben, Traube dicht.

P. secunda L. Birnbäumchenkraut. Traube einseitwendig.

In Nadel- und Laubwäldern in der Ebene und dem Vorgeb., besonders in Buchenwäldungen, d. d. g. G. nicht selten. Um Br. bei *Lissa, Mahlen, Skarsine* u. m. Mai, Juni. 2.

Stängel bis zur Hälfte beblättert, 2 - 5" h. Bltt. eif., gesägt. Kronenbltt. länglich, grünlich-weiss.

P. uniflora L. Stängel einblumig.

In dunklen moosigen Laub- und Nadelwäldern, auch Erlenbrüchen der höheren Ebene und des Vorgebirges zerstreut. Um Br. bei *Skarsine. Riemberg. Ohlau. Wohlau. Zobtenberg. Strehleiner Berge. Henschelkoppe b. Neurode. Hausdorfer Gebirge. Krauschen und Greulich bei Bunzlau.* Am hohen B. bei *Conradswaldau. Riesengebirge. Oppeln. Lissa Hora.* Juni. 2.

Stängel blattlos, mit einer Schuppe, 1 - 3" h. Bltt. fast kreisrund, sägesählig. Blume milchweiss. Staubgef. paarweise genähert, Staubfäden dreikantig. Kapselspalten kahl.

P. umbellata L. *Chimophila umb.* Pursh. W. et Gr. sil. Blüten schirmförmig.

In Nadelwäldern der Ebene und des Vorgeb. d. d. g. G. zerstreut. Um *Br. b. Mahlen, Trebnitz, Riemberg, Klitschdorf b. Bunzlau, Malschwitz b. Beuthen.* Am schwarzen Berge bei Charlottenbrunn. *Gr. Glaz* bei Rückerts, *Langenau, Leobschütz.* Häufig um *Trop.*, selten um *Te.* Juni, Juli. 2.

Stängel ansteigend, 6 - 10'' h. Bltt. in der Mitte des Stängels in 1 - 2 unregelmässigen Wirteln, spathelfg., gesägt, dicklederig, oberseits glänzend, dunkelgrün. Blumen übergeneigt. Kronen rosa-purpurn. Die Bltt. sind süsslich-bitter, adstringierend.

4. *Monotropeae.* Kelch 4-5blättrig. Krone aus 4-5 freien Blättchen am Gr. mit sackförmigen Vertiefungen. Acht oder zehn Staubgefässe, davon abwechselnd 5 aus der Mitte zweier warzenförmiger Drüsen entspringen. Narbe trichterförmig. Kapsel 4-5fächerig bis zur Hälfte in 4-5 Klappen auf der Mitte der Fächer aufspringend. Samen in lockerer Schale.

Monótropa L. *Fichtenspargel.* Kelch 5blättrig. Kronenblätter 5, am Grunde höckerig. x, 1.

M. Hypopitys L. Traube vielblumig, Kronenbltt. feingezähnt. *α. glabra.* Alle Theile kahl. *M. glabra* Bernhardi.

β. hirsuta. Stängel oben weichhaarig, Kronenbltt., Staubgef. und Stempel behaart.

In feuchten Wäldern, und zwar *α.* in Buchenwäldern, bei *Lissa,* *β.* in Nadelwäldern, um *Br.* bei *Mahlen, Trebnitz, Riemberg.* Am *Grocheberge* bei *Frankenstein,* um *Fürstenstein, Cudowa, Oppeln.* Wird ferner um *Bunzlau* bei *Krauschen, Looswitz, Zeche, Tiefenfurth,* um *Charlottenbrunn, Kupferberg, Hirschberg, Trop.* und *Te.* angegeben. Juni, Juli. 2.

Eine Schmarotzerpflanze, die aus den Wurzeln der Nadelhölzer und anderer Bäume hervorbrechen soll. Alle Theile weissgelb, werden beim Trocknen braun oder schwarz. Der Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., mit eiförmigen Blattschuppen bedeckt, übrigens fehlen die Bltt. gänzlich. Die Blüthen in einer endständigen, dichten, überhängenden, zuletzt aufrechten Traube. Kronenbltt. länglich, röhrenf. zusammenneigend.

IV. DICOTYL. MONOPET. HYPO-GYNAE.

Die Blumenkrone einblättrig, frei aus dem Fruchtboden entspringend, dh. weder mit dem einblättrigen Kelche noch mit dem Fruchtknoten verwachsen. Die Staubgefässe entspringen stets aus der Kronenröhre.

Zu dieser Abtheilung gehört die ganze vierzehnte, der grösste Theil der zweiten, und ein Theil der fünften und vierten Klasse Linné's.

Oleinae Lindley.

Kelch 4 spaltig oder 4 zählig. Krone trichterförmig mit 4 spaltigem Saum, oder bis auf den Grund in 4 Kronenbltt. getheilt, mit klappiger Knospenlage. Zwei aus der Kronenröhre entspringende oder mit je einem Paar Kronenbltt. verwachsene Staubgef. Fruchtknoten mit zwei Fächern und je zwei hängenden Eichen. Frucht eine auf dem Rücken der Klappen aufspringende 2fächerige Kapsel oder eine 2-4samige Pflaume oder Beere. Samen mit fleischigem Eiweiss und geradem Keim.

Blume und Sträncher mit gegenständigen gestielten Bltt. ohne Stützbltt. Die Sippe *Frazinus* weicht sehr von den übrigen ab, welche kaum bei uns ursprünglich einheimisch sind.

Ligustrum L. Hartriegel. Kelch 4zählig. Krone mit 4spaltigem Saum. Zwei-4samige Beere deren Fächer mit einer freien Haut ausgekleidet sind. II, 1.

† *L. vulgare L. Rainweide.* Bltt. länglich-lanzettlich kahl; Blüten in endständiger straussförmiger Rispe.

An Zäunen, Hecken und Dämmen. Um *Br.* bei *Pöpelwitz* und *Pollenschine, Ohlau, Wohlau, Gnadenberg* u. *Gröditz* bei *Bunzlau, Charlottenbrunn, Hirschberg.* Um *Troppau*, n. a. d. *Horka* b. *Stremplowitz*; ist aber kaum an einem dieser Standorte als wirklich wild anzusehen. Juni, Juli. h.

Blumen weiss von süslichem Geruche. Beeren schwarz.

Syringa L. Flieder. Kelch 4zählig. Krone mit 4spaltigem Saum. Ein-2samige 2klappige Kapsel. II, 1.

S. vulgaris L. Türkischer Hollunder. Blätter herzförmig, zugespitzt.

Um Dörfer und Städte hie und da fast verwildert, aber nicht ursprünglich einheimisch. April, Mai. h.

Blumen in endständigen straussförmigen Rispen, weiss, röthlich oder violett, wohlriechend.

Fraxinus L. Esche. Kelch (3-4theilig, oder) fehlend. Krone (3-4blättrig, oder) fehlend. Frucht eine flach-zusammengedrückte geflügelte Nuss. XXIII, 2.

F. excelsior L. Bltt. gefiedert, Blättchen sitzend lanzettlich-länglich zugespitzt, gesägt.

In Bergwäldern und an Flussufern, ausserdem häufig angebaut. Um *Br.* bei *Wildschütz*, im *Goß* bei *Kapsdorf*, bei *Plohmühle, Wildbahn* bei *Sulau, Tillendorf* u. *Warthe* bei *Bunzlau.* April. h.

Hoher Baum mit glatter Rinde, dicken Zweigen und grossen rosthäarigen Knospenschuppen. Die Blüten sind polygamisch, in rundlichen und länglich-runden Rispen

mit sitzenden Staubbeuteln und Stempeln an den Spitzen. Bltt. und Rinde sind bitter und zusammenziehend.

Asclepiadeae RBrown.

Kelch 5 theilig, stehenbleibend. Krone 5 spaltig mit dachziegelförmiger Knospenlage, abfällig. Fünf Staubgefäße aus dem Grunde der Krone entspringend; Staubfäden oft verwachsen. Der Pollen ist zu Massen von bestimmter Zahl und Form verbunden und hängt sich an die drüsigen Fortsätze der Narbe. Zwei Fruchtknoten mit zwei Griffeln die eine gemeinschaftliche schildförmig - fünfeckige Narbe mit drüsigen Ecken tragen. Zwei Schlauchkapseln mit einem Samenhalter an der Nath, der sich späterhin ablöst. Samen dachziegelförmig gereiht, hängend, meist mit einem Haarschopf, dünnem Eiweiss und geradem Keim.

Die dieser Familie eigenthümliche Gestalt des Inhalts der Staubbeutel kehrt nur bei den *Orchideae* wieder. Die meisten, zum Theil strauchartige und windende Gewächse, leben in wärmeren Ländern und enthalten einen scharfen Milchsaft nebst Cautschuk.

Cynanchum RBrown. *Schwalbenwurz*. Krone radfg. tief 5 spaltig. Die Staubfäden sind in ein 5 lappiges Krönchen verwachsen, dessen Lippen zwischen den Kronenzipfeln stehen. Zehn keulenförmige Pollenmassen. v, 2.

C. Vincetoxicum R. Br. *Asclepias Vinc.* L. Stängel aufrecht, Blumen in winkelständigen Schirmen.

In Gebüsch, Vorhölzern und Wäldern der Ebene und des Vorgebirges hin und wieder häufig, aber nicht überall. Um *Br.* häufig bei *Scheitnich*, *Oswitz*, *Schwoitsch*, *Lissa* u. v. a. *Ohlau*. *Wohlau*. *Bunzlau*, *Hirschberg*, *Oppeln* etc. Juni—Aug. 2.

Stängel $1\frac{1}{2}$ - 2' h., einfach. Wurzel knotig, mit starken Fasern, weiss. Bltt. gegenständig, eifg. mit langer Spitze, kurzgestielt, die oberen lanzettlich. Kronen weiss. Schlauchkapseln walzig-pfriemlich. Samen mit weissem Haarschopf. — Die frische Wurzel riecht stark, schmeckt scharf bitterlich und wirkt drastisch oder schwach-narcotisch.

Apocyneae RBrown.

Krone 5 spaltig mit schief-gedrehter Knospenlage. Staubfäden frei. Staubbeutel liegen auf der Narbe mit körnigem Pollen. Narbe köpf- oder scheibenförmig. Alles übrige wie bei den *Asclepiadeae*.

Vinca L. *Singrün*. Krone tellerförmig mit fünfeckigem Schlunde; Saumzipfel vorn schief gestutzt. Narbe scheiben-

förmig und darüber mit einem sternförmigen Haarschopf. Zwei Schlauchkapseln. V, 2.

V, minor L. Bltt. lanzettlich-elliptisch, die oberen beiderseits spitz; Stängel gestreckt kriechend, die Blütenäste aufrecht.

In Laubwäldern, besd. im Vorgebirge, zerstreut aber meist häufig und fleckenweise den Boden bedeckend, aber sehr selten blühend. *Skarsine*. Um *Ohlau* nach *Beilschmied*. *Kl. Zeche*, *Boberinsel* und *Giersdorf* bei *Bunzlau* nach *Schn.* *Hessberg* bei *Jauer*. *Rummelsberg* bei *Strehlen* vor *Pogart*. *Fürstensteiner Gr.* *Proskau*. *Teschen*. April, Mai. 2.

Bltt. lederartig, immergrün, am R. kahl. Kronen blau-violett. Als *Hb. Vincae Pervincae* waren die Bltt. officinell, von bitterlich-adstringirendem Geschmack. In Gärten werden *V. major* mit grösseren Blumen, und *V. herbacea* mit nicht wurzel-schlagenden Stängeln, gezogen.

Gentianeae Jussieu.

Kelch stehenbleibend. Krone 4-8spaltig, mit gewundener oder eingeschlagener Knospenlage. Staubgef. zwischen den Kronenzipfeln. Ein Fruchtknoten mit zwei theilweise oder ganz verwachsenen Griffeln. Frucht eine vielsamige 2 klappige Kapsel, die Samen an den Rändern der Klappen, oder bei eingeschlagenen Klappenrändern, wodurch die Kapsel zweifächerig wird, an 4 oder 2 oder einem mittelständigen Samenhalter (oder eine vielsamige Beere). Samen mit geradem Keim in der Axe des fleischigen Eiweisses.

Stauden oder Kräuter, mit meist gegenständigen, ganzrandigen Bltt. ohne Stützbltt., winkelständigem Blütenstand, schöngefärbten zahlreichen Blumen, von ausgezeichnet bitterem Geschmack. Sie lieben theils feuchten Boden, theils kühle Temperatur, daher besonders die Wiesen des Vor- und Hochgebirges.

1. *Menyantheae*. Fünf unverbundene oder zu einer Scheibe vereinigte Drüsen unter dem Fruchtknoten. Kronenzipfel mit eingeschlagener Knospenlage. Blätter wechselständig.

Menyanthes L. *Bitterklee*, *Fieberklee*. Krone trichterförmig, mit innen bärtigem Saume. Fruchtknoten auf einem gewimperten Ringe. Samen rund zusammengedrückt. V, 1.

M. trifoliata L. *Biberklee* (nach E. Meyer). Bltt. gedreit.

In Sümpfen und Torfmooren, sumpfigen Wäldern und an den Ufern stagnirender Flüsse, in der Ebene und dem Vorgebirge, d. d. g. G. hin und wieder, meist grössere Strecken überziehend und durch die söhliggen Wurzeln die Sümpfe befestigend. Um *Br.* bei *Bischwitz a. W.*, *Rothkretscham*, *Kl. Weigelsdorf*. *Riemberg*. *Wohlau*. *Seifersdorf* bei *Ohlau*. *Oppeln*. *Bunzlau* an vielen Orten. *Charlot-*

tenbrunn. Hirschberg. Gr. See an der Heuscheuer. Zossen, Zattig, Lindewiese. Um Teschen. Mai, Juni. 2.

Die söhliche, gegliederte, von Blattresten beschuppte Wurzel setzt sich in einen schief aufsteigenden Stängel fort. Bltt. 2-3 auf langen unten scheidigen Stielen, Blättchen breit-eifg., glänzend, etwas saftig. Ein winkelständiger langer Schaftstiel trägt eine längliche Aehre oder Traube mit kurzgestielten weisslich-rosaf. Blüten. Die Bltt. sind als *Hb. Trifolii fibrini* officinell, enthalten eine reine intensive Bitterkeit, und werden sowohl als Arzneimittel, als auch als Surrogat des Hopfens bei der Bereitung des Bieres angewandt.

Limnánthemum Gmelin Seekanne. Krone radförmig, mit bärtigem Schlunde. Fünf Drüsen zwischen den Staubgef. am Grunde des Fruchtknotens. Samen gerandet, gewimpert. V, 1.

L. nymphoides. Menyanthes n. L. Villarsia n. Ventenat W. et Gr. sil. Bltt. schwimmend, herz-kreisförmig, Blüten in achselständigen Schirmen.

In stehenden Wässern und Teichen. Um *Pless.* Nach älteren Angaben auch um *Liegnitz.* Juli, Aug. 2.

Stängel stielrund, gablig-getheilt. Bltt. lederartig. Kronen goldgelb. Kapsel elliptisch, langspitzig.

2. Gentianeae. *Fruchtknoten am Gr. ohne Drüsen. Kronenzipfel mit gewundener Knospelage. Blätter fast gegenständig.*

Sweetia L. Sweetie. Krone radförmig mit flachem Saum, 5 theilig, am Gr. jedes Zipfels zwei gewimperte Honigruben. Einfächerige Kapsel; Samen an den Klappenrändern. V, 2.

Bltt. wechselständig.

S. perennis L. Blumenstiele fast flügelig-vierkantig; Stängel einfach; Wurzelbltt. elliptisch.

Auf quelligen Abhängen und an den Bächen der Abhänge und Lehnen des Hochgebirges. Im Riesengeb. häufig, am *kl. Teiche*, in den *Schneegruben*, *Kesselkoppe* und *Kesselgrube*. *Weisse Wiese, Elb-, Riesen- und Melzergrund.* Im *Gesenke im Kessel*, von *Grabowski* gef. Juli, Aug. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h. Bltt. abwechselnd, wenige, kurz- oder lang-gestielt, etwas saftig. Krone stahlblau, gedüpfelt.

Gentiána L. Enzian. Kronenröhre walzig oder trichterfg.; Saum 5-9 spaltig. Staubbeutel nach dem Verstäuben unverändert. Einfächerige Kapsel; Samen an den eingeschlagenen Klappenrändern. V, 2.

Alle Arten sind bitter, haben gegenständige Bltt., schöngefärbte Blumen, und die meisten bewohnen höhere Gegenden oder nur das Hochgebirge.

a. Schlund der Krone kahl, Blumen in Quirlen.

G. punctata L. Blumen in Quirlen; Kronen 6spaltig mit glockiger Röhre; Bltt. nervig, die unteren gestielt elliptisch.

Auf den Kämmen und an den grasreichen Lehnen des *Gesenkes*, am *Hockschar*, auf der *Bründelhaide* und im *Kessel*. Juli, Aug. 2.

Stark und hoch, 1 - 1½' h. Stängel einfach mit 3 - 4 Blütenquirlen. Bltt. gross. Kelch glockig mit elliptischen aufrechten Zähnen. Kronen gelb, schwarzgedüpfelt. Die Wurzel wird wie anderwärts die der eigentlich officinellen *G. lutea* von den Wurzelgräbern des *Gesenkes* für die Officinen gesammelt und ihren, so wie den Bemühungen der reisenden Botaniker wird die Ausrottung der Pflanze an den angegebenen Standorten bald gelungen sein.

G. cruciata L. *Kreuzenzian*. Blumen in Quirlen; Kronen 4spaltig mit keulenförmiger Röhre; Bltt. lanzettlich, 3nervig, a. Gr. scheidenartig-verbunden.

In Vorgehölzen, an waldigen sonnigen Hügellehnen im Vorgebirge selten. Am *breiten Berge* bei *Striegau* von Schummel gef. Am *Annaberger*. Bei *Teschen*. Am *Tul* und bei *Lischna* bei *Ustron*. Am *Kitzelberge* bei *Kauffung* n. N. v. E. Juli, Aug. 2.

Stängel dicklich, aufsteigend, ½ - 1' h. Kronen azurblau. Wurzel und Kraut waren ehemals officinell.

b. Schlund der Krone kahl; Blumen einzeln winkelständig oder endständig.

G. asclepiadea L. Stängel vielblumig, Blumen gegenständig, Kronen 5spaltig; Bltt. aus eiförmigem Grunde lanzettlich.

In Wäldern und auf Waldwiesen des Hochgebirges doch in der untern Region desselben. *Tafelfichte* nach *Rabenhorst*. Im Riesengeb. häufig, z. B. oberhalb *Krumhübel*, an der *Seifenlehne*, um die *Schlingelbaude*, im *Melzergrunde*, oberhalb *Schreibershau*. Bei *Teschen* an der *Lissa Hora* und an der *Baranio*. Aug., Sept. 2.

Dicker schlüger Wurzelstock. Stängel 1 - 2' h. Kelch abgestutzt mit kurzen lanzettlichen Zähnen. Bltt. langspitzig, sitzend. Krone azurblau mit punktirtem Schlunde. Auch diese Art war ehemals officinell.

G. Pneumonanthe L. *Blauer Tarant*. Stängel vielblumig; Blumen gegen- oder wechselständig; Bltt. lanzettlich-linealisch stumpf.

Auf feuchten und fetten Wiesen, Waldwiesen, in der Ebene und am Fusse des Vorgebirges, nicht in allen Gegenden. Um *Br.* bei *Scheinich*, *Ottwitz*, *Lissa*. *Wohlau*. *Ohlau*. Am *Geiersberge*. *O.S.* um *Danbrau*, *Halbendorf*, *Ellgut*, *Karchwitz*. *Trop.* um *Herlitz*, *Meltsch*. Selten um *Te*. Aug., Sept. 2.

Stängel 1' h. Bltt. am Gr. scheidenfg.-verbunden, dreinervig, mit umgerolltem Rande. Kelch abgestutzt mit langen lineal-lanzettlichen Zipfeln. Krone mit keulig-glockenförmiger Böhre, sattblau mit Reihen grüner Punkte.

G. verna L. Wurzel vielköpfig mit Blätterrosetten und einblüthigen Stängeln; Blätter elliptisch spitz.

Auf feuchten und quelligen Stellen des Hochgebirges. Am *Peterssteine* und im *Kessel* im *Gesenke* zuerst von v. Mückusch entdeckt. Juni, Juli. ☐.

H. 2 - 3". Stängel mit 2 - 3 Blätterpaaren, aufsteigend. Kelch 5spaltig, mit geflügelten Ecken. Krone sattblau, mit walziger Röhre.

G. ciliata L. Blumen endständig; Krone vierspaltig mit gewimperten Zipfeln; Bltt. lineal-lanzettlich.

Auf sonnigen Hügeln und Bergwiesen im Vorgebirge. Um *Charlottenbrunn* auf den *langen Brachen* und um *Reimswaldau*. Um *Langenbielau* am *langen Berge* etc. *Zeisburg*. *Cudowa*. *Reinerz*. *Wölfelsdorf*. *Kitzelberg* bei *Kauffung*. Um *Gnadenfrei* n. *Wenck*. *Stremplowitz* und *Saubsdorf*. Häufig um *Teschen*. Juli—Sept. ☐.

Stängel etwas aufsteigend und bogig, $\frac{1}{2}$ - 1' h., meist 1 - 3blumig. Krone himmelblau.

c. Schlund der Krone bärtig, durch je eine in wimperige Fetzen zerschlitzte Schuppe am Grunde der Kronenzipfel.

G. campestris L. Krone 4spaltig; die Kelchzipfel ungleich, die beiden äusseren breit-elliptisch; Blätter eilanzettlich, die Wurzelbltt. verkehrt-eifg., gestielt.

Auf Wiesen und Triften im Vorgebirge. Um *Bunzlau* n. *Schn*. *Reichenbach*. Um *Charlottenbrunn* bei *Lehmwasser*, *Donnerau*, *Bärengrund*. *Landeshut*. *Warmbrunn*. *Schmiedeberg*. *Ustron*. Aug., Sept. ☉.

Stängel aufrecht, 3 - 5" h. Blumen winkelständig gegenüberstehend, einzeln oder auf 3bluthigen Aesten, gestielt. Kronen blau.

G. germanica Willdenow. Kronen 4spaltig; Kelchzähne gleichgross; Bltt. sitzend, länglich, spitz; Wurzelbltt. verkehrt-eifg., gestielt; Fruchtknoten unten stark verengert.

Auf fruchtbaren und etwas feuchten Wiesen im Vorgebirge zerstreut. Um *Charlottenbrunn* am *Blockberge*, bei *Tannhausen*, *Bärengrund*. *Salzbrunn*. *Kupferberg*. Bei *Lahn* nach v. *Flotow*. *O. Schmiedeberg*. Bei *Reinerz*. Am *Hummelschlosse*. *Raase*, *Meltsch*, *Jägerndorf*, *Zossen*. Juli—Sept. ☉.

Stängel aufrecht, 4 - 6" h. Kronen azurblau. Man findet oft von der Wurzel aus vielstängelige Exemplare, welche dadurch entstehen, dass der Hauptstängel bei der Heuernte abgeschnitten wurde. Reichblumig.

G. Amarella L. Kronen 5spaltig; Kelchzähne gleichgross; Bltt. sitzend aus einem breiten halbumbfassenden Grunde lanzettlich-langspitzig; Wurzelbltt. länglich, gestielt; Fruchtknoten unten kaum verengert.

Auf feuchten Wiesen in der Ebene. Zwischen *Gr. Weigelsdorf* und *Schleibitz*. *Wiesen* vor *Lissa*. *Koberwitz*. Aug., Sept. ☉.

Stängel aufrecht, 4 - 6" h., bald einfach, bald mit aufrechten Aesten. Diese ist der vorigen Art sehr ähnlich, hat aber fast um die Hälfte kleinere Blumen und lilaf. oder blass-violette Kronen. Eine ähnliche Form mit etwas kürzeren stumpfen Bltt. und kurzen Kronenzipfeln wächst auf dem Gipfel des *Zobten*, und andere zu dieser oder der vorigen gehörige Formen wurden anderwärts beobachtet.

Erythraea R. Richard. Tausendguldenkraut. Krone trichterförmig mit 5spaltigem Saum. Staubbeutel nach dem Verstäuben schraubenförmig gewunden. Samen an den eingeschlagenen Klappenrändern. v, 2.

E. Centaurium Persoon. Gentiana Cent. L. Stängel einfach, Blumen in endständiger büschelförmiger Doldentraube.

Auf sonnigen Triften in lichten Gehölzen und Haiden, d. d. g. G. in der Ebene und dem Vorgeb., doch nirgends sehr häufig. Um *Br.* bei *Oswitz, Schwoitsch, Lissa* u. m. Juni, Aug. ☉.

Stängel steif aufrecht, 4eckig, 1' h. Wurzelbltt. rosettenfg., oval-länglich, 5nervig. Kronen sattrosaf. mit weisslicher Böhre, nur vor Mittag bei Sonnenschein ausgebreitet. Die blühenden Spitzen als *Summitates Centaurii minoris* officinell, von ausgezeichneter Bitterkeit, im Thee aufguss ein beliebtes Hausmittel.

E. pulchella Fries. E. ramosissima Persoon. Stängel niedrig vielästig; Blätter oval; Blumen winkel- und achselständig.

Auf feuchten Triften und Brachäckern, an Gräben, d. d. g. G. in der Ebene und dem Vorgeb. hin und wieder. Um *Br.* bei *Krittern, Gr. Rake, Weigelsdorf. Ohlau. Wohlau. Bunzlau. Hirschberg. Oppeln.* Aug., Sept. ☉.

H. 1 - 6". Der Stängel löst sich ganz in Aeste auf. Blumen kurzgestielt, rosa-purp. oder weiss. Kronenröhre weiss, weit über den Kelch hervorragend.

Convolvulaceae Juss.

Krone regelmässig, mit lappigem Saum, und faltig-zusammengedrehter Knospenlage. Fünf freie Staubgef. zwischen den Zipfeln. Fruchtknote auf einer drüsigen Scheibe, 2-4 fächerig, mit je 1 oder 2 aufrechten Elchen. Ein bisweilen getheilter Griffel. Ein-4 fächerige Kapsel mit unvollständigen Scheidewänden im Grunde. Samen im inneren Winkel mit wenigem schleimigen Eiweiss und gekrümmtem Keim.

Kräuter oder Stauden mit windendem Stängel und wechselständigen, selten gar keinen Bltt., ohne Stützbltt.; meist einen bittern, auch scharfen und drastischen Milchsaft, besonders in der Wurzel führend. Die meisten in warmen Ländern heimisch.

Convolvulus L. Winde. Krone trichter-glockenfg., eckig-5lappig, mit 5 Falten. Griffel ungetheilt mit 2 Narben. Die Kapsel springt den Scheidewänden gegenüber auf. v, 1.

C. sepium L. Zaun-W. Bltt. pfeilförmig, mit abgestutzten gezähnten Ohren; Kelch von zwei herzförmigen Deckbltt. eingeschlossen.

In Gebüsch und Gesträuch besd. in Weidengebüsch an feuchten Orten, am Ufer von Gewässern und Gräben, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juli—Sept. 2.

Stängel windet sich im Gesträuch empor, bis 4 und 5' h. Blumenstiele vierkantig, einblumig; Krone gross, sahneweiss, geruchlos, nach dem Verblühen sich zu einem ringförmigem Wulst einrollend und abfallend.

C. arvensis L. *Acker-W.* Bltt. pfeilförmig mit spitzen Ohren; Deckbltt. von der Blume entfernt.

Auf Aeckern, Brachen, grasigen Dämmen, trocknen und sandigen Grasplätzen d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juni, Juli. ☉

Niederliegend und zwischen niedrigen Gewächsen sich fort oder emporwindend, bald kürzer, bald länger, kahl oder feinhaarig. Blumenstiele winkelständig, meist einblumig. Kronen weiss oder rosa, nur bei Sonnenschein geöffnet, wohlriechend. Die Bltt. ändern in der Breite ab.

Cuscuta L. *Flachsseide.* Kelch 4 - 5 spaltig. Krone glockig oder krugfg., 4-5 spaltig. Ein oder 2 Griffel. Kapsel rundum aufspringend. IV, 2.

Windende, parasitische Gewächse ohne Bltt. mit fadenförmigem Keim, fadenförmigen, meist durch einandergeschlungenen Stängeln, welche mit saugnapfartigen Luftwurzeln die Stängel anderer Gewächse umschlingen. In der Kronenröhre befinden sich unter den Staubgefässen schuppenförmige Blättchen.

C. europaea L. Aestig; Kronenröhre walzig so lang als der Saum, mit aufrechten der Röhre anliegenden Schuppen; Narben fädlich.

In Gebüsch und Gestrüpp besonders an Flussufern, d. d. g. G. auch hie und da im Vorgeb. häufig, doch nicht überall, auf Weiden, jungen Pappeln, Nessel, Hopfen, Rainfarn, Hanf, Aconitum u. a. Juli, Aug. ☉

Stängel von der Dicke eines dünnen Bindfadens, meist rüthlich, glasartig-glänzend, wie bei allen Arten. Blumen in dichten Knäueln. Kapseln eifg.

C. monogyna Vahl. *C. lupuliformis* Krocker. Aestig; Blumen in Aehren; Kronenröhre walzig doppelt so lang als der Saum, mit aufrechten der Röhre anliegenden Schuppen und einer Narbe.

Wie die vorige und auf denselben Pflanzen, nur hin und wieder in der Ebene. Um Br. häufig bei Neuscheinich, Marienau, Pöpelwitz, Oswitz, Strachate u. m. Carolath n. Beilschmied. Bobergebüsche bei Bunzlau n. Schn. Juni, Juli. ☉

Stängel etwas dicker als an der vorigen, roth. Blumen zuletzt gestielt, mit kleiner Deckschuppe. Kapsel eifg., gross.

C. Epilinum Weihe. Einfach; Kronenröhre fast kugelig doppelt so lang als der Saum, mit aufrechten der Röhre anliegenden Schuppen.

Im Lein, in der Ebene und dem Vorgeb. hin und wieder, bisweilen ganze Felder zerstörend. Um Br. bei Schweinern, Skarsine. Ohlau. Wohlau. Bunzlau. Striegau. Salzbrunn. Schmiedeberg. Juli, Aug. ☉

Stängel von der Dicke starken Zwirns. Kapsel kugelig.

C. Epithymum L. Aestig; Kronenröhre walzig so lang als der Saum durch die zusammenneigenden Schuppen geschlossen; Narben fädlich.

Auf freien Wald- und Haideplätzen, auf niedrigen Pflanzen z. B. Haidekraut, Quendel, Ginster u. a. hie und da. Um Br. bei *Lissa*. Breiter B. bei *Strigau*. *Charlottenbrunn*. Juli, Aug. ☉.

Stängel fädlich. Blumen dick-gehäuft.

Boragineae Jussieu.

Kelch 4-5spaltig, regelmässig oder unvollkommen zweilippig; zwischen den Zipfeln häufig Schuppen oder Haarbüschel am Schlunde. Fünf Staubgef. aus der Kronenröhre, zwischen den Zipfeln. Der Fruchtknoten auf einer Scheibe, die sich oft in Form einer Mittelsäule verlängert, aus vier an einander liegenden oder der Mittelsäule anhängenden Fruchtblättern mit 1 oder 2 Fächern und je einem hängenden Ei bestehend. Griffel einfach aus der Mittelsäule oder Scheibe entspringend mit meist kopfförmiger Narbe. Frucht: vier vom Kelche eingeschlossene Nüsschen. Same ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Kräuter oder Stauden, mit wässerigem Saft, wechselständigen, grösstentheils ranhaarigen (dh. auch *Asperifoliae* genannt) ungeheilten und ganzrandigen Bltt. ohne Stützbltt. Die Blumen stehen mit wenigen Ausnahmen in einfachen oder gabelig-getheilten, vor dem Blühen umgerollten Trauben. Bei mehreren ändern die Blumen während des Blühens ihre Farbe. Die meisten Arten im wärmeren Theile der gemässigten Zone; bei uns leben nur wenige Arten in höheren Gegenden und keine ist diesen eigen thümlich; manche sehr zahlreich und weit verbreitet. Sie enthalten, zumal in den Bltt., viel Schleim und etwas adstringirenden Stoff, einige in der Wurzel Farbestoff. Sämmtlich bei Linné in V, 1.

Cerithe L. Wachsblume. Krone fast walzig, ohne Schuppen im Schlunde. Staubbeutel pfeilfg., am Gr. verbunden. Zwei 2fächerige freie Nüsse.

Kraut fast kahl.

C. minor L. Kronen bis $\frac{1}{2}$ 5spaltig, mit aufrecht-gegeneinander geneigten Zähnen; Staubfäden 4mal kürzer als der Staubbeutel.

Auf Grasplätzen, an Hecken, Dämmen, Weg- und Ackerrändern, hie und da in der Ebene. Um Br. bei *Pilsnitz* und *Masselwitz*, *Zweibrod*t, *Koberwitz*. An der Strasse nach *Strehlen* und *Schweidnitz*. Um *Oppeln*. Selten um *Trop.*, häufig um *Te.* Mai, Juni. ☉.

Wurzelbltt. länglich-verkehrt-eifg., mit weisslichen Flecken; Stängelbltt. breit, zungenfg., ohrfg.-umfassend, grau, bläulich-grün, etwas fettig. Stängel aufrecht, 1' h. mit einigen beblätterten Ähren an der Spitze. Kronen gelb.

Echium L. Natterkopf. Krone trichterförmig mit schiefer fast 2 lippigem Saum, ohne Schuppen am Schlunde. Staubbeutel oval, frei. Vier freie Nüsse auf ebener dreieckiger Scheibe.

E. vulgare L. Frauenkrieg. Bltt. lanzettlich; Kronenröhre kürzer als der Kelch; Staubgef. niedergebogen am Saum anliegend.

Auf sonnigen trocknen Stellen an Wiesen und Dämmen, auf Sandplätzen und sandigen Brachen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein, bisweilen ganze Felder bedeckend, welche in der Ferne davon blau erscheinen, z. B. um *Schweinern* und *Schäbitz* bei *Br.* Juni bis Sept. ☉.

Stängel 1 - 3' h. von steifen, aus einem schwarzen Knütchen entspringenden, Borsten raub. Wurzel spindelig, sehr lang. Kronen blau, rosaf. oder weiss.

Lithospermum L. Steinsame. Krone trichterfg. mit 5 kurzen Schuppen am offenen Schlunde. Vier freie Nüsse auf ebener Scheibe.

L. officinale L. Stängel sehr ästig; Blätter lanzettlich, scharf; Nüsse glatt.

In Gebüsch. Um *Br.* bei *Wirwitz* von mir und bei *Treschen* von Schummel gef. Wird bei Schn. auch aus der Gegend von *Charlottenbrunn* u. *Salzbrunn* angegeben. Mai, Juni.

Stängel 1 - 2' h., dicht beblättert. Bltt. breit, lanzettlich, geadert. Kronen weiss. Nüsse glänzend-weiss, knochenhart, als *Sem. Mili Solis* officinell, mit öligem Kern.

L. arvense L. Bauernschminke. Rhytispermum arv. Wimm. Fl. v. S. Stängel oben ästig, Bltt. lineal-lanzettlich; Nüsse runzlich.

Auf Aeckern, Brachen und Sandplätzen, d. d. g. G., auch im Vorgeb. gemein und in Menge. April, Mai. ☉.

Wurzel spindelig, mit rother abfärbender Rinde. Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., einfach oder vom Grunde mit 1 oder mehreren aufsteigenden Nebestängeln. Bltt. seidenartig-grau. Kronen gelblich-weiss, selten bläulich.

Pulmonaria L. Lungenkraut. Krone trichterförmig mit 5 Haarbüscheln am offenen Schlunde. Vier freie Nüsse auf ebener Scheibe.

Blumen polygamisch. Vgl. die Anmkg. zu den *Sileneae*.

P. officinalis L. Wurzelbltt. gestielt, herzfg.; untere Stängelblätter länglich, die oberen ein wenig herablaufend; Stängel mit Borsten und Drüsenborsten besetzt.

In Vorgehölzen und lichten Laubwäldern besonders in der höheren Gegend der Ebene und d. d. g. Vorgeb., im ganzen Gebiet verbreitet und zahlreich. Um *Br.* bei *Bischofswalde*, *Lissa*, *Goi bei Kapsdorf* und durch die *Trebnitzer Hügelreihe*. März, Mai. ♄.

Wurzelstock dick, vielköpfig mit einem Blüthenstängel und seitlichen Wurzelbüscheln. Bltt. rauhaarig, bisweilen mit blassen Flecken. Kelch glockig. Kronen am Schlunde bauchig, zuerst röh, dann purpurviolett. H. $\frac{1}{2}$ - 1'.

P. angustifolia L. P. azurea Besser! Prim. Fl. galic. Wurzelbltt. elliptisch-lanzettlich in den Stiel verschmälert; Stängelbltt. untere am Gr. verschmälert, obere etwas herablaufend, lanzettlich oder linealisch.

Auf Waldwiesen und in lichten Vorhölzern in der Ebene und d. Vorgeb. hie und da. Um Br. bei *Lissa* und *Arnoldsmühl*. *Striegau*. Gr. *Herlitz*. *Gesenke*. *Malapane* und *Königshuld*. Um *Charlottenbrunn* und *Kupferberg* nach Schn. *Horka b. Herlitz* und *b. Jägerndorf*. März, Mai, etwas später als die vorige. 2.

Bltt. mit seidenartigen, Stängel mit abstehenden Haarborsten, $\frac{1}{2}$ -1' h. Nach ihrem Standort und dem Alter ändern die Bltt. in ihrer Breite ab. Krone blaurothlich, nachher saftsaublau.

Myosótis L. Vergissmeinnicht. Krone trichter- oder tellerförmig mit flachgewölbten Schuppen welche den Schlund verschliessen. Vier freie Nüsse, welche am Grunde mit einem Plättchen der Scheibe aufsitzen.

Blumen ohne Deckbltt., wahrscheinlich polygamisch. Linné begriff die meisten unserer Arten unter seiner *M. scorpioides*.

M. palustris Withering. Kelch 5zählig, mit anliegenden Haaren, bei der Fruchtreife offen; Griffel so lang als der Kelch; die unteren Stängelblätter länglich-lanzettlich, etwas spitz; Stängel eckig; Wurzelstock schief, kriechend.

An feuchten und nassen Plätzen, in Gräben, an Sumpf-, Lachen-, Teich- und Flussrändern, auf sumpfigen Wiesen und Waldplätzen, d. d. g. G. bis auf das Hochgeb. gemein. Mai — Juli. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ -3' h., mit anliegenden oder abstehenden borstlichen Haaren. Die Kronen sind von verschiedener Grösse, bald schwach-wohlriechend, bald geruchlos, erst rosafleischf., dann himmelblau, selner stets rosaf. oder weiss. Soll als Futter den Schafen nachtheilig sein.

M. caespitosa Schultz. Kelch 5spaltig mit angedrückten Haaren, bei der Fruchtreife offen; Griffel ganz kurz; Wurzelbltt. zungenfg., untere Stängelbltt. linealisch-länglich, stumpflich; Stängel stielrund undeutlich gerandet; Wurzel absteigend stark-faserig.

In Gräben und an Lachenrändern. Um Br. bei *Karlowitz* u. am *Fuchsberge bei Schwoitsch*. Um *Ohlau v. Beilschmeid* mitgetheilt. Ausserdem werden bei Schn. *Warthe*, *Uttig*, u. *Kroischwitz b. Bunzlau*, *Wohlau u. Hirschberg* angeführt. Ist jedenfalls viel seltner als die vorige. Juli — Sept. ☉.

Der vorigen sehr ähnlich, scheint aber eine wirklich verschiedene Art zu sein. Kelch tiefer getheilt, mehr glockig. Kronen stets klein. Trauben sehr lang u. schlaff.

M. sylvatica Hoffmann. Kelche tief 5theilig mit abstehenden Haaren, wovon die untersten söhlig stehen und hakenförmig sind; Kelchzipfel bei der Fruchtreife gegeneinander-geneigt; Fruchtstiele so lang oder länger als der Kelch; Kronensaum flach.

β. alpestris. Niedriger mit kürzeren Trauben und dichterem Behaarung. *M. alpestris* Schmidt. W. et Gr. ail.

In Gehölzen und Wäldern auf trockenem und feuchtem Grund in der höheren Ebene und durch das ganze Vorgebirge, im ganzen Gebiet, meist grosse Strecken bedeckend. Um *Br. im Goi b. Kapsdorf, Lissa, Trebnitzer Hügel etc.* β . im Hochgebirge: in der kleinen *Schnee-grube*. Mai — Juli. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$ h., oft mehrere rasenförmig aufsteigend. Kraut von Haaren grauschimmernd. Kronen azurblau, bald mit, bald ohne Geruch. Diese Art steigt an manchen Stellen bis in die Hochgebirge, wo sie niedriger, gedrungener, dichthaariger und mit grösseren Kelchen erscheint. Ich sah in der *Schnee-grube* selbst den Uebergang in die gewöhnliche Form.

M. intermedia Link. Kelche tief 5 theilig, bei der Fruchtreife geschlossen mit abstehenden Haaren, die untersten söhlig und hakenförmig; Fruchtstiele abstehend, doppelt so lang als der Kelch; Kronensaum hohl.

Auf Acker- und Gartenland, in Hecken an Dämmen und in Büschen auf steinigen Plätzen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juni, August. ☉.

Stärker und höher als die folgenden Arten, zu denen sie durch kleinere Kronen den Uebergang bildet. Stängel meist rasenförmig, 1 - $1\frac{1}{2}$ h. Bltt. länglich-lanzettlich von dichten Haaren grau. Kronen blau.

M. hispida Schlechtendal. Kelche 5spaltig, bei der Fruchtreife offen, mit abstehenden Haaren, die untersten söhlig und hakenförmig; Fruchtstiele söhlig-abstehend, so lang als der Kelch.

An Dämmen und Zäunen, in Grasgärten und Gebüschchen, hie und da in der Ebene und d. Vorgeb. Um *Br.* bei *Rosenthal* am Oderdamme, *Kl. Tschansch, Wildschütz, Lissa* u. m. Mai, Juni. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h. Bltt. grau mit lauter geraden Haaren. Kronen sehr klein, blau.

M. versicolor Persoon. Kelche tief 5spaltig, bei der Fruchtreife geschlossen, haarig, die untersten Haare söhlig und hakenförmig; Fruchtstiele kürzer als der Kelch; Trauben gestielt.

An Ackerrändern, auf kiesigen Triften und Flussufern, in Gebüschchen, auf Brachen in d. Ebene u. d. Vorgeb. nicht selten. Um *Br.* bei *Carlowitz, Lilienthal, Gr. Tschansch, Wildschütz, Lissa* etc. Mai, Juni. ☉.

H. $\frac{1}{2}$. Ausser der grauen Behaarung haben die Bltt. längs des Randes noch einzelne längere Wimperhaare. Kronen erst gelb, dann blassroth, zuletzt himmelblau.

M. stricta Link. Kelche tief 5spaltig, bei der Fruchtreife geschlossen, haarig, die untersten Haare söhlig und hakenförmig; Fruchtstiele kürzer als der Kelch; Trauben am Grunde beblättert.

Auf Aeckern, Triften, Brachen, Sandplätzen; d. d. g. G. gemein. Diese Art ist die häufigste, oft heerdenweise über grosse Brachfelder verbreitet. April—Juni. ☉.

Stängel meist in dichten Rasen, $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ h. Grau von dichten Haaren. Bltt. auf der Unterseite mit hakenförmigen Haaren. Kronen sehr klein, blassblau.

M. sparsiflora Mikan. Kelche tief 5spaltig, haarig, die untersten Haare söhlig und hakenfg.; Trauben armbüthig; die unteren Fruchtsiele viel länger als der Kelch, abwärts gebogen.

Auf Grasplätzen an Grabenrändern und in feuchten Gebüsch an Dämmen und Hecken; in der Ebene zerstreut. Um *Br.* bei *Rosenthal* am Oderdamme, an Grabenrändern vor *Gräbschen*, *Wildschütz*, *Lissa* im Park, *Schön-Ellgut*, *Massewitz*, *Heydewilzen* und *Kl. Totschen-Ohlau*. *Wohlau*. Mai, Juni. ☉.

Grün. Stängelbltt. länglich-lanzettlich, spitz. Weilschweißg-ästig und schlaf, sehr schnell welkend. Kronen blassblau. Gleicht dem *Omphalodes scorpioides*.

Echinosperrnum Swartz. *Igelsame*. Krone tellerfg. mit flachem Saum und flach-gewölbten Schuppen die den Schlund verschliessen. Nüsse an einer vierkantigen spitzigen Mittelsäule hängend, dreikantig, am Rande stachelig.

E. Lappula Lehmann. *Myosotis Lapp*. Linné. Fruchtsiele aufrecht.

Auf Mauern, Dächern und Steinhaufen nur an einigen Stellen des Gebietes. In *Strehlen*, *Striegau* und *Nimptsch* auf den Stadtmauern und Dächern. Am *breiten Berge* bei *Striegan*. In *Peilau*. Um *Oppeln*. *Burgberg* bei *Jägerndorf*. *Schlossberg* bei *Teschen*. Mai, Juni, auch im Herbst. ☉.

Mit seidenartig-graunem Ueberzug. Stängel aufrecht, 1' h., oben ästig. Bltt. lanzettlich, mit anliegenden Haaren. Nüsse gekörnt, am Rande mit zwei Reihen pfeilförmiger weicher Stacheln. Kronen azurblau.

E. deflexum Lehmann. *Myosotis deflexa* Wahlenberg. Fruchtsiele zurückgeschlagen.

An steinigcn sonnigen Hügelwänden im Vorgebirge. Am *Uhu-stein* bei *Einsiedel* im Gesenke von *Treviranus* entdeckt. Juni. ☉.

Stängel von der Mitte an ästig. Bltt. lanzettlich mit abstehenden Haaren. Nüsse mit einer Reihe pfeilförmiger Stacheln.

Cynoglossum L. *Hundszunge*. Krone trichterförmig mit aufrechten den Schlund zum Theil verschliessenden Schuppen. Vier oberseits abgeplattete stachelige Nüsse an einer vierkantig-zugespitzten Mittelsäule.

C. officinale L. Blätter dünn-graufilzig, untere elliptisch in einen Stiel verschmälert, obere lanzettlich-halbunfassend; Nüsse gerandet.

An Wegen und Landstrassen, trocknen Dämmen, an Dorfzäunen und in Waldgegenden in der Ebene. Um *Br.* in der *Odervorstadt* b. *Polnisch-Neudorf* und weiter an der Strasse nach *Hundsfeld*. In Dörfern an der Strasse nach *Schweidnitz* und in *O. S.* um *Oppeln*. Um *Ohlau*, *Wohlau*, *Bunzlau*. In Waldgegenden bei *Trachenberg*. *Trop. u. Te.* Mai, Juli. ☉.

Stängel aufrecht, 3' h. Krone schmutzig blutroth. Nüsse mit pfeilförmigen weichen Stacheln. Schimmel fand auch um Br. die Varietät mit weissen Kronen und röthlichen Schuppen. Die Pflanze riecht frisch unangenehm, nach Mäusen. Die Wurzel ist schleimig und war früher, wie auch das zu erweichenden Umschlägen dienliche Kraut officinell.

Omphalodes Tournefort. Gedenkemein. Krone tellerförmig, mit Schuppen welche den Schlund verschliessen. Vier oben eingedrückte mit einem verengerten häutigen Ringe versehene an der stielrunden Mittelsäule angeheftete Nüsse.

O. scorpioides Lehmann. *Cynoglossum* sc. L. Stängel niederliegend; Wurzelbltt. spathelfg. obere lanzettlich; Blumenstiele winkelständig einblumig.

In sonnigen Gehölzen in der höheren Ebene und dem Vorgebirge. Bisher nur am *Weinberge* bei *Skarsine* und am *langen Berge* bei *Donnerau*, an beiden Orten zuerst von Schimmel gef. April, Mai. ☉.

Stängel oben gabelig, zuletzt vielästig, schwach, bis 1' lang. Bltt. von zerstreuten kurzen Haaren schärflich. Kronen blass-himmelblau. Fruchtsiele niedergebogen.

Asperugo L. Scharfkraut. Kelch 5spaltig mit 2 Zähnen in jeder Bucht. Krone trichterfg. mit stumpfen den Schlund verschliessenden Schuppen. Nüsse an der vierkantigen Mittelsäule hängend und von dem vergrösserten zusammengedrückt-2blättrigen Kelche umgeben.

A. procumbens L. Schlangenäugel.

An Aeckern und Kräutereien, an Zäunen, Gräben und um Dunghaufen. Um Br. in den Vorstädten um *Neudorf*, *Gräbschen*, *Höfchen* etc. *Wohlau*, *Beuthen a. O.* Selten um *Trop.* Mai, Sept. ☉.

Stängel eckig, lang-ästig, mit krummen weichen Stacheln. Bltt. länglich, vorn breiter, 2-3 nahe bei einander sitzend, mit Stachelborsten am Rande und Kiele. Blumen den Bltt. gegenüber, fast sitzend zu 2-3. Kronen klein purpurblau. Hängt sich an, fast wie *Galium aparine*.

Borago L. Boretsch. Krone radförmig mit stumpfen aufrechten Schuppen am Schlunde. Staubfüden zweiarmig, der innere kürzere trägt den Staubbeutel. Staubbeutel kegelförmig gegen einander geneigt. Vier freie unten ausgehöhlte mit einem verdickten Rande umgebene Nüsse auf schwach gewölbter Scheibe.

B. officinalis L. Bltt. elliptisch, stumpf.

Einheimisch im Orient, bei uns nicht selten gebaut u. in Gärten gehalten, und daher hie und da scheinbar verwildert. Juni, Juli. ☉.

Stängel aufrecht, ästig. Bltt. wie der Stängel mit steifen Borsten besetzt, etwas saftig. Krone himmelblau. Staubbeutel schwärzlich. Die Bltt. haben einen erfrischen-

den Geruch und salzigen Geschmack, fast nach frischem Gurken, und enthalten verschiedene Salze; sie waren ehemals officinell.

Anchúsa L. Ochsenzunge. Kronenröhre gerade oder gekrümmt, mit flach gewölbten Schuppen welche den Schlund schliessen und napfförmigem Saum. Vier freie unten ausgehöhlte mit einem verdickten Rande umgebene Nüsse auf schwach gewölbter Scheibe.

A. officinalis L. und Matt. u. Krock sil. nebst *A. angustifolia* und *A. tinctoria* derselben. Mit gerader Kronenröhre.

Auf trocknen, sandigen und steinigen Plätzen, an Wegrändern u. Dämmen, hohen Brachen, Sandhügeln, Mauern d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juni—Aug. ☉.

Stängel aufrecht oder schief-aufsteigend, kstig, 1 - 2' h. Bltt. lineal- oder länglich-lanzettlich, eben oder am Rande wellig, dichter oder sparsamer mit weicheren oder stärkeren Haarborsten besetzt. Trauben mit Deckbltt., dichter oder lockerer, einseitwendig. Kronen zuerst roth, dann sammtblau oder violett, selten stets roth oder weiss. Kelch bald 5spaltig, bald 5theilig, mit Borsten oder kahl. Schmeckt fade-schleimig, die Blüthen etwas bitter. *Rad. et Flores Buglossi* waren officinell.

A. arvensis M. **Bieberstein.** *Lycopsis a.* Linn. **Liebäugel.** Kronenröhre in der Mitte gekrümmt.

Auf Aeckern unter der Saat und auf Brachen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juni—Aug. ☉.

Stängel aufrecht, meist einfach, 1' h., mit weissen steifen Borsten besetzt. Bltt. lineal-lanzettlich, schweifig-gezähnt, halbumbfassend, mit weissen Borsten. Krone himmelblau, innen roth, mit ungleichen Saumsipfeln.

Nonnia Medicus. Nonnie. Kronenröhre gerade. Schlund offen mit einem Haarkranz oder kleinen scharfen Schuppen umgeben; Saum tellerförmig. Vier freie unten ausgehöhlte mit einem verdickten Rande umgebene Nüsse auf flach-gewölbter Scheibe.

N. pulla De Cand. *Lycopsis p.* L. Matt. Krock. W. et Gr. sil. Stängel einfach; Bltt. lanzettlich mit angedrückten Haaren; Kronensaum so lang als die Röhre.

An Wegen. Um *Myslowitz*, *Pless* und *Troppau*. Nach Matt. um *Hirschberg*. *Ochab* bei *Te. n. Kotschy*. Mai, Juni. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., aufrecht. Bltt. ganzrandig. Kronen braun-purpurroth.

Symphytum L. Wallwurz. Krone walzen-glockenförmig mit fünfzähigem Saum, der etwas weiter als die Röhre ist, mit pfriemlichen, kegelförmig gegeneinander geneigten den Schlund verschliessenden Schuppen. Vier freie unten ausgehöhlte mit einem wulstigen Rande umgebene Nüsse auf flach-gewölbter Scheibe.

S. officinale L. Beinwell. Wurzel spindelig, ästig; Stängel ästig; Bltt. herablaufend, die unteren eilanzettlich in den Blattstiel verschmälert, die oberen lanzettlich.

Auf feuchtem und bewässertem Boden in Gestrüch und Wald, auf nassen Wiesen, an Graben-, Teich- und Flussrändern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Mai, Juni. ♀.

Wurzel braun, dick. Ganz borsthaarig. Stängel 2-3' h. Bltt. am Rande geschweift oder wellig. Der Kelch reicht bis an die Spitze der Krone. Kronen purpuroth oder rothblau. Eine Varietät mit weissen Kronen, wozu *S. tuberosum* Krock. sil gehört, ist manchen Stellen eigenthümlich, z. B. um *Bischofswitz a. W.* und *Weide bei Br.* Die Wurzel enthält viel zähen Schleim und war als *R. Consolidae majoris officinell.*

S. tuberosum L. Wurzelstock schief, ästig, mit knolligen Anschwellungen; Stängel einfach oder oben 2spaltig; Bltt. halb-herablaufend, die unteren eifg. in den Blattstiel verschmälert, die oberen elliptisch.

In feuchten Wäldern. Bei *Ohlau v. Beilschmied*, und um *Gröbnig bei Leobschütz von Schramm* gef. Um *Charlottenbrunn.* Um *Troppan* häufig. April, Mai. ♀.

Stängel 1' h., raubborstig. Die oberen Bltt. wenig kleiner als die unteren, scharfhaarig. Kelch reicht bis zur Hälfte der Krone. Krone weissgelb.

Solaneae Jussieu.

Kelch 5spaltig, häufig dauernd und mit der reifenden Frucht sich vergrößernd. Krone abfällig, mit faltig-gedrehter Knospelage, und fünftheiligem bisweilen ungleichförmigem Saum. Fünf Staubgefässe aus der Kronenröhre zwischen den Kronenzipfeln. Fruchtknoten zwei, zweifächerig. Ein Griffel mit fast zweilappiger Narbe. Frucht eine Kapsel oder Beere, 2fächerig oder durch Erweiterung der in der Axe der Scheidewand befindlichen dicken Samenhalter scheinbar-vierfächerig, mit je vielen Samen. Samen mit fleischigem Eiweiss und zirkelförmigem Keim.

Kräuter und Stauden mit wechselständigen Bltt. ohne Stützblätter; die obersten Zweige und Blütenstiele entspringen oft über den Blattwinkeln oder scheinbar denselben gegenüber. Die meisten haben ein düsteres Ansehen und dunkle Färbung, daher *plantae luridae* von Linné genannt, sind narcotisch und scharf und gehören zu den giftigen Gewächsen. Die meisten wachsen in der heissen Zone des neuen Continents; von den hier aufgeführten Arten kann man als ursprünglich einheimisch nur *Belladonna* und *Solanum Dulcamara* betrachten, da alle übrigen durch die Kultur eingeführt zu sein scheinen. Sämmtlich bei Linné in V, 1.

Solanum L. Nachtschatten. Krone radförmig. Staubbeutel kegelförmig-gegeneinandergeneigt, an der Spitze in ei-

nem Loche sich öffnend. Frucht eine vom unveränderten Kelch getragene Beere.

S. nigrum L. Schwarzer N. Bltt. ei-rautenförmig, schweifig- oder buchtig-gezähnt, die Blüten in schirmförmigen Trauben, die Fruchtstiele an der Spitze verdickt, niedergebogen.

α. *geminum*. feinhaarig, Bltt. buchtig-gezähnt, Beeren schwarz. *S. nigrum* Koch Syn. und der meisten Autoren.

β. *humile*. niedrig, fast kahl; Bltt. ganzrandig oder schweifig-gezähnt, Beeren grüngelb. *S. humile* Bernhadi.

γ. *miniatum*. behaart oder schwach zottig; Bltt. buchtig-gezähnt, Beeren roth.

Auf Acker- und Gartenland, an Hecken, Mauern, auf Schutt- und anderen unbebauten Plätzen, d. d. g. G. gemein, doch vielleicht erst mit der Agricultur eingeführt. Juni—Oct. ☉.

Stängel aufrecht, ästig, $\frac{1}{2}$ - 3' h., mit bald deutlichen, bald undentlichen Kanten und Hökern oder Weichstacheln. Bltt. eig., bald in das dreieckige, bald in das raufenförmige, Kr. klein, weiss. Beeren von der Grösse einer Erbse. Die schwach fleischigen Bltt. riechen unangenehm und bisweilen, besonders an einer stark haarigen Form mit tiefbuchtigen Bltt., moschusartig, von bitterlich-salzigem Geschmack, und nach dem Standort mehr oder minder schädlicher Wirkung. Die Behaarung, Gestalt der Blätter und Farbe der Früchte sind veränderlich und zwischen den oben angeführten Var. lassen sich in der Natur keine festen Gränzen ziehen.

S. Dulcamara L. Bittersüss. Stängel bogig; Bltt. eierzförmig, die oberen spießförmig; Blüten in sparrigen Doldentrauben; Beeren eiförmig.

An feuchten Orten zwischen Gebüsch, an Graben-, Teich- und Flussrändern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. zerstreut und einzeln. Juni. Aug. ♀.

Stängel kletternd, oft bläulich angelauten, 3 - 4' h., ganz kahl. Doldentrauben den Bltt. gegenständig. Kronen violett am Gr. gefleckt. Beeren roth. Die Stängel sind als *Stipites Dulcamarae* officinell und besitzen einen bittersüssen, reizenden Geschmack und schwach-narcotische Wirksamkeit. Auch die Beeren sind schavf.

* **S. tuberosum L. Kartoffel.** Bltt. ungleich-gefiedert; Wurzeln knollentragend.

Stammt aus dem mittleren Amerika. Juni, Juli. ♀. Man kennt und baut jetzt sehr viele Varietäten, welche sich durch das Laub, die Blüten, und durch die Gestalt, Grösse und Farbe der Wurzelknollen unterscheiden.

Atropa L. Tollkirsche. Krone glockig. Staubgefässe verschliessen in der Tiefe den Schlund, oben sind sie sammt dem Griffel niedergebogen. Frucht eine 2 fächerige Beere.

A. Belladonna L. Bltt. eiförmig, ganzrandig.

An sonnigen bewaldeten Berglehnen, besonders in Hauen, im Vorgebirge zerstreut. Am *Zobtenberge*, auf den *Briesnitzer Bergen*, *Hessberg* bei *Jauer*, an der *Eule*, bei *Schönau*. Am *Annaberge* in

OS. Bischofskoppe. Gesenke und um Herlitz, Mellisch, Benisch. Ustron. Juni, Juli. 2.

Stängel 3 - 4' h., dick, glänzend und braunroth, oben aestig. Bltt. breit-eiförmig, spitz, kurzgestielt, etwas fleischig, an den Nerven weichhaarig, bisweilen das grössere von einem kleineren begleitet. Blüthenstiele winkelständig zu 1 - 3, drüsig-behaart. Krone schmutzig violett, braungeadert, mit kurzem, umgeschlagenem Saum. Beere kugelig, erst grün, dann schwarzblau, von der Grösse einer Kirsche. Diese Pflanze ist sehr giftig, Bltt. und Wurzel von stark narkotischem Geruch und bitterlich-scharfem Geschmack; die Beeren schmecken anfangs süsslich. Sie gehört zu den heftigsten narcotisch-scharfen Arzneimitteln. Essig, Limonensaft und Kaffeh werden als Gegenmittel bei Vergiftungen durch Belladonna empfohlen.

Datura L. Stechapfel. Krone trichterförmig mit 5 lap-pigem gefaltetem Saum. Kapsel 4fächerig, vierklappig, von dem scheibenförmigen Boden des Kelches getragen, dessen oberer Theil umschnitten abfällt.

† **D. Stramonium L.** Bltt. rundlich-eifg., kahl, winklig- oder buchtig-gezähnt; Kapseln aufrecht, mit weichen Stacheln besetzt.

An Hecken, Mauern und Schutzplätzen in Vorstädten und Dörfern, früher häufig d. d. G. zerstreut, ist jetzt sehr selten geworden. Früher in den Vorstädten von *Breslau* häufig; jetzt noch in Oberschlesischen Dörfern hin und wieder häufiger. Stammt wahrscheinlich aus Asien und soll bei uns durch die Zigeuner verbreitet worden sein. Sommer und Herbst. ☉.

Stängel bis 4' h., einfach oder vielästig; die oberen Aeste den Bltt. gegenständig. Blumen auf kurzen Stielen, einzeln, wechselständig. Kronen weiss. Eine Var. mit lilafarbenen Kronen und violett-gefärbten Stängel, Blattadern und Kelchen d. i. *D. Tatula L.* kam sonst auch um Br. vor. Die Bltt. haben einen äusserst widrigen Geruch und unangenehm bitteren Geschmack; sie besitzen wie die Samen, eine bedeutende Schärfe nebst narkotischer Wirksamkeit. Die Pflanze gehört daher zu den giftigen, und es sind Pflanzensuren, Wein und Kaffeh die nächsten Gegenmittel, ist ausserdem aber ein vorzügliches Arzneimittel.

Nicotiana L. Tabak. Krone trichterförmig mit 5 lap-pigem gefaltetem Saum. Kapsel an der Spitze vierklappig vom bleibenden Kelch umgeben.

* **N. Tabacum L.** Bltt. länglich-lanzettlich, langspitzig; Kronenschlund bauchig-aufgeblasen, Saum mit 5 spitzen Zipfeln.

Stammt aus Amerika, und wird häufig besonders um Ohlau, Wansen und Neumarkt angebaut. Juli, Aug. ☉.

Stängel 3 - 5' h. Kronen rosenroth.

* **N. latissima Miller. N. macrophylla Spr.** Bltt. eilanzettlich, am Gr. geöhrt-herablaufend; Kronenschlund bauchig-aufgeblasen; Saum mit 5 spitzen Zipfeln.

Wie der vorige. Juli, Aug. ☉.

* *N. rustica* L. Bltt. gestielt, eig.; Kronenröhre walzig, Saum mit rundlichen stumpfen Zipfeln.

Stammt aus Amerika, wurde sonst häufig oder allein an den genannten Orten gebaut, da man jetzt die beiden vorigen Arten vorzieht. Juli, Aug. ☉.

Stängel 2-3' h. Kronen gelblich-grün. — Der Tabak gehört zu den scharfmerkotischen Pflanzen, von geringer Anwendung in der Arzneikunde, desto mehr in der Diät seit d. J. 1560, da ihn Jo. Nicot nach Frankreich und bald darauf Walter Raleigh nach England brachte.

Scopolina Schultes. Krone röhrig-glockig, 5 lappig. Kapsel rundlich, am Grunde umschnitten-aufspringend.

† *S. atropoides* Schultes. *Hyoscyamus Scopolia* L.

In Grasgärten bei Leobschütz wahrscheinlich verwildert, von Schramm gefunden und mitgetheilt. April, Mai. ♀.

H. 1/2-1', gabelästig. Bltt. oval, beiderseits spitz, gestielt. Blumen einzeln aus den Gabelwinkeln, hängend. Krone braunröthlich, innen grünlichgelb.

Hyoscyamus L. *Bilsenkraut*. Krone trichterförmig mit fünfklappigem etwas ungleichmässigem Saume. Kapsel von dem vergrößerten Kelche bis an den umschnitten abfallenden Deckel eng eingeschlossen.

† *H. niger* L. Bltt. eig.-länglich, buchtig-fiederspaltig, die unteren gestielt, die stängelständigen halbumbfassend.

β. annuus. Einjährig, niedrig, mit seichtbuchtigen Bltt. und blassgelben Blumen. *H. agrestis*. W. u. Kitaib.

Auf Schutt- und Dungplätzen, an Aeckern und Krautfeldern, an Zäunen und Mauern in Dörfern u. Vorstädten, d. d. g. G. häufig. Juni bis Sept. ☉ und ☉.

Stängel aufrecht, oben ästig, 2-3' h., zottig und klebrig-behaart. Bltt. zottig und klebrig-behaart. Blumen einzeln, sitzend in den Blattwinkeln. Kronen weissgelblich mit hellerem oder dunklerem violettem Adernetz. Kapseln am Gr. bauchig, oben eingeschnürt, bilden eine einseitwendige Aehre. Staubfäden am Gr. behaart, mit violetten Staubbeutel. Die Pflanze verbreitet einen starken, widrigen, narkotischen Geruch und gehört zu den wichtigsten, narkotischen Heilmitteln. Der narkotische Stoff ist ein eigenthümliches Alcaloid, das *Hyoscyamin*, welches wie die narkotischen Stoffe der vorigen Pflanzen dieser Familie, ausser dem *Nicotin*, die Eigenschaft hat, die Pupille des Auges auszudehnen. Bei dadurch veranlassten Vergiftungen sind Brechmittel, dann Weinessig anzuwenden. Das Vorkommen lässt muthmassen, dass auch diese Pflanze bei uns nicht ursprünglich einheimisch ist.

Scrophularinae R. Brown.

Kelch und Krone zweilippig oder fast gleichmässig 4-5spaltig. Staubgefässe ein Paar, oder zwei Paar, zwei längere und zwei kürzere, auch mit einem Ansatz zu einem fünften, oder fünf. Fruchtknoten 2fächerig, selten einfächerig, mit

einfachem Griffel und zweilappiger Narbe. Zwei Samenhalter an den eingeschlagenen Rändern beider Fruchtblätter, meist mit einander verwachsen und eine Mittelsäule bildend. Kapsel frei, ganz oder zur Hälfte 2 fächerig, selten einfächerig, 2klappig, selten 4klappig, mit vielen, wenigen, oder (bei *Tozzia*) einem Samen. Samen mit geradem oder schwach gekrümmtem Keim in der Mitte des fleischigen Eiweisses.

Stauden, seltner Kräuter, mit stielrunden, knotenlosen Stängeln und zerstreuten Blättern, oder mit vierkantigen, knotigen Stängeln und gegen- oder wirtelständigen Blättern. Bei Linné meist in XIV, 2; zwei Sippen in II, 1 und eine in V, 1. Sie sind vorzugsweise in der gemässigten Zone einheimisch, und mehrere gehören zu den häufigsten und weitverbreiteten Pflanzen; einige nur im Hochgebirge. Sie enthalten einen scharfen Stoff, der sich bis zum Narkotischen steigert, in anderen aber schwach und mit Schleim verbunden erscheint.

1. *Veroniceae*. Krone fast gleichmässig 4-5spaltig. Staubgef. 2-4. Kapsel auf der Mitte der Fächer aufspringend.

Limosella L. *Schlammling*. Krone glockig 5spaltig. Vier gleichlange Staubgefässe, mit zusammengeflossenen Staubbeutel-fächern. Kapsel rund bis zur Hälfte 2 fächerig mit oben freier walziger Mittelsäule. XIV, 2.

L. aquatica L. Bltt. langgestielt, spatelförmig.

An überschwemmt gewesenen Plätzen, an Rändern von Lachen, Teichen, Flüssen, in der Ebene an manchen Orten häufig. Um *Br.* b. *Pöpelwitz*, *Scheitnich*, an der *alten Oder* u. s. w. häufig. *Ohlau*, *Hirschberg* bei *Quirl*. *Warmbrunn*. Um *Bunzlau*. *Oppeln*. *Trop. Te.* Juli, Aug. ☉.

Kriechende und wurzelnde Ausläufer. Ganz kahl. Blüten auf einblumigen Stielen, gehäuft zwischen den Blättern. Kronen klein, weisslich-fleischfarben. II, 1-2''

Verónica L. *Ehrenpreiss*. Krone mit walziger Röhre und 4 theiligem Saum, dessen Zipfel etwas ungleich sind. Zwei Staubgefässe, Kapsel zusammengedrückt, ausgerandet, 2 oder 4klappig. II, 1.

Eine Sippe mit zahlreichen Arten, von verschiedener Tracht, in allen Höhenregionen, mehrere in grosser Menge und weit verbreitet, einige nur im Hochgebirge.

a. Trauben winkelständig; Wurzel mehrjährig.

V. scutellata L. Bltt. lineal-lanzettlich, spitz, mit entfernten auswärts gerichteten Zähnen; Trauben wechselständig; Kapseln stark zusammengedrückt.

An feuchten Orten, auf sumpfigen Wiesen, in Gräben, d. d. g. G. in der Ebene und d. Vorgeb. Um *Br.* bei *Oswitz*, *Grüneiche* etc. Juli, Aug. ☿.

Stängel 1 - $1\frac{1}{2}$ ' h., schwach; oft vielästig von unten. Aehren lang locker. Blumenstiele lang, sählig-abstehend. Kronen weiss und blass fleischfarben.

V. Anagallis L. Bltt. sitzend, lanzettlich und eifg., spitz, sägezählig; Trauben gegenständig; Kapsel rundlich, schwach ausgerandet.

In und am Rande von Gewässern, in Gräben u. Lachen, an Teichrändern, auf feuchtem Sande an Flussufern, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Juni, Aug. 2.

Stängel hohl, 1' h., seltner 3' h. und dann von 1" Dicks., aufrecht, seltner niederliegend. Ganz kahl. Trauben lang. Kronen blass lila. Var. mit fast ganzrandigen Blättern.

V. Beccabunga L. Bachbunze. Bltt. kurz gestielt, elliptisch oder länglich, stumpf, kerbzählig; Trauben gegenständig; Kapsel rundlich schwach ausgerandet.

In Gräben, an Lachen und an quellig-sumpfigen Orten, d. d. g. G. auch im Vorgeb., nicht selten doch weniger häufig als die vorige. Um Br. in der Odervorstadt, bei Neukirch, Klettendorf, Bischwitz a. W., Hühnern u. m. Juni—Aug. 2.

Ganz kahl, sattgrün, etwas fleischig. Aendert ab in der Grösse. Kronen sattblau. Das frische Kraut schmeckt schwach-salzig und etwas bitter, und wird als Salat genossen.

V. Chamaedrys L. Gamanderlein, Bathengel. Bltt. fast sitzend, eifg., kerbig-gesägt oder auch am Gr. eingeschnitten; Stängel zweireihig-haarig; Kapseln dreieckig, verkehrt-herzförmig, gewimpert.

Auf Wiesen und Triften, in Gebüsch, Vorhölzern und Wäldern, d. d. g. G. bis an das Hochgeb. gemein. Mai, Juni. 2.

Stängel aufsteigend. Bltt. in der Gestalt und Bekleidung veränderlich, bisweilen fast fiederspaltig. Kronen blass himmelblau, mit dunkleren Strichen, selten fleischroth oder weiss.

V. montana L. Bltt. lang-gestielt eiförmig, eingeschnitten kerb-zählig; Stängel am Gr. kriechend mit zerstreuten Haaren; Kapsel platt, sehr breit, beiderseits ausgerandet.

In schattigen Wäldern des Vorgebirges und in der Hügelerde der Ebene selten. Zuerst von Schummel in Wäldern zw. Skarsine und Mahlen bei Br. gefunden. Am schwarzen Berge bei Charlottenbrunn u. an den Dreiwässern zw. Lomnitz und O. Donnerau. Am hohen B. bei Conradswaldau. Messersdorf. Um Reinerz. Melzergrund im Riesengeb. Am Leiterberge und Hungerb. im Gesenke. Czantory bei Ustron. Mai, Juni. 2.

Dunkelgrün. Stängel schlaff, am Gr. gestreckt und wurzelnd, dann aufsteigend. Bltt. entfernt. Krone weisslich mit blutrothen Strichen.

V. officinalis L. Aechter Ehrenpreiss. Bltt. kurz-gestielt, verkehrt-eifg., länglich oder elliptisch, gesägt; Stängel am Gr. kriechend, mit der Spitze aufsteigend; Trauben vielblumig, dicht; Kapseln verkehrtherzfg.-dreieckig stumpf ausgerandet.

Auf trocknen Grasplätzen an buschigen und waldigen Orten, an buschigen Dämmen, in trocknen Laub- und Nadelwäldern, Haiden, d. d. g. G. bis an das Hochgebirge, gemein. Juni—Aug. 2.

Behaart, bald stärker, bald schwächer. Bltt. in der Breite und der Bundung veränderlich, bisweilen fast rundlich. Kr. klein, lilaf. oder weiss. Kapsel drüsig. Von 3' - 1' Länge. — Die frischen Bltt. haben einen schwach aromatischen, und bitteren, adstringirenden Geruch, und der Theeaufguss stand ehemals als ein treffliches Mittel bei catarrhalischen Leiden in grossem Ansehen. Der Name der Sippe entstand aus *Verc unica*.

V. latifolia L. *V. Teucrium* L. W. et Gr. sil. Bltt. sitzend mit schwach herzförmigem Grunde, eigf. oder länglich, eingeschnitten gesägt; Stängel aufrecht nur am Gr. bogenförmig-aufsteigend; Kelche 5 spaltig; Kapsel scharf-ausgerandet.

♂ Auf sonnigen grasigen Waldplätzen, auf Waldwiesen, an sonnigen bewaldeten Hügeln, im Vorgeb. und der Ebene zerstreut. Um *Br.* bei *Schwoitsch* und *Pollentschine*. *Trebnitz*. *Borschen* bei *Wohlau*. *Sprottau* nach *Güntzel*. Bei *Zobten*. *Kupferberg* bei *Dankwitz*. *Fischerbg.* b. *Polnitz*. *Berge* bei *Striegau*. *Fürstenstein*. *Grosstein* bei *Oppeln*. *Wronin*. *Jägerndorfer Schlossberg*. *Troppau* bei *Stremplowitz*, *Zossen*, *Braunsdf.* Jul, Aug. 2.

Aehnlich d. *V. Chamaedrys*, aber höher. Behaart. Lange dichte Blütentrauben. Kronen blau oder rosenroth. Stängel 1 - 2' hoch. An keinem der Standorte, auf denen ich die Pflanze beobachtete, sah ich einen Uebergang zu *V. prostrata*; letztere wächst nach v. Mückusch Angaben in der Umgegend von *Troppau*, jedoch erhielt ich von daher noch keine Exemplare.

b. Trauben endständig; Wurzel mehrjährig. Kronenröhre walzig, der Saum oft undeutlich-zweilippig.

V. longifolia L. et *Matt.* u. *Krock.* nebst *V. maritima* derselben. Bltt. gegen- oder zu 3-4 wirtelständig, lanzettlich mit langer Spitze, scharf-gesägt; Trauben dicht ährenförmig, eine einzelne oder mit mehreren seitlichen kürzeren; Kapsel rundlich, schwellend, ausgerandet.

An feuchten Orten zw. Gesträuch, an Graben-, Teich-, Flussrändern in Weiden-, Rohr- und anderem Gebüsch, auf feuchten Waldwiesen, nur in der tieferen Ebene, besonders in den Odergegenden. Um *Br.* bei *Schwoitsch*, *Bischofswalde*, *Zedlitz*, *Kosel* u. m. häufig. *Ohlau*. *Wohlau*. *Beuthen a. O.* *Oppeln*. *Czerschück* u. *Czisock a. d. Oder*. Um *Trop.* bei *Gilschwitz*. Juli, Aug. 2.

Stängel steif aufrecht, 2-4' h., meist sammt den Bltt. kahl oder sehr fein weichhaarig. Bltt. variiren in der Breite, bald lineal-lanzettlich, sehr spitz und tief gesägt, oft zu 3-4 im Quirl, bald länglich-lanzettlich, mit kürzerer Spitze und breiteren, seichterem Sägezähnen, meist gegenständig. Ährentrauben lang, bis 10". Kronen sattblau. Nach der mannigfaltigen Blattform hat man daraus mehrere Arten gebildet.

V. spicata L. Bltt. gegenständig, eigf.-länglich oder lanzettlich, kerbig-gesägt nach vorn ganzrandig, die unteren stumpf; Traube dicht, ährenförmig, eine einzelne oder von wenigen seitlichen beglei-

tet; Kapsel rundlich, schwellend, ausgerandet; Stängel und Blätter feinhaarig.

β. hybrida. Die unteren Bltt. eifg., am Gr. schwach herzfg., scharf-gesägt. *V. hybrida* L. Matt. und Krock. sil.

γ. cristata. Hoch, Bltt. länglich, beiderseits spitz; Kronenzipfel gedreht *V. orchidea* Crantz.

Auf sonnigen etwas sandigen Waldplätzen, auf Hügeln, in Häden, Kiefer- und Birken-Hauen, an hohen Wegrändern, in der Ebene nicht selten; jedoch scheint sie an manchen Orten u. im Vorgebirge (?) nicht vorzukommen. Um *Br.* bei *Schwoitsch*, *Oswitz* an der Schwedenschanze, *Lissa* und in der *Trebnitzer* Hügelkette häufig. *Ohlau*. *Wohlau*. *Oppeln*, *Djeschwitz*, *Dirschler Gypsgruben*. *Trop.* u. *Te.* Juni—Aug. 2.

H. meist $\frac{1}{2}$ - 1'. Von kleinen krausen angerückten Haaren mehr oder minder granschimmernd; Stängel oben mit oder ohne Drüsen; doch giebt es auch fast kahle Abänderungen. Stängel am Gr. sählig, dünn, bogenfg.-ansteigend, oder gleich aufrecht, meist mit einer endständigen Aehrentraube. Bltt. in der Breite und Bandung sehr veränderlich, bisweilen fast lineal-länglich. Kronen blau. Die Pflanze erscheint in mannigfaltigen Abänderungen; *β* wurde mehrmals im *Pilsnitzer* Walde, *γ* bei *Lissa* unweit *Muckeram* und um *Kl. Totschen* beobachtet.

c. Trauben endständig auf dem Stängel und den Aesten. Kronenröhre sehr kurz. Die Bltt. gehen nach oben in Deckblatt über.

V. bellidioides L. Bltt. verkehrt-eifg., stumpf, schwach-gekerbt, die unteren grösser fast rosettenförmig, die Stängelblätter gegenständig; Traube kurz, arblumig.

Auf begrasteten Flecken zwischen den Felsen und dem Gerölle des *Schneekoppen-Kegels*, nicht unter 4500'. Im *Kessel* im *Gesenke* nach *Schauer*. Juni, Juli. 2.

Stängel einfach, haarig, 2 - 3" h., ansteigend-aufrecht. Bltt. fast lederartig. Kronen himmelblau.

V. alpina L. Bltt. elliptisch, die unteren kleiner; Traube endständig, arblüthig, haarig.

An felsigen Wänden im *Riesengebirge*, am *kleinen Teiche* und an der *Schneekoppe*. Juli, Aug. 2.

Stängel einzeln oder rasenfg., 2 - 3" h., zart, aufsteigend, nach oben dickhaarig, anderwärts aber auch fast kahl. Bltt. ganzrandig oder fein gekerbt, weichhaarig. Kronen lilafarben, kleiner als an der vorigen.

V. serpyllifolia L. Bltt. eifg. od. länglich, schwach gekerbt, die unteren kleiner, rundlich, die obersten lanzettlich, ganzrandig; Stängel aufsteigend; Traube locker; Kapsel zusammengedrückt stumpf ausgerandet.

Auf feuchten Triften, Wiesen, Sandplätzen, an Gräben und sandigen Rändern von Gewässern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. April—Sept. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., oft unten kstig, oben stets einfach. Bltt. fast glänzend. Aehre oft sehr lang. Deckblatt breit und an einer Abänderung viel breiter und grösser. Kro-

nen lila und weiss, an trocknen Plätzen dunkler. — Hierher gehören auch die von Krause hinter *Hühnern* bei Br. gefundenen, für *V. peregrina* ausgegebenen Exemplare.

V. arvensis L. Bltt. herz-eifg., gekerbt, die obersten lanzettlich ganzrandig; Stängel meist ästig; Trauben locker ährenförmig; Kapsel zusammengedrückt mit längerem Griffel.

Auf Aeckern, Brachen und feuchten Sandplätzen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. März, April und im Herbst. ☉.

Stängel von unten oder aus der Mitte ästig, selten ohne Aeste, 3 - 4" h., überall mit kurzen und in zwei Reihen mit längeren Haaren besetzt. Die Blumen sehr kurz gestielt, daher scheinbar winkelständig. Kronen azur- oder himmelblau, sehr klein, kaum länger als der Kelch.

V. verna L. Bltt. fiedertheilig, die untersten eifg. ungetheilt, die obersten lanzettlich; Stängel ästig; Trauben locker vielblumig; Kapsel zusammengedrückt mit gleichlangem Griffel.

Auf sandigen Aeckern, Sandhügeln, nicht selten d. d. g. G. Um Br. bei *Carlowitz*, *Schwoitsch*, *Pascherwitz*, *Goldschmiede*, *Lissa* u. m. Selten um Trop. u. Te. April, Mai. ☉.

Stängel bald einfach, bald von unten ästig, 3 - 4" h., rauhaarig, oberhalb drüsig. Bltt. oft unterseits purpurroth angelaufen. Kelchzipfel ungleichmässig. Kronen azurblau, klein. Hierher auch *V. austriaca* Krock. sil.

V. triphyllus L. Bltt. fingerfg. getheilt, die untersten eifg., ungetheilt, die obersten lanzettlich; Stängel ästig; Trauben locker; Kapseln schwellend.

Auf Aeckern, Brachen und Sandplätzen, in der Ebene u. dem Vorgeb., gemein. März—Mai. ☉.

Stängel meist aus der Mitte od. v. Grunde ästig, oben drüsig. Bltt. schmutzgrün, unterseits oft roth, drüsig. Kronen sattazurblau. Kapseln drüsig.

d. Blumen einzeln, winkelständig. Fruchtstiele zurückgeschlagen.

V. agrestis L. *V. agrestis* β . *opaca* W. et Gr. sil. Blumenstiele so lang als das Blatt; Bltt. länglich-eifg., kerbig-gesägt; Kelchzipfel elliptisch, stumpf; Kapsel schwellend, rundlich, in spitzem Winkel ausgerandet, die Lappen an der Nath zusammengedrückt.

Auf trocknen Acker- und Krautbeeten hin und wieder, seltner als die folgenden. Um Br. bei *Oswitz*, *Lissa* u. m. April, Mai. ☉.

Stängel und Bltt. etwas dick und saftig, dunkelgrün. Kronen blassblau, oft fast ganz weisslich. Diese und die beiden folgenden Arten sind einander sehr ähnlich und bisweilen schwer zu unterscheiden.

V. didyma Tenore. *V. agrestis* W. et Gr. sil. *V. polita* Fries. Wimm. Fl. v. Schl. Blumenstiele so lang als das Blatt; Bltt. rundlich-eifg., tief kerbig-gesägt; Kelchzipfel eifg., spitz; Kapsel schwellend, rundlich, in spitzem Winkel ausgerandet, die Lappen an der Nath gerundet.

Auf Aeckern, Garten- und Gemüsebeeten, an Zäunen u. Mauern d. d. g. G. zerstreut. April, Mai, auch im Herbst. ☉.

Kleiner und dünner als die vorige und die folgende, hellgrün. Stängel fast fädlich. Kronen azurblau, der schmalere Zipfel weiss. Die Blumen sind fast um die Hälfte kleiner als an der folgenden Art.

V. Buxbaumii Tenore. Die oberen Blumenstiele länger als das Blatt; Bltt. eig. - rundlich tief kerbig-gesägt; Kelchzipfel eilanzettlich spitz; Kapsel netzaderig, zusammengedrückt, in stumpfem Winkel ausgerandet.

Auf Aeckern, Brachen und Gartenland, d. d. g. G. gemein. April, Mai und im Herbst. ☉.

Diese Art ist gewöhnlich grösser als die beiden vorigen, kommt aber auch mit dünnen einfachen, fädlichen Stängeln vor. Stängel v. Gr. an ästig, gestreckt, haarig. Bltt. meist deutlich herzfg., haarig. Krone azurblau, der kleinere Zipfel blass oder weisslich.

V. hederifolia L. Bltt. herzfg. - rundlich, 3-5lappig; Kelchzipfel herzförmig; Kapsel kugelig vierlappig.

Auf Acker-, Brach- und Gartenland, an Hecken, Zäunen und im Gebüsch an grasleeren Stellen d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein u. in sehr grosser Menge. März-Mai. ☉.

Stängel liegend, von unten viel- und lang-ästig, an den Kanten behaart. Bltt. kurzgestielt, weichhaarig, 3-7lappig, der mittlere Lappen grösser. Kelche starkgewimpert. Samen napfförmig, welche nach Regengüssen häufig die Aecker bedecken und nächst den Wurzelsfasern von *Ficaria* die Sagen von Getraide-Regen veranlassen haben.

2. Rhinanthae. Krone zweilappig. Zwei ungleiche Paare von Staubgefässen. Kapsel 2fächerig, auf der Mitte der Fächer aufspringend. — Die meisten aus dieser Abtheilung werden beim Trocknen, besond. durch hinzugebrachte Wärme, bald schwarz. Alle in XIV, 2.

Pedicularis L. Läusekraut, Moorkönig. Kelch aufgeblasen, der 5te Zahn sehr kurz. Krone 2lippig, mit zusammengedrückter helmförmiger Oberlippe. Kapsel zusammengedrückt, geschnäbelt, vielsamig. Samen grubig-netzaderig.

P. palustris L. Kelch 2lappig, mit eingeschnitten-gezähnten, krausen Lappen; Bltt. gefiedert mit fiederspaltigen Fiedern; Stängel aufrecht, vom Grunde an ästig.

Auf moosig-sumpfigen Wiesen im Vorgeb. bis in die Ebene herab, verbreitet d. d. g. G. und ziemlich häufig meist in grösseren Gruppen. Um *Br.* hinter *Klettendorf*. *Garsuche bei Ohlau*. *Beuthen*. *Rogau bei Zobten*. *Silsterwitz*. Am *Sattelwalde*. *Neurode*. *Schreckendorf bei Landeck*. *Warmbrunn*. *Oppeln*, *Ratibor*, *Leobschütz*. *Gesenke*. *Teschen*. Mai, Juni. ☉.

Kahl, wie die folgenden. Steif aufrecht. selten einfach, 1' h. Die Blumen einzeln winkelständig, eine längliche Traube bildend. Kronen rosapurpurfarben, mit sichelförmig geschnäbelter Oberlippe. Das Kraut riecht unangenehm, schmeckt scharf und war früher officinell, dem Vieh erregt es Durchfall. Bei dem Trocknen wird diese und fast alle Arten dieser Sippe sehr leicht schwarz.

P. sylvatica L. Kelch 5zähmig, die Zähne oben blattartig, gezähnt; Bltt. gefiedert mit fiederspaltig-gelappten Zipfeln, der Hauptstängel aufrecht, die Nebenstängel gestreckt.

Auf moosigen Moor- und Torfwiesen in Waldgegenden, d. d. g. G. in der Ebene und dem Vorgeb. häufig. Um Br. bei *Friedewalde*, *Bischwitz a. W.*, *Lissa* etc. Mai, Juni. ☉.

Der Hauptstängel, 4 - 6' h., ist am Gr. von eirunden a. d. Spitze gekerbten oder fiederspaltigen Schuppen eingeschlossen; zur Seite treiben ringum schwächere, im Bogen aufsteigende Nebenstängel. Längliche Traube. Kronen blass purpurroth, sichel-förmig-geschnäbelt.

P. sudetica L. Kelch 5spaltig, an den Ecken zottig, mit lanzettlichen, gesägten Zähnen; Bltt. fiederspaltig; Stängel ohne Aeste.

In den Sümpfen und auf quellig-moorigen Stellen der höchsten Kämme des *Riesengebirges*; auf der *weissen Wiese* und dem *Koppenplane*, der *Seiffenlehne*, um die *Teiche*, in den *Schnee gruben*, *Elbwiese*, *Pudelbaude* u. m. Juni, Juli. ☿.

Stängel 1' h., am Gr. ein wenig aufsteigend. Traube länglich, mit zottig-behaarter Axe. Kronen hell purpurroth. Eine der eigenthümlichen Seltenheiten der Schlesi-schen Flora.

Tozzia L. *Tozzie*. Kelch 5zählig. Kronenröhre nach oben erweitert, Saum 2lippig, die Lippen fast gleichgross, die obere 2- die untere 3-theilig. Kapsel einsamig, 2klappig.

T. alpina L.

Auf moosigen und quelligen Gebirgs-Abhängen, in der Region d. Vorgebirges. Auf dem *Malinow* und an der *Baranio* bei *Teschen* von *Kotschy* entdeckt. Juli, Aug. ☿.

Stängel gestreckt-aufsteigend, $\frac{1}{2}$ ' lang, in der Mitte ästig, glänzend, glasartig. Bltt. breit-eifg., grob-sägezählig. Blumen einzeln winkelständig. Kronen gelb.

Melampyrum L. *Wachtelweizen*. Kelch ungleich vier-spaltig. Krone mit kurzer kegelförmiger zusammengedrückter Oberlippe. Kapsel schwach zusammengedrückt, geschnäbelt, mit 2-4 Samen.

Deckblätter von den Stängelbltt. verschieden, häufig gefärbt.

M. cristatum L. Aehren viereckig, dicht dachziegelf.; Deckbltt. herzförmig., nach vorn gefaltet umgebogen, kämmig gezähnt.

In Vorhölzern, lichten trocknen Wäldern, auf Waldwiesen, meist truppweise nur in der Ebene in einigen Gegenden. Um Br. bei *Oswitz*, *Bischwitz a. W.*, *Treschen*, *Lissa* u. m. *Ohlau*. *Wohlau*. *Beuthen*. *Teschen*. Juni, Juli. ☉.

Stängel aufrecht, wenig ästig, bis 1' h. Deckbltt. weisgrünlich und rosaf. Krone weisslich mit rothem Anhauch und gelber Unterlippe.

M. arvense L. Aehren locker; Deckbltt. eilanzettlich in borstliche Zähne fiederig gespalten, unterseits punktirt; Kelche scharf; Kronen geschlossen.

Auf Aeckern unter der Saat, besd. unter Hafer, Weizen, Gerste, vorzugsweise auf Thonboden, d. d. g. G. nicht selten, auch im Vorgeb. Juni, Juli. ☉.

Stängel 1' h. Bltt. lanzettlich, stumpflich, die oberen oft spießfg. Deckbltt. rosa purpurfarben. Kronen rosaf. und gelb. Die Samen sollen, dem Mehle vermengt, diesem eine blaue Farbe und bittern Geschmack geben.

M. nemorosum L. Tag und Nacht. Aehren locker, einseitwendig; Deckbltt. herzfg. lanzettlich, gezähnt, die obersten schopfg.; Kelche rauhaarig.

In Vorhölzern und Hainen d. d. g. G. in der Ebene, hier und da auch noch im Vorgebirge, häufig. Juli, Aug. ☉.

Stängel 1 - 2' h., oft sehr Ästig, mit ausgesparten Aesten. Bltt. kurzgestielt, ganzrandig, eilanzettlich, die oberen am Gr. mit spitzen Zähnen. Deckbltt. kammförmig gezähnt, die obersten violettblau, aber ohne Blumen, daher eine Anzahl derselben den Stängel schopfförmig endigt. Kronen goldgelb mit dunklerer Böhre.

M. pratense L. Aehren locker, einseitwendig; Deckbltt. spießfg.-gezähnt; Kelchzipfel aufsteigend, die unteren schmaler; Kronenröhre gerade mit geschlossenem Schlunde.

In trocknen Gehölzen, besonders Birkenhainen, auf Waldwiesen d. d. g. G. nicht selten. Um Br. b. Ransern, Lissa, Arnolds Mühl, Heydewilzen, der Trebnitzer Hügelkette etc. Juni, Juli. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ h., dünn. Bltt. lineal-lanzettlich. Aehre sehr locker. Kronen blassgelblich oder weißlich, selten goldgelb.

M. sylvaticum L. Aehren locker, einseitwendig; Deckbltt. ganzrandig oder am Gr. fast spießförmig; Kelchzipfel fast gleich, mit umgerolltem Rande; Kronenröhre gekrümmt, mit offenem Schlunde.

In Gehölzen und Wäldern des Vor- und Hochgebirges d. d. g. G. häufig. Juli, Aug. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., dünn. Aehren sehr locker. Kronen goldgelb.

Alectorólóphus Haller. Klapper. Kelch zusammengedrückt bauchig, Saum verengt 4zählig. Krone mit kegelförmiger zusammengedrückter abgestumpfter Oberlippe. Kapsel stark zusammengedrückt. Samen platt, gerandet.

Ganzrandige, linealische, runalig-starre Bltt. Kronen gelb.

A. minor. Rhinanthus minor Ehrh. Kelche kahl; Kronenröhre gerade, kürzer als der Kelch; Oberlippe mit 2 kurzen, eiförmigen Zähnen; Stempel eingeschlossen; Samen flügelig-gerandet

Auf Wiesen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. doch hier seltner, stets in Menge und bisweilen heerdenweise. Mai, Juni. ☉.

Linné begriff wenigstens diese und die folgende Art unter dem Namen *Rhinanthus Crista Galli*. Diese Art, meist einfach, $\frac{1}{2}$ - 1' h., mit glattem, viereckigem, ungeflecktem Stängel, ist kleiner und von dunklerer Farbe als die folgende. Bltt. länglich-linealisch, kerbig-gesägt. Kronen schmutzig, sattgelb, fast braungelb. Deckbltt. grün oder bräunlich. Die Zähne an der Oberlippe sind blass, nur selten violett und im letzteren Falle die Pflanze etwas höher und der Stängel mit schwarzen Linien gezeichnet, so dass dergleichen Exemplare (var. *fallax* W. et Gr. sil.) einen Uebergang zur folgenden anzuzeigen scheinen.

A. major Reichenb. Excurs. *Rhinanthus major* Ehrhart. Kelche kahl; Kronenröhre gekrümmt, so lang als der Kelch; Oberlippe mit zwei eiförmigen Zähnen; Stempel hervorragend; Samen flügelig-gerandet.

Auf Wiesen und auf feuchten Aeckern unter der Saat in der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Mai—Juli, etwa 10-14 Tage später als die vorige, mit der man sie nicht selten in Gesellschaft sieht. ☉.

Unterscheidet sich von der vorigen durch helleres Grün und bleiche Deckblätter auf den ersten Anblick. Stängel 1 - 1½' h., oft mit einigen Aesten aus der Mitte, schwarz-liniert oder punktiert. Kronen hellgelb, mit mehr gewölbter Oberlippe, deren Zähne violett sind. Die Samen kommen häufig unter das Mehl und geben ihm eine schmutzige Farbe.

A. hirsutus Allione. **A. villosus**. Wimm. Fl. v. Schles. *Rhinanthus Alektorolaphus* Pollich. Axe, Deckblätter und Kelche zottig-rauhhaarig; Kronenröhre gekrümmt, so lang als der Kelch; Oberlippe mit 2 eiförmigen Zähnen; Stempel hervorragend; Samen gerandet.

Auf Grasplätzen und feuchten Aeckern im Vor- und am Fusse des Hochgebirges. Um *Charlottenbrunn*, *Neurode* am *Zentner* und *Annaberge*, *Reinerz* und *Langenau*. *Schreiberschau*, *Schmiedeberg*, *Fischbach*. Im *Gesenke* bei *Einsiedel*, *Freiwaldau*, *Grüfenberg*. *Ustron* bei *Teschen*. Juni, Juli. ☉.

Der vorigen durchaus ähnlich, doch von eigener Tracht; ich sah beide oft dicht neben einander. Die Samen haben nur einen sehr schmalen Hautrand.

A. pulcher Schummel in litt. *Rhinanthus pulcher* Schummel in Günth. et Schummel Costar. sil. *Rhin. alpinus* Baumgarten. Deckbltt. und Kelche kahl, schwarz-gestrichelt und punktiert; Kronenröhre gekrümmt, fast so lang als der Kelch; Oberlippe mit 2 länglichen Zähnen; Stempel hervorragend; Samen flügelig-gerandet.

Auf Wiesen und an fruchtbaren Lehnen des Hochgebirges. Im *Riesengebirge* in d. *Schnee gruben*, *Elbwiese*, an der *Pudelbaude*, am *kl. Teiche*, im *Riesengrunde*. *Gl. Schneeberg*. *Gesenke* am *Petersstein*, *Altwater*, *Kessel* etc. Juli, Aug. ☉.

II. 1'. Diese Art galt uns früher für eine Abart des *A. major*, scheint aber doch wesentlich verschieden und durch keine Uebergänge mit jener zusammen zu hängen. Die Oberlippe ist mehr nach oben gezogen, mit violetten, längeren Zähnen, und die Unterlippe mit blauen Flecken geziert, daher ich Schummels bezeichnende Benennung vorzog, zumal als der ältere Name Baumgartens noch den Sippenamen *Rhinanthus* fährt.

Bartschia L. *Bartschie*. Kelch glockig 4spaltig. Krone mit helmförmiger ungetheilte Ober- und 3theiliger Unterlippe. Kapsel eiförmig zusammengedrückt. Samen geribbt, die seitlichen Rippen geflügelt.

B. alpina L. Bltt. gegenständig, eifg., halbumbfassend, gesügt.

Auf quelligen Stellen und an Bächen des Hochgebirges. Im Riesengeb. am Fusse der *Koppe*, im *Riesengrunde*, an den *Teichen*, der *Kesselkoppe*, um die *Elbquellen*, *Schneeegruben*, *Elbgrund*, *Kesselgrube* etc. Im Gesenke im *Kessel*. Auf der *Babia Gora*. Juni, Juli. ♀.

Stängel oft von unten vielästig, mit einfachen, aufrechten Ästen, $\frac{1}{2}$ ' h., schwach zottig. Bltt. runzlich, weichhaarig, dunkelgrün; die oberen violett. Blumen einzeln, winkelständig. Kelche klebrig. Kronen dunkelviolett.

Odontites Haller. Zahntrost. Krone mit zusammengedrückter ausgerandet-abgestutzter Oberlippe. Die Staubbeutelächer sämtlich gleich mit kurzen Grannen am unteren Ende. Kapsel eiförmig, zusammengedrückt, stumpf. Samen gerippt-eckig.

O. verna Reichenbach. *Euphrasia* Od. L. *Bartsia* Od. W. et Gr. sil. Bltt. lineal-lanzettlich; Deckbltt. länger als die Blumen; Kronen aussen feinhaarig.

An etwas feuchten Plätzen, auf Wiesen, feuchten Aeckern, an Gräben und Teichrändern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. nicht selten, bisweilen gruppenweise. Juli—Sept. ☉.

Stängel aufrecht, in d. Mitte mit aufsteigenden Ästen, $\frac{1}{2}$ - 1' h. feinhaarig. Bltt. kerbig-gesägt. Blüten einzeln, winkelständig, eine einseitwendige Achse bildend. Kronen schmutzig rosaf. Das Kraut war als *Hb. Euphrasiae rubrae* ehemals officinell.

Euphrasia L. Augentrost. Krone mit flacher ausgerandeter oder gezählter Oberlippe. Die äusseren Staubbeutelächer des längeren Paares sind länger und haben stärkere Grannen als die übrigen. Kapsel länglich, zusammengedrückt, stumpf. Samen gestreift.

E. officinalis L. Bltt. eifg., sitzend, spitz und scharf gesägt; Blumen in den Winkeln gegenständig.

α. pratensis. Mit abstehenden Haaren, oben drüsig; Blattzähne stachelspitzig.

E. Rostkoviana Hayne Arzneigew.

β. nemorosa. Mit anliegenden, krausen Haaren, ohne Drüsen; Blattzähne langspitzig, fast borstlich; Stängel meist einfach. *E. nemorosa* Persoon.

γ. alpestris. Mit anliegenden, krausen Haaren, ohne Drüsen; Blattzähne stachelspitzig; Stängel einfach mit wenigen Blattpaaren.

Auf Wiesen und freien Waldplätzen durch d. g. G. und in allen Höhenregionen häufig und zahlreich. *α.* auf feuchten Wiesen, *β.* in trocknen Gehölzen, Birkengebüschen und Haiden; *γ.* auf den Lehnen und Wiesen des Hochgeb. im *Riesengeb.*, *Gesenke* und *Gl. Schneeberg*. Juli—Sept. ☉.

Stängel 4 - 8" h., bald vielästig-buschig, bald einfach, ohne oder mit wenigen Ästen. Die Bekleidung, die Tiefe der Einsahnung der Bltt. und die Grösse der Bltt. und Blumen ist veränderlich. Kronen weiss mit violetten Linien und gelben Flecken im Schlunde, bisweilen ganz blossviolett, besonders bei *γ* und *β*. Von allen Var. gibt es kleinblumige Formen. Das Kraut hat einen schwach salzig-bitterlichen Geschmack und war ehemals als Augenmittel in Ruf.

3. Orobanchaeae. Schmarotzergewächse mit schuppenförmigen Blättern. Krone zweilippig. Zwei ungleiche Paare von Staubgefässen. Kapseln einfächerig zweiklappig mit wandständigen Samenhältern auf der Mitte der Klappen. XIV, 2.
Keine grüne Farbe; fast alle Theile braungelblich, Blumenkronen oft weisslich, mit blauer oder röthlicher Färbung.

Orobánche L. Sommerwurz. Kelch 4spaltig oder 2blättrig, Krone mit ausgerandeter Oberlippe; die Röhre fällt beim Welken von ihrem Grunde ab, von dem sie sich umschnitten ablöst.

Man unterscheidet die Arten dieser Sippe gegenwärtig genauer als früher und zur sicheren Kenntniss muss man die Pflanze kennen, aus deren Wurzeln sie entspringen. Sie sind selten, meist vereinzelt, und kommen bei uns nur spärlich vor.

O. pallidiflora Wimm. et Grab. sil. Kelchbltt. vielnervig, breit-eifg. mit pfriemlicher Spitze, so lang als die Kronenröhre; Krone glockig, in der Mitte des Rückens gerade, oben nach vorn gekrümmt, aussenseits und die Oberlippe auch innenseits drüsig-behaart, die Haare aus einem ocherfarbenen Höker entspringend; Lippen ungleich mit feinen, spitzen Zähnen, am Rande kraus; die obere an der Spitze etwas aufwärts-gekrümmt, zweilappig, mit abstehenden Lappen, die Zipfel der untern fast gleich; Staubgef. entspringen nahe am Gr. der Krone, unten schwach behaart, oben kahl; Griffel oben mit Drüsenhaaren besetzt. Koch Synops.

Wir fanden diese Art, welche mit *O. speciosa* De Cand. sehr nahe übereinkommt, in einigen Exemplaren auf einem Brachacker zwischen *Koberwitz* und *Wirwitz* bei *Br.*, wahrscheinlich auf den Wurzeln von *Cirsium arvense*; in Günthers Sammlung befinden sich ausserdem mehrere gleichfalls in Schlesien ohne genauere Bezeichnung des Standortes gesammelte. Juni. 2.

An frischen Exemplaren waren die Blumenkronen fast weisslich mit schwachem gelblichem Hauch und mit einigen röthlichen Adern durchzogen, die Achse etwas locker, die Blumen gross, die Staubgef. oben bogenförmig gegen einander-geneigt; die Narbe kastanienroth. — An Exemplaren, die ich neuerdings von Kelch aus der Gegend der *Gypsgruben* bei *Dirschel* in *OS.* erhielt, und die hierher zu gehören scheinen, waren die Kelchbltt. ungleich-2spaltig mit sehr kurzem innerem Zipfel, häufig vorn verwachsen, meist mit fast verloschenen Nerven, die Krone gross, am Gr. blassgelblich, die Lippen schwach kastanienroth, innen gelblich, mit röthlichen Adern. Narbe satt-kastanienroth mit söhlig-aneinanderliegenden, schwach-erhabenen Lappen. Höhe 1 - 1½'; Achse bei ½' Länge etwa 15 - 20 Blumen.

O. Galii Duby. Kelchbltt. vielnervig, gleichmässig 2spaltig, halb so lang als die Kronenröhre, vorn einander berührend oder verwachsen; Krone vom Grunde allmählig erweitert glockig, am Rücken gekrümmt; die Lippen mit feinen ungleichen Zähnen, die obere helmförmig mit geradeausstehenden Seiten; Zipfel der untern eifg., ziemlich gleich gross, halb so lang als die Röhre; Staubgef. entspringen über dem Gr. der Krone, dicht behaart oder drüsig; Griffel

drüsig, Scheibe der Narbe sammtartig ohne erhabenen Rand. Koch Syn.

Mit Gewissheit nur an den *Gypsgruben* b. *Dirschel*, von Kelch gefunden. Wahrscheinlich gehören hierher auch die früher unter dem Namen *O. caryophyllacea* von uns bezeichneten Exemplare von *Prieborn* bei *Strehlen* und aus der Gegend von *Oppeln*. Juni. 2.

Meist nur bis 1' h. Aehre ziemlich dicht. Die Kronen schmutzig-weissgelb gegen die Lippen mit röthlichem oder lilafarbenem Sauche. Die Narbe wie bei der vorigen Art. — Sollte die Gestalt und Zertheilung der Kelchblätter und die Bekleidung der Staubgefässe bei ein und derselben Art variiren, was ich mit Grund vermüthe, so werden diese beiden und manche andere Arten wieder vereinigt werden müssen.

O. rubens Wallroth. Kelchbltt. vielnervig, breit eifg., pfriemlich-zugespitzt, vorn und hinten mit einem Zahne oder ungleich 2spaltig so lang als die Kronenröhre, vorn mehr oder minder verwachsen; Krone aus gekrümmtem Grunde röhrig-glockig mit geradem Rücken und helmförmig-abgeneigter Spitze; Lippen ungleichgezähnt, die obere 2lappig mit abstehenden Lappen, die Zipfel der unteren eifg., fast gleich gross, die seitlichen abstehend; Staubgef. entspringen aus der Krümmung der Krone, bis zur Mitte dicht haarig; Scheibe der Narbe sammtartig ohne erhabenen Rand.

Diese Art entdeckte *Grabowski* i. J. 1833 auf Wurzeln von *Modicago falcata* an trocknen Wegrändern um *Grosstein* bei *Oppeln*, und neuerlich *Wichura* auf dem *Kupferberge* bei *Danckwitz* vor Nimptsch. Juni. 2.

H. bei 1½'. Bekleidung mit Drüsen durchaus mässig und kurz, bis auf die innere Seite der Oberlippe. Stängel bräunlich-roth. Aehre unten etwas locker, oben dicht. Kelche mit sparsamen Drüsen. Kronen ziemlich gross, weisslich- oder stroh-gelb mit etwas bräunlichen Adern, am Rande unregelmässig-korbähnig. Lappen der Lippen abstehend, der mittlere der Unterlippe häufig etwas länger als die seitlichen. Staubgef. unter der Mitte der Kronenröhre eingefügt, bogenförmig-gegeneinander-geneigt. Griffel oben bogenförmig-niedersteigend, nicht vorragend. Narbe aus zwei erhabenen auseinanderstehenden Lappen, wachsgelb später saffrigelb.

O. stigmatodes nobis. Die Kelchbltt. fast gleichmässig 2spaltig, mit geraden lanzettlichen Zipfeln, vorn einander berührend oder verwachsen, ohne deutliche Nerven, etwas kürzer als die Kronenröhre; die Krone röhrig-glockig, am Rücken bogenförmig; die Oberlippe undeutlich 2lappig, mit geraden Lappen, die Unterlippe mit drei länglich-runden, fast gleichgrossen Lappen, beide am Rande ausgefressen-gezähnt; die Staubgef. entspringen unter der Mitte der Röhre, unten zottig-behaart; oben schwach drüsig und im Bogen niedersteigend; Griffel mit sparsamen Drüsen besetzt.

Auf lertigen Aeckern, bei den *Gypsgruben* bei *Dirschel* in *OS.*, an Wurzeln von *Centaurea Scabiosa* von Kelch i. J. 1840 entdeckt und mitgetheilt. Juni. 2.

Ungern vermüthe ich die schon an Arten überreiche Sippe um eine neue; allein wie man jetzt die Formen unterscheidet, ist die vorliegende mit keiner bekannten Art zu vereinigen. Am nächsten kommen ihr *O. Picridis* Schultz, mit welcher sie in der Tracht sehr übereinstimmt und *O. Salviae* Schultz; jene unterscheidet sich durch den

geraden Rücken der Kronenröhre, stumpfe Zähne der Lippen und violette Narbe, diese durch die nicht niedergebogenen Staubfäden. Ausgezeichnet ist diese Art durch die fast bis an den Rand der Oberlippe vortretende, erst wachs- dann goldgelbe Narbe mit erhabenen, nach aussen gerichteten Lappen, die unter Vergrößerung sammtartig erscheinen. Höhe 1 - 1½'. Stängel dicht mit Drüsen besetzt, am Gr. nicht sehr aufgetrieben. Aehre bis ½' lang, dicht, 20 - 30 gedrängte Blumen enthaltend. Deckbltt. lanzettlich, so lang als die Krone. Kelchbltt. oft verwachsen, 4theilig, die äusseren Zipfel etwas länger, so lang als die Kronenröhre, schmal-lanzettlich, ausser den Mittelribben ohne deutliche Nerven, stark drüsig. Krone bis 7''' lang, röhrig und bogenförmig, nach vorn wenig erweitert und söhlig, am Gr. gelblich, vorn gelbbraun, mit schwachem röthlichem Schimmer; die Lippen am Rande spitz-gezähnt.

O. coerulea Villars. Kelch einblättrig, mit 5 lanzettlichen, spitzen Zähnen; Staubbeutel kahl; Stängel einfach.

Am *Hartheberge* bei *Frankenstein* und um *Halbendorf* bei *Oppeln* von *Fincke* gef., nach auswärtigen Beobachtungen auf den Wurzeln von *Achillea Millefolium*. Juni. 2.

Stängel ½' h., oben bläulich-rostfarben, drüsig. Kronen mit langer gekrümmter Röhre, spitzen Zipfeln, blau.

O. ramosa L. Kelch einblättrig mit 4 eig.-dreieckigen Zähnen; Staubbeutel kahl; Stängel ästig.

Um *Bojanowe* bei *Ratibor* von *Kelch* entdeckt. Juni, Juli. 2.

Stängel ¼' h. Blumenähre locker. Kronenröhre am Gr. verengert, Saum 5lappig, gefranzt. Kronen blass-purpurbau, halb so gross als die der vorigen.

Lathraea L. *Schuppenwurz*. Traube einseitwendig. Kelch 4spaltig. Krone mit ungetheilte Oberlippe und bleibender Röhre.

L. Squamaria L. Blumen hängend.

In schattigen Wäldern an feuchten Stellen auf den Wurzeln von Buchen, Haseln, gewöhnlich um ausgerodete Stämme und zum Theil in vermoderndem Laube versteckt, in der Ebene und im Vorgeb. d. d. g. G. hin und wieder. Um *Br.* bei *Lissa* u. *Arnoldsmühl. Deutschhammer. Hohlstein* b. *Löwenberg. Gröditzberg. Bögenberge. Sandgebirge* bei *Charlottenbrunn*. An der *Eule. Jauersberg. Cudowa. Hirschberg*. Im *Goi* bei *Beuthen* in *OS.* Bei *Herlitz* u. *Dorfleschen. Te.* März, April. 2.

Ein vielästiger, walzenfg., innen zelliger, aussen mit grossen weissen Schuppen bedeckter Wurzelstock, treibt viele aufsteigende, mit weissröthlichen Schuppen besetzte, ½' hohe Stängel. Kronen blass rosenroth. Staubbeutel pfeilfg., haarig. Die ganze Pflanze ist saftig und fleischig und wird beim Trocknen schwarz.

4. *Antirrhineae*. Krone zweilippig, maskirt oder gähnend. Zwei ungleiche Paare von Staubgefässen und bisweilen der Ansatz zu einem fünften vor der Oberlippe. Kapsel halb oder ganz 2fächerig, vielsamig, durch Spaltung der Scheidewand aufspringend.

Antirrhinum L. *Löwenmaul*. Krone maskirt, am Gr. mit einem Höker. Die Kapsel öffnet sich an der Spitze in drei Löcher. XIV, 2.

A. majus L. Kelchzipfel eifg., stumpf, kürzer als die Krone; Blumen in dichter Traube.

Auf Mauern und in steinigem Wäldern des Vorgebirges selten. Bei *Fürstenstein* und in der Haide bei *Altwasser*. Juni Juli. ☽.

Stängel 1 - 2' h., ästig. Bltt. gegen- und wechselständig, länglich-lanzettlich, kahl; Kelchzipfel mit Drüsen besetzt. Kronen gross, purpurfarben, oder weiss mit gelben Flecken im Gaumen. Eine beliebte Zierpflanze.

A. Orontium L. *Kleiner Dorant*. Kelchzipfel lanzettlich, länger als die Krone; Stängel arnblumig, Blumen entfernt.

Auf Aeckern und Brachen auf sandigem Grunde in der Ebene zerstreut. Um *Br.* bei *Ransern*, *Koberwitz*, *Riemberg* u. m. *Ohlau*. *Wohlau*. *Beuthen a. O.* *Medzibor*. *Oppeln*. *Jägerndf.* und *Koschendorf*. Juli—Sept. ☽.

Stängel einfach oder am Gr. ästig, 4 - 8' h. Bltt. lanzettlich-linealisch. Durchaus feinhaarig. Kronen rosa- oder hell-purpurf. mit blässerer Röhre.

Linaria Torrnefort. *Frauenflachs*. Krone maskirt am Gr. mit einem Sporn. Kapsel springt an der Spitze in 2-6 Zähne auf. XIV. 2.

Alle Arten bei Linné unter *Antirrhinum*.

? **L. Cymbalaria Miller.** Bltt. herzeirund, 5lappig, kahl.

Auf alten Mauern. Bei *Fischbach* von *Zöllfel* gef. und *b. Görnitz* am unteren Theile der *Kahle* nach *Schneider* u. *Rabenhorst*. Juni—Aug. ☽.

Stängel kriechend und rankend, vielästig. Bltt. dicklich. Krone hell-violett mit weissem Gaum und zwei gelben Hökern. Exemplare aus Schlesien sah ich noch nicht; vielleicht waren auch die gefundenen aus zufällig verstreutem Samen entsprungen.

L. Elatine Miller. *Kleine Erdwinde*. Bltt. eifg., die obern am Gr. spiessfg.; Stängel fädlich, gestreckt; Sporn gerade; Blumenstiele kahl.

Auf Aeckern in Thonboden nach der Ernte, in der Ebene hin und wieder; scheint den tieferen Gegenden eigen zu sein. Um *Br.* bei *Zimpel*, *Höfchen*, *Gr. Rake*, *Schleibitz*, *Paschkerwitz*, *Lissa*, *Koberwitz*. *Oppeln*. Selten um *Trop.* u. *Te.* Juli—Sept. ☽.

Stängel bis fusslang, von unten langästig, bogig, mit abstehenden zerstreuten Haaren. In fettem Boden werden die Bltt. grösser und am Gr. stark-gezähnt. Blumenstiele fast hardünn, lang, bogig, winkelständig, zerstreut. Krone blassgelblich, Unterlippe schwefelgelb, Oberlippe mit violettem Vorderrande.

L. spuria Miller. *Grosse Erdwinde*. Bltt. eifg., fast ganzrandig; Stängel fädlich, gestreckt; Sporn gekrümmt; Blumenstiele zottig.

Wie die vorige, aber viel seltner und bisher nur aus der Gegend von *Br.* bei *Krittern*, *Kapsdorf* und *Zedlitz* hinter *Hühnern*, u. *Koberwitz*, *Kl. Bresa* und *Bohrau*. *Ochab* bei *Te. n. Kotschy*. Juli bis Sept. ☽.

Stängel etwas kürzer als an der vorigen, auch stärker und mehr behaart. Die Bltt. fast alle eifg., oder die oberen am Gr. beiderseits mit einem kurzen Zahn. Krone grösser, gefärbt wie die vorige.

L. minor Desfontaines. Durchaus mit Drüsenhaar besetzt; Bltt. lanzettlich stumpf, die untern gegenständig; Blumen einzeln in den Blattwinkeln fast traubig; Samen länglich, gefurcht.

Auf Aeckern, Brachen, Sandplätzen und steinigten Hügeln und auf Mauern in der Ebene nicht selten. Um *Br.* bei *Höfchen*, *Grübchen*, *Pöpelwitz*, *Lissa* etc. *Wohlau*. *Beuthen a. O.* *Neukirch* bei *Goldberg*. *Ohlau*. *Oppeln*. Selten um *Troppau* u. *Gurek* bei *Te. Hirschberg* am *Kapellenberg* und *Kitzelberg*. Juni—Sept. ☉.

Stängel aufrecht, 3 - 4'' h., mit ausgebreiteten Aesten, selten einfach. Untere Bltt. fast spathelfg. Kronen rosaf. mit weissgelblichen Lippen.

L. arvensis Desfontaines. Kahl; Kelche und Blumenstiele drüsig; Bltt. linealisch die untern zu 4 im Quirl; Trauben kopfförmig; Samen geflügelt.

Auf Aeckern und Sandhügeln zerstreut. Um *Br.* auf der Kräuterei am *Nikolaithor*, *Rosenthal*. *Heydewilxen*. *Cudowa*. *Oppeln*. *Kynast* bei *Warmbrunn*. *Troppau*. Juli, Aug. ☉.

Dünn und schlank. Stängel 4 - 8'' h., einfach oder von unten ästig, aufrecht. Bltt. graugrün. Kronen blau.

L. vulgaris Miller. *Antirrhinum Linaria* L. Kahl, Axe und Blumenstiele drüsig-behaart; Bltt. lineal-lanzettlich gedrängt; Blumen in dicht-dachziegelförmiger Traube; Samen geflügelt.

An Wegrändern, Dämmen, Ackerrainen, auf Brachen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juli, Aug. ☉.

Stängel meist einfach, aufrecht. Bltt. 3nervig, spitzig, etwas graugrün. Kronen gross, gelb mit orange und weiss. Eine hin und wieder vorkommende Missbildung mit veränderten 2 - 7 spornigen Kronen heisst *Peloria*, man findet auch einzelne Blumen ohne Sporn. Die frischen Bltt. und Blüthen sind als *Hb. Linariae* officinell, von unangenehmem Geruch und bitterlichem Geschmack; sie ist scharf und wird als schmerzstillendes Mittel angewandt.

Lindernia L. *Lindernie*. Krone 2lippig; obere Lippe ausgerandet, untere 3 spaltig. Narbe kopfförmig. Kapsel 2fächerig mit freier Mittelsäule. XIV, 2.

L. pyxidaria Allione. *Anagalloides procumbens* Krock. sil. *Capraria gratioloides* L. sp. pl. Bltt. länglich-eifg., ganzrandig, sitzend, gegenständig; Blumen winkelständig, einzeln, gestielt; Stängel liegend oder schief aufrecht.

Auf überschwemmt gewesenen Stellen, besd. auf trockengelegten Fluss- und Teichrändern während trockner Sommer, auf schlammigem und sandigem Grunde, daher oft in manchen Jahren sehr selten, oft wieder in Menge und an verschiedenen Stellen zum Vorschein kommend. Um *Br.* an den Ufern der *Oder* hin und wieder bei *Neuscheinich*, am *Weidendamme*. An Lachen bei *Grüneiche* und *Pö-*

nehwitz. Sehr häufig in der *Lohe* bei *Masschwitz*. *Kalichteich* bei *Oppeln*. Juli—Sept. ☉.

Stängel meist rasenförmig aus der Wurzel, meist gestreckt, selten schief-aufrecht, vierkantig, 1 - 6" lang. Etwas saftig, glänzend und bräunlich-grün, ganz kahl. Bltt. 2nervig. Kronen schnell abfällig, nur Vormittags geöffnet, lila-rosenf.

Gtatiola L. Gottesgnade. Krone 2 lippig, gähmend; obere Lippe zurückgebogen, ausgerandet. Zwei Staubgef. und Ansatz zu einem zweiten Paar. Narbe 2 lappig. Kapsel halbvierklappig. II, 1.

G. officinalis L. Bltt. gegenständig, sitzend, lanzettlich, gesägt; Blumenstiele winkelständig, einblümig.

An feuchten Orten, auf nassen Wiesen, an Gräben, Fluss- und Teichrändern, in der Ebene zerstreut. Um *Br.* am *Lehmdamme*, an der *alten Oder*, bei *Grüneiche*, *Kosel*, *Tschechnitz*, *Krampitz bei Lissa*, *Hasenau*. *Ohlau*. *Arnsdorfer Teich* u. *Schöneiche* bei *Wohlau*. *Beuthen a. O.* *Goldbach* bei *Bunzlau*. *Gr. Herlitz*. *Moosebruch* bei *Reiwiesen*. *Te.* Juli, Aug. ♀.

Stängel 1' h., aufrecht. Kahl. Bltt. wechselweise-gegenständig. Kelch 2lippig. Lappen des Kronensaums rundlich. Krone weiss. Das Kraut hat einen anhaltend bittern Geschmack und gehört zu den scharfen drastischen Mitteln.

Digitális L. Fingerhut. Krone unten röhrig oben glockig mit schiefem 4spaltigem Saum. Zwei Paar ungleicher Staubgefässe; Staubbeutel quer aufspringend. Kapsel 2 fächerig; Mittelsäule oben frei. XIV, 2.

D. grandiflora Lamarck. Bltt. länglich-lanzettlich, gesägt, weichhaarig, die oberen halbumbfassend; Krone drüsig-behaart, die Zipfel der Unterlippe dreieckig.

An sonnigen und steinigen Waldlehnen im Vorgebirge und Hochgeb. auch hie und da in der Ebene. Um *Br.* am *Fuchsberge* bei *Schwoitsch*. *Zobten* und *Geiersbg.* *Harthebg.* bei *Frankenst.* *Eule*. Um *Kynau* und *Charlottenbrunn*. *Riesengeb.* im *Riesengrunde*, *Elbgrunde*, *Schneeegruben*. *Troppau* bei *Grätz* und *Herlitz*. *Teschen*. Um *Oppeln*, *Malapane*, *Proskau*, *Rosenberg*. Juni, Juli. ♀.

H. 2'. Stängel einfach, aufrecht. Wurzelbltt. lang, elliptisch, in den Stiel herablaufend. Kronen gross in einseitwendiger Traube, blass-schwefelgelb, innen mit braunen netzadrigen Flecken. Breite und Behaarung der Bltt. ist veränderlich. Die Zipfel der Unterlippe bald spitzer und länger, bald kürzer und stumpfer; auch die Grösse der Krone und die Intensität der Farbe ist veränderlich. Kapsel mit 2 Furchen und 2 Nähten.

* *D. purpurea L.* Bltt. eilanzettfg., gekerbt, unterseits filzig; Krone aussen kahl; die Zipfel der Unterlippe kurz eifg., gerundet.

Im westlichen Deutschland wild; bei uns häufig als Zierpflanze gebaut. Juni, Juli. ☉.

Stängel fein-filzig, 2 - 3' h. Bltt. schwach-runzlig. Kronen purpurroth mit weissen Döpfeln im Schlunde, oder weiss. Diese ist eine der vorzüglichsten deutschen Arznei-

pflanzen. Die Bltt. schmecken scharf und bitter, und wirken narcotisch-scharf, insbesondere auf die Blutcirculation retardirend.

Scrophularia L. *Braunwurz*. Krone fast kugelig mit kurzem zweilippigem Saum und zurückgerollter Unterlippe. Zwei ungleiche Paare Staubgefäße, und der Ansatz zu einem fünften unter der Oberlippe. Kapsel halb zweiklappig. XIV, 2.

Stängel vierkantig; Bltt. eifg., gegenständig. Blumen klein, dunkelfarbig in Rispen.

S. nodosa L. *Kropfwurz*. Bltt. eifg. länglich, kahl, gesägt, die unteren Zähne länger und spitzer; Stängel viereckig; Kelchzipfel eifg., stumpf mit schmaalem Hautrande.

An feuchten Orten zwischen Gebüsch, in Wäldern, an buschigen Grabenrändern und Flussufern, in d. Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Juni—Aug. 2.

Wurzel knotig-verdickt. Stängel steif, meist einfach, 2-4' h. Blüten in gabliger Theilung der Zweige, in länglicher Rispe. Blumenstiele drüsig. Kronen braunroth mit grün, selten durchaus gelbgrünlich. — Das Kraut und die Wurzel waren ehemals officinell und in grossem Ansehen; beides riecht unangenehm und schmeckt widrig-bitter und scharf.

S. aquatica L. Bltt. eifg. länglich, kahl, gesägt, die unteren Zähne kleiner; Stängel und Blattstiele breit geflügelt; Kelchzipfel rundlich, stumpf mit breitem Hautrande.

An und in Gewässern, Gräben, Teichen, Flüssen, zwischen Gersträuch in der Ebene hin und wieder, zumal in der tieferen. Um *Br.* zerstreut bei *Gr. Rake*, *Kapsdorf* im *Goi*, um *Trebnitz*, *Skarsine*, *Dyhrenfurth*, *Wohlau*, *Beuthen a. O.* *Ohlau*, *Oppeln*, *Wronin*, *Troppau*, *Bobrek* bei *Te.* Juni—Aug. 2.

Stängel 2-4' h., Aeste im Bogen aufsteigend. Bltt. fein-gesägt. Kronen braungrün. Das Kraut war als *Hb. Betonicae aquaticae* ehemals officinell.

S. Scopolii Hoppe. *S. glandulosa* W. et Kit. W. et Gr. sil. Bltt. eifg. - länglich, doppelt - gekerbt, beiderseits weichhaarig; Stängel u. Blattstiele zottig, Kelche und Blumenstiele drüsig; Kelchzipfel rundlich, stumpf mit breitem Hautrande.

In trocknen Bergwäldern im südöstlichen Vorgebirge und in Dörfern an Zäunen in der oberschlesischen Ebene. Um *Br.* in der *Strachate*. Um *Oppeln* in den *Pascheken*, bei *Halbendorf*, *Groschwitz*, *Wronin*, *Eiglau*, *Slavenczicz*, *Ratibor* in der Vorstadt. Im *Gesenke* bei *Einsiedel*, *Karlsbrunn*, am *Altwater* bei der Schweizeri und im *Kessel*. Um *Ustron* in *O. Lischna*, am *Tul* u. m. Juni bis Aug. 2.

Stängel steif, 1½-3' h. Untere Bltt. stumpf. Kronen braungrün.

S. vernalis L. Bltt. rundlich-eifg., herzförmig, doppelt gekerbt; Blumenstiele winkelständig, gablig-doldentraubig, 3-7 blumig; Kelchzipfel länglich spitz ohne Hautrand.

In Gebüsch im Vorgebirge. Einziger sicherer Standort: bei *Ustron*! Bei *Strzebowitz* u. *Sucholasetz* n. v. *Mückusch*. Ausser-

dem um *Breslau* einigemal in einzelnen Exemplaren von Schummel bemerkt, und in *OS.* um *Schippowitz*. Nach Rabenhorst bei *Gr. Hennersdorf*. Mai, Juni. ☉.

Stängel 1 - 2' h. Hellgrün. Kronen grüngelb. Kapsel eig.-langspitzig. Der Ansatz zu dem 5ten Staubgefäße fehlt dieser Art.

5. *Verbascae*. Krone radförmig, mit fast gleichmässig 5 theiligem Saum. Vier oder fünf fast gleichmässige Staubgef. aus dem Schlunde mit schief oder söhlig aufliegenden Staubbeuteln. Kapsel auf der Mitte der Fächer aufspringend. v, 1.

Verbascum L. *Wollkraut*. Fünf etwas ungleiche Staubgefäße. Kapsel an der Spitze 2klappig. v, 1,

Wollig-filzige Stauden; lange Blütenähren. Kronen gelb, bei einer Art violett. Die Arten dieser Sippe bilden häufig Bastardformen. Sie enthalten viel Schleim.

V. *Thapsus* Linn. nach Wahlenberg u. Fries. V. *Schraderi* Meyer Chl. hanov. Koch. Syn. Bltt. fein-gekerbt mit dünnem, gelblichem Filz bedeckt, sämmtlich bis zu den nächstunteren herablaufend; meist eine einzelne dichte Blüthentraube mit sehr kurzen Blumenstielchen; Kronen fast trichterförmig; die Staubgefäße ungleich; 2 längere mit 2 länglichen Staubbeuteln, wovon der Staubfaden viermal länger als der Staubbeutel ist.

An sonnigen und steinigen Waldplätzen und buschigen Wegrändern, auf steinigen Hügeln, im Vorgeb. und hie und da in der Ebene. Um *Br.* bei *Arnoldsmühl*, *Charlottenbrunn*, *Peilau*, *Cudowa*, *Hirschberg*. Um *Wehrau*, *Hohlstein* bei *Bunzlau*, *Oppeln*. *Trop. Te.* Juli, Aug. ☉.

H. 2 - 4'. Stängel, Bltt. und Kelche sind bei dieser und den beiden folgenden Arten mit weissgelber, dicker, etwas lockerer Filzwolle bekleidet. Blumenähre aus kleinen Büscheln zusammengesetzt, steif-aufrecht. Diese Art hat kleinere blässere schwefelgelbe Blumen und etwas dünneren Filz, als die folgende.

V. *thapsiforme* Schrader. V. *Thapsus* Koch Syn. Bltt. gekerbt mit dichtem gelblichen Filz bedeckt, sämmtlich bis zu den nächstunteren herablaufend; meist eine einzelne dichte Blüthentraube mit sehr kurzen Blumenstielchen; Krone radförmig; die Staubgef. ungleich; 2 längere mit länglichen Staubbeuteln, wovon der Staubfaden kahl und doppelt so lang als der Staubbeutel ist.

Auf sandigen und steinigen unfruchtbaren Plätzen, besd. hohen Brachen, auf Sandhügeln, in Haiden, in d. Ebene u. d. Vorgeb. häufig, bisweilen heerdenweise. Juli, Aug. ☉.

Unterscheidet sich von der vorigen durch grössere, mehr ausgebreitete, sattgelbe Kronen und dickeren Filz; an schattigen Orten jedoch ist er bisweilen auch ziemlich dünn. Traube gew. durchaus dicht, nur selten am Gr. unterbrochen. Var. mit weissen Blumen an der *Oder* bei *Oppeln*. Bltt. und Blumen dieser drei Arten sind officinell. Die Bltt. schmecken bitterlich-schleimig; die Blüthen haben einen schwachen angenehmen Geruch und süsslichen Geschmack, und schleimig-zuckerstoffhaltige ätherische Bestandtheile; der Theeausguss ist bei leichten Fieberformen ein allgemeines Volksmittel.

V. phlomoides L. Bltt. gekerbt mit dichtem gelblichem Wollfilz bedeckt, nur kurz oder zur Hälfte herablaufend; meist eine einzelne dichte, am Gr. unterbrochene Blüthentraube mit sehr kurzen Blumenstielchen; Krone radförmig, die Staubgef. ungleich: 2 längere mit länglichen Staubbeuteln, woran der Staubfaden kahl und doppelt so lang als der Staubbeutel ist.

Wie die vorige, aber seltner. Um *Br.* bei *Lissa*. Um *Militsch* und *Trachenberg*. *Oppeln*. Juli, Aug. ☉.

Unterscheidet sich von der vorigen nur durch die halb- oder noch weniger herablaufenden Bltt. Die oberen Bltt. sind meist sehr breit, fast rundlich, plötzlich in eine feine lanzettliche Spitze übergehend. Auch pflegt der Filz etwas dünner und das Kraut mehr grünlich zu sein. Doch bin ich von der Artverschiedenheit dieser und der vorigen noch nicht hinlänglich überzeugt.

× *V. collinum* Schrader. Bltt. gekerbt, halbherablaufend, filzig, die oberen länglich, spitz; Stängel oberhalb scharf-eckig; Traube aus ungefähr 5 blumigen Büscheln zusammengesetzt mit Stielchen von der Länge des Kelches; sämmtliche Staubfäden mit purpurf. Wollzotten; Staubbeutel gleichförmig.

In *Peilau* bei *Reichenbach* fand ich i. J. 1829 einige Exemplare. Juli, Aug. ☉.

Diese Pflanze steht in ihren Kennzeichen zwischen *V. Thapsus* und *V. nigrum* in der Mitte, in deren Gesellschaft sie auch wuchs, und ist unbedenklich als ein Bastard zwischen diesen beiden Arten anzusehen.

× *V. adulterinum* Koch. Bltt. gekerbt, die unteren länglich-eifg. in den Stiel verschmälert, oberseits weichhaarig unterseits schwach-graufilzig, die oberen sitzend eifg. oder rundlich mit langer feiner Spitze beiderseits schwach-filzig; der Stängel von dünnem Sternhaar filzig, oben scharfeckig; Traube locker aus entfernten 3-5 blumigen Büscheln, die Blumen kurz-gestielt; die Staubgef. ungleich; die beiden längeren Staubfäden fast kahl mit länglichen Staubbeuteln, die 3 kürzeren mit blassvioletter Wolle besetzt.

Einige Exemplare fand *Krause* im Dorfe *Lange* bei *Laskowitz* bei *Breslau*. Juli. ☉.

Diese Form ist ein Bastard von *V. thapsiforme* und *V. nigrum*, so dass sie am unteren Theile der letzteren, am oberen der ersteren gleicht, jedoch im ganzen zwischen beiden ziemlich in der Mitte steht.

V. Lychnitis L. Bltt. gekerbt oberseits fast kahl, unterseits staub-filzig grauweiss, die unteren elliptisch-länglich in einen Stiel verschmälert, die oberen sitzend eifg., langspitzig; Stängel oben aestig mit pyramidalen Rispe; Staubfäden weisswollig.

Auf trocknen Hügeln, auf Sandfeldern, kiesigen Flussufnern; auf lichten steinigen und trocknen Waldplätzen, d. d. g. G. in d. Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Um *Br.* bei *Carlowitz*, *Oswitz*, *Fuchsberg* bei *Schwoitsch* etc. Um *Trop.* bei *Dorfleschen*, um *Te.* bei *Navshy*. Juli, Aug. ☉.

Stängel 3-4' h. Kelche weissfilzig. Kronen hellgelb, kaum halb so gross als bei *V. thapsiforme*.

V. nigrum L. Bltt. gekerbt, oberseits fast kahl, unterseits dünnfilzig, untere Stengelbltt. länglich-eifg. am Gr. herzfg.; langgestielt; die oberen eifg.-länglich, Stängel oben scharf-eckig mit verlängelter Traube; Staubfäden purpurwollig.

In Gebüsch, an Zäunen und Hecken, Wegen, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Juli, Aug. ☺.

Stängel 2-4' h., mit zerstreuten Sternhaaren. Bltt. dunkelgrün. Blüthentraube meist einzeln; die unteren Büschel entfernt. Kr. dunkelgelb.

V. phoeniceum L. Bltt. oberseits glänzend, unterseits weichhaarig; die Wurzelbltt. rosettenfg., gestielt eifg. gekerbt; Blumen entfernt einzeln gestielt in langer Traube mit drüsig-behaarter Axe; Staubbeutel sämmtlich gleich.

Auf Grasplätzen und Waldrändern in einigen Gegenden der Ebene. Um Br. bei Koberwitz und Wirrwitz, Kristelwitz, Silsterwitz, Bauerwitz bei Leobschütz. Katscher. Juni, Juli. ☺.

Stängel aufrecht, weichhaarig, armblättrig, einfach, 1½ - 2' h. Kronen violett.

V. Blattaria L. *Schabenkraut*. Bltt. kahl, die unteren länglich ausgebuchtet; Traube endständig mit einzelnen, entfernten gestielten Blumen, und drüsig behaarter Axe; Staubbeutel alle gleichförmig.

An Wegen, Grabenrändern, auf sonnigen steinigen Plätzen, an Flussufern, in der Ebene hin und wieder. Um Br. bei Krittern, Oswitz, Kl. Bischwitz, Hühnern. Ohlau. Mirschelwitz. Steinau a. O. Tillendorf und Gröditz bei Bunzlau. Oppeln. Ochab bei Teschen. Juni, Juli. ☺.

Stängel aufrecht, 1½ - 2' h. Blumenstiele und Kelche sauber mit gestielten Drüsen besetzt. Kronen gelb, selten weisslich. Zwei längere Staubfäden am Grunde, drei kürzere durchaus mit violetter Wolle besetzt.

Labiatae Jussieu.

Kelch 4-5spaltig, oft 2lippig. Krone unregelmässig 4-5spaltig, meist 2lippig. Zwei ungleiche Paare von Staubgef., selten ein Paar. Der Fruchtknoten sitzt auf einer fleischigen Scheibe, tief viertheilig mit je einem aufrechten Ei. Griffel einfach zwischen den Fruchtblättern aus der Scheibe entspringend, mit 2 Narben. Vier freie vom Kelche umschlossene Nüsse. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Kräuter und Stauden mit vierkantigem, knotig-gegliedertem Stängel, gegen- oder wirtelständigen, unterseits drüsigen Bltt. ohne Stützbltt. und meist in Aehren oder Trauben vereinigten Blumen. Fast alle sind aromatisch und enthalten ätherisches Oel mit Extractiv- und Gerbestoff. Die Unterabtheilungen nach Benth. Die Mehrzahl bei Linné in XIV, 1, einige in II, 1. Die Heimath dieser Pflanze ist der wärmere Theil der gemässigten Zone. Die Mehrzahl wohnt in der Ebene und im Vorgebirge; kaum ein Paar steigen bis auf das Hochgebirge.

1) *Menthoideae*. Die Staubgefässe von einander entfernt. Krone trichterfg. mit 4 fast gleich grossen Saumzipfeln.

Mentha L. Minze, Minte. Zwei Paar Staubgef. mit Staubbeuteln. XIV, 1.

Es giebt fast keine Pflanzensippe, deren Arten so sehr in der Haarbekleidung veränderlich wären, wie die Arten dieser, die daher schwer zu erkennen und auch sonst schwierig zu unterscheiden sind. Es giebt auch Formen mit kleineren Blumen und kürzeren (eingeschlossenen) Staubgef. und andere mit grösseren Blumen und vorragenden Staubgef.; die *Menthae* sind also polygamisch.

M. aquatica L. Die oberen Blütenquirle genähert und meist kopfförmig, grösser als ihre Deckblätter; Kelche länglich mit borstlich-pfriemlichen Zähnen; Bltt. eifg., gestielt, gesägt.

α. *capitata*. Die oberen Blütenquirle in einen Kopf zusammengedrängt. *M. aquatica* Koch Syn.

a. *glabrata*. Bltt. und Stängel fast kahl; Blumenstiele und Kelche haarig.

b. *hirsuta*. Bltt., Stängel, Blumenstiele und Kelche rauhaarig.

β. *verticillata*. Die Blütenquirle sämmtlich gesondert. *M. sativa* Koch Syn.

a. *glabrata*. Bltt. und Stängel fast kahl.

b. *hirta*. Bltt. und Stängel kurz- oder rauhaarig. — Ist die Behaarung sehr dicht, so dass die Bltt. grauschimmern, so ist diess *M. acutifolia* Smith.

W. et Grab. sil.

An feuchten und wasserreichen Orten, in Gräben, an Teich- und Bachrändern u. in Bächen, auf Sumpfwiesen d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juli, Aug. 2.

Diese Art sieht nur der folgenden ähnlich, ist aber durch die länglichen Kelche mit spitzen pfriemlichen Zähnen alsbald zu unterscheiden. Die Form mit kopfförmigen Quirlen ist die häufigere; diejenigen aber mit gesonderten Quirlen lassen sich nicht als eine besondere Art absondern. Ob indest die *M. acutifolia* mit Recht hierher gezogen wird, scheint noch zweifelhaft. Stängel meist aufrecht, von $\frac{1}{2}$ - 2' H., oft von der Mitte ästig, mit abstehenden Aesten. Bltt. in der Breite und Grösse veränderlich, bei *M. acutifolia* beiderseits spitz. Geruch meist stark und grob-aromatisch. Kronen blau oder lilafarben.

M. arvensis L. Blumen in gesonderten, winkelständigen Quirlen; Kelche glockig mit kurzen dreieckigen Zähnen; Bltt. eifg., zahnig-gesägt, gestielt.

α. *aquatica*. Fast kahl, Bltt. oval, gesägt.

β. *lanceifolia*. Bltt. länglich-lanzettlich, beiderseits spitz.

γ. *legitima*. Stängel und Blumenstiele rauhaarig.

An feuchten Orten, besd. auf Aeckern nach der Erndte, auch an Gräben, Lachenrändern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juli, Aug. 2.

Kleiner als die vorige, Stängel am Gr. liegend und von unten vielästig, oft aber besd. bei α fast aufrecht, von der Mitte ästig, meist nicht über 1' h. Blütenstand niemals kopfig, und auch die oberen Deckbltt. meist länger als ihre Quirle. Die glockigen Kelche zeichnen diese Art aus. Geruch des Krautes sehr mannigfaltig, bisweilen sehr angenehm aromatisch nach Bergamottöl und ähnl., bisweilen auch widerlich. Kronen blau oder lilaf.

Wimmer's Flora.

M. rubra Hudson. *M. pratensis* Koch Syn? Blüten in gesonderten, winkelständigen Quirlen; Bltt. eilanzettlich beiderseits spitz, scharf gesägt; Stängel und Blumenstiele kahl; Kelche länglich, kahl, mit pfriemlichen rauhen Zähnen.

Nur einmal fand ich einige Exemplare an einem Bache bei Sandhübel bei *Freiwaldau* im Juli 1825. 2.

Ob diese Art wirklich als verschieden anzusehen sei, ist ungewiss, da ich sie nicht weiter beobachten konnte. Ausser jenen Merkmalen zeichneten sich die gefundenen Exemplare durch röthliche Farbe der Stängel, Aeste und Blattadern auf der Unterseite der Bltt. aus. Kronen lilafarben. Staubgefässe eingeschlossen.

M. viridis L. *M. sylvestris* ♂ *glabra* Koch Syn. Die Blütenquirle bilden unterbrochene Aehren; Bltt. fast sitzend, lanzettlich, spitz, kahl; Deckbltt. borstlich; Kelchzähne rauhaarig.

Nur einmal in Menge am *Stober* bei *Kreuzburg* von *Beilschmied* gefunden und mitgetheilt. Nach *Rabenhorst* b. *Gr. Hengersdorf*. Juli, Aug. 2.

Stängel sehr ästig, 1 - 2' h., kahl, röthlich. Kelche eig., kahl, mit borstlichen Zähnen. Ich führe diese als eigene Art auf, da ich noch keine Uebergänge sah.

M. sylvestris L. Die Blütenquirle bilden walzige Aehren; Bltt. eig. oder länglich-lanzettlich, zählig-gesägt, fast sitzend; Kelchzähne linealisch-pfriemlich bei der Fruchtreife gegeneinander geneigt; Deckbltt. lineal-pfriemlich.

α. *nemorosa*. Stängel und die Bltt. oberseits fast kahl, unterseits dünnfilzig graugrün.

β. *genuina*. Stängel dünnfilzig; Bltt. oberseits dünnfilzig, graugrün, unterseits dicht-graufilzig.

γ. *tomentosa*. Stängel und die Bltt. beiderseits dicht-weissfilzig.

An feuchten Orten, in Gräben an Bach-, Fluss- und Teichrändern, um Quellen und Lachen in Dörfern, in der Ebene u. dem Vorgebirge, häufig jedoch nicht überall. Um *Br.* bei *Bischwitz a. W.*, *Paschkerwitz*, *Trebnitz*, *Riemberg*, *Dyhrenfurth*. Um *Prausnitz*, *Trachenberg*, *Militsch*, *Wohlau*, *Bunzlau*, *Beuthen a. O.* *Charlottenbrunn*, *Hirschberg*, *Oppeln*. Aug., Sept. 2.

Diese Art ist in der Bekleidung, Gestalt und Einzahnung der Bltt. und anderen Merkmalen sehr veränderlich, doch in der hier gefassten Umgränzung an dem ährig-quiriligen Blütenstand und dem Filz der Bltt. von den anderen leicht zu unterscheiden. Kronen blasblau.

M. Pulegium L. Blumen in entfernten, kugeligen Quirlen; Kelche röhrig, bei der Fruchtreife durch einen Haarring geschlossen; Bltt. elliptisch, stumpf verloren gezähnt.

Auf feuchten Grasplätzen an Rändern von Lachen und Flüssen, d. d. g. G. vorzüglich in der Ebene, hin und wieder. Um *Br.* bei *Pöpelwitz*, *Masschwitz*, *Friedewalde*, *Grüneiche* etc. Juli, Aug. 2.

Wurzel kriechend. Stängel am Gr. wurzelnd, aufsteigend. Kelch flüppig. Blumen lilaf. Mit den Blumen als *Hb. Pulegii officinell*, von scharf-aromatischem bitterem Geschmack.

Anmkg. Die bei uns wildwachsenden Arten finden in der Medicin keine Anwendung, sondern nur *M. piperita* mit länglichen Aehren, gefurchtem Kelche und

länglichen gestielten Bltt. und deren Varietät *M. crispa* mit krausen Bltt. Erstere besitzt unter allen Arten das meiste ätherische Oel und ist im Theeaufguss ein sehr gebräuchliches Hausmittel.

Lycopus L. Wolfstrapp. Ein Paar Staubgefässe mit Staubbeutel mit oder ohne Ansatz zu einem zweiten Paare. II, 1.

L. europaeus L. Bltt. eifg.-länglich, buchtig-gezähnt, am Gr. fiederspaltig.

An nassen und feuchten Plätzen, in Gräben, an Teich- und Bachrändern zwischen Gesträuch und Rohr, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juli, Aug. 2.

Stängel aufrecht, 1 - 3' h., vierkantig, häufig einfach. Bltt. gegenständig, nach oben zu allmählig kleiner, kahl oder feinhaarig. Blüten in den Blattwinkeln gehäuft. Kelchzipfel stachelspitzig. Kronen klein, weiss, mit rosaf. Punkten. Enthält einen bittern harzigen Stoff.

2. Monardeae. Zwei vollständige unter der Oberlippe parallele Staubgef. Krone rachenförmig.

Sálvia L. Salbei. Das Band der Staubbeutel ist fadenförmig liegt quer auf dem Staubfaden steigt gegen die Oberlippe an, und trägt an seiner Spitze ein Staubbeutel-fach, das kürzere Ende aber den Ansatz zum zweiten Fache. II, 1.

* *S. officinalis* L. Stängel am Gr. holzig; Bltt. lanzettlich-länglich-runzlich, Kelchzähne in eine dornige Granne endigend; Kronenröhre inwendig mit einem Haarringe.

Ist in Südeuropa heimisch und wird bei uns fast in allen Gärten gebaut. Juni, Juli. 2.

H. 2 - 3'. Blumen in 6 - 12blumigen Quirlen, mit hinfälligen Deckbltt. Kronen violett. Die Bltt. sind als *Hb. Salviae* officinell, riechen fast balsamisch und schmecken aromatisch bitter-zusammenziehend; der Absud ist als Gurgelmittel und der Gebrauch der frischen Bltt. zur Reinigung des Zahnfleisches allgemein bekannt.

S. glutinosa L. Stängel krautartig; Axe, Deckbltt. u. Kelche drüsig-zottig und klebrig; Bltt. spieß-herzfg. grobgesägt, die oberen langspitzig.

In Bergwäldern zumal an Haulehnen. Auf der *Landecke* bei *Huttschin* von Grabowski und im *Niedercker Schlage* bei *Ustron* von Kotschy gef. Juni, Juli. 2.

Stängel 3 - 4' h. Deckbltt. so lang als die Kelche. Bltt. gross und breit. Kronen gross, schmutzig-schwefelgelb mit röthlichen Punkten.

S. pratensis L. Stängel krautartig; Axe, Deckbltt. u. Kelche klebrig-haarig; Bltt. eifg. doppelt kerbig-gesägt ungetheilt oder dreilappig, runzlig, unten weichhaarig, die Wurzelbltt. herzfg., gestielt; Blumen zu 6 in jedem Quirl.

Auf Grasplätzen an hohen Wegrändern und Ackerrainen auf trocknen Wiesen und steinigen Hügellehnen in d. Ebene und dem Vorgeb.

hie und da sehr häufig, doch nicht überall. Um *Br.* bei *Carlowitz*, *Oswitz*, *Fuchsbg.* bei *Ottwitz*, und am Wege nach *Trebnitz*, so wie längs der nach *Strehlen*, *Nimptsch* u. *Schweidnitz* führenden Chausseen. Um *Wohlau*, *Wilkau* bei *Beuthen a. O.*, *Ohlau*, *Oppeln*. *Trop. Te.* Juni, Juli. 2.

Stängel 1 - 2' h., Quirle gesondert, Axe einfach oder mit 2 Nebenaxen. Kronen gross mit gewölbter helmförmiger vorgezogener Oberlippe, unter welcher die Staubgef. verborgen sind, blau bis violett, auch weiss, selten fleischroth, häufig aus blau und weiss gemischt. Hat einen scharfen grob-aromatischen Geruch und Geschmack.

S. verticillata L. Bltt. fast 3eckig-herzfg. ungleich kerbig-gezähnt; die Blattstiele der unteren Bltt. gezähnt; Blüten in gesonderten vielblumigen fast kugeligen Quirlen.

Auf Grasplätzen an Wegrändern und auf sonnigen und steinigen Hügeln, besonders auf Kalkboden, im Vorgeb. z. B. um *Liebesdf.* am *Sattelwald* nach *Unverricht*, *Reinerz*, *Habelschwerdt*, *Annaberg* bei *Kosel*; auch in der Ebene vereinzelt um *Br.*, häufiger in *OS.* um *Oppeln*, *Krappitz*, *Rosenberg*, *Falkenberg*, *Katscher*. *Gräfenberg*. *Trop. Te.* Juni, Juli. 2.

Stängel 1½ - 2' h., haarig. Bltt. haarig. Kronen klein, hellviolett.

Anmkg. Nach v. Mückesch's Angabe soll *S. sylvestris* im Gebiete von *Troppau* gefunden worden sein; neuerdings wenigstens ist sie daselbst von Niemandem beobachtet worden.

3. *Satureinae.* Staubgefässe von einander entfernt, oben auseinandergehend oder gegeneinandergeneigt mit einem breiten Bande zwischen den gesonderten Staubbeuteln. Krone fast zweilippig mit kurzer Röhre.

Origanum L. *Dost.* Blumen in Aehren gestellt mit dachziegelförmigen Deckblättern. Staubgef. oben auseinandergehend. Kelch gleichmässig 5zählig oder schief-gespalten und an der Spitze dreizählig oder ganz. XIV, 1.

O. vulgare L. Kelch 5zählig; Bltt. eifg., spitz, fast kahl.

Auf bewaldeten sonnigen und steinigen Hügeln, steinigen Berglehnen im Vorgeb. Um *Br.* bei *Treschen* u. *Schummel* u. *Koberwitz* n. *Krause*. Um *Strehlen*, *Nimptsch*, *Silberberg*, *Warthe*, *Striegau*, *Fürstenstein*, im *Riesengeb.* *Leobschütz*. *Thomasdorf* im *Gesenke*. *Xyrowa* in *OS.* *Troppau*. *Teschen*. Juli. 2.

Stängel aufrecht, unten fast zottig, meist braunroth, 1 - 1½' h. Deckbltt. kahl oder behaart, länger oder kürzer als die Kelche, dunkel rosa-violett. Kronen purpurf., grösser oder kleiner. Die Blumen sind polygamisch. Die blühenden Spitzen sind officinell, von stark-aromatischem Geruche und aromatisch-bitterm Geschmack, das nach Linné im Theeaufguss als Getränk dienen kann.

* *O. Majorana* L. *Majoran.* Kelch halbirt, ohne Unterlippe, eiförmig; Bltt. gestielt elliptisch, stumpf, beiderseits grau-filzig. Einheimisch in Portugal und Nordafrika; bei uns häufig gebaut. Juli, Aug. ☉.

Deckblt. dicht-dachziegelförmig. Kronen weiss, wenig vor den Deckblt. hervorragend. Ist ein beliebtes Gewürz und Küchenkraut.

Thymus L. Quendel. Blumenquirle ährenförmig oder kopfförmig gestellt. Staubgef. oben auseinandergehend. Kelch 2lippig. XIV, 1.

Die Blumen sind polygamisch, daher Formen mit grösseren Kronen hervorragenden Staubgef. und andere mit kleineren Kronen und eingeschlossenen Staubgef. Die Form und der Geruch der Bltt. und die Bekleidung sind sehr veränderlich, daher viele unhaltbare Arten aufgestellt wurden.

Th. Serpyllum L. Blütenquirle kopfig oder traubig-gestellt; die unteren Kelchzähne so lang als seine Röhre; Bltt. oval oder rundlich, gestielt, unterseits eben; Stängel niederliegend, nebst den Aesten an den Ecken kurzhaarig oder zottig.

α. glaberratus. Kelche und Bltt. kahl, Bltt. oft kreisrund.

β. vulgaris. Kelche haarig; Bltt. verkehrt-eif.; Blüthenköpfe kurz.

γ. caudatus. Kelche haarig; Bltt. elliptisch; Blüthenähre sehr lang.

δ. adscendens. Kelche haarig; Aeste sehr lang, aufsteigend, oben Ästig; untere Quirle entfernt, obere in länglichem Kopfe.

ε. lanuginosus. Kelche rauhaarig; Bltt. auf beiden Flächen haarig. *Th. lanuginosus* W. et Gr. sil.

Auf Grasplätzen, an Dämmen, Rainen, auf sonnigen und steinigten Hügeln und Waldplätzen, in Gehölzen und Haiden, an Felswänden im Gebirge. Die var. *α.* besd. auf Bergen, am *Geiersberge*, im *Aupen-grunde* im Riesengeb., *Kessel* im Ges. *ε.* bei *Eisersdorf* um *Glaz* von Schummel gef. Juli—Sept. *h.*

H. der Aeste 3-10". Kronen rosapurpurf. oder weiss. Zahlreiche eingesenkte Oeldrüsen auf der Unterseite der Bltt. Der Geruch des Krautes ist sehr verschiedenartig, bisweilen deutlich nach Zitronen. Die blühenden Zweige sind als *Hb. Serpylli* officinell und gehören zu den gewürzhaften Kräutern, die man äusserlich anwendet; der Theeaufguss giebt ein angenehmes Getränk. Für die Bienenwärter ist der Quendel ein wichtiges Gewächs.

Th. angustifolius Persoon. *T. serpyllum β. ang.* Koch Syn. Blütenquirle kopfig; die unteren Kelchzähne länger als seine Röhre; Bltt. elliptisch, unterseits liniirt, starr; Stängel niederliegend; Aeste auf den Flächen weichhaarig, an den Ecken kurzhaarig oder zottig.

Auf Sandboden, auf sandigen Hügeln, in Haiden und Kieferwäldern d. d. g. G. in der Ebene u. dem Vorgeb. häufig. Juli, Aug. *h.*

Nach *Fries* ist diese Art der wahre *T. Serpyllum* des *Linné*, daher er den vorigen *T. Chamaedrys* benennt. Auch dieser, den ich für eine durchaus verschiedene Art halte, durchläuft eine Reihe von Modificationen. Die Bltt. sind bald lineal-elliptisch, bald oval-elliptisch, an schattigen Stellen auch mit verlängerten schlaffen Aesten. Kronen purpur-roth, purpur-violett oder weiss. Geruch weniger angenehm.

Calamintha Münch. Krone zweilippig. Staubgefässe oben gegeneinandergeneigt. Kelch zweilippig. Quirle ohne Hülle. XIV, 1.

C. Acinos Clairville. *T. Acinos L.* W. et Gr. sil. Blumen zu 6 im Quirl; Bltt. eifg., gesägt; Kelchzähne bei der Fruchtreife zusammenschliessend.

Auf trocknen, sandigen und steinigen Hügeln und Brachen, d. d. g. G. auch im Vorg. nicht selten. Um *Br.* bei *Carlowitz*, *Fuchsberg* bei *Schwuitsch*, *Oswitz* u. m. Juli, Aug. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., aufrecht, ästig, zottig. Kronen röthlich blau oder weiss. Hat einen unangenehm-scharfen Geruch.

Clinopodium L. Wirbeldost. Krone zweilippig. Staubgef. oben gegeneinandergeneigt. Kelch zweilippig. Quirle kreisförmig von einer aus bortlichen Deckbltt. bestehenden Scheinhülle gestützt. XIV. 1.

C. vulgare L. Stängel aufrecht, zottig.

In lichtigem Gehölz, Wäldern, an Hecken, d. d. g. G. auch im Vorg. gemein. Juli, Aug. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 2' h. Bltt. eifg.-länglich, mit entfernten Zähnen, oberseits haarig. Kronen purpurf. oder weiss. Kann als Theesurrogat dienen.

4. Nepeteae. Vier Staubgef., unter der Oberlippe parallel: das obere Paar länger. Krone 2lippig. Kelchzähne zuletzt abstehend oder gegeneinandergeneigt.

Nepeta L. Katzenkraut, Blätter in einem aus Spirren zusammengesetztem Schweif. Mittellappen der Unterlippe gerundet, hohl. XIV, 1.

Die Arten dieser Sippe sind bei uns nur verwildert.

† **N. Cataria L.** Bltt. eifg., unterseits grau-filzig, Kelchzähne mit pfriemlicher Stachelspitze; Nüsse glatt und kahl.

In Dörfern an Zäunen, Mauern und Schutthaufen, auf Gartenland und an Wegen, hin und wieder zerstreut besd. in Gebirgsdörfern, wo sie aus den Gärten her stammt, und in *OS.* Um *Br.* selten und einzeln. Um *Wohlau*, *Wehrau* und *Bunzlau*, *Freiburg*, *Striegau*, *Hirschbg.* *Oppeln.* Juli, Aug. 2.

Stängel $1\frac{1}{2}$ - 2' h., weissgrau, aufrecht. Bltt. gestielt, weich, oberseits runzlig. Kronen weissgelb, am Schlunde mit violetten Punkten. Die geriebenen Bltt. riechen stark zitronenartig, als Aufguss und zu Fussbädern angewandt. Die Katzen lieben das Kraut.

N. nuda L. Bltt. länglich, beiderseits kahl; Kelchzähne linealisch, spitzlich; Nüsse körnig, an der Spitze behaart.

In Dörfern und an Wegen. Um *Br.* einigemal von Schummel, und in *OS.* um *Oppeln*, *Ratibor* und *Leobschütz* von *Grabowski* gef. Juli, Aug. 2.

Stängel oben meist mit ruthenförmigen Aesten. Kronen weissröthlich mit rothen Punkten im Schlunde.

Glechóma L. Gundtrebe. Blüten in winkelständigen Schein-Quirlen. Mittellappen der Unterlippe flach, verkehrt-herzfg. XIV, 1.

G. hederaceum L. Bltt. gekerbt, nierenfg., Stängel kriechend.

Auf Grasplätzen in Gebüsch und Wäldern, an Gräben, auf feuchten Wiesen, an Hecken und Gartenzäunen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. April, Mai. 2.

Die Stängel kriechen und wurzeln und treiben nach oben aufrechte einfache Aeste von 2 - 8" Länge. Die oberen Bltt. fast herzfg. Kronen blau, selten rosaf. od. weiss. Das Kraut war als *Hb. Hederæ terrestris* officinell, riecht unangenehm und schmeckt bitter und herbe, sonst hochgeschätzt, jetzt nur noch als Suppenkraut im Gebrauch.

5. **Stachydeae.** Vier Staubgef. unter der Oberlippe parallel; das untere Paar länger. Krone 2lippig. Kelchzähne zuletzt abstehend.

Melittis L. Bienenkraut. Kelch glockig. Oberlippe der Krone flach, gerade, Unterlippe mit verkehrt-eiförmigem flachem Mittellappen. Staubbeutel paarweise ins Kreuz gestellt. XIV, 1.

M. Melissophyllum L.

In Waldgegenden der höheren Ebene u. d. Vorgebirges zerstreut. Um *Br. zw. Schüllerlehle u. Gohlau. Heydewilzen.* Zwischen *Haufen* und *Riemberg.* Am *Zobten* u. *Geiersberge.* *Rummelsbg.* bei *Strehlen.* *Harthebg.* b. *Frankenstein.* *Schobergrund* bei *Nimptsch.* In *OS.* um *Winow* und *Grosstein* bei *Oppeln, Proskau, Rosenberg, Leobschütz, Herlitz* und *Jägerndorf.* Mai. 2.

Stängel meist mehrere aus einer Wurzel buschig, 1 - 1½' h., einfach, aufrecht, rauchhaarig. Bltt. eifg., schwach - herzfg., rauchhaarig. Blumen 1 - 3 gestielt, winkelständig, einseltwendig. Kelch mit kurzer oder zugespitzter, ungetheilter oder ausgerandeter, zweispaltiger, auch dreizähliger Oberlippe. Oberlippe der Krone bald ganzrandig, bald ausgerandet. Krone gross, weiss und purpurfarben gemischt. Frisch ist die Pflanze fast geruchlos, trocken riecht sie angenehm wie *Anthoxanthum.*

Lámium L. Taubnessel. Kelch röhrig. Kronenröhre am Schlunde erweitert, Oberlippe helmförmig-gewölbt, Seitenlappen der Unterlippe abgestutzt zahnförmig, Mittellappe breit ausgerandet am Gr. verschmälert. Narben zugespitzt. XIV, 1.

L. amplexicaule L. Bltt. rundlich-nierenfg., stumpf-gekerbt; die oberen stengelumfassend, fast gelappt; Kronenröhre gerade.

Auf Aeckern, Brachen und Gartenbeeten, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. März — Mai und im Herbst. ☉.

Stängel ½' h. Kelche rauhzottig. Kronen purpurroth mit langer dünner Röhre. Die Kelchzähne ändern in der Länge ab.

L. purpureum L. Bltt. eihersfg., gestielt, ungleich kerbig-gesägt; Kronenröhre gerade.

Auf Acker-, Brach- und Gartenland überall gemein. März, April und im Herbst. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ h., glasartig-glänzend. Bltt. ruzmalig, die unteren rundlich. Kronen purpurfarben, oder rosaf. Oft, besond. im ersten Frühling, sind die Bltt. roth.

L. maculatum L. *Geflechte T.* Bltt. herzeifg., ungleich gesägt; Kronenröhre gekrümmt über dem Grunde mit einer Einschnürung in die Quere; Rand des Schlundes mit einem pfriemlichen Zahn auf jeder Seite.

Auf feuchten und schattigen Plätzen, an Grabenrändern, Bächen, sumpfigen Waldrändern, in feuchten schattigen Wäldern von d. Ebene bis in das Hochgebirge. Um Br. in *Hühnern* im Dorfe, hinter der *Wildschützer Mühle*, bei *Lissa*, *Arnoldsmühl*, *Skarsine*, *Trebnitz* u. m. Durch das ganze Vorgebirge. *Kessel* im Gesenke. Mai, Juni. ♀.

Wurzel kriechend. Stängel am Gr. wurzelnd, von unten ästig, unten niederliegend und aufsteigend, 1 - 2' h., glasartig-glänzend. Bltt. ändern ab in Breite, Zuspitzung und Bekleidung; die gefleckten sind selten. Blüthen 10 - 16 in einem Quirl. Kronen gross, lebhaft purpurfarben.

L. album L. *Weisse T.* Bltt. herzeifg., langspitzig, ungleich-gesägt; Kronenröhre gekrümmt, über dem Grande mit einer schrägen Einschnürung; Rand des Schlundes mit 3 kleinen Zähnen und einem grösseren pfriemlichen Zahn auf jeder Seite.

An Hecken, Mauern und Grabenrändern in Dörfern u. Vorstädten in d. Ebene u. d. Vorgeb. zerstreut. Um Br. häufig. Mai, Juni, Aug. Sept.

Kronen von der Grösse der vorigen aber weiss. Bentham sieht diese und die vorige als Abarten einer Art an; ich sah nie einen Uebergang. Das frische Kraut riecht unangenehm. Die Blüthen waren als *Fl. Urticae mortuae* officinell.

Galeobdolon Hudson. *Goldnessel.* Kelch röhrig. Kronenröhre am Schlunde erweitert; Oberlippe helmförmig-gewölbt, Unterlippe mit spitzen Zipfeln. XIV, 1:

G. luteum L. *Galeopsis Galeobdolon* Linn. Bltt. rundlich-eifg. *β. montanum.* Die oberen Bltt. lanzettlich-langspitzig.

In Hainen und Wäldern der Hügel-Ebene und des Vorgeb. Um Br. bei *Bischwitz* in der Müncher Haide, *Goi* bei *Kapsdorf*, *Arnoldsmühl*, *Lissa*, in der *Trebnitzer* Hügelreihe. *Wohlau*. *Zeche*, *Hohlstein* bei *Bunzlau*. *Ohlau*. *Oppeln* in den *Pascheken*, b. *Winow* etc. *β.* im Vorgeb. um *Charlottenbrunn*, an der *Eule* etc. *Trop.* und *Te.* Mai, Juni. ♀.

Stängel unten wurzelnd, mit aufsteigenden, an den Kanten rückwärts-haarigen Aesten. Bltt. gestielt, rundlich-eifg., die ersten gefleckt. Kronen gross, goldgelb, innen mit bräunlichen Flecken.

Galeopsis L. *Dawn.* Kelch röhrig. Kronenröhre oben erweitert; Oberlippe schwach-gewölbt, Unterlippe mit stum-

pfem oder ausgerandeten Mittellappen; am Schunde beiderseits ein Höker (oder hohler Zahn). Staubbeutel in zwei Klappen geöffnet. XIV, 1.

G. Ladanum L. Kormwuth. Stängel mit weichen nach unten angedrückten Haaren besetzt, unter den Knoten nicht verdickt; Bltt. lanzettlich oder länglich lanzettlich; Oberlippe der Krone oberflächlich-gezähnt.

α. latifolia. Bltt. länglich-lanzettlich, gleichförmig-sägezählig; Kelche grünlich, rauhaarig. *G. latifolia* Hoffmann.

β. angustifolia. Bltt. lineal-lanzettlich, ungleich oder verloren-gezähnt; Kelche grauzottig. *G. angustifolia* Ehrhart.

Auf Aeckern und Brachen; *β.* auf trocknen Aeckern, steinigen u. sonnigen Hügeln zumal des Vorgebirges, als bei *Wartha, Cudowa, Teschen.* Juli, Aug. ☉.

Stängel aufrecht, oft vielästig, meist röthlich, $\frac{1}{2}$ ' h. Kelche drüsig und haarig, bei *β* grauzottig ohne Drüsen. Krone purpurfarben, aussen feinhaarig, mit langer Röhre. Von beiden Var. giebt es Formen mit grösserer und kleinerer Krone.

G. Tetrahit L. Hanfnessel. Stängel steifhaarig, unter den Knoten aufgetrieben; Bltt. länglich-eifg., langspitzig, Kronenröhre fast so lang als der Kelch.

Auf Aeckern, an Zäunen und Hecken, in Gestrüpp auf kiesigen Flussufern, auf sandigen freien Waldplätzen und in Hauen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juli—Sept. ☉.

Stängel steif aufrecht, $\frac{1}{2}$ - 1' h.; einfach oder ästig. Kronen purpurf., fleischf. od. weisslich mit gelbem rothgefleckten Felde am Gr. der Unterlippe. Unterlippe mit länglichem oder äeckigem, vorn abgestutztem oder ausgerandetem oder 2spaltigen Mittellappen. Ueberhaupt erscheint die Pflanze in vielen, auf unwesentlichen Veränderungen gegründeten Gestalten, von denen eine als *G. bifida* v. Bönninghausen bekannt ist. Samen braun, weiss marmorirt.

G. versicolor Curtis. G. cannabina Roth. Stängel steifhaarig unter den Knoten aufgetrieben; Bltt. länglich-eifg., langspitzig; die Kronenröhre doppelt so lang als der Kelch; Mittellappen der Unterlippe fein gekerbt.

Auf feuchten sumpfigen Waldplätzen in Haidegegenden zwischen Gestrüpp, in Erlenbrüchen, in der Ebene u. d. Vorgebirge zerstreut. Um *Br.* bei *Gr. Rake*, im *Goi* bei *Kapsdorf, Trebnitz, Dyhrenfurth, Lissa.* Um *Wohlau, Ohlau, Fürstenstein, Oppeln* bei *Dambrau, Leobschütz. Trop. Te.* Juli, Aug. ☉.

Stängel 2 - 3' h. Kronen sehr gross, gelb, der Mittellappe der Unterlippe purpurfarben.

G. pubescens Besser. Stängel mit weichen, abwärts angedrückten Haaren, unter den Knoten mit steifen Haaren besetzt und etwas verdickt; Bltt. breitereifg. zugespitzt, die unteren fast herzförmig; Kronenröhre länger als der Kelch; Mittellappen der Unterlippe fein gekerbt.

An Wegen und Gräben, in Hecken, Zäunen und Gebüsch um Dörfer und Vorstädte, d. d. g. G. (auch im Vorgeb.?). Um *Br.* in der

Odervorstadt und den anliegenden Dörfern. *Ohlau. Wohlau. Bunz-
lau. Oppeln. Trop. Te.* Juli, Aug. ☉.

Stängel 1 - 2' h., oft vielästig. Bltt. weich, bald welkend. Die oberen Quirle genähert. Kelche am Rande wimperig-bärtig, Zähne drüsig. Krone purpurfarben, $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{2}$ kleiner als die der vorigen, selten mit gelber Oberlippe.

Stachys L. Ziest. Kronenröhre walzig innen mit einem Haarringe, am Schlunde nicht erweitert; Oberlippe schwach gewölbt oder flach, Unterlippe mit grossem verkehrt eigf.- oder -herzfg. Mittellappen. Staubgef. nach dem Verblühen seitwärts gebogen. Nüsse gerundet stumpf. XIV. 1.

St. germanica L. Quirle vielblumig; Stängel dicht wollzotig; Bltt. eiherzfg. wollfilzig, die oberen sitzend lanzettlich; Kelchzähne spitzig, mit einer Stachelspitze.

In Dörfern an Zäunen und Hecken, auf steinigem und trockenem Waldplätzen in der Ebene zerstreut. Um *Br.* bei *Ransern, Bischwitz a. W., Klettendorf, Pilsnitz, Lambsfeld, Oberrnigk, Karoschke* bei *Prausnitz. OS.* um *Oppeln, Grosstein, Krappitz.* Einzeln um *Trop. u. Te.* Juli, Aug. 2.

Stängel 1 - $1\frac{1}{2}$ h. Gewöhnlich ist die ganze Pflanze von der dichten Bekleidung silber- oder bleigrau; doch ist sie bisweilen auch dünner, so dass das Grün der Bltt. durchschimmert. Bltt. gekerbt oder gesägt. Kronen klein, purpurf.

St. alpina L. Quirle vielblumig; Stängel rauhaarig, oben drüsenhaarig; Bltt. eiherzfg., spitz, gesägt; Kelchzähne stumpf mit einer Stachelspitze.

Auf trockenem Waldlehnen im Vorgebirge und Hochgeb. *Zobtenberg. Hohe Mense. Gl. Schneeberg. Riesengeb.* im *Riesengrunde. Leiterberg, Altwater* und *Kessel* im Gesenke. Auf dem *Tul b. Ustron.* Juli, Aug. 2.

Stängel 2 - 3' h. Stark behaart, aber grün. Kronen schmutzig bluthroth.

St. sylvatica L. Quirle 6blumig; Stängel rauhaarig, oben veraestet und mit Drüsen besetzt; Bltt. eiherzfg., zugespitzt, gesägt, rauhaarig; Kelchzähne pfriemlich mit einer Stachelspitze; Kronen doppelt so lang als der Kelch.

In feuchten und schattigen Wäldern, sumpfigen Hauen und Gestrüpp, Erlenbrüchen in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Um *Br.* bei *Schwöitsch, Treschen,* in der *Trebnitzer* Hügelreihe. Juni - Aug. 2.

Stängel $1\frac{1}{2}$ - 2' h. Bltt. dunkelgrün, breit-eigf., die Blütenbltt. lanzettlich; die meisten Quirle blattlos. Kronen schmutzig-purpurroth, Unterlippe mit blutrothen Punkten. Riecht stark und widrig. Die Stängel liefern, wie Hanf bearbeitet, ein brauchbares (?) Garn.

St. palustris L. Quirle 6-12blumig; Stängel steif- oder kurzhaarig; Bltt. a. Gr. herzfg., lanzettlich, spitz, kérbig-gesägt, weichhaarig, die oberen halbumbfassend; Kelchzähne pfriemlich mit einer Stachelspitze; Kronen doppelt so lang als der Kelch.

Auf feuchten Plätzen, an Gräben, Flussrändern, in feuchten Gebüsch und auf feuchten Aeckern d. d. g. G. häufig. Juli—Sept. 2.

Stängel 1 - 2' h., steif-aufrecht, mit abwärts gerichteten, borstlichen Haaren, einfach, oft röthlich. Bltt. länglich oder länglich-lanzettlich, die unteren oft kurz-gestielt. Kronen purpurfarben mit gefleckter Unterlippe.

St. arvensis L. Quirle 6blumig; Stängel aufrecht, steifhaarig; Bltt. eihertzfg., stumpf, gekerbt, schwach behaart; Kelch so lang als die Krone mit lanzettlichen, stachelspitzigen Zähnen.

Auf Brachäckern. Um *Br.* bei *Lissa* von Schummel gef. Um *Teschen* n. *Kotschy*. Juli, Aug. ☉.

Stängel einfach oder von unten mit aufsteigenden Aesten, $\frac{1}{2}$ ' h. Kronen klein, blass-röthlich.

St. annua L. Quirle 4—6blumig; Stängel oben weichhaarig; Bltt. gestielt, kerbig-gesägt, die unteren elliptisch-länglich, die oberen lanzettlich, ganzrandig; Kelche zottig, mit feinhaariger Stachelspitze.

Unter der Saat und auf Brachäckern in der Ebene zerstreut. Um *Br.* bei *Protsch*, *Weide*, *Kapsdorf*, *Rake*, *Koberwitz*. Um *Wohlau*, *Miltsch*, *Nimptsch*, *Oppeln*, *Tarnowitz*. *Teschen* nach *Kotschy*. Aug., Sept. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' h., einfach oder von unten an ästig. Deckbltt. linealisch. Kronen weiss-gelb.

St. recta L. Quirle 6blumig; Stängel aufsteigend, rauhaarig; Bltt. gestielt, länglich-lanzettlich, kerbig-gesägt, die oberen eig., zugespitzt, ganzrandig; Kelche rauhaarig, mit gelber Stachelspitze.

An sonnigen Wegrändern und Hügelwänden, in der Hügelgegend der Ebene. Um *Br.* bei *Kl. Totschen*. *Canth. Weinbg.* bei *Ohlau*. *Vogelgesang* bei *Nimptsch*. *Marmorbruch* bei *Prieborn*. *Grosstein* bei *Oppeln*. *Annaberg*. *Katscher* und *Kösling*. *Trop. u. Te.* Juni. 2.

Stängel 1' h., ziemlich steif. Kronen gelblich, innen mit braunrothen Strichen.

Betónica L. *Betonie*. Kronenröhre walzig, ohne Haarung und ohne Erweiterung am Schlunde; Oberlippe gewölbt, Mittellappen der unteren stumpf. Nüsse gerundet, stumpflich. XIV, 1.

B. officinalis L. *B. stricta* Aiton W. et Gr. sil. Bltt. eig.-länglich, am Gr. herzfg.

Auf freien Waldplätzen, an Waldrändern, in feuchten Gebüsch, in d. Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G., gemein. Juli, Aug. 2.

Stängel einfach, steif-aufrecht. Quirle in eine längliche, am Gr. unterbrochene Achrentraube gestellt. Krone aussen feinhaarig, purpurf. Bltt. behaart oder kahl. Wurzel und Krant waren früher officinell. Die Bltt. können als Theesurrogat dienen. Es giebt viele Varietäten von dieser Pflanze; bei uns kommen nur einige unbedeutende Abänderungen vor.

Marrubium L. Andorn. Staubgef. und Griffel in der Kronenröhre verborgen, die am Ursprunge der Staubgef. einen unterbrochenen Haarring hat. Nüsse an der Spitze in einer dreieckigen Fläche abgestutzt. XIV, 1.

M. vulgare L. Stängel weissfilzig; Bltt. rundlich-eifg., adrig-runzlig.

In Dörfern an Zäunen, Mauern und Schuttplätzen hin und wieder in der Ebene. Um Br. in *Kapsdorf* bei *Hühnern*, *Paschkowitz*, *Mahlen*, *Leuthen*, *Koberwitz*. *Wohlau*. *Beuthen a. O.* *Bunzlau*. In Dörfern um *Oppeln*, *Gleiwitz* etc. Juli—Sept. 2.

Stängel am Gr. ästig, mit aufsteigenden einfachen Aesten, von 1 - 1½' H. Die ganze Pfl. weiss-grau. Kelch mit hakigen Zähnen. Kronen klein, weisslich. Das frische Kraut als *Hb. Marrubii albi* officinell, hat einen angenehmen moschusartigen Geruch und stark-bittern Geschmack, daher ein wirksames balsamisches reizendes Arzneimittel.

Ballóta L. Gottesvergess. Kelch trichterförmig. Kronenröhre nicht erweitert mit schiefem Haarring; Oberlippe flachgewölbt, Mittellappen der Unterlippe verkehrt-herzfg. Staubgef. nach dem Verblühen gerade. Nüsse gerandet, stumpflich. XIV, 1.

B. nigra L. B. ruderalis. Wimm. Fl. v. S. Bltt. eifg.; Kelch mit 5 eifg. begranneten Zähnen.

In Gebüsch an Hecken, Zäunen, Mauern und Schuttplätzen, d. d. g. G. häufig. Juli, Aug. 2.

Dunkelgrün, oft schmutzig-roth. Stängel mehr oder minder behaart, ästig. 1 - 2' h. Bltt. fast länglich-dreieckig, sägesähmig. Kelchzähne und Grannen in der Länge sehr veränderlich. Krone schmutzig-purpurf. oder weiss, aussen feinhaarig.

Leonúrus L. Herzgespann. Kelch kreiselförmig. Kronenröhre nicht erweitert, mit einem Haarring; Oberlippe fast flach, Lappen der Unterlippe stumpf, meist, umgerollt. Die Nüsse in einer dreieckigen Fläche abgestutzt. XIV, 1.

L. Cardiaca L. Die unteren Bltt. handfg.-5 theilig eingeschnitten gesügt, die oberen länglich, am Gr. keifg., 3 spaltig.

An Hecken, Zäunen und Mauern in Dörfern und Vorstädten, d. d. g. G. gemein. Juli—Sept. 2.

Dunkelgrün, aufrecht, 1 - 2' h., ästig. Alle Quirle beblättert. Kelche stechend. Kronen klein, rosapurpurf. oder weiss, die Lappen der Unterlippe umgerollt, so dass ein einziger länglicher Lappen zum Vorschein kommt.

Chaetúrus Ehrhart. Kelch kreiselfg. Kronenröhre ohne Haarring und ohne Erweiterung; Oberlippe flach gewölbt, Unterlippe fast aufrecht mit stumpfem Mittellappen. Die Nüsse in einer dreieckigen Fläche abgestutzt. XIV, 1.

C. Marrubiastrum Reichenbach. *Leonurus M.* Linn. Bltt. länglich.

An Zäunen und Mauern in Dörfern und auf Brachen in d. Ebene zerstreut. Um *Br.* in *Oswitz*, *Schwoitsch*, *Bischofswalde*, um *Allhof* und *Treschen*. *Pudschütz* bei *Frausnitz*. *Wohlau*. *Ohlau*. *Opeln*. Juli—Sept. ☉.

Stängel steif-aufrecht, von unten ästig, 1 - 2' h., weichhaarig. Hell- und mattgrün. Bltt. oben und unten verschmälert. Kronen rosafarben.

6. Scutellarinae. *Vier Staubgef. unter der Oberlippe parallel. Krone 2lippig. Kelch bei der Fruchtreife oben zusammengedrückt-geschlossen.*

Scutellaria L. Schildträger. Kelch mit zwei ganzrandigen nach dem Verblühen geschlossenen Lippen, die Oberlippe am Rücken mit einer hohlen zuletzt abfallenden Schuppe. Kronenröhre am Schlund erweitert, ohne Haarring; Oberlippe 3spaltig, Unterlippe ungetheilt. XIV, 1.

S. galericulata L. Stängel mit weichen, abwärts-stehenden Haaren besetzt; Bltt. herzfg., länglich od. lanzettlich, kerbig-gesägt; Kelche kahl.

An feuchten buschigen Plätzen, Graben-, Teich- und Flussrändern, auf nassen Waldwiesen, in der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Juni—Aug. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., schwach, v. Gr. ästig. Bltt. schwach-rundlig. Kronen blau. Unterlippe innen weiss mit blauen Punkten. Schlund fast verschlossen.

S. hastifolia L. Schwedisch Fieberkraut. Stängel mit weichen, aufwärts stehenden Haaren besetzt; Bltt. am Gr. mit 1—2 Zähnen beinahe spießförmig, ganzrandig; Kelche drüsig.

An Gräben und feuchten Wiesen in der Ebene hie und da vereinzelt. Um *Br.* bei *Schwoitsch* u. m. *Wohlau*, *Beuthen a. O.* *Ohlau*. *Drahömischl* bei *Te.* Juli, Aug. 2.

Wie die vorige. Bltt. etwas grösser, nur die unteren spießförmig, mit glatten Flächen. Krone blau. Schlund stark-aufgeblasen.

Prunella L. Braunelle. Kelch 2lippig, 5zählig. Kronenröhre kurz mit einem Haarring; Oberlippe helmförmig am Rücken gerillt, Lappen der Unterlippe stumpf. XVI, 1.

P. vulgaris L. Die längeren Staubgef. an der Spitze mit dornförmigem Zahne versehen; Oberlippe des Kelches mit 3 gestutzten stachelspitzigen, Unterlippe mit 2 eilanzettlichen, stachelspitzigen Zähnen.

Auf Wiesen, Triften, freien Waldplätzen, in Gebüsch, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Juni—Sept. 2.

Wurzel kriecht. Stängel am Gr. liegend oder aufsteigend. Bltt. gestielt mit zerstreuten borstlichen Haaren, eifg.-länglich, verloten-gezähnt. Die Quirle in einem läng-

lichen endständigen Kopfe. Krone violett oder weiss mit kahler Oberlippe. — Anderwärts giebt es eine Abänderung mit fiederspaltigen Bltt.

P. grandiflora L. Die längeren Staubgef. an der Spitze mit einem kleinen Höker versehen; Oberlippe des Kelches mit breit-eifig-spitz-gegrannten Zähnen. *P. vulgaris* β . *grandiflora* L.

Auf Wiesen und Triften im Vorgeb. hie und da auch in der Ebene. Um *Br.* auf Wiesen vor *Lissa*, an Ackerrändern um *Gr. Glauche*. An den Kieselschieferbrüchen bei *Steine. Geiersberg. Malapane*. Mai, Juni. 2.

Wie die vorige aber grösser, Blumen doppelt so gross. Bltt. eifg.-länglich, am Grunde gezähnt, bisweilen fiederspaltig. Oberlippe der violetten Krone am Rücken weichhaarig.

7. *Aiuoideae*, Krone einlippig; die Oberlippe fehlt gänzlich oder ist sehr kurz. Nüsse netzaderig-runzlig.

Ajúga L. *Günsel*. Oberlippe der Krone aus 2 kleinen Läppchen bestehend, Unterlippe 3lappig mit genäherten Lappen, Röhre mit einem vollständigen von dem Ursprunge der Staubgefässe entfernten Haarringe. XIV, 1.

A. genevensis L. *A. alpina* L. Wimm. Fl. v. S. Ohne Ausläufer.

Auf Wiesen, an Waldrändern, buschigen und grasigen Dämmen, in Obstgärten, in der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Mai, Juni. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' h., sottig. Bltt. sottig, länglich, eingeschnitten-gezähnt, die am Stängel und die an der Wurzel gleich gross. Blüthenbltt. gezähnt. Quirle in länglicher Aehre. Kronen azurblau, selten rosenroth oder weiss.

A. reptans L. *Blauer Guckuk*. Mit Ausläufern.

In Hainen und Wäldern, auf Waldwiesen, in der Ebene u. d. Vorgeb. gemein. Mai, Juni. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' h., fast kahl. Bltt. fast kahl, länglich-verkehrt-eifg., schwach-kerbig-gezähnt, die wurzelständigen rosettenförmig ausgebreitet und grösser. Kronen kleiner, sattblau, auch fleischfarben oder weislich. Das Kraut war als *Hb. Bugulae* s. *Consolidae maj.* ehemals officinell, ist jedoch unbedeutend.

Chamaepitys Tournefort. Oberlippe der Krone sehr kurz ausgerandet, Unterlippe dreilappig, Mittellappen verlängert, Seitenlappen kurz, aufsteigend, vom mittleren entfernt; Röhre mit einem unterbrochenen Haarringe am Ursprunge der Staubgefässe. XIV, 1.

C. vulgaris Link. *Teucrium C. L. Ajuga C.* Schreber. Koch Syn.

Auf trocknen und steinigen Brachäckern. Um *Oppeln* bei *Kl. Tarnau, Kl. Schminitz* und *Sacrau* von Grabowski und Fincke i. J. 1826 gefunden. Mai, Juni. ☉.

Stängel 2 - 4" h., selten einfach, meist von unten in Aeste gelöst, rauchhaarig und ganz beblättert. Bltt. haarig, 3theilig mit linealischen Zipfeln. Blumen einzeln, winkel-gegenständig, kurz-gestielt. Kronen gelb. Das Kraut riecht rosmarinartig und schmeckt balsamisch-bitter; es war ehemals officinell.

Téucrium L. Gamander. Die Kronenröhre kurz und ohne einen Haarring. Die Oberlippe tief 2theilig, ihre Zipfel liegen auf dem Grunde der unteren Lippe, so dass diese 5theilig erscheint; die Staubgefäße ragen über die Spalte der Oberlippe heraus. XIV. 1. j

T. Scordium L. Lächknoblauch. Bltt. länglich-lanzettlich grob gesägt; Blumen zu 4 im Quirl.

In Gräben, an Teich- und Flussrändern, auf Sumpfwiesen, in d. Ebene zerstreut. Um Br. bei *Rothkretscham*, *Bischwitz a. W.*, *Tschechnitz*, *Lissa*, *Hühnern. Wohlau. Pasche b. Beuthen. Oppeln.* Juli, Aug. 2.

Stängel aufrecht, am Gr. mit kurzen blättertragenden Ausläufern, $\frac{1}{2}$ - 1' h., zottig. Kronen blass-purpurroth. Das frische Kraut hat einen starken Knoblauchgeruch und schmeckt stark-bitter, als *Hb. Scordii* officinell.

T. Botrys L. Bltt. fast doppelt-fiederspaltig; Blumen zu 2-6 im Quirl.

Auf Aeckern und Brachen. Um *Grosstein* bei *Oppeln* schon von *Krock.* dann bei *Proskau, kl. Schinnitz, Muchenitz u. Tarnau* von *Grabowski* gef. Am *Kitzelbg.* und *Mühlberge* bei *Kaufung* und *b. Seitendorf* nach *Nees v. E.* Zwischen *Striegau* u. *Bolkenhayn* nach *Chaussy.* *Fischerbg. b. Polsnitz* nach *Unverricht.* Juli, Aug. ☉.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' h., vom Gr. vielästig, etwas klebrig. Kronen blass-purpurf. mit gelblichem schwarz-punktirten Schlunde.

Anmkg. Als Topfgewächs ist allgemein bekannt das durch seinen äusserst starken süchtigen aromatisch-campherartigen Geruch ausgezeichnete *T. Marum*, das im südlichen Europa einheimisch ist. — Nach v. Mäekusch Angaben soll *T. montanum* in der Umgegend von *Troppau*, so wie nach einer anderweitigen Tradition *T. Scorodonia* in der Gegend von *Schönau* bei *Jauer* gefunden worden sein.

Verbéneae Jussieu.

Kelch und Krone 2lippig oder ungleichmässig 4-5theilig. Vier bald ungleiche bald gleiche, oder zwei Staubgef. Fruchtknoten 2-4fächerig, mit je ein oder zwei Eichen. Griffel einfach. Frucht pflaumenartig mit fleischigem lederartigem oder häutigem Ueberzug, vier einsamige Kerne enthaltend oder mit Zerreißung des Ueberzugs in 4 Nüsse zerfallend. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Verbena L. Eisenkraut. Kelch 5spaltig. Krone tellerförmig mit 5spaltigem fast 2lippigem Saum. Frucht in 4 Nüsse zerfallend. II; 1.

V. officinalis L. Blüten in dünnen Aehren; Bltt. dreispaltig-geschlitzt.

An Mauern und Zäunen in Dörfern und Vorstädten, Wegrändern, in der Ebene ziemlich verbreitet, doch nicht überall. Um *Br.* in den meisten umliegenden Dörfern. Um *Wohlau, Beuthen a. O., Bunzlau, Ohlau, Oppeln.* Juni—Sept. ☉.

Stängel steif, 1 - 2' h., mit steil-abstehenden gegenständigen Aesten. Bltt. länglich, gezähnt, scharflich. Kronen klein, lilablau. Ist fast geruchlos, von bitterem zusammenziehenden Geschmack und stand sonst als ein Universal- und Wundermittel in grossem Ansehen.

Lentibulariae Richard.

Kelch zweilippig. Krone zweilippig, gespornt. Zwei Staubgefässe. Ein einfücheriger Fruchtknoten mit einer freien oben kugelförmig verdickten Mittelsäule, einfachem Griffel und 2 Narben. Frucht eine vielsamige Kapsel. Samen ohne Eiweiss mit aufrechtem Keim.

Sumpfpflanzen mit blattlosen Blütenstielen und wenigen endständigen Blumen.

Pinguicula L. Fettkraut. Kelch 5 theilig. Krone rachenförmig. Kapsel zur Hälfte 2klappig. II, 1.

Wurzelbltt. rosettenfg., fleischig.

P. vulgaris L. Sporn pfriemlich, kürzer als die Krone; Kronenzipfel gesondert; Kapsel eiförmig.

Auf moosigen Sumpfwiesen im Vor- und Hochgebirge. Um *Wölfelsdorf* und *Reinerz.* Am *Peterssteine* und im *Kessel* im Gesenke. *Königshuld* u. *Przybor* bei *Oppeln.* *Diehsa* bei *Görlitz.* Juni. ♀.

Bltt. länglich, hellgrün mit röthlicher Rippe, fleischig, von vielen feinen Drüsen klebrig, am Rande zurückgerollt. Schaft stielrund, fleischig, von kurzen Drüsenhaaren klebrig, 2 - 4" h., bald einzeln, bald 2 - 4. Kronen violett. Staubbeutel kugelig.

Utricularia L. Wasserhelm. Kelch 2blättrig. Krone maskirt. Kapsel umschnitten-aufspringend. II, 1.

Die ästigen Stängel unter Wasser mit vieltheiligen feinen Blättchen und gestielten Blasen besetzt, welche vor dem Blühen Wasser, später Luft enthalten; aus dem Knotenpunkte der Stängel entspringt der blattlose Schaft, welcher die kurze Blüthenraube über das Wasser erhebt. Kronen gelb.

U. vulgaris L. Bltt. nach allen Seiten gerichtet, fiederig-vieltheilig mit eiförmigem Umriss, Zipfel haarförmig entfernt, feindornig; Sporn kegelfg., Oberlippe so lang als der Gaumen.

In Gräben und Teichen in der Ebene hie und da. Um *Br.* bei *Scheitnich, Oswitz,* an der Strasse nach *Hundsfeld,* bei *Tschansch.*

Bruch bei Neumarkt. Danckwitz bei Jordansmühl. Bankau bei Kreuzburg. Um Ohlau. In den Boberlachen hinter dem Wehrdamme bei Bunzlau. Bei Swibedove und Grabowitz bei Militsch. Um Oppeln und Karlsruhe. Nieder Berbisdorf bei Hirschberg. Selten um Trop. u. Te. Juli, Aug. 2.

Ist die grösste Art, mit den grössten Blumen. Kronen goldgelb mit orangefarbenen Streifen im Gaumen.

U. intermedia Hayne. Bltt. 2reihig, gablig-vieltheilig, mit nierenförmigem Umriss; Zipfel borstlich mit feinen Dornzähnen; Sporn kegelfg., Oberlippe ungetheilt, doppelt so lang als der Gaum; Fruchtstiele aufrecht.

In Moorsümpfen. In der *Primkenauer Haide* bei Beuthen a. O. von Beilschmied und im *grossen See* an der *Heuscheuer* von Neumann gef. Um *Hosenitz* und *Aschitzau* b. Bunzlau nach Schn. Juli, Aug. 2.

Etwa halb so gross als die vorige; Schaft 4 - 5" h. Kronen gelb mit braunrothen Strichen im Gaum.

U. minor L. Bltt. nach allen Seiten gerichtet, gabelig-vieltheilig, im Umriss eiförmig, Zipfel borstlich ohne Zähne; Sporn sehr kurz-kegelfg., Oberlippe ausgerandet so lang als der Gaum; Fruchtstiele zurückgeschlagen.

In Gräben und Sümpfen. *Garsuche bei Ohlau. Polnisch Tarnau bei Beuthen nach Beilschmied. In Torflachen der Hosenitz bei Sprottau n. Schneider. Im Altteiche bei Wohlaw nach Güntzel. Kreba bei Görlitz n. Rabenhorst. Juni, Aug. 2.*

Von dieser Art sah ich bisher nur ein schlesisches Exemplar ohne Blumen von Garsuche bei Ohlau.

Primulaceae Ventenat.

Kelch 4-5 theilig, dauernd. Krone regelmässig, meist tellerförmig, mit 4-5 spaltigem Saum, Staubgefässe hinter den Kronenzipfeln. Fruchtknoten frei einfächerig, mit einfachem Griffel und ungetheilte Narbe. Frucht eine 4- oder 5klappige selten umschnitten - aufspringende einfächerige Kapsel mit schildförmigen Samen an einer freien dicken Mittelsäule. Samen mit fleischigem Eiweiss und geradem Keim.

Kräuter und Stauden meist mit ungetheilten Bltt. ohne Stützbltt. Einige Arten dem höheren Gebirge eigen. Bei *Anagallis*, *Trientalis* und *Lysimachia* ist die Knospelage der Krone zusammengerollt, bei den übrigen dachziegelförmig.

Trientalis L. *Siebenstern*. Kelch 5-8 theilig. Krone mit sehr kurzer Röhre und 5-8 theiligem ausgebreitetem Saum. Staubgef. meist 7 aus dem Schlunde entspringend. Kapsel springt in 5-8 vollständige nachher zurückgerollte Klappen auf. VII, 1.

T. europaea L.

In schattigen Wäldern in feuchtem Moose besonders des Vorgebirges und in den Mooren des Hochgebirges. Um *Br.* bei *Skarsine* und *Lissa* von Schummel, *Marien Cranst.* v. *Wichura* gefunden. *Deutschhammer. Ohlau. Drüsel, Zeche, Gröbel, Birkenbrück* und *Gröditz* bei *Bunzlau. Charlottenbrunn. Freiburg. Zentner* bei *Neurode. Heuscheuer. Sattler* bei *Hirschberg. Weisse Wiese, Agnend. Schneeegrube* im Riesengebirge. *Herlitz. Allwäter. Lissa Hora* und *Baranio. Juni, Juli. 2.*

Wurzel kriechend, gezähnt. Stängel 2 - 4'' h., unten blattlos, oben eigf.-längliche Bltt. in Gestalt einer Hülle tragend, aus deren Mitte 1 - 4'' kurze einblumige Blumenstiele. Kronen weiss.

Anagallis L. Gauchheil. Kelch 5 theilig. Krone radförmig mit 5 theiligem ausgebreitetem Saum. Staubfäden aus dem Schlunde entspringend. Die Kapsel springt umschnitten auf. v, 1.

A. arvensis L. Kronenzipfel ohne Drüsen.

β. caerulea. Kronenzipfel mit feinen Drüsenhaaren.

Auf Aeckern, Brachen und Gartenland. *β.* auf Thon- und Kalkboden, um *Br.* bei *Schliesa* von v. *Uechtritz*, bei *Koberwitz* und *Kl. Bresa* bei *Bohrau* von *Krause*, um *Oppeln* am *Moritzberge* u. a. von *Grabowski* gef. Juni, Juli. ☉.

Aestig, aufsteigend, 2 - 4'' h., auch niederliegend. Bltt. eigf., etwas dicklich, gegenständig, oder zu 3 im Quirl, unten schwarzpunktirt. Kronen fleisch- oder mennigroth, bei *β* blau, nur bei Sonnenschein ausgebreitet. Fruchtsiiele niedergebogen. Im Herbste bemerkt man verschiedene Missbildungen der Blumen, namentlich eine mit vergrösserten Kelchen und verkümmerten grünlich-rothen Kronenblättchen. Die Pflanze stand früher in grossem Ansehen und soll nach *Orfila* wirklich scharfe Eigenschaften besitzen.

Centunculus L. Kleinling. Blumentheile vier-zählig. Kronenröhre fast kugelig. Kapsel springt umschnitten auf. IV, 1.

Sitzende winzige Blumen.

C. minimus L. Bltt. eigf., wechselständig.

Auf feuchtem Sandboden, Aeckern, Teich- und Flussrändern, um Ziegeleien, in der Ebene hin und wieder. Um *Br.* bei *Friedewalde, Lissa* etc. *Bunzlau. Ohlau. Oppeln. Zottig* bei *Trop.* Juli, Aug. ☉.

- Stängel liegend, wurzelnd, ästig, vorn aufsteigend, 1 - 2'' lang. Kelchzipfel linealisch. Kapsel kugelig. Bltt. und Blüten winzig.

Lysimachia L. Kelch 5 theilig. Krone radförmig mit 5 theiligem Saum. Staubfäden aus dem Schlunde entspringend. Kapsel fünfklappig. v, 1.

L. thyrsiflora L. Blüten in winkelständigen, gestielten Trauben; Bltt. lanzettlich.

In beschatteten Gräben und am Rande sumpfiger Teiche zwischen Gesträuch in der Ebene. Um *Br.* bei *Scheitnich*, *Marienau*, *Schwoitsch*, *Lissa*, *Protsch a. W.*, *Claren-Cranst.* *Wohlau.* *Ohlau.* *Schlava* bei *Beuthen.* *Gnadenberger Wasser*, *Boberlachen*, *Försterbach* bei *Bunzlau.* *Giersdorf*, *Lomnitz* und *Warmbrunn.* *Oppeln.* *Wronin.* *Moosebruch* bei *Reiwiesen.* *Teschen.* Mai, Juni. 2.

Stängel am Gr. sählig, wurzelnd, aufrecht, 6 - 8" h. Bltt. lineal-lanzettlich, halb-umfassend, fein schwarzpunktirt. Die Blumen in den Winkeln der mittleren Bltt., Trauben eig.-länglich, dicht. Kronen klein, gelb, mit linealen Zipfeln und einem Zahn zwischen je 2 Zipfeln. Staubfäden am Gr. durch einen schmalen Ring verbunden.

L. vulgaris L. Stängel aufrecht; Bltt. eig.-länglich; Blumen rispig auf winkelständigen, traubigen Stielen; Staubfäden bis zur Mitte verwachsen.

In feuchten Gebüsch an Gräben und Bächen, Weidengebüsch an Flussufern, in d. Ebene u. d. Vorgeb. gemein. Mai, Juni. 2.

Stängel 2 - 4' h. Bltt. gegenständig oder zu 3 - 4 im Quirl, unterseits oft feinhairig oder sammetweich. Kronen goldgelb mit elliptischen Zipfeln. Die halb verwachsenen Staubgef. bedecken den Fruchtknoten. Das Kraut ist herbe und etwas säuerlich und war als *Hb. Lysim. luteae* officinell.

L. Num mularia L. Egelkraut, Pfennigkraut. Stängel gestreckt kriechend; Bltt. herzfg.-rundlich; Blumenstiele einzeln in den Blattwinkeln, kurz.

Auf feuchtem Boden ausgetrockneter Gräben und Lachen, auf feuchten Waldplätzen, sumpfigen Wiesen, in d. Ebene u. dem Vorgeb. gemein. Juni, Juli. 2.

Stängel einfach, fasslang. Bltt. blutroth punktirt. Kelchzipfel herzfg. Kronen gross, goldgelb mit rothen Punkten. Staubfäden hängen am Gr. ein wenig zusammen. Das Kraut ist säuerlich und bitter und war als *Hb. Nummulariae* officinell.

L. nemorum L. Gelber Waldmeyer. Stängel gestreckt, mit der Spitze aufsteigend; Bltt. eig., spitz; Blumenstiele einzeln in den Blattwinkeln länger als das Blatt.

In feuchten Wäldern und an Waldrändern des Vorgebirges, d. d. g. *G. Zobtenberg*, *Eule*, *Zentner* bei *Hausdorf*, *Sonnenkoppe*, *Gröditzberg*. *Sattler* und *Agnatendorf* bei *Hirschberg*. *Gesenke.* *Teschen-Geb.* Juni, Juli. 2.

Stängel schwach, 4 - 6" lang, am Gr. wurzelnd. Kronen blass-goldgelb mit breit-eig. Zipfeln. Kelchzipfel linealisch-pfriemlich. Fruchtstiele im Bogen niedersteigend.

Andrósace *L. Mamsschild.* Kelch 5zählig oder 5spaltig. Krone teller- oder trichterfg.; Röhre bauchig am Schlunde zugeschnürt mit einem fünfklappigen Krönchen. Kapsel an der Spitze 5klappig. v, 1.

Schaft blatlos; Blumen in endständigem Schirm.

A. obtusifolia Allione. *A. Chamaejasme* Wimm. Fl. v. S. Wurzel vielköpfig; Blüthenschaft und Kelche fein-sternhaarig; Bltt. lanzettlich, am Gr. verschmälert ganzrandig.

An abhängigen Felswänden im Hochgebirge. Am Basalt in der kleinen Schneegrube, zuerst von Ludwig gefunden. Juni, Juli. ♀.

Wurzelbltt. rosettenf., feinhaarig. Schaft 3-4" h. Hüllbltt. klein, lineal-lanzettlich. Drei bis vier kurzgestielte Blumen. Kelchsknohe kurz. Kronen blass, röthlich-weiss.

A. septentrionalis L. Wurzel einfach; Blüthenschaft sternhaarig; Kelche kahl; Bltt. lanzettlich, gezähnt.

Auf sandigen Brachäckern der Ebene. Bisher nur bei Freyhan von Wessel, bei Wohlau von Güntzel und bei Glogau auf dem Artillerie-Exercirplatz von Schmäck gef. Juni, Juli. ☉.

Bltt. rosettenf., fein-gewimpert. Schaft dick 3-5" h. Hüllbltt. lanzettlich. Kronen milchweiss.

Anmkg. Nach Kotschy ist *A. elongata* einmal bei Poln. Ostrau bei Teschen gefunden worden.

Primula L. Himmelsschlüssel. Kelch 5spaltig. Kronenröhre walzig an der Einfügungsstelle der Staubgef. angeschwollen, am Schlunde mit oder ohne Krönchen. Kapsel an der Spitze 5spaltig. v, 1.

Bltt. an der Wurzel rosettenf. Blumen auf blattlosem Schaft, endständig in einem Schirm.

P. officinalis Jacquin. P. veris a. Linn. Bltt. eifg., unterseits dünn-sammtfilzig; Schirm vielblumig; Kelch aufgeblasen mit eiförmigen, kurzspitzigen Zähnen; Kronensaum hohl.

Auf Wiesen, freien Waldplätzen, an grasreichen Hügellehnen, in der Ebene zerstreut, häufig im Vorgebirge. Um Br. bei Scheitnich, Althof und Oltwitz, Lissa, Koberwitz. Wohlau. Beuthen. Bunzlau. Oppeln. Vom Zobten durch das ganze Vorgebirge mit der folgenden so wechselnd, dass diese gewöhnlich tiefer, die folgende höher vorkommt; bisweilen jedoch auch, wie z. B. bei Donnerau am langen Berge, umgekehrt. April, Mai. ♀.

Wurzelbltt. rosettenf., runzlich, in den Stiel verlaufend, am Rande ausgefressen-gezähnt. Schaft 1' h. Blumenstiele zu 5-15, überhängend. Kelch grüngelb. Kronen citrongelb. Ist wie die folgende polygamisch, daher Kronen von zweierlei Form: a mit kurzem Griffel, stark-aufgeblasenem Ende der Röhre und Staubgef. aus dem Schlunde; b mit langem Griffel, Staubgef. aus der Mitte der Röhre und darüber walzig-erweiterter Röhre. Blumen von schwachem Wohlgeruch, sind officinell. Früher galt die ganze Pflanze als ein ausgezeichnetes Nervenmittel.

P. elatior L. Bltt. eifg., unterseits kurzhaarig; Schirm vielblumig; Kelch mit eiförmigen, zugespitzten Zähnen; Kronensaum flach.

Auf grasreichen Hügellehnen und Waldwiesen im Vorgebirge, meist grosse Strecken bedeckend bis an das Hochgebirge hinaufsteigend. Gröditz und Rothlach bei Bunzlau. Um Charlottenbrunn bei Lehmwasser, Donnerau etc. Salzbrunn. Kupferberg. Hirschberg bis zu den Schlesischen Bauden hinauf. Retnerz. Cudowa. Leobschütz. Gesenke. Mai, Juni. ♀.

Schaft 1' h. Kurzhaarig. Krone grösser als an der vorigen, schwefelgelb. Von dieser Art stammen die vielen in Gärten unter dem Namen der *Primeln* verbreiteten Varietäten.

P. minima L. Bltt. keilfg., vorn abgestutzt und gezähnt, kahl; Schaft kurz, 1-2 blumig.

Auf Grasplätzen und an Wänden des *Riesengebirges*, kaum unter 4000'. Mai, Juni. ♀.

Wurzel ästig-vielköpfig. Bltt. dicklich und saftig, breiter und schmaler; aus ihrer Mitte 1-3 einblumige, 2-8''' lange Blumenstiele. Kronen rosa-purpurroth, bisweilen etwas ins violette neigend, bis zur Böhre 5theilig, Lappen 2spaltig oder 2theilig mit ausgesperrten linealischen Zipfeln.

Hottonia L. *Hottonie*. Kelch tief 5 theilig. Kronenröhre walzig an der Einfügungsstelle der Staubgef. angeschwollen. Kapsel 5klappig. v, 1.

Bltt. unter Wasser fiederig-vieltheilig. Blumen quirlständig auf blattlosem Schaft.

H. palustris L. Blumen gestielt in gleichweit von einander entfernten Quirlen.

In Gräben, Sümpfen und anderen stehenden Gewässern, in der Ebene ziemlich häufig. Mai, Juni. ♀.

Der Stängel treibt unter der Oberfläche des Wassers ringum Aeste, welche mit kammförmig-vieltheiligen Bltt. mit linealischen Abschnitten besetzt sind, aus deren Mitte der hohle, runde, aufrechte, 8-10'' hohe, Blüthenschaft. Quirle 4-5blumig, mit kleinen Deckbltt. Krone weisslich-fleischfarben mit orangef. Grunde.

Soldanella L. *Alpenglöckchen*. Krone trichterförmig-glockig mit 5 spaltigem Saum und vieltheiligen Zipfeln. Die Kapsel springt in kleine Zähne auf, nachdem sich von der Spitze ein kurzer Deckel umschnitten gelöst hat. v, 1.

S. alpina L. Bltt. randlich-nierenfg.; Blumenstielchen drüsig-scharf; Schlund mit fünf Schuppen.

Auf grasigen Plätzen zwischen Felsgerölle auf dem Gipfel der *Babia Gora* im J. 1828 gefunden. Juni. ♀.

Bltt. über der Wurzel, gestielt, lederartig, oberseits glänzend. Blumenschaft 3-4'' h. mit gestielten Blumen in einem Schirm. Hüllbltt. linealisch-stumpf. Kronen violett-blau. Kapsel länglich.

Glaux L. *Milchkraut*. Kelch glockig, 5 spaltig, gefärbt. Krone fehlt. Staubgefässe im Grunde des Kelches hinter den Zipfeln desselben. Kapsel fünfklappig. v, 1.

G. maritima L.

Auf salzhaltigen Wiesen. Zuerst im J. 1810 von Henschel um *Hermannsdorf* bei *Breslau* gef.; dann i. J. 1829 auf einer Wiese an der Chaussee nach *Lissa* mit *Triglochin maritimum*, *Scirpus pauciflorus* und *Orchis laxiflora*. Mai, Juni. ♀.

Stängel am Gr. wurzelnd, 2-3'' lang. Bltt. länglich-lanzettlich, punktiert hell und etwas graugrün, etwas fleischig. Kelche fleischfarben und weisslich.

Plumbagineae Jussieu.

Kelch dauernd, gefaltet, 5 zählig. Krone regelmässig 5 theilig, mit zusammengerollter Knospenlage. Fünf Staubgefässe hinter den Kronenzipfeln, aus ihrem Grunde entspringend, in der Knospe aufrecht. Fruchtknote frei, einfächerig, mit einem Ei. Fünf freie Griffel oder ein Griffel mit 5 lappiger Narbe. Frucht eine einfächerige Kapsel, die an der Spitze 5 klappig ist oder am Gr. unregelmässig abreisst, mit einem Samen der von einer aus dem Gr. frei aufsteigenden Samenschnur herabhängt. Samen mit geradem Keim in der Axe des fleischigen Eiweisses.

Hierzu gehört die grosse Sippe *Statice*, im südlichen Europa einheimisch, von der sich *Armeria* durch Tracht und Blüthenstand wesentlich unterscheidet.

Armeria Willdenow. *Grasnelke*. Krone fast fünfblättrig. Fünf freie Griffel. Blüthen in einen aus Trauben zusammengesetzten, von dachziegelförmigen Hüllbltt. umschlossenen Kopf gestellt. v, 5.

A. vulgaris Willdenow. *Statice Armeria* L. Bltt. linealisch, 1 nervig, gewimpert; die äusseren Hüllbltt. feinspitzig, die inneren stumpf mit einer Stachelspitze.

Auf trocknen, etwas sandigen Grasplätzen in der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Juni — Sept. 2.

Wurzelstock schief. Wurzelbltt. zahlreich grasblättrig. Schaft blatlos mit einem Bluthenkopfe. Die äusseren Hüllbltt. setzen sich in eine kurze, walzenförmige Scheide fort. Jede Blume mit einem Deckblatt. Kronen rosaf. Die ähnliche *A. maritima* wird in Gärten zu Babatten-Einfassung, unter dem Namen Englisches Gras, benutzt.

Plantagineae Jussieu.

Kelch dauernd, 4 theilig, mit trocknen Rändern. Krone trockenhäutig, röhrig mit 4 spaltigem Saum. Vier Staubgef. aus der Kronenröhre zwischen den Kronenzipfeln, in der Knospe eingeschlagen. Fruchtknote frei 2- oder einfächerig, mit 2 oder mehreren Eichen. Ein Griffel. Frucht eine umschnitten aufspringende 2- oder 4 fächerige Kapsel. Samen vorn gewölbt, hinten flach mit fleischigem Eiweiss und geradem Keim.

Kräuter oder Stauden. Blumen in dichten walzigen oder kopfförmigen Aehren. Wege- und Feldpflanzen. In den Wurzeln ein zusammenziehender und in d. Blättern u. Samen ein schleimiger Stoff.

Plantago L. Wegerich. Kronenröhre eigf., Saum zurückgeschlagen. Kapsel springt umschnitten auf. IV, 1.

a. Blätter grundständig, Schaft blattlos.]

P. major L. Wegebrette. Bltt. gestielt, eigf., 5-9nervig, kahl oder schwach behaart; Schaft stielrund; Aehre lineal-walzig; Deckblatt eigf., stumpflich. gekielt, am Rande häutig; Kapsel 8samig.

β. agrestis. Klein; Bltt. am Boden liegend, länger als die aufsteigenden, 3-blumigen Schafte.

An Wegrändern und trocknen Fussteigen, Gras- und feuchten Sandplätzen, auf Triften, Aeckern nach der Ernte und Brachen d. d. g. G. bis auf das Hochgeb. gemein. Mai, Juni und Aug., Sept. 2.

Bltt. starknervig, am Rande schweifig, bisweilen am Gr. gezähnt. Die Pflanze ist in der Größe, Gestalt der Bltt. und Länge der Aehre sehr veränderlich; besonders sind die kleineren Formen auf feuchten Sandplätzen und Aeckern sehr auffallend. Staubbeutel violett. Die Wurzel schmeckt süßlich, die Bltt. salzig-bitterlich. Die letzteren sind noch officinell und bei dem Volke als kühlendes Deckmittel bei alten Geschwüren üblich. Die Samen aller Arten sind schleimig.

P. media L. Bltt. elliptisch, schwach-gezähnt, 7-9nervig, beiderseits kurzhaarig; Schaft stielrund; Aehre länglich-walzig; Deckblatt eigf., spitzlich, am Rande häutig; Kronenröhre glatt.

Auf Wiesen, Triften, an Wegrändern, überall gemein. Mai, Juni. 2.

Ändert wenig ab. II. 8-11". Die Aehre ist vor dem Blühen überhängend. Staubbeutel rosenroth.

P. lanceolata L. Hundsrinne. Bltt. lanzettlich, schwach-gezähnt, 3-6nervig, kahl oder haarig; Schaft gefurcht; Aehre eigf. oder eigf.-walzig; Deckblatt eigf.-zugespitzt, trockenhäutig; die seitlichen Kelchzipfel am Rücken gekielt.

An Wegrändern, auf trockenen, sandigen und steinigten Plätzen, auf Brachen, in trockenen Wäldern, überall gemein. April, Sept. 2

In vielen Stücken veränderlich. Bltt. bisweilen fast linealisch und wiederum elliptisch-lanzettlich, kurz oder lang, am Boden liegend oder schief aufrecht. Schaft $\frac{1}{2}$ -1', aufsteigend oder aufrecht. Aehren bisweilen kugelig und auch walzig. Eine Missbildung mit 3-7 gehäufteten Aehren ist nicht selten. Staubbeutel ochergelb, dann braun. — Hierher auch *P. altissima* Krock.

P. montana Lamarck. Bltt. lanzettlich, schwach gezähnt, 3-5nervig; Schaft stielrund; Aehre eigf.; Deckblatt breiteiförmig, stumpf mit kurzer Spitze, trockenhäutig, an der Spitze bärtig; Kelchzipfel häutig, ohne Kiel, an der Spitze bärtig.

Auf Grasplätzen an felsigen Abhängen im Hochgebirge. Im Kessel im Gesenke von Grabowski i. J. 1834 gefunden. Juli, Aug. 2.

H. $\frac{1}{2}$ '. Bltt. meist mit weissen Zottenhaaren stellenweise bekleidet. Deckblatt schwarzbraun mit grünem Mittelstreifen.

P. maritima L. Bltt. linealisch, ganzrandig oder gezähnt; etwas fleischig und steif, rinneförmig, unterseits undeutlich 3nervig; Schaft rund, Aehre linealisch-walzig; Deckbltt. eig., spitzlich, am Rande häutig; Kelchzipfel häutig gekielt; Kronenröhre schwachzottig.

Auf Sandplätzen. Bei *Ober-Friedrichswaldau* bei *Guhrau* i. J. 1829 von Schmidt gef. und uns mitgetheilt. Juli, Aug. 2.

Wurzelstock dick, walzig. Bltt. an unserem Exemplare kahl, etwas gekrümmt. Schaft 2-4" h., im Bogen aufsteigend.

b. Stängel ästig, heblättert.

P. arenaria Waldstein und Kitaibel. *P. cynops* Matt. *P. psyllium* Krock. Bltt. linealisch; Aehren eig.-länglich; die vorderen Kelchzipfel schief-spathelfg., stumpf, die hinteren lanzettlich-spitz.

Auf lockerem Sande, auf sandigen Hügeln und Aeckern, an Flussufern hie u. da in der Ebene. Um *Br. b. Carlowitz, Schwoitsch, Oswitz* etc. Um *Oppeln*. Nicht um *Trop.* u. *Te.* Juli — Sept. ☉.

H. 4" - 1'. Selten ohne Aeste, meist vielästig, blassgrün, etwas klebrig. Staubbeutel gelb. Die schleimigen Samen werden bei der Kattun- und Seidenbereitung angewandt, daher die Pflanze in Frankreich angebaut wird.

V. DICOT. APETALAE.

Die Blumenhülle (nächste Umhüllung der Stempel- und Staubgefässe) besteht nur aus einem einzigen Blattkreise, oder fehlt gänzlich.

Hierher gehören der grössere Theil der ein-, zwei- und drei und zwanzigsten und ein Theil der sechsten und achten Classe Linné's.

Polygoneae Jussieu.

Blumenhülle 3-6theilig, mit dachziegelförmiger Knospelage. Staubgefässe aus dem Grunde der Blumenhülle und zu 1, 2 oder 3 hinter deren Zipfeln. Fruchtknoten frei über der Blumenhülle einfächerig, linsenförmig oder 3kantig mit einem aufrechten Ei. Zwei oder 3 Griffel, oder sitzende Narben. Frucht eine nackte oder von den unteren Blumenhüllzipfeln umschlossene Nuss oder Kornfrucht. Samen mit mehligem Eiweiss und geradem oder gekrümmtem Keim.

Kräuter oder Stauden mit wechselständigen Bltt. und meist totenförmig-verwachsenen, den Blattstiel scheidenförmig umgebenden Stützblättern. Die meisten Arten in grosser Menge um die menschlichen Wohnungen und einige bis auf das hohe Gebirge.

Rumex L. *Ampfer*. Blumenhülle bis auf den Grund 6theilig; die 3 inneren Zipfel grösser mit der Frucht nach-

wachsend und dieselbe bedeckend. Sechs Staubgef., je 2 hinter den äusseren Zipfeln. Drei Griffel mit pinselförmigen Narben. Frucht eine dreikantige Nuss. VI, 3.

Einige Arten haben die Stempelblumen und Staubfadenblumen zweihäusig getrennt. Die Stängel oben in viele Blütenäste verzweigt, an denen die Blumen in Quirlen stehen. Die vergrösserten, die Frucht umhüllenden inneren Blumenhüllenzipfel heissen hier der Kürze wegen nach der ehemals üblichen Benennung Fruchtklappen. Die Wurzeln enthalten einen adstringirenden Stoff u. die Blätter haben häufig einen sauern Geschmack.

a. Blätter am Grunde gerundet, oder verschmälert.

R. maritimus L. Bltt. linealisch-lanzettlich; die Quirle von einem Blatte gestützt, die oberen genähert; Fruchtklappen rautenförmig, beiderseits mit 2 Zähnen von der Länge der Klappe, mit lanzettlich-vorgezogener, ganzrandiger Spitze, sämmtlich höckerig.

An Gräben und Lachen der Dörfer und Vorstädte, an Teichrändern, an vielen Orten der Ebene. Um *Br.* in der *Oder-Vorstadt* u. den umliegenden Dörfern. *Wohlau. Beuthen. Ohlau. Oppeln. Gr. Herlitz.* Juli, Aug. 2.

H. 1 - 3'. Sehr vielästig. Gelbgrün und zuletzt ist fast die ganze Pflanze gelblich. Ausserdem durch linealische Bltt. und die sehr langen Klappenzähne ausgezeichnet.

R. conglomeratus Murray. Die untersten Bltt. herzfg.- oder eigf.-länglich, die oberen herzfg.-lanzettlich, zugespitzt; Aeste fast söhlig-aufsteigend; die Quirle entfernt, nur die obersten ohne Deckbltt.; Fruchtklappen lineal-länglich, stumpf, ganzrandig, sämmtlich höckerig.

An feuchten Plätzen, Gräben, Teichrändern, in feuchten Gebüsch, an Flussufern, in der Ebene u. im Vorgeb., d. d. g. G. Um *Br.* häufig bei *Kleinburg, Oswitz, Zedlitz, Bischwitz* etc. Juli, Aug. 2.

H. 2 - 3' Ausgespreizte Aeste. Bisweilen Bltt. u. Stängel schmutzig-roth.

R. sanguineus L. Krock. sil. *R. Nemolapathum* W. et Gr. sil. Bltt. herzfg.-länglich, die oberen lanzettlich, zugespitzt; Aeste gerade aufrecht-abstehend; Quirle genähert, nur die untersten von einem Blatt gestützt; Fruchtklappen lineal-länglich, stumpf, ganzrandig, nur eine höckerig.

In feuchten Laubwäldern der Ebene u. d. Vorgebirges d. d. g. G. häufig. Um *Br.* in den Oderwäldern bei *Pilsnitz, Treschen* etc. Juli, Aug. 2.

H. 2 - 3'. Bisweilen sind der Stängel und die Blattadern röthlich. Das Laub welkt schnell.

R. obtusifolius L. *Grindwurz.* Die untersten Bltt. herz-eigf., stumpf, die oberen spitz, länglich u. herzfg., die obersten lanzettlich; Quirle gesondert ohne Deckblätter; Fruchtklappen eigf.-dreieckig, netzadrig, am Gr. mit pfriemlichen Zähnen, in eine lange, stumpfe, ganzrandige Spitze endigend, sämmtlich höckerig.

Wimmer's Flora.

Auf Angern und an Gräben, an Zäunen und Hecken in Dörfern, an Waldrändern, überall gemein. Juni — Sept. 2.

H. 2 - 4'. Nur die ersten Wurzelblt. sind vorn gerundet-stumpf. Stängel und Blüthen oft schmutzig roth. Die Länge der Zähne an den Fruchtklappen ist veränderlich. Dicker Wurzelstock, innen gelb, von bitterem und herbem Geschmack, als *R. Lapathi acuti* officinell, ein auflösendes Adstringens.

R. crispus L. *Krause Grindwurz*. Bltt. länglich-lanzettlich, spitz, am Rande wellig und kraus; Quirle genähert ohne Deckblt.; Fruchtklappen rundlich, stumpf, ganzrandig oder am Gr. gezähnt, entweder sämmtlich oder nur eine höckerig.

Auf Angern und Wiesen, an Graben- und Wegrändern, überall häufig. Juni — Aug. 2.

H. 2 - 4'. Schmutzigrün, oft röthlich. Die unteren Bltt. gestielt. — *R. pratensis* W. et Gr. sil. ist eine Varietät dieser Art mit gezähnten Klappen.

R. Hydrolapathum Huds. *R. acutus* Krock. sil. *R. aquaticus* Linn. nach Fries. Bltt. lanzettlich, beiderseits verschmälert, am Rande schwach-wellig, mit oberseits flachem Blattstiel; Quirle ohne Deckblt.; Fruchtklappen oval-dreieckig, ganzrandig oder am Gr. gezähnt, sämmtlich höckerig.

An stehenden und fließenden Gewässern zwischen Gesträuch in der Ebene verbreitet. Um Br. bei *Marienau, Oswitz, Bischwitz, Wohlau, Beuthen, Bunzlau, Ohlau, Oppeln, Troppau u. Teschen*. Juli, Aug. 2.

H. 3 - 5'. Diese Art ist die grösste der unsrigen, an den oben und unten langspitzigen Bltt. leicht kenntlich.

R. aquaticus L. *R. Hippolapathum* β . Fries. Wurzelblt. herz-eifg., spitz, am Gr. breiter, mit oberseits rinnenförmigem Blattstiel; Quirle ohne Deckblt.; Fruchtklappen herzfg., ganzrandig oder gezähnt, sämmtlich ohne Höker.

An Bächen, Flüssen und Teichrändern nur am Fusse des Gebirges. Boberbette bei *Bunzlau*. An der *Weistritz* hinter *Schweidnitz; Striegauer Wasser* b. *Muhrau, Charlottenbrunn, Schönau, Schmiedeberg*. Im Gesenke bei *Einsiedel, Zuckmantel, Jägerndorf*. Juni bis Aug. 2.

H. 3'. Blätter oft schwach-wellig, durch den breiteren Grund sehr ausgezeichnet, sonst denen des *R. obtusifolius* ähnlich. Quirle ziemlich dicht.

R. alpinus L. *Mönchs-Rhabarber*. Wurzelblt. rundlich-herzfg., abgerandet-stumpf mit oberseits rinnenförmigem Blattstiel; Quirle dicht, ohne Deckblt.; Fruchtklappen herzeifg., ohne Höker.

Auf Gebirgswiesen an sumpfigen und quelligen Stellen. Im Riesengeb. um die *Hampel-, Padel- und neue schlesische Baude*. Um *Karlsbrunn* im Gesenke. Auf d. *Baranio* am *Czorny*. Juli, Aug. 2.

H. 2 - 3'. Stängel sehr dick, aufsteigend. Bltt. sehr gross. Die Wurzel ist hier und da unter dem Namen *R. Rhabarbari Monachorum* bekannt.

b. Bltt. spieß- oder pfeilförmig. Zweihäusig.

R. Acetosa L. *Sauerampfer*. Bltt. pfeil- oder spießfg.; Stützblt. zerschüßt; Fruchtklappen rundlich-herzfg., ganzrandig, am

Gr. mit einer herabgebogenen Schuppe; die drei äusseren zurückgeschlagen.

β. arifolius. Bltt. breit und stumpf, Stängelbltt. Sechsig; Stätzbltt. ungetheilt.

Auf fruchtbaren Wiesen und freien Waldplätzen gemein. *β* auf Wiesen, an Bächen, in feuchten Waldungen des Hochgebirges, im *Riesengebirge* und *Gesenke* sehr häufig. Mai, Juli. 2.

Stängel 1 - 1½' h., oben rispig mit fast aufrechten Aesten. Blumen roth. Die Pflanze, welche Staubgefässblumen trägt, ist kleiner. Die Bltt. schmecken angenehm-sauer und enthalten Kleesals.

R. Acetosella L. Bltt. spießförmig, länglich oder lineal-lanzettlich; innere Fruchtklappen eifg., ganzrandig, ohne Höker; die äusseren während der Blüthe aufrecht-anliegend.

β. multifidus. Die Bltt. in viele linealische Fetzen handförmig-zertheilt.

Auf sandigem Boden, Aeckern, Brachen, Triften, Sandplätzen, in Kieferwäldern, auf Mauern, oft grosse Strecken bedeckend u. färbend. Mai—Sept. 2.

Wurzel kriechend. Stängel ½ - 1'. Die Bltt. sind bisweilen pfeilfg., dann spießförmig, dann sind die Ohren am Gr. gezähnt oder gespalten, und endlich das ganze Blatt vielspaltig, wie bei *β*. Blumen sehr klein, röthlich.

Polygonum L. *Knöterich.* Blumenhülle 5theilig, drei Zipfel nach innen, zwei nach aussen liegend. Staubgef. 5-8; je einer vor den 3 inneren, je 2 vor den beiden äusseren und 1 hinter dem hinteren Zipfel; wovon einige bisweilen fehlen. Kornfrucht 3 kantig oder linsenförmig. VIII, 2.

Die Arten dieser Sippe bilden häufig Bastardformen. Bei den meisten sind die Stätzbltt. tutenf. verwachsen und umgeben den Grund des Stängelgliedes in Form einer Scheide.

P. Bistorta L. *Otterwurz. Hirschzunge.* Stängel einfach mit einer dichten Aehre.

Auf grasreichen etwas feuchten Wiesen, auch Torfwiesen in der Ebene zerstreut, bis auf die Wiesen des Hochgebirges. Um *Br.* bei *Kl. Tschansch*, vor *Lissa*, *Riemberg*, *Dyhrenfurth. Wohlau. Thomasd.* und *Tiefenfurth* bei Bunzlau. *Oppeln. Riesengebirge. Tropau* bei *Herlitz* und *Seitendorf.* Am *Altwater.* Mai, Juni. 2.

Stängel 3 - 4' h., nur am Gr. beblättert. Wurzelstock dick, s-förmig gewunden, braun, innen gelb. Bltt. länglich, fast sungef., am Gr. herzf., in den geflügelten Stiel verlaufend, unterseits weissgrau. Aehre walzig, dicht. Blumen weisslich-rosenfarben oder rosenroth. Die Wurzel enthält viel eisenblauenden Gerbestoff, und ist als adstringirendes Mittel officinell; in Sibirien dient sie zur Nahrung.

P. amphibium L. Wurzel kriechend; Bltt. länglich und länglich-lanzettlich; Aehren einzeln, dicht, walzig; Nüsse eifg., etwas zusammengedrückt, glänzend.

α. aquaticum. Die oberen Bltt. schwimmend, oberseits glänzend, kahl.

β. terrestre. Die Bltt. länglich-lanzettlich, mit steifen Haaren besetzt.

An feuchten Orten und in Gräben und Teichen, theils fluthend im Wasser wie *α*, theils wo das Wasser fehlt, aufrecht in ausgetrockne-

ten Lachen und Gräben, in der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Juni, Juli. ☉.

H. 1 - 1½'. Stützbltt. gewimpert. Kronen fleischf. oder blass-rosaf. Die beiden Formen sehen einander sehr unähnlich und zeigen auf das deutlichste den Einfluss des Wassers auf die Gestalt der Gewächse.

P. lapathifolium L. Rutlich. Bltt. länglich, auch lanzettlich und eigf.-rundlich, schärflich; Stützbltt. fein-gewimpert; Stängel ästig; Aehren länglich-walzig, dicht, aufrecht auf drüsig-scharfen Stielen; Nüsse rundlich, zusammengedrückt mit einer Vertiefung.

- α. *viride*. Bltt. länglich-lanzettlich, Stängel und Blumenhüllen grünlich; Aehrenstiele stark-drüsig.
- β. *agreste*. Bltt. lineal-lanzettlich, unterseits schwach-graufilzig, Stängel und Blumenhüllen grünlich, Aehrenstiele stark-drüsig.
- γ. *nodosum*. Bltt. länglich-lanzettlich, beiderseits grün; Stängel aufrecht mit stark angeschwollenen Gelenken, rothgefleckt; Blumenhüllen weiss oder röthlich; Aehrenstiele glatt oder schwach-drüsig.
- δ. *prostratum*. Bltt. eigf.-rundlich, stumpf, unterseits weissfilzig; Stängel gestreckt mit stark angeschwollenen Gelenken, rothgefleckt; Blumenstiele weiss oder röthlich; Aehrenstiele glatt oder schwach-drüsig.

Auf Acker- und Garten-Land, um Dunghaufen, an Gräben und auf sandigen Teich- und Flussrändern; α und β besd. auf Aeckern, γ an Gräben und auf Dungboden, δ auf feuchtem Sandboden. D. d. g. G. gemein. Fast alle Var. an den *Oderufem* bei *Neu-Scheinich*. Juli—Sept. ☉.

H. 1 - 2'. Wie die Varietäten zeigen, eine der vielgestaltigsten Pflanzen. Der Uebergang in der Bekleidung zeigt sich zuerst in schwachen Haarstreifen und grauer Färbung auf der Unterseite der Blätter.

P. Persicaria L. Bltt. länglich-lanzettlich, kahl; Stützbltt. haarig, lang-gewimpert; Aehren länglich-walzig, aufrecht, einige abgekürzt und eigf., auf glatten Stielen; Nüsse zum Theil dreikantig, zum Theil zusammengedrückt.

Auf Acker- und Brachland, in Gräben, d. d. g. G. gemein. Juni bis Aug. ☉.

H. ½ - 1½'. Stängel gestreckt oder aufsteigend, mit ausgebreiteten armförmig-geknieten Aesten. Das Kraut hat eine Art von mattem Fettglanz. Bltt. beiderseits weiss-punktirt, unterseits zuweilen grau. Blumen weiss oder röthlich.

× **P. laxiflorum Weihe** Bltt. länglich-lanzettlich, langspitzig, kahl; Stützbltt. gewimpert; Aehren fast linealisch, locker, verlängert, an der Spitze übergeneigt; Nüsse dreikantig, spitz, etwas glänzend, schwach vertieft.

In Gräben, an Teichrändern, auf Gartenland, an Zäunen. Um Br. in der Odervorstadt und den umliegenden Dörfern, und d. d. g. G. zerstreut. Juli, Aug. ☉.

H. 1 - 2'. Blumen schön rosenroth. Diese Art ist ein Bastard zwischen *P. Persicaria* und *P. Hydropiper*, daher im Charakter nicht beständig.

P. Hydropiper L. Wasserpfeffer. Bltt. breit-lanzettlich, langspitzig, am Rande wellig, kahl; Stützbltt. schwach-gewim-

pert; Aehren linealisch, locker, übergeneigt; Nüsse dreikantig, matt, schwach-runzlig.

Auf feuchten Grasplätzen und Angern, in Gräben und an Teich- und Flussrändern d. d. g. G. gemein. Juli, Aug. ☉.

Stängel 1 - 1½' h., ästig, kahl, mit geschwollenen Gelenken, grünroth. Schmutzigrün. Stützbltt. schwärzlich-blutroth, oben rostbraunhäutig. Blütenhüllen grün und weiss mit Drüsen. Die ganze Pflanze schmeckt brennend-scharf und erregt Röthe auf der Haut.

P. minus Hudson. Bltt. lineal-lanzettlich; Stützbltt. langgewimpert; Aehren schlank u. locker, linealisch, fast aufrecht; Nüsse glänzend, 3kantig oder 3kantig-zusammengedrückt.

Auf nassen und sumpfigen Wiesen, in Gräben, an Teich- und Flussrändern, d. d. g. G. in der Ebene, aber etwas seltner als die vorigen. Juli, Aug. ☉.

Stängel bisweilen einfach, meist aber mit ausgesperrten langen Aesten, ½ - 1½' h. Kahl und hellgrün. Blumen weiss-rosenroth. Die schmälern Bltt. und doppelt kleineren Samen unterscheiden es von den vorigen. Es kommen aber Bastardformen mit der vorigen und auch mit *P. Persicaria* vor.

P. aviculare. *Wegetritt*, *Tennengras*. Blumen winkelständig; Bltt. elliptisch-lanzettlich od. oval, am Rande schärflich; Stützbltt. schlitzig-wimperig, kahl; Nüsse scharf dreikantig, matt, nadelrissig.

An betretenen Wegen, auf Angern, Brachen, an Mauern und unter der Saat, d. d. g. G. gemein. Juni - Sept. ☉.

Stängel gestreckt, vielästig, nur unter der Saat aufrecht und dann gewöhnlich breitblättrig. Blumen zu 2 - 4 auf kurzen Stielen, weisslich. Das Kraut war als *Hb. Centumnodiæ* officinell.

P. Convolvulus L. Blumenhülle an der Frucht vergrössert; Blumen winkelständig in Büscheln; Stängel windend; Bltt. herzpfeilfg., Blumenhüllzipfel stumpf-gekielt; Nüsse 3kantig, matt, nadelrissig.

Auf Getraide- und Gemüsefeldern besd. nach d. Ernte d. d. g. G. häufig. Juli, Aug. ☉.

Stängel gestreckt oder sich emporwindend, vom Gr. ästig, mit scharfen Ecken. Stützbltt. undeutlich. Blüten hängend. Blumenhülle grünlich-weiss. Acht Staubgef.

P. dumetorum L. Blumenhülle an der Frucht vergrössert, Blumen winkelständig in Büscheln; Stängel windend; Bltt. herzfg.-dreieckig mit langer Spitze; Blumenhüllzipfel flügelig-gekielt; Nüsse dreieckig, schwach-glänzend, punktirt-runzlig.

In Hecken, Gebüsch und Gestrüpp und besonders an Grabenrändern und Flussufern, d. d. g. G. häufig. Juli, Aug. ☉.

Stängel in Gesträuch sich emporwindend, höher und grösser als die vorige Art. Acht Staubgef.

* *P. Fagopyrum* L. *Buchweizen*. Blüten in Trauben, die winkelständigen einfach, die endständige doldentraubig; Bltt. herzpfeilfg.; Nüsse 3kantig zugespitzt.

Stammt aus d. Orient und wird in sandigen Gegenden namentlich Oberschlesiens häufig angebaut. Juli, Aug. ☉

Stängel aufrecht, etwas glänzend. Acht Staubgef. Drei Griffel mit kugeligen Narben. Die Samen, unt. d. Namen Haidegraupe bekannt, dienen als Speise.

Thymeleae Jussieu.

Blumenhülle röhrig mit 4 spaltigem Saum und dachziegel-förmiger Knospenlage. Staubgef. in der Röhre oder dem Schlunde eingefügt, doppelt so viel als Zipfel der Blumenhülle, mit aufrechten Staubbeuteln. Ein freier einfächeriger Fruchtknoten über der Blumenhülle mit einem hängenden Ei, einem Griffel und einer Narbe. Frucht eine einsamige Nuss oder Pflaume. Same mit geradem Keim und geringem oder auch ohne Eiweiss.

Meist Sträucher ohne Stützbltt.

Daphne L. Zeiland, Seidelbast. Blumenhülle abfallend. Pflaume mit weichem oder lederartigem Fleisch und einem Samen ohne Eiweiss. VIII, 1.

D. Mezereum L. Kellerhals. Blumen sitzend, in Häufchen zu 3 an den Seiten der Aeste; Zipfel der Blumenhülle eifg., spitz; Bltt. kahl, lanzettlich, am Gr. verschmälert.

In Gehölzen und Laubwäldern in der Ebene und dem Vorgebirge. Um Br. bei *Arnoldsmühl* u. *Lissa*; zw. *Zweikretscham* und *Wiesa*, Waldmühle bei *Kritschen. Riemberg. Ottendorf* bei Beuthen. *Ohlau. Oppeln.* Vom *Zobten* d. d. g. Vorgebirge, und bei *Troppau* und *Teschen.* Im *Kessel* im Gesenke. März. ♄

Strauch mit abstehenden Aesten, 1 - 4' h., mit aschgrauer glatter Rinde. Die Blumen vor dem Ausbruch der Bltt., rosa-lilaf. von starkem angenehmen Geruch. Bltt. brechen an den Spitzen der Zweige büschelig hervor. Die Samen waren als *S. Coccyditi* officinell und sind scharf und giftig; eben so die Rinde, welche Blasen auf der Haut sicut und ziemlich als scharfes Gift wirkt.

Passerina L. Spatzenzunge. Blumenhülle ausdauernd und die Frucht umgebend. Frucht eine einsamige Nuss. VIII, 1.

P. annua Wickström. Stelleria Pass. L. Stängel kahl, steif; Bltt. linealisch, etwas abstehend; Blumen winkelständig mit gegeneinandergeneigten Zipfeln.

Auf sonnigen und trocknen Brach- und Saatfeldern. *Mönchhof* bei *Teschen* von *Kotschy* entdeckt. Um *Strzebowitz* u. *Stablowitz* bei *Troppau* nach *RM.* Juli, Aug. ☉

Stängel gewöhnlich einfach oder mit wenigen aufrechten Aesten aus der Mitte $\frac{1}{2}$ - 1' h., dünn und schlank. Kraut grasgrün. Blumen klein weisslich.

Santaleae RBrown.

Blumenhülle mit 4-5 theiligem Saum in klappiger Knospenlage; die Röhre mit dem Fruchtknoten verwachsen. Staubgefäße je einer hinter den Zipfeln der Blumenhülle, am Schlunde eingefügt. Einfähriger Fruchtknoten mit einem Griffel und 2-4 an der Spitze einer freien Mittelsäule hängenden Eichen. Frucht: eine einsamige Nuss oder Pflaume. Same mit geradem Keim in der Axe des fleischigen Eiweisses.

Thesium L. *Vermeinkraut*. Saum der Blumenhülle innen kahl. Staubfäden auf der äusseren Seite bärtig. Nuss von der dauernden Blumenhülle gekrönt. V, 1.

T. Linophyllum L. Bltt. lineal-lanzettlich; Blumen von drei Deckbltt. gestützt; Blumenröhre sehr kurz; Nüsse kugelig-eiförmig.

β. latifolium. Höher, Bltt. lanzettlich, deutlich 3-5nervig.

Auf hügeligen Gras- und Waldplätzen in d. Ebene und d. Vorgebirge. Um Br. bei Carlowitz, Fuchsberg bei Schwoitsch, Lissa. *β.* am Geiersberge. Katscher nach Wenck. Juli, Aug. 2.

Stängel aufrecht, am Gr. oft aufsteigend, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h., oben eine Traube oder Rispe tragend. Bltt. schmal, linealisch, meist undeutlich 3nervig, oder breiter lineal-lanzettlich und lanzettlich, deutlich 3- auch 5nervig. Blumenhülle aussen grünlich, innen weisslich, bleibt an der Nuss als ein Krönchen stehen, indem die Klappen des Saums sich einschlagen; je reifer die Nuss, desto kürzer wird dieses Krönchen, indem die Blumenhülle mehr vertrocknend sich zusammenzieht und die Saumlappen sich tiefer einrollen. Daher scheinen die auf die verschiedene Länge derselben gegründeten Arten *Th. montanum* Ehrhart und *intermedium* Schrad. nicht haltbar zu sein.

T. alpinum L. Bltt. lineal.; Blumen von drei Deckbltt. gestützt; Fruchttraube fast einseitwendig; Blumenröhre so lang als der Saum; Nüsse oval.

Auf Grasplätzen an Hügeln und auf Haidelehnen im Hochgebirge. Am Geiersberge. Gl. Schneeberg. Kupferberg. Riesengeb. am Kl. Teiche, im Riesengrunde, Elbgrunde, Schneegruben etc. Gesenke am Hockschar, Bründelhaide, Altvater. Juni, Juli. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' h., schief-aufsteigend, in Basen. Bltt. sehr schmal. Blumenhülle am Nüsschen lang.

T. ebracteatum Hayne. Wurzel kriechend; Blumen mit einem einzelnen, den Stiel fortsetzenden Deckbltt.; Nüsschen oval, lederartig.

Auf Waldplätzen. In OS. zwischen Chromstau u. Malapan von Fincke gef. Mai, Juni. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' h. Stiele fast wagrecht abstehend. Bltt. schmal. Die obersten Stiele sehr kurz, aufrecht und ohne Blume nur ein Deckblatt tragend.

Aristolochieae Jussieu.

Die Röhre der Blumenhülle am Gr. an den Fruchtknoten angewachsen; der Saum zungenfg.-2lippig oder gleichmässig-dreitheilig, mit klappiger Knospenlage. Staubgef. 6 oder 12 aus einem auf dem Fruchtknoten stehenden Ringe entspringend mit dem Griffel mehr oder weniger verbunden. Fruchtknoten 3- oder 6fächerig mit gleich vielen sternförmig-verbundenen Narben. Frucht eine 3-6fächerige Beere oder Kapsel mit vielen Samen am inneren Winkel der Fächer. Samen mit sehr kleinem Keime am Gr. des fleischigen Eiweisses.

Stauden meist mit windendem Stängel und knolliger Wurzel, wechselständigen gestielten Bltt. ohne Stützbltt. Sie enthalten einen bald mehr gewürzhaften, bald scharfen Stoff.

Asarum L. Haselwurz. Blumenhülle glockig mit dreispaltigem Saum. Zwölf freie Staubgef. Eine 5fächerige lederartige, ungleichmässig sich öffnende Kapsel. XI, 1.

A. europaeum L. Bltt. nierenförmig, stumpf.

In schattigen Wäldern unter Gesträuch und im abgefallenen Laube versteckt, in der Hügelgegend der Ebene und durch das ganze Vor- und untere Hochgebirge. Um Br. im *Goi* bei *Kapsdorf*, *Arnoldsmühl*, *Lissa*; in der *Trebnitzer* Hügelreihe etc. März, April. 2.

Stängel kriecht am Boden, ästig mit kurzen Trieben und je 2 dunkelgrün-glänzenden Bltt., in deren Achsel eine kurzgestielte übergeneigte, schmutzig-braunrothe Blume steht. Die Wurzel enthält einen scharfen ekelerregenden Stoff; auch die Bltt. sind scharf und drastisch, bekannt als Niesemittel.

Aristolóchia L. Osterluzei. Blumenhülle langröhrig mit zungenförmigem Saum. Sechs Staubgef.; die Staubfäden mit dem Griffel verwachsen. Eine sechsklappige lederartige Kapsel. XX, 5.

? **A. Clematitis L.** Wurzel kriechend; Stängel einfach, aufrecht; Bltt. eifg., tief herzfg., kahl; Blüten in winkelständigen Büscheln.

Früher hin und wieder um Waldländer um Br. bei *Pöpelwitz* u. *Pilsnitz*, doch nur verwildert und aus Gärten entkommen, wie sie noch jetzt in Graspärten in *Ober-Thomasdorf* im Gesenke vorkommt. Juni. 2.

Stängel 2 - 3' h., bogig. Blumenhülle am Gr. kugelig-aufgeblasen, gelblich. Hat frisch einen unangenehmen Geruch, und die Wurzel ist bitter und scharf.

Cannabinae.

Blumen zweihäusig. Staubgefässblumen mit 4- oder 5theiliger Blumenhülle, in der Knospe aufrecht. Stempelblu-

men mit einblättriger schlauchförmiger Hülle. Fruchtknoten einfächerig mit einem hängenden Ei und zwei Narben. Frucht eine Nuss. Same ohne Eiweiss mit gekrümmtem oder gewundenem Keim.

Sie haben starken dauerhaften Bast und zähe Fasern und enthalten bitteren Stoff.

Cánnabis L. Hanf. Staubgefässblumen mit fünftheiliger Blumenhülle und 5 Staubgef. Stempelblumen mit einer schlauchförmigen, auf der einen Seite der Länge nach gespaltenen Blumenhülle. Nuss v. d. bleibenden Hülle umgeben. XXII, 5

* **C. sativa L.**

Einheimisch in Persien und Indien; wird allgemein gebaut. Juni, Juli. ☉.

Stängel 2-3' h. Bltt. fingerfg., 5-7zählig, Blättchen lanzettlich, stark-gesägt, rauchhaarig, dunkelgrüner an der Stempelblumenpflanze. Staubgefässblumen in aufrechten Trauben. Stempelblumen gehäuft, stark-beblätterte Aehren bildend. Jene Pflanzen beissen bei dem Volke *Femel* oder *Fimmel*, diese *Mastel*. Das frische Kraut riecht betäubend und dient im Orient zu berausenden Getränken; die Bltt. sind bitter und betäubend; auch der Same, der ein fettes Oel enthält, ist als einhüllendes Mittel officinell. Bekannt ist der Gebrauch des Hanfes zu Stricken, Leinwand etc.

Húmulus L. Hopfen. Staubgefässbl. mit 5 theiliger Blumenhülle und 5 Staubgef. Stempelblumen mit schuppenförmigen offenen Blumenhüllen hinter grossen dachziegelförmig zu einem Kätzchen oder Zapfen vereinigten Deckblättern. XXII, 5.

H. Lupulus L.

In Hecken und Gebüsch an Waldrändern und in Gestrüpp an Flussufern; auch in einigen Gegenden z. B. um *Münsterberg* häufig angebaut. Juli, Aug. ♄.

Stängel windend, bis 5' h., scharf. Bltt. gestielt, herzförmig, Slappig, scharf. Die Staubgefässblumen in hängenden Trauben. Die innere Seite der Blumenhülle der Stempelblume und der Fruchtknoten sind mit gelben glänzenden Drüsen bedeckt, in welchen ein eigenthümliches bitteres Aroma enthalten ist, wodurch die Hopfenkätzchen für die Arzneikunde und bei der Bierbrauerei eine hohe Wichtigkeit haben.

Urticeae Jussieu.

Blumen ein- oder zweihäusig. Staubgefässbl. mit 4- oder 5 theiliger Blumenhülle, in der Knospe eingerollt. Stempelblumen mit 2-5 theiliger Blumenhülle. Fruchtknoten einfächerig, mit einem aufrechten Ei und einer häufig seitwärts gewandten Narbe. Nuss von der Blumenhülle bedeckt. Same mit geradem Keim in der Axe des fleischigen Eiweisses.

Kräuter mit zahlreichen kleinen und unscheinlichen grünlichen Blumen. Bei dem Anblühen springen die Staubgefässe elastisch zurück, streuen den Staub aus und öffnen die Blumenhülle.

Urtica L. Nessel. Blumen ein- oder 2häusig, in Aehren oder Köpfen. Staubgefässbl. mit 4-5theiliger Blumenhülle mit klappiger Knospenlage. Stempelblumen mit 4theiliger Blumenhülle; zwei Zipfel klein oder ganz verkümmert, die beiden grösseren ausdauernd und die Nuss bedeckend. XXI, 4.

Das Kraut mit hohlen Borsten bedeckt, welche einen scharfen Saft enthalten und dadurch auf der Haut bei der Berührung Brennen verursachen.

U. dioica L. Grosse Brennessel. Blumen 2häusig; Bltt. länglich-herzfg., langspitzig, grob-gesägt.

Zwischen Gesträuch und Gestrüpp an un bebauten Orten, Schuttplätzen, an Zäunen und Mauern, d. d. g. G. gemein. Juni, Juli. 2.

Stängel aufrecht, 1-3' h. Die Bltt. sind in der Breite veränderlich. Die Bastfasern können wie die des Hanfes zu Gespinnaten verbraucht werden. Sie ist ein gutes Futterkraut. Gelähmte Gliedmaassen werden durch Peitschen der Haut mit Nesseln oft wieder beweglich.

U. urens L. Kleine Br. Blumen einhäusig; Bltt. rauten-eifg., spitz, eingeschnitten-gezähnt.

Auf Gartenland, an Schuttplätzen, Mauern und Zäunen, d. d. g. G. gemein. Juni—Oct. ☉.

H. 1/2 - 1'. Hellgrün. Einfach oder am Gr. ästig. Von säuerlich kühlendem Geschmack.

Parietaria L. Glaskraut. Blumen polygamisch in quirlständigen Spirren in den Blattwinkeln; die unteren jeder Spirre Stempelbl., die mittleren Zwitterbl., die obersten Staubgefbl. Blumenhülle 4- oder 5theilig, bei den Zwitterblumen später verlängert, die Nuss bedeckend. XXIII, 1.

P. erecta Mertens u. Koch. P. officinalis Willd. Stängel aufrecht; Deckblatt sitzend.

An Mauern, hie und da. *Breslau am Dome, an der Jesuiter Kirche, dem Matthiasthore und am Lehdamme. Ohlau. Gorkau bei Zobten.* Juli—Sept. 2.

Stängel 1 - 1 1/2' h., glasartig-glänzend. Bltt. wechselständig, gestielt, länglich-eifg., beiderseits spitz, durchscheinend punktiert, kurzhaarig. Narben pinselfg., roth. Ist von sazigem Geschmack und enthält salpetersaures Kali.

Ulmeae Agardh.

Blumenhülle glockenfg., 4- oder 5- selten 8theilig. Staubgef. meist je eines hinter einem Zipfel der Blumenhülle, aus deren Grunde entspringend. Fruchtknote frei 1- oder 2fläche-

rig mit je einem hängenden Ei. Zwei lange Griffel. Frucht eine einsamige Nuss. Same aus der Spitze der Axe herabhängend, ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Blume oder Sträucher mit wechselständigen, ungleichseitigen gesägten Blättern und hinfalligen Stützblt.; Blumen in sitzenden Büscheln vor Erscheinung der Blt.

Ulmus L. Ulme. Fruchtknote 2 fächerig. Die Nuss durch Fehlschlagen 1 fächerig, mit einem Hautflügel umgeben. v. 2.

U. campestris L. Rüster. Blumen fast sitzend; Früchte kahl.

α. vulgaris. Rinde der Aeste ohne Kork; Blt. scharflich.

β. glabra. Rinde der Aeste ohne Kork; Bltt. glatt. *U. glabra* Miller. *U. discolor* W. et Gr. sil.

γ. suberosa. Rinde der Aeste korkig-gefügelt. *U. suberosa* W. et Gr. sil.

In Wäldern und Vorhölzern, d. d. g. G. häufig. *β.* bei *Koberwitz*. *γ.* oft in den *Oderwäldern* bei *Pilsnitz*, *Treschen* etc. April. h.

Baum oft von bedeutender Höhe. Die Blt. am Gr. ungleich, in der Breite und Bekleidung veränderlich. Blüten in kleinen sitzenden Köpfchen; Blumenhüllen grünlich mit braunrothen Zipfeln. Die Form mit korkflügeligen Aesten, besonders ausgezeichnet an stranchartigen Exemplaren (*Müncher Haide* bei *Bischwitz*) kann nur als Abart gelten; man sieht den Uebergang und dieselbe Erscheinung an *Acer campestre*.

U. effusa Willdenow. Blumen gestielt, hängend; Früchte weichhaarig.

Wie die vorige und fast gleich häufig d. d. g. G. März, April, etwa um 8 Tage früher als die vorige. h.

Gleichfalls ein hoher Baum. Die Blt. ebenfalls am Gr. ungleich und in der Breite veränderlich, meist scharflich. Die Früchte am Bande zottig-wimperig, in der Gestalt wie die der vorigen, bald mehr länglich, bald rundlich.

Cupuliferae Richard.

Blumen einhäusig. Staubgefässblumen in walzigen oder rundlichen Kätzchen aus schuppenförmigen dachziegelförmig-gestellten Deckblättern, ohne oder mit 4-6 spaltiger Blumenhülle. Fünf bis zwanzig Staubgef. aus der Blumenhülle oder dem Deckblatt entspringend, mit nach innen gewandten Staubbeuteln. Stempelblumen bald einzeln an der Spitze sitzender Knospen bald gehäuft oder in Kätzchen. Blumenhülle mit dem Fruchtknoten verwachsen mit einem feingezähnten, später sich verlierenden Saume. Fruchtknoten 2- oder 3- (oder 6-) fächerig, mit je 1 oder 2 hängenden Eichen am inneren Winkel. Narben am Gr. oft verwachsen, 2 od. 3 (od. 6). Frucht eine einsamige Nuss, entweder eine einzelne oder mehrere ganz oder zum Theil in einer becher- oder kapselförmigen oder ge-

lappten Hülle, welche sich aus den verwachsenden Deckblättern bildet und während der Fruchtreife vergrössert und damit verhärtet. Same einzeln, ohne Eiweiss, mit geradem Keim und oft dicken Keimblättern.

Bäume oder Sträucher mit wechselständigen Bltt. und hinfälligen Nebenbltt., häufig in grosser Anzahl gesellig wachsend und grössere Waldungen bildend. Die Blumen erscheinen mit oder vor dem Ausbruche der Bltt. Die Rinde enthält einen aus Gallussäure und Gerbestoff zusammengesetzten adstringirenden Stoff.

Cárpinus L. Hainbuche. Zwölf bis 20 Staubgef. mit Haarbüscheln an der Spitze, ohne Blumenhülle auf dem Gr. der eiförmigen Deckblätter, die ein walziges Kätzchen bilden. Stempelblumen je zwei unter einem abfälligen Deckblatt in lockeren Kätzchen. Blumenhülle ein dreilappiges Schuppenblättchen zur Hälfte mit dem Fruchtknoten verwachsen, mit der Frucht sich vergrössernd. Zwei fadenförmige Narben. Nuss vielkantig vom bleibenden Saum der Blumenhülle gekrönt. XXI, 6.

C. Betulus L. Weissbuche. Die Deckschuppen der Fruchtkätzchen dreitheilig.

In Wäldern der Ebene und des Vorgebirges, meist zerstreut in gemischten Waldungen, d. d. g. G. Mai. h.

Ziemlich hoher Baum mit glatter aschgrauer, flechtenreicher Binde und weissem, sehr hartem und zähem Holze. Bltt. kurzgestielt, eig.-länglich, doppelt eingeschnitten-gesägt, kahl. Deckbltt. der Staubgefässblumen gelbgrün, am Bande rothbraun. Wird besonders in Garten- und Parkanlagen zu Laubwänden gebraucht. Das Holz ist zu Tischlerarbeiten tauglich und unter allen unseren Hölzern das beste Brennholz.

Córylus L. Hasel. Staubgefässblumen in walzenförmigen Kätzchen: je drei Deckbltt., die beiden hinteren mit dem vorderen am Gr. und unter sich bis zur Hälfte verwachsen, längs dieser Nath 8 Staubgef. mit Haarbüscheln an der Spitze. Stempelblumen einzeln in einer von dachziegelförmigen Schuppen eingeschlossenen Knospe, mit zwei herausragenden fadenförmigen Narben. Die unreife Fruchthülle schwammig. Nuss eirund von einer vergrösserten dreitheiligen am Rande zer-schlitzten Blüthenhülle umgeben. XXI, 8.

C. Avellana L. Fruchthüllen glockig, vorn etwas offen und zerrissen-gezähnt.

In Wäldern und Vorhölzern der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Febr., März. h.

Hoher Strauch mit langen Aesten und grauer glatter Binde. Staubgefässblumen mit braungelben Deckbltt. Narben purpurroth. Die jungen Zweige und Hauptadern auf der Unterseite der Bltt. mit rostrothfarbenen Drüsenborsten besetzt. Bltt. herzförmig-rundlich, zugespitzt, rauchhaarig. Stützbltt. länglich-stumpf. Nüsse schwach-zusammengedrückt.

Das Holz wird verschiedentlich angewandt. Die Fruchtkerne sind wohlschmeckend und enthalten ein fettes Oel.

Quercus L. Eiche. Staubgefässblumen in langen schlaffen, ungleichmässigen Kätzchen; Deckbltt. und Blumenhülle ununterschieden, 5-9 lippig; 5-9 Staubgefässe um eine flache Drüse, mit nackten Staubbeuteln. Stempelblumen einzeln oder gedrängt oder an einer verlängerten Spindel von einander gesondert, mit zahlreichen dachziegelförmigen Deckbltt., welche an der Nuss zu einem holzigen Becher verwachsen. Fruchtknote 3 fächerig mit einem kurzen dicken Griffel und 3 dicken Narben. Nuss ei- oder länglichrund, ohne Spur der Blumenhülle, in den aus den Deckblättern gebildeten Becher zur Hälfte oder bis unter die Spitze eingesenkt. XXI, 8.

Ansehnliche Bäume, die grosse Waldungen bilden. Viele Arten zum Theil mit immergrünen Bltt. im südlichen Europa, dem Orient und in Nord-Amerika. Am wichtigsten sind *Q. infectoria*, wovon die türkischen Galläpfel, *Q. coccifera*, wovon die Kermesschildläuse und *Q. Suber*, wovon der Kork kommen.

Q. Robur L. et Willdenow. Bltt. gestielt, verkehrt-eifg., tiefbuchtig mit rundlichen Zipfeln; Früchte länglich, sitzend.

In der höheren Ebene und dem Vorgebirge zerstreut und manchen Gegenden fehlend, bei uns kaum grössere Wälder bildend, sondern nur in einzelnen Gruppen. Auf höheren Standpunkten nur noch strauchartig. April, Mai. 7.

Von der folgenden Art durch etwas spätere Blüthezeit, ein wenig abweichende Blattform und stiellose Früchte zu unterscheiden. Fries ist der Ansicht, dass in Schweden diese beiden Arten in einander fließen, und es dürfte sich vielleicht auch bei uns rechtfertigen lassen.

Q. pedunculata Ehrhart. Bltt. fast sitzend, länglich-verkehrt-eifg., tief buchtig mit gerundeten Zipfeln, Früchte länglich, gestielt.

Bildet grosse Wälder besonders in der tieferen Ebene und den Odergegenden, die jedoch in der neueren Zeit sehr geschmolzen sind; die wegen ihrer Grösse berühmten Exemplare bei *Bleischwitz* und *Belkau* gehören dieser Art an. In der *Trebnitzer* Hügelreihe findet man sie öfter in Gesellschaft der vorigen. April, Mai. 4.

Staubgefässblumen gelbgrünlich, Stempelblumen röthlich. — Das bräunliche Holz giebt ein langsam verkohlendes Brennholz und treffliches Bauholz. Die Rinde enthält eisenbläuernden Gerbstoff mit Gallussäure, und ist das gewöhnlichste Gerbmittel und treffliches tonisches Arzneimittel. Die Eicheln enthalten geröstet ein empyreumatisches Oel und bitteren Stoff und werden in Gestalt des Eichelkaffees ein wirksames Arzneimittel. Durch den Stich eines wespenartigen Insekts, *Cynips Quercus* L., entstehen an den Zweigen und Stielen kugelige Auswüchse, die *Galläpfel*, welche zum Schwarzfärben und Fabrikation der Dinte gebraucht werden; die bei uns wachsenden sind jedoch wenig brauchbar.

Fagus L. Buche. Staubgefässblumen in gestielten kugeligen Kätzchen, mit kleinen hinfalligen Deckschuppen und glockenförmigen 5-6theiligen Blumenhüllen; 8-12 Staubgef. um eine flache Drüse mit nackten Staubbeutel. Stempelblumen gestielt, je zwei mit dachziegelförmigen langen und schmalen Deckbltt. welche um die beiden Nüsse zu einer holzigen Kapsel verwachsen. Fruchtknote dreifächerig. Zwei dreikantige Nüsse, von der halb vierklappigen Kapsel umschlossen. XXI, 6.

F. sylvatica L. Rothbuche. Bltt. eifg., verloren-gezähnt, kahl, am Rande wimperig.

Meist grosse Waldungen bildend, hin und wieder auch mit Nadelholz vermischt, in der höheren Ebene, dem Vor- und Hochgebirge, bis gegen 4000', wo dieselbe zuletzt strauchartig erscheint. In grösseren Beständen in der *Trebnitzer* Hügelkette um *Skarsine* u. *Trebnitz*, hinter *Deutschhammer*, um *Sprottau*, *Grätz* bei *Troppau*, am *Palomb* und um *Lomna* b. *Teschchen*, *Sandgeb.* und am *langen Berge* bei *Donnerau*, am *Schreibendorfer Berge*, am *Gl. Schneeberge*, in den Gründen und Thälern des *Riesengebirges* u. *Gesenkes* u. s. w. April, Mai. ♀.

Hoher und starker Baum mit weiter Krone, glatter flechtenreicher Rinde. Bltt. im Frühjahr seidenartig-zottig, später fast lederartig, hellgrün. Stiele der Kätzchen wollig. Nüsse hellbraun, enthalten viel fettes Oel, dienen zur Schweinemast; ihr Genus soll Schwindel erregen. Das Holz ist röthlich und nach dem der Weissbuche das beste Brennholz. Man glaubt, dass dieser Baum nie vom Blitz getroffen werde.

Betuleae Richard.

Blumen einhäusig in Kätzchen. Staubgefässblumen in langen walzenförmigen Kätzchen; die Deckbltt. dachziegelförmig, gestielt, oben schildförmig erweitert, mit zwei seitlichen kleineren Schuppen verwachsen, dreiblumig; jede Blume mit 2 oder 4 Staubgef., ohne oder mit 4 lappiger Blumenhülle. Stempelblumen in kleinen Kätzchen; die Deckbltt. dachziegelfg., sitzend, 3- oder 2blumig; der Fruchtknote ohne Blumenhülle, 2 fächerig, mit je einem Ei und 2 fadenförmigen Narben. Nuss zusammengedrückt, einsamig. Same hängend, ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Bäume mit wechselständigen Bltt. und hinfalligen Stützbltt. Die Blumen erscheinen mit oder vor dem Ausbruche der Bltt.

Bétula L. Birke. Sechs Staubgef. unter jedem Deckbltt., je zwei in einer Blume, ohne Blumenhülle; Staubbeutel ge-

spalten. Stempelblumen je drei unter einem flachen dreilappigen Deckblatt. Nüsse zweiflügelig. XXI, 4.

B. alba L. Bltt. rautenfg.-dreieckig, lang gespitzt, doppelt gesägt, nebst den Stielen kahl; die Seitenlappen der Frucht-Deckblätter niedergebogen; Samen elliptisch mit einem über den Samen hinausreichenden Flügelrande.

β. pendula. Trauerbirke. Bltt. sehr lang gespitzt; Zweige flatterig, hängend.

γ. microphylla. Bltt. klein, eifg.-spitzig, am Gr. gerundet, grob und meist einfach gesägt.

Auf trocknen hohen und hügeligen Stellen, besonders auf Sandboden und in der Nähe der Kieferwälder. *γ.* bei *Schmiedeberg* und auf dem *langen Berge* zw. *Karlsdorf* und *Habendorf*. April. h.

Zierlicher Baum mit grauer rissiger Rinde, aber an den jüngeren Stämmen und Aesten mit weisser Oberhaut, die sich lagenweise von der Rinde ablösen lässt, dünnen braunrothen, häufig warzigen Zweigen. Die Staubgefässblumen in langen Kätzchen an den Spitzen der Zweige, die Stempelblumen in kurzen grünen walzigen Kätzchen an den Seiten. Das Holz dient vorzüglich den Sattlern und Stellmachern. Aus der Oberhaut wird der *Birkenkämpfer* und aus der Rinde das *empyreumatische Birkenöl*, das bei der Juchtenbereitung dient, gewonnen und aus dem Saft im Frühjahr ein weinartiges Getränk bereitet. Aus der inneren weichen Rinde macht man im hohen Norden Kuchen zur Winternahrung. Die Bltt. riechen angenehm und schmecken bitter.

B. pubescens Ehrhart *B. odorata* *Bechstein*. Bltt. oval oder rautenfg., spitz, ungleich-gesägt, unterseits in den Aderwinkeln behaart; die Seitenlappen der Fruchtdeckblatt. aufsteigend; Samen verkehrt-eifg. mit einem bis an die Spitze derselben reichenden Flügelrande.

β. carpathica. Bltt. rundlich mit kurzer Spitze, nebst den Stielen kahl. *B. carpathica* Willdenow.

γ. obtusifolia. Bltt. oval-länglich, grob-gezähnt.

Auf sandigen Hügeln, häufig in Moorgegenden u. auf Torfgrund, seltner als die vorige, doch stellenweise sehr zahlreich. Um *Br.* bei *Oswitz*, *Lissa*, *Mahlen*, *Riemberg*. Bei *Trachenberg*. Am *Geiersberge*, und hin und wieder im Vorgebirge. *γ.* um *Neudörfel* b. *Lissa*. Steigt bis auf das Hochgebirge: *β.* am *kleinen Teiche* im Riesengeb., im *Kessel* und am *Peterssteine* im Gesenke. April, Mai, ein wenig später als die vorige. h.

Mässiger Baum, häufig auch als Strauch. Die jungen Bltt. und Blattstiele weichhaarig, von starkem Geruch. Diese Art hält *Fries* für Abart der vorigen; bei uns lässt sich kein Uebergang nachweisen. Die Gebirgsform hat dunklere und lederartige Bltt., auch ein abweichendes Aussehen; doch ist ihr Zusammenhang mit der Form der Ebene leicht aufzufinden.

B. nana L. Bltt. kreisfg., gekerbt, kahl; Stempelblumen in eiförmigen Kätzchen; Samen rundlich-eifg. mit schmalem Flügelrande.

Auf Torfmooren des Vorgebirges. Auf der *Iserwiese*. Auf den *Seefeldern* an der *hohen Mense*, vermuthlich auch auf den ähnlichen Stellen an der *Heuscheuer*. Mai, Juni. h.

Ein niedriger Strauch mit rothbrauner Rinde.

Alnus Tournefort Erle. Zwölf Staubgef. unter jedem Deckbltt., je 4 in einer Blume, mit viellappiger Blumenhülle; Staubbeutel ungespalten. Stempelblumen je 2 unter einem schildförmigen Deckblatt. Nüsse ungeflügelt. XXI, 4.

A. glutinosa L. Rotherle. Schwarzerle. Betula Alnus Linn. Bltt. verkehrt-eifg.-rundlich, ungleich-gesägt, eingedrückt; unterseits in den Aderwinkeln zottig.

In feuchten Waldungen, an Fluss- und Teichufern, bisweilen über grosse sumpfige Strecken, sogenannte Brüche, verbreitet, in der Ebene und dem Vorgeb. d. d. g. G. häufig. März, April. ♀.

Baum und Strauch mit röthlich-schwarzbrauner Rinde. Das frische Holz im Frühling fast orangeroth. Laub dunkelgrün, etwas klebrig. Die Deckblt. der Stempelblumen vergrössern sich und verholzen zu einem eirunden Scheinzapfen. Die Rinde enthält Gerbestoff; die Blt. sind als Heilmittel bei Geschwüren üblich.

A. incana L. Grauerle. Bltt. eifg.-länglich, spitz, doppeltgezähnt, unterseits grau und weichhaarig.

An feuchten Orten und Flussufern im Gebirge zerstreut. Um Br. bei Kl. **Kletschkau**, an der Weide bei **Kryzanowitz**, **Bresa** bei **Bohrau**. **Ohlau**. **Krauschen** und **Nischwitz** b. **Bunzlau**. **Boberröhrsdorf** bei **Hirschberg** nach N. v. E. **Oppeln**. **Krasno** bei **Teschen**. März, April, 8 Tage früher als die vorige. ♀.

Rinde glatt, grau. Die Kätzchen der Stempelblumen sind länglich, länger als an der vorigen.

Salicinae Richard.

Blumen zweihäusig in Kätzchen, aus dachziegelförmigen schuppenförmigen Deckblättern. Die Blumenhülle ist ein schief abgestutzter fleischiger Becher oder zu einer warzenförmigen Drüse verkümmert. Zwei bis zwölf Staubgef. mit langen fadenförmigen, selten verwachsenen Staubfäden. Fruchtknoten frei einfächerig, mit zwei Näthen, zwei gespaltenen Narben und zwei Samenhältern an der Wand der Klappen mit vielen hängenden Eichen. Frucht eine zur Hälfte 2klappige Kapsel. Samen mit langer Haarwolle umgeben, ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Bäume oder Sträucher mit wechselständigen Bltt. und hinfälligen Stützbltt., weichem und zähem Holze, gerbestoffhaltiger und bitterer Rinde, bisweilen balsamisches Harz enthaltend, von sehr raschem und üppigen Wachsthum und grosser Gedeihkraft. Die Blumen erscheinen meist vor dem Ausbruche der Bltt.

Salix L. Weide. Deckbltt. ungetheilt. Staubgefäss- und Stempelblumen ohne Blumenhülle mit 1 oder 2 Drüsen am Grunde. XXII, 2.

Die Binde enthält Salicin, einen bitteren Extractivstoff. An einer bisweilen vorkommenden Missbildung in den Kätzchen der *S. cinerea*, *Caprea*, *aurita* und *silesiaca* beobachtet man die Verwandlung der Staubgefäße in Fruchtknoten, (oder richtiger umgekehrt? oder beides?) in den mannigfaltigsten Uebergangsstufen und Bildungsformen. Die Arten dieser Sippe sind wegen der ausserordentlichen Wandelbarkeit der Theile in Gestalt und Behaarung schwer zu sondern. An den jungen saftreichen Trieben erlangen die Bltt. und Stützbltt. eine ungewöhnliche Grösse, sind breiter und glänzend oder bei den behaarten Arten viel stärker behaart; letztere fehlen an älteren Zweigen meist ganz.

a. *Fragiles*, *Bruchweiden*. Die Kätzchen auf seitlichen beblätterten Zweigen endständig. Deckschuppen einfach, gelbgrün, vor der Fruchtreife abfällig.

S. pentandra L. *Lorbeerweide*. Fünf bis zehn Staubgef. in jeder Blume; Kapseln eilanzettlich, kahl, kurz-gestielt, Stiel doppelt so lang als die Drüse; Bltt. eigf.-elliptisch, zugespitzt, fein und dicht-gesägt, ganz kahl; Stützbltt. eigf., gerade; Blattstiele nach vorn mit mehreren Drüsen besetzt.

In feuchten Wäldern, an Fluss- und Bachrändern, in Moor- und Torfgegenden an Waldrändern und auf Wiesen, d. d. g. G. in d. Eb. u. dem Vorgeb. Um *Br.* bei *Bischwitz a. W.*, hinter *Kl. Weigelsdorf*, *Kottwitz* u. *Garsuche* bei Ohlau. *Riemberg*. *Wohlau*. *Bunzlau*. *Straupitz* bei Hirschberg. Um Troppau bei *Kunau*, *Breitenau* und bei *Hermannstadt*, *Einsiedel* und auf dem *Moosebruche* im Gesenke. Um *Teschen*. Mai, Juni. ♀.

Strauch oder Baum, mit dicklichen glänzenden, drüsig-gesägten Bltt. von fast balsamischem Geruch. Die Kätzchen der Staubgefäßblumen sehr dick. Variirt mit elliptisch-lanzettlichen Bltt. — Wahrscheinlich kommt auch *S. cuspidata* Schultz in Schlesien vor, welche ein Bastard zwischen *S. pentandra* und *S. fragilis* zu sein scheint.

S. fragilis L. *Bruchw. Knackweide*. Zwei Staubgef. in jeder Blume; Kapseln eilanzettlich, kahl, gestielt, Stiel 2-3 mal so lang als die Drüse; Bltt. lanzettlich, langspitzig, kahl, mit eingebogenen Sägezähnen; Stützbltt. halb-herzfg.

β. *Russelliana*. Die jüngeren Bltt. im Sommer u. Herbst unterseits grau mit dünnem Seidenhaar mehr oder weniger besetzt.

An Wegen, Landstrassen, Waldrändern, um Dörfer, d. d. g. G. häufig. April, Mai. ♀.

Hoher Baum, der nebst der folgenden häufig an Landstrassen angetroffen wird, wo er durch Abköpfen, das alle 4-6 Jahr wiederholt wird, ein eigenthümliches Ansehen erhält. Die Zweige brechen bei leisem Schlage an den Ausgangswinkeln leicht ab. Bltt. eigf.-lanzettlich oder lanzettlich, ungleichseitig, oberseits schwachglänzend, unterseits blaugrün. Auch die var. β ist häufig, gew. mit schmälern Bltt. und leichteren Zähnen, vielleicht als Bastard der *S. fragilis* und *S. alba* anzusehen.

S. alba L. Zwei Staubgef. in jeder Blume; Kapseln spitz-eigf. stumpf, kahl, zuletzt gestielt; Stiel kaum so lang als die kurze Drüse; Bltt. lanzettlich, langspitzig, gesägt, beiderseits seidenartig-behaart; Stützbltt. lanzettlich.

Mit der vorigen, minder häufig. April, Mai. ♀.

Hoher Baum. Bltt. meist silberweiss, doch bei dünnerem Ueberzuge auch grauschimmernd und bisweilen verliert sich im Herbst der Haarüberzug fast ganz. — Die *S. vitellina* L. spec. pl. ist eine Abart hiervon mit dottergelben Zweigen, besonders im Frühjahr, meist an feuchten Standorten, z. B. bei *Arnoldsmühl*, dergleichen von mehreren Weidenarten vorzukommen pflegen. Von dieser Art besonders ist die Rinde officinell.

b. *Amygdalinae*, *Mandelweiden*. Die Kätzchen auf seitlichen beblätterten Zweigen endständig. Deckschuppen einfarbig, gelbgrün, bis zur Fruchtreife dauernd.

S. amygdalina L. Drei Staubgef. in jeder Blume; Deckschuppen kahl; Kapseln kahl, gestielt, Stiel 3mal so lang als die Drüse; Bltt. lanzettlich oder länglich, spitz, gesägt, kahl; Stützbltt. halbherzförmig.

α. *concolor*. Bltt. unterseits grün, oder schwach-graugrün. *S. triandra* L. Krock. sil.

β. *discolor*. Bltt. unterseits grau oder grauweiss. *S. amygdalina* L. Krock.

An Fluss- und Bachufern, nebst *S. viminalis* die häufigste Art in den Weidengebüschen längs den Ufern der *Oder* und anderer Flüsse; d. d. g. G., seltner im Gebiet von *Teschen*. April, Mai. ♀.

Meist strauchartig. Die Bltt. variiren von eif.-länglicher bis in die lineal-lanzettliche Gestalt, und eben so durch allmälige Abstufungen in der Färbung der Unterseite. Kätzchen der Staubgefässblumen dünn-walzig, locker. Deckschuppen weissgrünlich, an den Stempelblumen bisweilen rostbraun, und dann auch die Kapseln bräunlich. v. Mückusch fand bei *Troppan* auch die Form, deren Kätzchen am Gr. Staubgefässblumen und oben Stempelblumen tragen.

S. hippohaëfolia Thuillier. Drei Staubgef. in jeder Blume; Deckschuppen haarig; Kapseln filzig oder kahl, gestielt, Stiel so lang als die Drüse; Bltt. lanzettlich-langspitzig, fein drüsig-gezähnt, zuletzt kahl, am Rande umgebogen; Stützbltt. halb-herzfg.

Wie die vorige, jedoch selten; wahrscheinlich an vielen Orten, aber bisher übersehen. Um *Br.* bei *Grüneiche* und *Bischofswalde*, *Treschen*, an der *alten Oder* bei *Scheitnich* und *Rosenthal*, um *Pöpelwitz*, *Masselwitz*. April, Mai. ♀.

Strauch. Bltt. schmal-lanzettlich, sehr lang, oberseits glänzend, bald oben, bald am Rande schwach-wellig, mit filzigen, feinhaarigen oder kahlen Fruchtknoten. Deckschuppen blass-rosaroth oder ziegelroth, stärker oder schwächer behaart. Bisher wurden nur Exemplare mit Stempelblumen gefunden; aus Böhmen sahen wir dergleichen mit Staubgefässblumen als *S. scaphila* Tausch von Opts in Prag ausgegeben.

c. *Pruinosae*, *Reifweiden*. Kätzchen seitlich sitzend. Deckschuppen an der Spitze gefärbt. Staubbeutel nach dem Verstäuben gelb. Innere Rinde gelblich.

S. daphnoides Villars. *S. praecox* Hoppe. Kapseln eikegelfg., sitzend, kahl; Bltt. länglich-lanzettlich, drüsig-gesägt, anfangs zottig, später kahl; Stützbltt. halb-herzfg.; Griffel verlängert, Narben länglich; Deckschuppen seidenhaarig-zottig.

An Flussufern. Zuerst an der *Oppa* und *Mora* nächst *Troppan* von v. Mückusch gef., dann in den *Pascheken* und um *Nakel* bei

Oppeln von Grabowski, um Ohlau von Beilschmied und um Br. am Wege nach Hundsfeld von Krause gefunden. März, April. ♀.

Hoher Baum, aber auch strauchartig. Die Aeste sind bald grünlich, bald mit starkem graublauen Reif überzogen. Sehr dicke, grosse, längliche, zottige Kätzchen. Die Bltt. ändern sehr in der Breite und Bekleidung ab; im Alter sind sie kahl und bisweilen unterseits seegrün. Hierher rechne ich auch *S. acutifolia* Willd., wozu die Expl. von Nakel und zum Theil von Hundsfeld gehören, welche Koch und Grabowski für eine besondere Art ansehen.

d. *Purpureae*, *Purpurweiden*. Kätzchen seitlich, sitzend. Deckschuppen an der Spitze gefärbt. Staubbeutel roth, nach dem Verstäuben schwarz.

S. purpurea L. *S. monandra* Hoffm. Zwei bis an die Spitze verwachsene Staubfäden in jeder Blume; die Kätzchen am Gr. von Deckbltt. gestützt; Kapseln eifg., stumpf, sitzend, filzig; Narben eifg.; Bltt. lanzettlich, zugespitzt, nach vorn etwas breiter, scharfgesägt, kahl. *Hauptformen* nach Koch:

α. *vera*. Niedriger mit kurzen ausgesperrten Aesten und sehr dünnen Kätzchen.

β. *Lambertiana*. Mit vielen ausgesperrten Aesten, breiten Bltt. und dickeren Kätzchen.

γ. *Helix*. Mit langen aufrechten Aesten und langgezogenen Bltt.

Auf feuchten Orten an Flussufern, Bächen, feuchten Wiesen und Waldrändern d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. März, April. ♀.

Meist ein niedriger Strauch, mit olivengrünen, hellgelbgrünen, gelbrothen oder purpurrothen, dünnen, biegsamen Zweigen. Bltt. stets schwach-seegrün, zuerst seidenhaarig, später ganz kahl mit einem schwachen Fettglanze oder Reif; sehr oft, wie auch die Kätzchen, beinahe gegenständig. Griffel sehr kurz oder fehlend. Die Deckschuppen an der Spitze schwärzlich oder röthlich.

S. rubra Hudson. *S. fissa* Ehrhart. Krock. sil. Zwei bis zur Hälfte verwachsene Staubfäden in jeder Blume; Kätzchen am Gr. von Deckbltt. gestützt; Kapseln eifg., sitzend, filzig; Narben länglich-linealisch oder fädig; Bltt. lang-lanzettlich, langspitzig, schweifiggezähnt, zuerst feinhaarig, später oberseits kahl und glänzend; Stützbltt. linealisch.

α. *glabrata*. Bltt. ganz kahl, nach vorn breiter, zugespitzt; Griffel kurz.

β. *pubescens*. Bltt. unterseits seidenartig-behaart, langspitzig; Griffel länger.

Mit der vorigen um Br. hin und wieder an der *alten Oder* bei *Scheitnich*, *Pöpelwitz*, *Grüneiche*, *Pilsnitz*, *Rosenthal*, *Arnoldsmühl*. Bei *Salzbrunn* und *Hirschberg* nach Schn. *Schönbrunn* bei Teschen nach R.u.M. April. ♀.

Diese Art ist ein Bastard zw. *S. purpurea* und *S. viminalis*, daher ihr seltenes und vereinzeltes Vorkommen und das Schwankende ihres Charakters; die Form α steht der vorigen, die Form β der folgenden näher. Die Bltt. können leicht mit denen der *S. hippophaefolia* verwechselt werden, und sind, wie auch die Kätzchen, oft fast gegenständig.

c. *Viminales*, *Korbweiden*. Kätzchen seitlich, sitzend. Deckschuppen an der Spitze gefärbt. Staubbeutel nach dem Verstäuben gelb. Innere Rinde grünlich.

S. viminalis L. *Korbweide*, *Bandweide*. Kapseln eilanzettlich, filzig, sitzend; Griffel lang, Narben fädlich ungetheilt; Deckschuppen behaart; Bltt. lanzettlich oder linealisch, langspitzig, verlorengeschweift, unterseits seidenhaarig; Stützblt. linealisch.

An Flussufern und in feuchten Gebüschern d. d. g. G. gemein. März, April. ♀.

Hoher Strauch mit langen zähen hellgelben oder olivengrünen Zweigen; die jüngeren sammthaarig, die starken und saftigen Triebe meist sammtfilzig und mit langen und breiten, unterseits silberweissen Bltt. (solche Form ist auch *S. stipularis* Wimm. Fl. v. Schles. von *Malapane*). Bltt. breiter oder schmaler, unterseits mit schwächerem grauem oder stärkerem silberweissem Seidenüberzug. Deckschuppen mit schwarzer Spitze. Die Stützblt. gewöhnlich klein und hinfällig; an den saftigen Trieben aber oft gross und halbfeilförmig.

S. acuminata Smith. Kätzchen sitzend, später kurz-gestielt; Kapseln eilanzettlich, filzig, gestielt; Griffel so lang als die fädlichen ungetheilten Narben; Bltt. länglich-lanzettlich, spitz oder langspitzig, ganzrandig oder schweifig-gezähnt, unterseits mit mattem, seidenartigem oder wolligem Filz; Stützblt. nieren-herzfg.

An Flussufern in der Ebene d. d. g. G. zerstreut und vereinzelt. Um *Br. bei Bischofswalde*, *Schwoitsch*, *Sandberg*, *Schonsnitz* bei *Canth*, *Tschechnitz*. *N. Tillendorf* bei *Bunzlau* nach *Schn. Oppeln*. Bei *Troppau* an der Oder. April. ♀.

Hoher Strauch, auch baumartig. Hat einige Aehnlichkeit mit *S. viminalis*, aber viel dickere Kätzchen und breitere Bltt. Die Gestalt und Bekleidung der Bltt. ist äusserst veränderlich. An alten Bltt. ist letztere oft sehr dünn. Die Exemplare von *Troppau* zeichneten sich durch dicken Filz der jüngeren Zweige und starken weissen Filz der Unterseite der Bltt. aus. — Koch führt in der Synops. auch *S. Smithiana* Willdenow und *S. mollissima* Ehrhart aus Schlesien auf. Es gelang mir bisher noch nicht konstante Unterschiede in den hierher gehörigen Formen aufzufinden.

S. incana Schrank. *S. riparia* Willd. Kätzchen bogenförmig; Kapseln eilanzettlich, kahl, gestielt, Stiel doppelt so lang als die Drüse, Griffel verlängert mit 2spaltigen Narben, Deckschuppen kahl, kurz gewimpert; Bltt. lineal.-lanzettlich, langspitzig, feingezähnt, unterseits weissgrau filzig.

Auf steinigem Flussufern, im Südosten des Gebiets, wo sie zum Theil die anderen daselbst fehlenden Arten vertritt. Im *Weichselthale* längs des Dorfes *Weichsel* zuerst von *Kotschy* mitgetheilt. An der *Oelse* bei *Freistadt*. An der *Mora* bei *Troppau* nach v. *Mückusch*. April, Mai. ♀.

Strauch mit olivenbraunen oder kastanienbraunen Aesten. Bltt. oberseits dunkelgrün und anfangs weichhaarig, später kahl, unterseits mit dünnerem oder dickerem weisslichem Filz.

f. *Capreae*, *Saalweiden*. Kätzchen seitlich, anfangs sitzend, später gestielt. Deckschuppen an der Spitze gefärbt. Staubbeutel nach dem Verstäuben gelb. Kapseln langgestielt. Hohe Sträucher oder Bäume.

S. cinerea L. Kapseln aus eiförmigem Grunde verschmälert lang-lanzettlich, filzig; gestielt, Stiel 4mal so lang als die Drüse;

Griffel sehr kurz, mit eiförmigen, 2spaltigen Narben, Bltt. elliptisch- oder lanzettlich-verkehrt eifg.; kurz zugespitzt, eben, wellig-gesägt, aschgrau-grün unterseits grau-weichhaarig oder filzig; Stützbltt. nierenfg.; Knospen grauhaarig.

An feuchten und wasserreichen Orten, auf Wiesen, an Wald-, Fluss-, Teich- und Grabenrändern d. d. g. G. hin und wieder mit *S. aurita* wechselnd und mehr an tieferen Plätzen doch auch bis in die Region des Vorgebirges. März, April. h.

Die aschgraue Farbe der Zweige und Bltt. macht diese Art leicht kenntlich. Die Kätzchen eifg. und eif.-länglich. Schuppen an der Spitze schwarz. Kapseln nur sehr selten schwach-weichhaarig oder ganz kahl und dann stets in Missbildung begriffen. Form u. Bekleidung der Bltt. ist äusserst wandelbar; jene bald länglich lanzettlich, bald verkehrt-eifg., sogar bis in das rundliche. Die jungen Zweige sind stets sammthaarig.

S. silesiaca Willdenow. Kapseln aus eiförmigem Grunde langpfriemlich, kahl oder seidenhaarig, gestielt, der Stiel 3-4mal länger als die Drüse; Bltt. verkehrt-eifg., zugespitzt, kerbig-gesägt, unterseits fast gleichfarbig; Stützbltt. nieren-herzfg.

β. crassifolia. Bltt. oval, fast lederartig, oberseits glänzend, unterseits fast kahl.

γ. rotundata. Bltt. oval-rundlich, vorn gerundet, am Gr. schwach-herzfg.

δ. lancifolia. Bltt. verkehrt-eifg.-lanzettlich, fast kahl, unterseits graugrün.

An feuchten Orten, auf Wiesen, an Lehnen und Bächen des Vor- und Hochgebirges, etwa bis 4000'. Auf der *Eule* und *Sonnenkoppe*. Gr. Glaz um *Langenau*, *Reinerz*, *Cudowa*. Auf d. *Heuscheuer*, *hohen Mense*, *Schneeberg*. Riesengeb. längs des Fusses und besonders um den *Zackenfall*, die *schles. Baude*, *Pudelbaude*, im *Elb-* u. *Riesengrunde*. Im *Gesenke*. *Czantory* bei *Ustron*. *Babia Gora*. *β.* und *γ.* am *Hockschar*, *δ.* im *Riesengrunde*. Mai, Juni. h.

Strauch mit krummen verworrenen Aesten. Bltt. verkehrt-eifg., länger oder kürzer gespitzt, oberseits feinhaarig oder kahl, unterseits dünn-grauhaarig oder fast kahl und schwach-graugrün, nie ganz kahl; die jungen Bltt. röhlich schimmernd. Die Bltt. sind in der Mitte am breitesten. Gleichhänfig mit kahlen und mit seidenhaarigen Kapseln. Diese Art tritt in der höheren Region an die Stelle der *S. cinerea* und zum Theil der *S. aurita*.

S. caprea L. *Saalw.* *Sohlw.* Kapseln aus eiförmigem Grunde pfriemlich, gestielt, Stiel 4-6mal länger als die Drüse; Griffel sehr kurz, mit eiförmigen, 2spaltigen Narben; Bltt. eifg. oder elliptisch mit umgekrümmter Spitze, schwach-wellig-gekerbt, oberseits kahl, unterseits graufilzig; Stützbltt. nierenfg.; Knospen kahl.

Auf Sand- und Haideboden, in Kiefer- und Birkenwäldern, auf Hügeln, überhaupt an höheren und trockneren Stellen in der Ebene u. dem Vorgeb. d. d. g. G. nicht selteu. Um *Br.* bei *Lissa*, *Arnolds-mühl*, in der *Trebnitzer* Hügelreihe sehr häufig. März, April, nächst *S. daphnoides* am frühesten von allen Arten. h.

Baum seltner strauchartig. Aeste und Knospen sehr dick, erstere kahl oder weichhaarig. Bltt. elliptisch, bald mehr in das rundliche, bald in das langliche, oberseits glatt und schwach-glänzend, unterseits mit stärkerem oder schwächerem, weisslichem oder grauem, meist sehr dichtem Filz. Kätzchen dick, eifg.-länglich.

S. aurita L. *Salbeiweide*. Kapseln aus eiförmigem Gr. pfriemlich; filzig, gestielt, Stiel 3-4mal so lang als die Drüse; Griffel

sehr kurz; Blätter verkehrt-eiförmig, am Gr. keilförmig mit umgekrümmter Spitze, wellig-gesägt, runzlig, unterseits grau und kurzhaarig-filzig; Stützbltt. nierenfg.; Knospen kahl.

α. vulgaris. Niedriger mit kurzen ausgesperrten Aesten und kleineren Bltt.

β. uliginosa. Höher mit längeren aufrechten Aesten und grösseren Bltt.

In feuchten Haidegegenden, auf sumpfigen Wiesen und Waldrändern, in Moor- und Torfbrüchen, d. d. g. G. bis an das Hochgeb. häufig. Um Br. bei *Lilienthal, Oswitz, Lissa*, wo besonders *β* häufig ist, *Riemberg* etc. April, Mai. *h.*

Strauch von mittlerer Höhe, mit schmutzig-braunen, auch roth oder kastanienbraunen Zweigen. Aeste, Bltt. und Kätzchen sind kleiner als an den drei vorhergehenden. Die Stützbltt. sind an dieser Art beständiger. Die Bltt. sind bald unter der Spitze am breitesten.

S. depressa L. nach Fries. *S. Starkeana* Willdenow. W. et Gr. sil. Kapseln aus eifg. Gr. linealisch-walzig, filzig, gestielt, Stiel 5 mal so lang als die Drüse; Griffel sehr kurz; Bltt. elliptisch od. verkehrt-eifg., kurz zugespitzt, ausgefressen-gesägt, unterseits graugrün, zuletzt ganz kahl; Stützbltt. nierenfg.

In Brüchen. Um Gr. *Tschirnau* bei *Guhrau* von *Starke* gef. u. an *Willdenow* und *Günther* mitgetheilt; das Exemplar im K. botan. Garten hierselbst stammt von diesem Orte. Sie ist seitdem an ihrem Standorte noch von niemand gesehen worden. April. *h.*

Niedriger Strauch mit langen, dünnen, zähen, olivengrünen Zweigen. Die stempeltragenden Kätzchen lang-walzig, schlaff, oft schwach-gekrümmt, und bei der Frucht reife lang-gestielt. Deckschuppen länglich, haarig. Die erwachsenen Bltt. sind durchaus glatt, eben und ganzrandig. Pflanzen mit Staubgefässblumen wurden nicht beobachtet.

S. bicolor Ehrhart. *S. Weigeliiana* Willd. W. et Gr. sil. *S. arbuscula* Wimm. Fl. v. Schles. Kapseln aus eiförmigem Gr. pfriemlich gestielt, Stiel 2-3 mal länger als die Drüse; Griffel verlängert mit 2spaltigen Narben; Bltt. eifg.-elliptisch, fast ganzrandig oder verloren schweifig-gesägt, unterseits graugrün, zuletzt kahl; Stützbltt. halb-herzfg. mit schiefer Spitze.

An Gebirgslehnen. Im *Riesengebirge* an der Lehne des *Brunnenberges* zuerst von *Weigel*, später von *Beilschmied, Tausch* und *Wagner* gefunden. Mai, Juni. *h.*

Strauch mit kurzen ausgesperrten röthlich-braunen Aesten. Die jungen Bltt. sind mit seidenartigem Haar bekleidet. Deckschuppen an der Spitze schwärzlich, langzottig. — Pflanzen mit Staubgefässblumen wurden noch nicht gefunden.

S. hastata L. Kapseln eifg.-pfriemlich, kahl, gestielt, Stiel $1\frac{1}{2}$ mal so lang als die Drüse; Deckschuppen bärtig-zottig; Griffel verlängert; Bltt. elliptisch, kahl, gesägt; Stützbltt. lanzettlich-halb-herzfg.

Auf sumpfigen abhängigen Stellen des Hochgebirges. Im *Gesenke am Hockschar, Peterssteine* und im *Kessel*. Mai, Juni. *h.*

Niedriger Strauch, mit kurzen aufrechtstehenden, etwas höherigen Aesten. Bltt. hellgrün, unterseits graugrünlich, eifg.-elliptisch oder lanzettlich-elliptisch, zuletzt ganz kahl. Deckschuppen rostbraun mit langen weissen Seidenzotten.

g. Repentes. Kätzchen seitlich, anfangs sitzend, später gestielt. Deckschuppen an der Spitze gefärbt. Staubbeutel nach dem Verstäuben gelb. Kapseln sehr lang-gestielt, der Stiel länger als die Deckschuppe. Niedrige Sträucher, deren Hauptstamm unter der Erde kriecht.

S. myrtilloides L. Frucht-Kätzchen lang-gestielt mit beblättertem Stiel; Kapseln aus eiförmigem Gr. lanzettlich, mit einem 4 und mehrmal längerem Stiele als die Drüse; Griffel kurz mit eig. ausgerandeten Narben; Bltt. eig. am Gr. seicht herzförmig, länglich oder lanzettlich, ganzrandig, kahl, matt, unterseits netzaderig; Stützbltt. halb-eifg.

In waldigen Moorsümpfen der Ebene u. d. Vorgebirges. Zuerst in Sümpfen bei *Königshuld* in OS. von Grabowski u. Fincke gef. Auf der *Heuscheuer am grossen See* von Neumann. Auf der *Iserwiese* nach Tausch. Vermuthlich auch auf den Seefeldern an der *hohen Mense*. Mai, Juni. ♀.

Diese Art ist durch die graubläuliche Färbung der Bltt. leicht kenntlich. Die Fruchtkätzchen walzig; oft sind die Kapseln röthlich und von graublauem Belf überzogen, bei uns stets glatt. — Die *S. finmarchica* Willd. Wimm. Fl. v. Schles. mit unterseits runzlich-aderigen und anfangs weichhaarigen Bltt. mit krummer Spitze, von Grabowski bei *Königshuld* gef. ist eine Bastardform dieser Art und d. *S. aurita*.

S. repens L. Fruchtkätzchen gestielt; Kapseln aus eifg. Gr. lanzettlich, gestielt, Stiel 2-3mal länger als die Drüse; Griffel kurz mit eig. 2spaltigen Narben; Bltt. lineal-lanzettlich oder oval, unterseits seidenhaarig oder grau; Stützbltt. lanzettlich.

α. rosmarinifolia. Bltt. linealisch oder lineal-lanzettlich mit langer Spitze.

β. incubacea. Bltt. lanzettlich oder länglich-lanzettlich, zugespitzt, unterseits bald dünn, bald dicht seidenhaarig.

γ. argentea. Bltt. breit-oval mit krummer Spitze, unterseits oder auch beiderseits silber-seidenhaarig.

δ. fusca. Hoch, mit langen Aesten; Bltt. oval mit krummer Spitze, oberseits kahl, unterseits weissgrau-seidenartig.

Auf Wiesen, Waldwiesen, in Haiden, auf trocknen sandigen Stellen und auf Torf- und Moorwiesen, meist gruppenweise oder auch grössere Strecken bedeckend, in der Ebene, selten im Vorgeb., d. d. g. G. Um *Br.* an der *alten Oder* am *Kratzbusch*, bei *Lilienthal*, zw. *Tschansch* und *Bleischwitz*, um *Schwoitsch*, *Lissa*, wo sämmtliche Variet., *Koberwitz*, *Skarsine* etc. *γ.* besonders um *Lissa*, bei *Oppeln* und *Leobschütz*. April, Mai. ♀.

Meist von 1' H., selten wie *δ.* bis 3'. Aeste aufrecht. Bltt. in der Gestalt und Bekleidung sehr wandelbar, doch lassen sich die Uebergänge leicht verfolgen. Staubbeutel rothgelb, nach dem Verstäuben schwärzlich. Narben bald gelblich, bald rosaf. oder purpurroth. Die stempeltragenden Kätzchen sind bald sehr kurz, fast kugelig und bisweilen armlüthig, bald eifg. und eifg.-länglich oder walzig. Kapseln kahl feinhaarig seidenhaarig oder filzig, bald kürzer, bald länger. — Manche Autoren sehen die oben aufgeführten Abarten für so viel verschiedene Arten an; sorgfältige Beobachtung hat mich überzeugt, dass es zwischen denselben keine festen Grenzen giebt, daher ich auch die *S. angustifolia* Wulfen und *S. rosmarinifolia* L. bei Koch Syn. hierher rechnen zu müssen glaube. — *S. ambigua* Ehrh. oder *S. pilicata* Fries, mit ellipti-

schen, vorn breiteren, untermwärts runzlich-aderigen, zottig-seidenhaarigen, zuletzt kahlen Bltt. und halb-eisg. Stützbltt., welche in einzelnen Exempl. bei *Lissa* gef. wurde, und nach N. v. E. bei *Warmbrunn* vorkommt, ist ein Bastard zwischen *S. repens* und *S. aurita*.

h. Frigidae, Alpenweiden. Kätzchen seitlich, bei der Fruchtreife gestielt. Deckschuppen an der Spitze gefärbt. Staubbeutel nach dem Verstäuben gelb. Kapseln auf kurzem, die Drüse nicht überragenden Stiele. Sehr ästige Sträucher, mit kurzen höherigen Aesten.

S. Lapponum L. *S. limosa* Wahlenberg. W. et Gr. sil. Kätzchen dick, stark-zottig, zuletzt kurz-gestielt; Kapseln eilanzettlich, sitzend, dann kurzgestielt; Griffel verlängert; Narben linealisch 2spaltig; Bltt. elliptisch-eisg. oder lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig, anfangs seidenhaarig-zottig, später oberseits runzlig, untermwärts matt-filzig; Stützbltt. halbeisg. mit umgekrümmter Spitze.

α. acuminata. Bltt. elliptisch-lanzettlich oder lanzettlich-langspitzig.

β. elliptica. Bltt. länglich- oder eisg.-elliptisch, spitz.

γ. ovalifolia. Bltt. länglich-verkehrt-eisg., beiderseits grün, weichhaarig.

Auf quellsumpfigen Stellen und an Bächen auf den Kämmen und Lehnen des Hochgebirges. Hauptplatz mit allen Varietäten: am *kleinen Teiche* im Riesengeb., dann im *Riesen-* und *Elbgrunde*, auf der *Elb-* und *Pantschewiese*, *Kesselgrube*. Im Gesenke am *Allvater*, *Peterssteine*, im *Kessel*. Mai, Juni. ♀.

Der Standort, der Wuchs, die dicken starkzottigen Kätzchen und die meist stark-filzigen Bltt. machen diese Art leicht kenntlich. Seltner sind die Formen mit beiderseits weissfilzigen und die mit beiderseits fast kahlen Bltt. Deckschuppen langzottig. Die Bltt. etwas dicklich, bisweilen fast lederartig.

i. Glaciales, Gletscherweiden. Kätzchen endständig.

S. herbacea L. Kätzchen endständig, gestielt, der Stiel zweiblättrig, knospentragend; Kapseln eikegelfg., kahl, fast sitzend; Bltt. rundlich-oval, stumpf, bisweilen eingedrückt, gesägt, kahl, netzaderig, beiderseits glänzend.

In Felsritzen des Hochgebirges. Auf dem *Gesenke* am *Allvater* und *Peterssteine*. Auf der *Iscrwiese*? Mai, Juni. ♀.

Ein zweigiger Strauch, dessen rostbrauner ästiger Stock im Moose zwischen Felsen kriecht. Die beblätterten Zweige von 1 - 2'' Länge. Kätzchen arnbüthig, 2 - 3'' lang, eisg. Deckschuppen länglich-linealisch, rostbraun.

Pópulus L. *Pappel.* Deckblätter gelappt. Blumenhülle becherförmig. XXII. 7.

Hohe Bäume, deren Knospen balsamisches Harz ausschwitzen.

P. alba L. *Silberpappel.* Bltt. herzförmig-rundlich, winklig-gezähnt oder fünfplappig, untermwärts schneeweiss-filzig oder grau; Deckschuppen gespalten und gewimpert.

In Wäldern, an Flüssen und Teichen d. d. g. G. zerstreut. März, April. ♀.

Hoher Baum; die Rinde am oberen Stamme und den Aesten geglättet, weisslich. Deckschuppen rostbraun. Bltt. oberseits dunkelgrün, an jungen Trieben handförmig-

Slappig und glänzend. Der Fils der Unterseite verliert sich bisweilen so, dass nur noch graue Färbung übrig bleibt; diess ist *P. canescens* Smith, welche hin und wieder z. B. um Mahlen bei Br. vorkommt. Das Holz ist weiss, weich und zähe.

P. tremula L. *Zitterpappel*, *Espe*. Bltt. fast kreisrund, winklig-gezähnt, im Frühling seidenartig-zottig, im Herbst kahl; Deckschuppen fiederig-ingeschnitten, zottig-gewimpert.

In Wäldern, Gebüsch, an Landstrassen d. d. g. G. häufig. März April. h.

Hoher Baum mit geglätteter grauweisser Rinde, doch auch bisweilen als Strauch. Die jungen Bltt. im Frühling bald schwach bald dicht silberhaarig, selten kahl. Kätzchen lang-walzig, grau. Die Bltt. zittern bei leisem Winde. Staubbeutel roth. — Das Holz ist weich, die Rinde dient zum Gerben.

† *P. pyramidalis* Rozier. Bltt. rautenförmig, Aeste aufrecht.

An Landstrassen und Wegen seit Anfang dieses Jahrhunderts aus der Lombardei eingeführt und viel durch Anbau verbreitet, doch jetzt schon viel seltner, da man sie als wenig brauchbar durch andere Bäume zu ersetzen anfängt. April. h.

Ausgezeichnet durch den hohen kegelförmigen Wuchs, indem die aufrechten Aeste dicht am Hauptstamme anliegen. Wir sahen hier nur Pflanzen mit Staubgefässblumen. Staubbeutel roth.

P. nigra L. *Schwarzpappel*. Bltt. dreieckig-eiförmig, Aeste abstehend.

An feuchten Orten, Waldrändern, an Wegen und Landstrassen häufig angepflanzt. April. h.

Hoher Baum mit abstehenden Aesten, die jüngeren häufig scheinquirlich. Staubbeutel roth. Stempelblumen grün. Bltt. glatt und kahl, schwach-glänzend, fast lederartig von bitterharzigem Geschmack. Von dieser und der vorigen Art sind die grossen bräunlich-gelben wohlriechenden klebrigen Knospen officinell, woraus man mit Fett eine Salbe, wie auch eine Art Wachs gewinnen kann; sie enthalten ein ätherisches Oel mit Harz und Wachs.

Coniferae Jussieu.

Blumen ein- oder zweihäusig in einfachen oder zusammengesetzten Kätzchen, jedes Kätzchen nur einerlei Blumen tragend. Deckblätter dachziegelförmig gestellt, schuppen- oder schildförmig, die oberen gewöhnlich verkümmert oder fehlend. Blumenhülle ist nicht vorhanden. Staubgefässe 1-8; die Staubbeutel stehen auf dem Deckblatt oder unter dem Schilde der zu einer oben schildförmigen Säule verwachsenen Staubfäden. Stempelblumen in vielblüthigen Kätzchen, selten einzeln, mit doppelten Schuppen, wovon die äusseren mit der Blüthe abwelken, die inneren oder Fruchtschuppen dauern. Am Grunde der inneren liegen zwei, selten ein oder mehrere, Fruchtknoten

ohne deutliche Narbe, welche mit der umgebenden Hülle zu Nüsschen sich ausbilden, bedeckt von den verholzenden und einen Zapfen bildenden oder zu einem fleischigen offenen oder geschlossenen Beerenzapfen (*galbulus*) verwachsenden Fruchtschuppen. Keim in der Axe des fleischigen Eiweisses. Keimblätter zwei oder mehrere in wirtelförmiger Stellung.

Bäume oder Sträucher, deren Holz grösstentheils ohne Spiralgefässe aus lauter verlängerten sogenannten porösen Zellen besteht, und die einen eigenthümlichen harzigen Saft in besonderen Gefässen der Rinde enthalten. Blätter nadel- oder schuppenförmig, meist vielaeilig-spiralisch gestellt, seltner büschel-, quirl- oder gegenständig. Zweige meist am Stamm quirlförmig, an den Aesten zweizeilig. Die Pflanzen dieser Familie bilden in den gemässigten und kalten Zonen grosse Waldungen mit schlanken, geraden Stämmen und immergrünen Blättern, wodurch sie die Physiognomie dieser Gegenden vorzüglich charakterisiren: durch ihren Reichthum an Harz sind sie von besonderem mannigfaltigem Nutzen. — Die Theile der Stempelblumen und der Frucht werden von den Systematikern sehr verschiedenartig gedeutet. Die Samen der *Coniferae* enthalten bisweilen mehrere Keime, wie bei den Farn stets der Fall ist.

Pinus L. Kiefer, Föhre. Die Fruchtschuppen am reifen Zapfen holzig, nach oben zu schildförmig-verdickt und genabelt, zwei abwärts-gekehrte Samen tragend XXI, 9.

Bltt. stets büschelförmig, je zwei (oder mehrere) von einer kurzen Scheide umschlossen.

P. sylvestris L. Kiefer. Blätter gepaart; die Zapfen vor der Eröffnung ei-kegelförmig, zurückgekrümmt; Fruchtschuppen innen hohl länglich an der Spitze dreieckig, mit viereckigem Schilde und einem warzigen Nabel, die unteren stets anliegend; die Flügel 3 mal so lang als die Nuss.

In den sandigen und trocknen Gegenden der Ebene bis in das Vorgebirge, grössere Waldungen bildend, nur vereinzelt am Hochgebirge. In der Höhe von 2000' treten bei uns die *Fichte* und *Tanne*, und an einzelnen Punkten die beiden folgenden Arten an ihre Stelle. Mai. ½.

Baum mit geradem, schlanken, wo er frei wächst aber gewöhnlich verkrümmenden Stamme von 50—100' H. mit rostrother schuppiger Rinde. Die Kätzchen der Staubgefässbl. gelb und bei leisem Windhauche in Menge den gelben Blütenstaub austrennend, woher die Fabeln von Schwefelregen; die K. der Stempelbl. roth, an den Spitzen der jungen Triebe. Die jungen Triebe sind officinell und werden in der Bierbrauerei zur Kläre benutzt; durch Einhaue in die Rinde wird der *gemeine Terpentin*, ein dickflüssiges Weichharz von bitterlich-scharfem Geschmack und durch Destillation daraus das *Terpentinöl* gewonnen, wobei *Colophonium* zurückbleibt. Aus dem Holz wird durch trockne Destillation das *Theer*, und durch Abdampfen aus diesem das *schwarze Pech* und aus dem trocknen Terpenin durch Schmelzen und Siehen das *gelbe Pech* bereitet, und bei dem Verbrennen der Rückstände der *Kienruss* gesammelt.

P. obliqua Suter. *P. uliginosa* Neumann. *Seekiefer*. Blätter gepaart; die Zapfen vor der Eröffnung eiförmig, sählig-niedergebogen; Fruchtschuppen innen hohl, spatelfg., an der Spitze gerundet und wulstig, mit rautenförmigem Schilde und in eine herabgebogene Spitze endigenden Nabel, die unteren stets anliegend; Flügel 2mal so lang als die Nuss.

Auf waldigen Mooren des Vorgebirges um 2000-2400' hoch. Auf dem grossen See, dem Grundwasser- und Dohlen-See a. d. Heuscheuer v. Neumann, auf den Seelfeldern bei Reinerz von Schummel u. auf dem Moosebruch bei Reiwiesen im Gesenke von Weeber gef. Lomnitz bei Hirschberg nach N. v. E. Mai, Juni. h.

Baum von 30-40' H., aber an ungünstigen Stellen krüppelhaft mit schiefem und verwachsenem Stamme, auch wohl strauchartig mit langen Aesten, und dann von den Bewohnern Knieholz genannt. Rinde in der Jugend glatt aschgrau, dann rissig und schuppig-blättrig. Bltt. $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ " lang, blaugrau. Holz dicht und schwer, etwa 100 Jahrringe auf einen Durchmesser von $2\frac{1}{2}$ ". Die Zapfen sind fast doppelt so gross als an der folgenden, eben so die Schuppen; letztere auf der Innenseite scherenbraun, an der Spitze und auf der Aussenseite kastanienbraun. Das Schild ist gebrochen, indem die Hälfte auf der wulstigen Spitze, die untere auf der Aussenseite liegt und sich in diese verläuft. An den unteren Schuppen ist der wulstige Rand stärker und mehr nach aussen gewölbt.

P. Pumilio Hänke. *Zwergkiefer*, *Knieholz*. Bltt. gepaart; die Zapfen vor der Eröffnung eig.-länglich, sählig-abstehend; Fruchtschuppen innen flach, spathelförmig, an der Spitze abgestutzt-gerundet mit rautenförmigem Schilde und einem mit vortretender Falte versehenen Nabel.

Auf den hochgelegenen Mooren, sumpfigen Kämmen und Abhängen des Riesengebirges und an der Babia Gora, meist um 4000', an einzelnen Stellen auch tiefer herabsteigend. Mai, Juni. h.

Die Aeste breiten sich vom Grunde an auf der Erde aus und steigen mit ihren Enden empor. Bltt. etwa 1" lang, steif. Die Zapfen sind so lang als die Blätter. Diese Art wächst nie baumartig! Aus den jungen Trieben wird in Ungarn und der Schweiz das Krummholztöl, *Ol. templinum*, bereitet. Auf der Iserwiese geht das Knieholz nach Lutz bis 2350' herab.

Abies Tournefort. *Tanne*. Die Fruchtschuppen am reifen Zapfen holzig, nach oben verdünnt, zwei abwärts-gekehrte Samen bergend. XXI, 9.

Blätter nadelförmig, entweder von Anfang oder später schraubenständig.

A. pectinata DeCand. *Weiss-T.*, *Edel-T.* *P. Picea* L. Bltt. kammförmig, ausgerandet, unterseits mit 2 weissen Linien; Fruchtschuppen stumpf, angedrückt.

In Wäldern der Ebene und des Vorgebirges bis auf das Hochgebirge, doch weniger hoch und seltner als die folgende. Mai. h.

Hoher Baum mit pyramidaler Krone, die unteren Aeste oft niedergebogen ein Schirmdach bildend. Rinde glatt, weisslich. Zapfen aufrecht. Man gewinnt daraus den Strassburger Terpentin. Das Holz ist weiss und biegsam.

A. excelsa Lamarck. *Rothanne, Fichte. P. Abies* L. Bltt. zusammengedrückt fast vierkantig stachelspitzig, einzeln; Zapfen hängend mit ausgefressen-gezähnelten Fruchtschuppen.

In Wäldern der Ebene und des Vorgebirges bis auf das Hochgeb. bei uns bis zu 4000' H., theils allein, theils mit der vorigen und mit *Fagus*, seltner mit *Pinus sylvestris* grössere Wälder bildend. Mai. ♀.

Hoher Baum mit pyramidaler Krone; die unteren Aeste oft abwärts geneigt. Rinde glatt, grauröthlich. Liefert *Fichtenharz*; die Rinde dient zum Gerben.

A. Larix Lamarck. *Lerchentanne, Lieberbaum. P. Larix* L. Blätter büschelförmig, Zapfen eiförmig, mit stumpfen Schuppen.

Hin und wieder d. d. g. G. aber meist wohl nur angepflanzt. Wild vielleicht nur im südlichen Theile, um *Jägerndorf, Herlitz, Golschdorf, Olbersdorf u. Freudenthal* nach R. u. M. Mai. ♀.

Ansehnlicher Baum von schnellem Wachstume, die Zweige bogenförmig nach unten geneigt. Die Blätter sind einjährig zu 15-30 aus grossen, becherförmigen Scheiden, an den jungen Zweigen einzeln in spiraler Stellung, sehr schmal und blaugrün. Die Kätzchen der Staubgef. gelb, rundlich; die der Stempelbl. roth. Zapfen gelbgrau, 1" lang. Man gewinnt daraus den *venetianischen Terpentn.* In südlichen Gegenden schwitzt aus den Bltt. das *Lerchen-Manna*. Das Holz ist sehr dauerhaft und widersteht der Fäulniss.

Juniperus L. *Wachholder*. Die Fruchtschuppen am reifen Zapfen fleischig, zu einer Schein-Beere verwachsen; nur die drei oberen bergen einen aufrechten Samen. XXII, 12.

J. communis L. Aufrecht, mit abstehenden und söhligigen Aesten; Bltt. zu drei in einem Büschel, söhlig-abstehend linealisch-pfriemlich mit stechender Spitze, Beeren 2-3 mal kürzer als d. Blätter.

In Nadelwäldern und Haiden, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. April, Mai. ♀.

Strauch, erst im hohen Alter baumartig, 3-4' h. Bltt. unterseits grau. Blumen zweihäusig. Die Früchte reifen erst im 2ten Jahre, daher findet man unreife grüne und reife schwarzblau zu gleicher Zeit. Das Harz besitzt einen harzig-aromatischen Geruch und giebt Wohlgeruch beim Verbrennen. Die Beeren enthalten ein ätherisches Oel und einen harzigen Zuckerstoff, sind officinell. Der eingedickte Saft ist ein abführendes, schweisstreibendes Hausmittel.

J. nana L. Niederliegend, mit niedergebogenen Aesten, Bltt. zu drei in einem Büschel, gekrümmt, lanzettlich-linealisch mit stechender Spitze; Beeren fast so lang als die Bltt.

Auf Kämmen des Hochgebirges. *Iserwiese*, bis 2350' nach Lütz. Gesenke am *Hockschar* und *Allwater, Babia Gora*. Mai, Juni. ♀.

Wächst polsterförmig, 1 - 2' h.

Taxus L. *Eibe*. Zweihäusig. Die Fruchtschuppen an dem reifen Zapfen fleischig zu einer oben eingesenkten Schein-Beere verwachsen; nur die oberste enthält einen an der Spitze freien Samen. XXII, 12.

T. baccata L. Bltt. linealisch, spitz.

Auf trocken und sonnigen Hügeln im Vorgebirge, früher vielleicht häufiger, jetzt nur noch selten und vereinzelt. Zuverlässig wild: auf Hügeln bei *Briesnitz u. Niklasdorf* unweit Silberberg; *Spitzberg* bei *Probsthain*, im *Iwalde* d. i. Eibenwalde bei *Thommendorf* bei *Bunzlau*; auf der *Machowa Gora* bei *Ustron*. Ausserdem bei *Fürstenstein*, *Falkenberg*, *Rosenberg*, *Landshut* bei *Freiwalddau*, *Pazuch u. Zeislowitz* bei *Ustron*. April. ½.

Sehr ästiger Baum oder Strauch. Blätter immergrün, zweizeilig, dunkelgrün, linienförmig, spitz. Frucht roth. Rinde, Holz u. die grünen Zweige waren ehemals officinell, sie schmecken herb u. bitterlich; die Bltt. wirken erregend und betäubend, aber die Angaben von der grossen Giftigkeit dieses Baumes sind übertrieben. Das Holz ist rothbraun und fest.

Nymphaeaceae De Cand.

Blumenhülle vielblättrig, die Blätter spiralisch geordnet; 4-5 äussere aussen grün einen Scheinkelch darstellend, die inneren gefärbt, die innersten allmählig in Staubgef. übergehend. Staubgef. in unbestimmter Anzahl spiralisch geordnet, unter dem freien Fruchtknoten oder auf einer den Fruchtknoten überziehenden Scheibe bis an die Narben hinauf angeheftet; Staubfäden flach, Staubbeutel aufrecht, nach innen gewandt. Fruchtknoten vielfächerig, mit je vielen Eichen an wandständigen Samenhaltern. Narben sitzend, strahlenförmig, je eine über einem Fach. Frucht eine lederartige vielfächerige kapselförmige Beere. Samen mit einem schleimigen Samenbeutel. Der Keim von einem besonderen Keimsack umschlossen mit dem Würzelchen an denselben angewachsen, am Grunde des Samens in eine Höhle des mehligten Eiweisses hineinragend.

Wasserpflanzen mit starkem, söhligem Wurzelstock im Schlamme, woraus sich schwimmende, kreisförmige Blätter und einzelne Blumen auf langen Stielen über das Wasser erheben.

Nymphaea L. Seelilie, Seerose. Vier Blätter der Blumenhülle sind aussen grüngefärbt; die übrigen schraubenförmig am Fruchtknoten geordnet. Die Narbe vielstrahlig. XIII, 1.

N. alba L. Weisse S. Seekandel. Bltt. tief-herzfg.-rundlich, ganzrandig, die Lappen am Grunde schief-eifg.; die Narben mit 10-20 Strahlen.

In stehenden oder langsam fliessenden Gewässern mit schlammigem Grunde, in d. Ebene d. d. g. G. nicht selten. Um *Br.* in der *Ohlau* bei *Marienau*, der *Weide* bei *Bischwitz*, bei *Grüneiche*, *Oswitz*, *Pirscham u. Treschen* etc. *Wohlau*, *Beuthen*, *Rohrlach* bei *Bunzlau*; *Ohlau*, *Oppeln*, *Gilschwitz b. Troppau*, *Teschen*. Juli. ½.

Bltt. oberseits dunkelgrün, spiegelnd, lederartig. Die 2" breiten Blumen erheben sich in Gestalt weisser Rosen über das Wasser. Blumenhüllbltt. elliptisch-lanzettlich, weiss. Narben gelb. Früchte birnförmig. Eine andere Art mit blauen Blumen in Ungarn. Nahe verwandt hiermit ist die *ägyptische Lotusblume*.

Nuphar Smith. Mummel. Fünf Blätter der Blumenhülle sind aussen grüngefärbt; die übrigen mit einer Honigrube versehen, am Grunde des Fruchtknotens eingefügt. Narbe ausgeschweift oder sternförmig. XIII, 1.

N. luteum Smith. Gelbe S. Nixblumen. Narbe 10-20 strahlig, schwach-ausgeschweift; Staubbeutel lineal-länglich; Bltt. oval, am Gr. herzfg. mit genäherten Lappen.

Wie die vorige d. d. g. G. in der Ebene, aber ungleich häufiger und zahlreicher. Juli. 2.

Bltt. der vorigen, mehr in die Länge gezogen. Blumen 1" breit, gelb; die inneren Bltt. länglich-spathelfg., von eigenthümlichem, starkem Geruch. Frucht birnenkegelfg. Beide Arten haben einen dicken, söhlichen, mehlig-fleischigen Wurzelstock. Man findet auch eine Form mit zur Hälfte kleineren Blumen und Bltt.

N. pumilum Smith. Narbe 10 strahlig, sternförmig spitzgezähnt; Staubbeutel fast viereckig; Bltt. eierzfg. mit auseinanderstehenden Lappen, unterseits feinhaarig.

In Teichen. Bei *Pless* von *Zellner* entdeckt und mitgetheilt. Juni, Juli. 2.

Der vorigen ganz ähnlich, aber durchaus kleiner. Bltt. 2-3" lang. Die Bltt. der Blumenhülle grünlich-gelb. Die ersten Wurzelbltt. dieser Arten unter Wasser sind sehr fein dünnhäutig.

Ceratophylleae Gray.

Blumen einhäusig, winkelständig. Blumenhülle tief vieltheilig, die Zipfel vorn abgestutzt mit 2-3 stechenden Spitzen. Viele fast sitzende Staubbeutel, oben mit einer in zwei Spitzen verlaufenden Ausrandung und zwei oben in einer gemeinschaftlichen Oeffnung vereinigten Fächern. Ein einfacher Fruchtknoten mit einem hängenden Ei und fadenförmigem Griffel. Frucht eine vom Griffel gekrönte am Gr. mit zwei Stachelfortsätzen versehene Nuss. Same hängend, ohne Eiweiss, mit geradem Keim; im Federchen zwei nahe an einander stehende Blattpaare entwickelt, daher scheinbar 4 wirtelständige Keimblätter.

Untergetauchte Wasserpflanze mit wirtelständigen, in lineale Zipfel gabelig-gescheitlen Blättern.

Ceratophyllum L. Igellock, Zinken, Hornblatt. XXI, 8.

C. demersum L. Bltt. 2-4 mal gabelig in linealisch-fädliche Zipfel getheilt; Nüsse ungeflügelt, mit 2 zurückgebogenen Dornen am Grunde und einem an der Spitze.

In stehenden und langsam fließenden Gewässern in der Ebene gemein, hie und da auch im Vorgeb. Juli, Aug. 2.

Stängel fädig, ästig, dicht beblättert; die Blattquirle oben genähert und mit den Spitzen zusammengeneigt, so dass die Enden die Form eines Thierschweifes haben. Bltt. hornartig, am Rücken gezähnt.

VI. MONOCOTYLEDONEAE.

Ein einzelnes das Federchen umfassendes Keimblatt.

Wurzel meist zwiebförmig oder ein söhligter Wurzelstock, bisweilen knollen- oder büschel-, sehr selten rübenförmig. Stängel entweder stielrund oder dreikantig. Blätter mit vorherrschend ausgebildeten Blattscheiden, in denen theils der Blattstiel theils die Blattplatte ganz oder theilweise verschlungen wird. Die Blattplatte gewöhnlich schmal und lang, mit geraden Ribben, selten mit Adernetz durchzogen. Blätter stets wechselständig, in einfacher Schraubenlinie, mit drei selten mit 2, 6 oder mehreren Zeilen aufsteigend, selten in mehrfachen, bisweilen nach oben quirlständig. Blumenthelle stets zu 3, 6 oder 9. Die beiden Blumenhüllen sind am Grunde mehr oder weniger in eine einzige bald seichter bald tiefer getheilte Blumenhülle verschmolzen, bisweilen jedoch von einander durch Färbung und Knospelage verschieden, wodurch der Unterschied von Kelch und Krone angedeutet wird. — Der Stängel hat keinen Rindenkörper; die Gefässbündel sind in den holzigen Stämmen durch den ganzen Stamm zerstreut und durchkreuzen einander.

Lemneae Link.

Blumenhülle: eine napfförmige ungetheilte oder zweilappige Haut. Zwei Staubgefäße, wovon der eine kürzer ist und sich später entwickelt. Ein freier Fruchtknoten mit 2-4 aufrechten Eichen am Grunde, kurzem Griffel mit eingesenkter Narbe. Frucht ein dünnhäutiges Nüsschen mit 1-4 eiweisslosen Samen mit geradem Keim.

Schwimmende Wasserpflanzen ohne Blätter; der Stängel besteht aus gegliederten, blattähnlichen Platten, aus deren Rande die Blumen einzeln hervorbrechen.

Lemna L. Wasserlinse. XXI, 2; bei späteren II, 1.

L. trisulca L. Stängelglieder lanzettlich, zuletzt gestielt, kreuzförmig-sprossend; Wurzeln einzeln.

In Gräben, Teichen und an stillstehenden Gewässern, unter Wasser. Häufig. ☉.

Die Arten dieser sonderbaren Pflanzensippe kommen mit 1- und mehrsamiger Frucht und mit querliegenden und aufrechten Samen vor. Sie blühen sehr selten. Das Laub derselben ist eine Art Blattlager, das zwischen Blatt und Stängel die Mitte hält. Gewöhnlich bedecken sie die Oberfläche des Wassers in grosser Anzahl als ein grüner Ueberzug.

L. polyrrhiza L. Stängelglieder fast kreisrund; Wurzeln büschelig-gehäuft.

Auf der Oberfläche des Wassers schwimmend, wie die folgenden, seltner und mehr vereinzelt als diese.

L. minor L. Entengrün. Stängelglieder verkehrt-eifg., beiderseits flach; Wurzeln einzeln.

L. gibba L. Stängelglieder verkehrt-eifg., unterseits erhaben; Wurzeln einzeln.

Najadeae Link.

Blumen ein- oder zweihäusig, in den Blattwinkeln. Staubgefässblumen mit einem Staubgef. und schuppenförmiger oder scheidenförmiger Blumenhülle. Stempelblume ohne Blumenhülle: ein einfächeriger Fruchtknoten mit einem aufrechten Ei und 2-3 fädlichen Narben. Frucht ein einsamiges Nüsschen. Same aufrecht ohne Eiweiss mit geradem beiderseits abgerundetem Keim und grossem Würzelchen.

Wasserpflanzen mit gegliedertem Stängel und schmalen, am Rande gezähnten, am Gr. in eine kurze Scheide übergehenden Blättern.

Caulinia Willdenow. Blumen einhäusig. Staubgefässblumen von einer unten abreissenden Blumenhülle umgeben, mit einem aus kurzem Staubfaden sich allmählig verdickendem einfächerigem an der Spitze sich öffnendem Staubbeutel.

C. fragilis Willdenow. Günther G. et W. Enum. stirp. sil. *Najas minor* Allione. Bltt. schmal-linealisch, schweifig-gezähnt, zurückgekrümmt, mit stachelspitzigen Zähnen; Scheiden wimperig-gezähnt.

In perennirenden kleinen Teichen der Ebene hie und da. Um *Br.* hinter dem *Lehmdamme* und vor *Grüneiche*; wahrscheinlich noch häufiger, aber bisher übersehen. Aug., Sept. ☉.

Unter Wasser. Hat einige Ähnlichkeit mit *Ceratophyllum*, wovon es sich leicht durch die zurückgekrümmten Bltt. unterscheiden lässt. Wurde bei uns nur ein

einzigsmal mit Früchten gefunden. Häufig wie die *Charae* mit einer Kalkkruste überzogen.

Potamogetoneae Jussieu.

Blumenhülle unterständig, viertheilig oder deckblattartig. Staubgef. 1, 2, 4. Vier freie Fruchtknoten, mit je einem hängenden Ei; Narbe schildförmig mit oder ohne Griffel. Frucht ein trocknes oder lederartiges Nüsschen mit einem hängenden eiweisslosen Samen mit gekrümmtem oder eingerolltem Keim und verdickten Würzelchen.

Süßwasserpflanzen mit gegliedertem Stängel, unter dem Wasser vegetirend, bisweilen die oberen Blätter schwimmend, die Blüten über das Wasser hervortreibend. Bltt. mit oder ohne Stiel oder Scheide, mit tutenförmigen, stengelumfassenden Stützblättern, wechselständig, nur die oberen gegenständig. Blumen in den Blattwinkeln sitzend oder auf Stielen ährenförmig.

Potamogeton L. Samkraut. Zwitterblumen in Ähren. Blumenhülle: vier ungefärbte Schuppenblätter mit klappiger Knospenlage. Vier Staubgef. hinter d. Blumenhüllblättern, mit schuppenförmigen Staubfäden. Keim hakenförmig. IV, 4.

Die Arten dieser Sippe bilden einen Haupttheil der Vegetation in unseren Gewässern, besonders der Ebene, sind wie alle Wassergewächse sehr vielgestaltig, haben einen schlammigen, unangenehmen Geruch und werden als Ackerdünger benutzt.

P. natans L. Sämmtliche Bltt. lang-gestielt, die unter Wasser befindlichen lanzettlich oder länglich, die schwimmenden lederartig, rundlich- oder länglich-elliptisch; die Blumenstiele gleich-dick; die Nüsse zusammengedrückt, am Rücken stumpf, der Stängel einfach.

In stehenden und fließenden Wässern der Ebene und d. Vorgebirges, vielleicht bis auf das Hochgebirge, häufig d. d. g. G. Juli, Aug. 2.

Von allen übrigen durch die schwimmenden, lederartigen, glänzenden oberen Bltt. zu unterscheiden, welche in der Größe und Breite abändern, unb am Gr. bald schwach-herzförmig, bald gerundet oder schief zulaufend vorkommen. Die unteren sind gewöhnlich bis auf den Blattstiel durch Fäulnis zerstört. Blumenähre dicht, solllang.

P. rufescens Schrader. Die unter Wasser befindlichen Bltt. sitzend, häutig, durchscheinend, länglich-lanzettlich, beiderseits ein wenig verengert, stumpflich; die schwimmenden lederartig, lanzettlich-spathelförmig, in einen kurzen Stiel verschmälert; die Blütenstiele gleich-dick; die Nüsse linsenförmig-zusammengedrückt mit scharfem Rücken; d. Stängel einfach.

Bisher nur in fließendem Wasser an zwei Stellen der Ebene: um *Br.* bei *Bischwitz an der Weide* und in der *Brande* bei *Militsch*.

In *Warmbrunn* neben der Gallerie nach *Elsner*. *Kreuzburg* an mehreren Orten nach *Beilschmied*. Juli, Aug. 2.

Wird getrocknet durchaus röthlich, welche Farbe zum Theil auch schon an der frischen Pflanze wahrgenommen wird. Dieser Art nicht unähnlich ist *P. spathulatus* Schrader, welche Art vielleicht bei uns noch aufgefunden werden wird.

P. gramineus L. *P. heterophyllus* Schreber. Die unter Wasser befindlichen Bltt. häutig durchscheinend, breit- oder schmal-lanzettlich, nach dem Gr. enger, sitzend, am Rande scharf, die oberen kürzer und breiter, gestielt; die schwimmenden lanzettlich- oder eig.-elliptisch, lang-gestielt, lederartig; die Blütenstiele nach oben verdickt; die Nüsse zusammengedrückt, mit stumpfem Rücken; Stängel ästig.

β. latifolius. Stängel kurz, vielästig-ausgebildet; sämtliche Bltt. häutig, oval oder breit lanzettlich, oft wellig, mit einer Stachelspitze.

In Teichen und langsam fließenden Wässern der Ebene zerstreut. In Teichen um *Militsch* bei *Swibedove* (*β*) und *Grabowitz*. Im *Kalichteiche* bei *Oppeln* v. *Grabowski* gef. Juli, Aug. 2.

An der gewöhnlichen Form ist der Stängel mässig-lang, die unteren Bltt. kurz-lanzettlich, gekrümmt, die obersten elliptisch lederartig: der wahre *P. heterophyllus* Schreber. Die letzteren fehlen bisweilen und dann pflegt der Stängel lang-gestreckt und die unteren Bltt. schmal-lanzettlich oder linealisch zu sein: der *P. gramineus* Linn. Eine mehr abweichende Form ist *β*, welche leicht mit der folgenden Art verwechselt werden kann.

P. lucens L. Sämmtl. Bltt. unter Wasser, häutig, durchscheinend, gestielt, oval oder lanzettlich, stachelspitzig, am Rande feingesägt; die Blütenstiele nach oben verdickt; die Nüsse zusammengedrückt mit stumpfem, verloren gekieltem Rücken; d. Stängel ästig.

In stehenden und fließenden Wässern der Ebene häufig. Um *Br.* bei *Marienau*, *Scheitnich* etc. Juli, Aug. 2.

Sattgrün. Bltt. gross, meist oval. Die Blattfläche schwindet bisweilen, wenn der Wasserspiegel fällt, theilweise oder ganz, so dass nur die stachelförmige Mittelrippe übrig bleibt.

P. perfoliatus L. Sämmtliche Bltt. unter Wasser, häutig, durchscheinend, eig., oder ei-lanzettlich, am Gr. herzförmig und halbumbfassend.

Wie die vorige, in der Ebene zerstreut, in manchen Gegenden sehr häufig. Um *Br.* gemein. *Rosenthal* und *Tarnau* bei *Beuthen*. *Ohtau*. *Oppeln*. *Teschen*. Juli, Aug. 2.

Stängel etwas ästig. Die Bltt. ändern ab von der rundlichen bis zur schmal-länglichen Form. Schmutziggün.

P. crispus L. Sämmtliche Bltt. unter Wasser, häutig, durchscheinend, sitzend, lineal-länglich, stumpflich mit kurzer Spitze, am Rande gesägt und welligkraus; Nüsse geschnäbelt.

In stehenden und fließenden Wässern d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juli, Aug. 2.

Stängel ästig, zusammengedrückt. Bltt. sattgrün mit röthlichen Nerven; am Rande bald mehr, bald minder wellenförmig.

P. compressus L. Sämmtliche Bltt. unter Wasser, häutig, durchscheinend, sitzend, linealisch, stumpflich oder spitzlich in eine feine Spitze ausgehend, vielnervig, mit 3 — 5 stärkeren Nerven; Blüthenähren dicht; Stängel flügelig-zusammengedrückt, vielästig.

α. zosterifolius. Aehren vielblumig, Bltt. meist stumpflich dann zugespitzt. *P. zosterifolius* Schumacher W. et Gr. sil. *P. compressus* Wimm. Fl. v. Schles. Koch Syn.

β. acutifolius. Aehren armlumig, Bltt. meist langspitzig. *P. acutifolius* Link W. et Gr. sil. Wimm. Fl. v. Schles. Koch Syn.

In Bächen, Gräben, Flüssen, Teichen und Lachen d. d. g. G. in der Ebene häufig. Um *Br.* hinter *Scheitnich*, bei *Marienau*, *Treschen* etc. Um *Trebnitz*, *Militsch*, *Trachenberg*, *Wohlau*, *Bunzlau*, *Ohlau*, *Oppeln*, *Jägerndorf*, *Troppau*, *Rothwasser* etc. Juli, Aug. 2.

Ausgezeichnet durch die grasartigen, braun- oder hellgrünen, vollkommen linealischen Bltt. mit zahlreichen Nerven. Der Stängel platt-zusammengedrückt, gabelig-vielästig, mit kürzeren oder längeren Gliedern. Die beiden Formen *α* u. *β* lassen sich nicht als Arten unterscheiden; die Zuspitzung der Bltt. wenigstens ist durchaus nicht beständig.

P. obtusifolius Mertens u. Koch. Sämmtliche Bltt. unter Wasser, häutig, durchscheinend, sitzend, linealisch, stumpf, mit kurzer, feiner Spitze, 3 — 5 nervig, Blüthenstiele so lang als die dichte Aehre; Stängel zusammengedrückt mit rundlichen Kanten, vielästig.

In Teichen und Gräben. Um *Br.* bei *Marienau*. Im Dorfteiche zu *Kotzerke* bei *Trebnitz*. *Garsuche* bei *Ohlau*. Im *Stadtteiche* und um *Wilhelmsthal* bei *Wohlau*. Bei *Pless*, *Straupitz* und *N. Berbisdorf* bei *Hirschberg* nach N. v. E. Juli, Aug. 2.

Der vorigen ähnlich, aber etwas kleiner, mit schmäleren Bltt., welche einen starken, am Grunde röthlichen Mittel- und zwei schwächere, mit jener hier und da durch schiefe Queradern verbundene Seitennerven haben. Schön hlgrün.

P. pusillus L. Sämmtliche Bltt. unter Wasser, häutig, durchscheinend, linealisch oder linealisch-borstlich, spitz, 1 — 3 nervig; Blüthenstiele 2 — 3 mal so lang als die meist unterbrochene Aehre; Stängel rundlich-zusammengedrückt.

In Lachen, Gräben und Bächen, d. d. g. G. nicht selten. Um *Br.* bei *Marienau*, *Scheitnich*, *Treschen* etc. Juli, Aug. 2.

Bltt. von $1\frac{1}{2}$ — 1" breit, lang und grasartig, mit einem dickeren Mittel- und zwei feinen Seitennerven, oder mit einem einzigen Mittelnerven und dann linealisch-borstlich. Von dieser Art wird noch *P. trichoides* Chamisso u. Schlechtendal unterschieden durch einnervige Bltt. und halbkreisförmige Früchte, während dem eigentlichen *P. pusillus* 3 — 5 nervige Bltt. und schief-elliptische Früchte zugeschrieben werden. Sollten jedoch keine andere Unterschiede gefunden werden, so scheint diese Trennung misslich; ich sah wenigstens an ein und demselben Exemplar Blätter ohne und andere mit zwei sehr feinen Seitennerven.

P. pectinatus L. *P. marinus* W. et Gr. sil. Sämmtliche Bltt. unter Wasser, häutig, durchscheinend, am Grunde scheidenförmig,

linealisch-borstlich; Früchte am Rücken im trockenen Zustande gekielt.

In Weihern und Flüssen, d. d. g. G. zerstreut. Um *Br.* in der *Ohlau* am Ziegelthor, hinter *Scheitnich*, hinter dem *Lehmdamme*, in der Lohe bei *Masselwitz*, im Park bei *Köberwitz*. *Wohlau*. *Kalchiteich* bei *Oppeln*. *Gr. Hennersdorf* bei *Görlitz*. Juli, Aug. 2.

Bald länger-gestreckt, bald in die Breite vielästig. Die Bltt. variiren ein wenig in der Breite. Die trocknen Früchte besonders am Rücken runzlig.

Anmkg. Nach *Babenhorst* kommt *Pot. praelongus* Wulfen in der *Neisse* bei *Görlitz* vor. Ich sah noch keine Exemplare daher.

Zannichellia L. Blumen einhäusig, winkelständig. Staubgefässblume neben der Stempelblume, mit einem Staubgefäss ohne Blumenhülle. Stempelblume mit einer deckblattartigen Blumenhülle. Narbe schief auf bleibendem Griffel. Keim spiralig-eingerollt. XXI, 1.

Z. palustris L.

In stehenden Wässern, in manchen Jahren hie und da häufig, in anderen wieder sparsam erscheinend. Um *Br.* bei *Kl. Kletschkau*, in *Hundsfeld*. *Bunzlau* in den *Boberlachen* am Wehre. *Leobschütz* nach *Schramm*. Um *Troppau* bei *Zossen* und *Palhanetz* nach *R. u. M.* Um *Hirschberg* bei *Herischdorf* und am *Hainwasser* nach *N. v. E.* Juni—Aug. 2.

Stängel gabelig-vielästig, haardünn, gegliedert mit je drei schmal-linealischen oder haardünnen Bltt. 4-6 gestielte Nüsschen in einem kurz-gestielten Schirm, mit gezähntem Kiel; Griffel von der halben Länge derselben.

Hydrocharideae DeCandolle.

Blumenhülle tief 6- oder 5theilig; die drei äusseren Zipfel grün, die drei inneren gefärbt mit zusammengebrochener Knospenlage. Drei Staubgef. zwischen den inneren Zipfeln, oder mehrere. Fruchtknoten am Grunde mit der Blumenhülle verwachsen, 1- oder 6fächerig, mit vielen Eichen an wandständigen Samenhältern. Drei oder sechs gespaltene Narben, sitzend oder auf dicken Griffeln. Beerenfrucht mit vielen eiweisslosen Samen mit geradem Keim und verdicktem Würzelchen.

Sumpf-Wasserpflanzen, oft mit zweihäusigen Blumen, so dass in den Staubgefässblumen verkümmerte Stempel und in den Stempelblumen Staubfäden ohne Staubbeutel vorhanden sind.

Stratiotes L. Krebssee. Blumen zweihäusig. Staubgefässblumen in einem Schirm mit einem scheidenförmigen Deckblatt am Grunde jedes Blumenstieles. Staubgef. über 20, die

äusseren ohne Staubbeutel. Stempelblume einzeln mit vielen Staubfäden ohne Staubbeutel. Beere 6 fächerig, 6 kantig. XIII, 6.

S. aloides L. *Wassersäge*. Bltt. dreieckig-schwerdtförmig, stachelig-gewimpert.

In stehenden Wässern, schilfigen Weihern und Flüssen hie und da in der Ebene. Um *Br.* häufig bei *Scheitnich, Marienau, Ransern, Oswitz* etc. *Fasanerie* und um *Tarnau bei Beuthen a. O. Wohlau. Ohlau. Oppeln. Teschen.* Juli, Aug. 2.

Die Bltt. rosettenfg., aufrecht-abstehend, aus deren Mitte ein blattloser Schaft mit scheidenförmigen Deckbltt. Die drei inneren Zipfel der Blumenhülle viel grösser als die äusseren, sehr zart, weiss.

Hydrócharis L. *Froschbiss*. Blumen zweihäusig. Staubgefässbl. meist zu 3 mit zwei gemeinschaftlichen Deckbltt.; neun Staubgef., die drei äusseren gewöhnlich ohne Staubbeutel. Stempelblumen einzeln mit einem Deckblatt, mit 2 Staubfäden ohne Staubbeutel. Beere 6 fächerig, eiförmig. XXI, 8.

H. Morsus Ranae L.

In stehenden Wässern, Gräben, an Rändern stagnirender Flüsse, d. d. g. G. nicht selten; scheint um *Troppau* zu fehlen. Juli, Aug. ☉.

Bltt. kreisrund-nierenfg., gestielt, schwimmend, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits meist röthlich. Schaft blattlos, 1-2" lang. Die drei inneren Zipfel der Blumenhülle grösser als die äusseren, sehr zart, weiss.

Alismaceae Jussieu.

Blumenhülle tief 6 theilig; die äusseren Zipfel grün, die 3 inneren gefärbt. Staubgefässe 6 oder mehrmal 6. Drei, 6 oder mehrere Fruchtknoten über der Blumenhülle, frei oder durch einen gemeinschaftlichen Fruchträger verbunden, jeder mit einem Griffel gekrönt, mit 1 oder 2 Eichen, das zweite hängend. Trockne nicht aufspringende Früchtchen. Samen mit lederartiger Schale ohne Eiweiss mit gekrümmtem Keim.

Sumpfgewächse mit söhlicher Wurzel und blattlosem Schaft, scheidenförmigen Bltt. an der Wurzel, quirlständigen Blumen.

Alisma L. *Froschlöffel*. Zwitterblumen in einer aus Quirlen zusammengesetzten Rispe. Die 3 inneren Zipfel der Blumenhülle mit eingerollter Knospenlage. Sechs oder mehrere, scheibenförmig - zusammengestellte, einsamige Nüsschen. VI, 5.

A. Plantago L. Stängel blattlos, Blumen rispig; Nüsse stumpflich am Rücken gefurcht, eine dreikantige Frucht bildend; Bltt. herzfg., eifg. oder lanzettlich.

β. lanceolatum. Bltt. lanzettlich, am Gr. verschmälert.

γ. graminifolium. Bltt. linealisch, ein und das andere nach oben in eine schmale Platte verbreitert.

In bewässerten und vom Wasser verlassenen Gräben, Lachen, Teichen und an deren Rändern zwischen Schilf, auf sumpfigen Wiesen, d. d. g. G. häufig. *γ* bisher nur am *Kalichteiche* bei Oppeln von Grabowski gef. Juli, Aug. 2.

Wurzelbltt. rosettenförmig. Stängel aufrecht, $\frac{1}{2}$ — 4' h., mit pyramidalem Blüthenstand, am Gr. zwiebelig-aufgetrieben. Die 3 inneren Blumenhüllzipfel rundlich, weiss, fleisch- oder rosaf. Die frische Wurzel und das Kraut sind scharf; letzteres kann gefährlich werden.

Anmkg. *Alisma natans* wächst nach Elsner in N. v. E. Verzeichniss „*fm Isergebirge* um die *Tafelfichte* nach Reichenberg zu“; siehe auch Babenhorst Fl. Lusat.

Sagittaria L. *Pfeilkraut.* Einhäusige Blumen in Winkeln, die oberen Staubgef. die unteren Stempel tragend. Die 3 inneren Zipfel der Blumenhülle mit dachziegelförmiger Knospenlage. Zahlreiche Nüsschen, schraubenförmig auf einem kugeligen Fruchtboden. XXI, 8.

S. sagittifolia L. Blätter tief pfeilförmig.

In Teichen, Lachen und stagnirenden Flüssen, d. d. g. G. in der Ebene häufig. Juni—Aug. 2.

Bltt. auf langen 3kantigen Stielen, breiter oder schmaler, länger- oder kürzer gesplizt. Stängel blattlos, oben mit 3-4 entfernten Quirlen von je 3 Blumen. Aeusseres Bltt. der Blumenhülle oval, hohl, grün; die inneren rundlich, weiss, mit kurzem, rötlichem Nagel.

Butomeae Richard.

Blumenhülle tief 6theilig; bald nur die drei inneren, bald alle Zipfel gefärbt, dauernd. Drei, 6 oder mehrere Fruchtknoten über der Blumenhülle, frei oder am Grunde verbunden, jeder mit einem Griffel gekrönt, mit vielen Eichen. Die Frucht besteht aus mehreren verbundenen Schlauchfrüchten, welche zahlreiche Samen an einem netzförmigen die ganze innere Wand überziehenden Samenhalter enthalten. Samen ohne Eiweiss mit geradem oder gekrümmtem Keim.

Blumen schirmförmig.

Bütomus L. *Schaafheu.* Neun Staubgef., je zwei zwischen und je einer hinter den inneren Zipfeln der Blumenhülle. Sechs am Gr. verbundene nach innen aufspringende Schlauchkapseln. IX, 4.

B. umbellatus L.

In Gräben, Weihern und Teichen, an Flussrändern, in der Ebene d. d. g. G. nicht selten. Juni—Aug. 2.

H. $1\frac{1}{2}$ - 2'. Wurzelstock stark, schief-söhlig. Bltt. zahlreich linealisch-rinnenfg., Stängel blattlos. Blumen gestielt bis 20 und mehr in einem Schirm. Blumenhülle weisslich und rosafarben. Soll als Futter den Kühen schaden.

Iuncagineae Richard.

Blumenhülle tief 6 theilig, schwach gefärbt. Sechs Staubgef., mit nach aussen gewandten Staubbeuteln. Drei bis sechs Fruchtknoten, über der Blumenhülle, jeder mit einem Griffel gekrönt, am Grunde verbunden, oder in einen einzigen 3-6 fächerigen Fruchtknoten vereinigt, mit 1 oder 6 aufrechten Eichen. Drei bis 6 trockne Schlauchfrüchte, nur am Grunde verbunden, oder an eine centrale Axe geheftet, am Grunde sich ablösend. Samen ohne Eiweiss mit geradem Keim.

Moorpflanzen mit oben blattlosem Schaft, schmalen und langen, zur Hälfte scheidenförmigen Bltt. und ährigem Blütenstand.

Triglóchin L. Dreizack. Staubfäden sehr kurz. Drei oder 6 Fruchtknoten mit je einem Ei. Griffel fehlt. Drei oder sechs Schlauchkapseln an einer centralen Axe, innen in einer Längsnath sich öffnend. VI, 3.

T. palustre L. Früchte linealisch, aus drei Kapseln bestehend.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen, Torfw., d. d. g. G. in der Ebene nicht selten. Um *Br.* bei *Carlowitz*, *Bischwitz a. W.*, *Wildschütz*, *Lissa* etc. Juni, Juli. 2.

Stängel am Gr. zwieblig-aufgetrieben, 1' h., dünn. Bltt. schmal-linealisch. Blumen klein, grünlich, mit fiederigen Narben. Früchte an die Spindel angedrückt.

T. maritimum L. Früchte eifg., aus sechs Kapseln bestehend.

Auf sumpfigen salzhaltigen Wiesen, in der Ebene selten. Um *Br.* auf Wiesen *an der Strasse nach Lissa*. Um *Prausnitz*. *Wohlau*. *Guhrau*, wo sie zuerst von *Starke* gef. wurde. Krock sil. 576.

Höher und dicker als die vorige, bis $1\frac{1}{2}$ ' h. Bltt. linealisch. Narben fiederig, zurückgekrümmt. Früchte abstehend.

Scheuchzeria L. Scheuchzerie. Staubfäden dünn. Drei Fruchtknoten mit je zwei Eichen. Griffel fehlt. Drei am Gr. verbundene, zweiklappige Schlauchkapseln. VI, 3.

S. palustris L.

In torfigen Sümpfen des Vorgebirges und der Ebene. Auf den *Seefeldern* an der h. Mense, zuerst von *Seliger* und *Schummel*.

gef. Im *grossen See an der Heuscheuer* von Neumann, und bei *Königshuld* von Grabowski gef. Nach Krocke auch bei *Falkenberg* von Löwe gef. Nach Schn. bei *Hosenitz, Tiefenfurth* und *Greulich*. Juni, Juli. 2.

Wurzelstock schief, gegliedert. Stängel aufrecht, 4 - 8' h., mit scheidigen, linealisch-rinnenförmig. Bltt. Blumen in einer Aehre, 2 - 6, gestänlich.

Typhaceae Jussieu.

Blumen einhäusig, in dichten Aehren oder Köpfen, die unteren Stempel, die oberen Staubgef. tragend. Blumenhülle besteht aus drei oder mehreren Schuppen oder Borsten. Fruchtknoten einfächerig mit einem hängenden Ei, einfachem Griffel und zungenförmiger Narbe. Die Fruchthülle aus doppelten Lagen; eine äussere schwammige oder häutige und eine innere harte mit der Samenschale verwachsene. Keim in der Axe des mehligen-fleischigen Eiweisses.

Sumpfgewächse mit sühligem Wurzelstock, schmalen parallelgestreiften, unten scheidigen Bltt. Blüthensand kolbenförmig.

Typha L. *Kolbenrohr*. Blumen in einhäusigen übereinanderstehenden walzigen Aehren an gemeinsamer Spindel, mit hinfälligen Deckblättern. Staubgeföhl.: je ein Staubfaden mit mehreren Staubbeuteln und einer Blumenhülle aus drei Haaren. Stempelblumen: Hülle aus mehreren an der Spitze verdickten Haaren; d. Fruchtknoten gestielt. XXI, 3.

T. latifolia L. Bltt. flach; die beiderlei Aehren genähert.

An den Rändern von Weltern, Teichen und Flüssen in der Ebene d. d. g. G. verbreitet, meist gedrängt und ganze Strecken erfüllend, doch nicht überall. Um *Br.* am *Lehmdamme*, um *Friedewalde, Kleinburg, Bischwitz a. W. Belkau. Beuthen a. O. Wohlau* im Stadtteiche. *Bunzlau. Hirschberg. Oppeln. Troppau* häufig. Juni, Juli. 2.

H. 3 - 5'. Die schilfartigen aufrechten Bltt. umschliessen den runden Schaft. Aehren in Gestalt walziger Kolben, die unteren stempeltragenden zuletzt kastanienbraun; vor dem Blühen in scheidige Deckbltt. eingehüllt. Die Bltt. dienen zu Matten und zum Dachdecken.

T. angustifolia L. Bltt. unten rinnenförmig; die beiderlei Aehren von einander entfernt.

Wie die vorige und an manchen Orten häufiger, an anderen seltener als jene. Juli. 2.

H. der vorigen. Bltt. halb so breit, dunkler grün.

Sparganium L. *Igelkolben*. Blumen in einhäusigen kugeligen Köpfen. Die staubgefösstragenden Köpfe oben;

einfache Staubgefäße mit spreuförmigen Schuppeblättchen als Blumenhülle. Fruchtknoten sitzend mit drei Schuppen umgeben. XXI, 3.

S. ramosum Hudson. *S. erectum* α Linn. Die Blüthenspindel aestig; Bltt. am Gr. dreischneidig, mit hohlen Seitenflächen; die Narben linealisch.

Im Wasser zwischen Schilf an den Rändern von Teichen und stagnirenden Flüssen d. d. g. G. nicht selten. Um Br. bei *Friedewalde*, *Oswitz*, *Ransern*, *Margarethenmühle* etc. Juni, Juli. 2.

Stängel stark, 1 - 3' h., oben ästig. Bltt. schwerdtförmig-linealisch. Die Köpfe der Staubgefäßblumen viel kleiner. Staubbeutel keulenförmig. Schuppenbltt. bräunlich.

S. simplex Hudson. *S. erectum* β L. Die Blüthenspindel ungetheilt; die Bltt. am Gr. dreischneidig, mit ebenen Seitenflächen; die Narben linealisch.

Im Wasser in Gräben, an Teich- und Flussufern, d. d. g. G. häufig. Juni, Juli. 2.

Stängel 1 - 1½' h., einfach. Die Köpfe der Staubgefäßblumen sind wenig kleiner als die der Stempelblumen.

S. natans L. Die Blüthenspindel einfach; die Bltt. eben, niederliegend; die Narben länglich.

In Gräben und Teichen, meist fluthend. Um Br. bei *Gniechwitz* und *Koberwitz*. *Tiefenfurth* bei Bunzlau und bei *Wohlau* n. Schn. *Kreba* b. Görlitz. Juni, Juli. 2.

Zarter als die vorigen, mit linealischen, langen, aber schwachen, meist fluthenden Bltt. Oft bis 2' lang. Gewöhnlich nur ein Köpfchen mit Staubgefäßblumen.

Aroideae Jussieu.

Blumen einhäusig oder zwittrig auf einem walzigen fleischigen Blumenboden, Kolben s. spadix, söhlig und dicht gedrängt, ohne oder mit einer aus Schuppenblättchen bestehenden Blumenhülle. Staubgefäße hinter den Schuppenblättchen, wenn diese vorhanden sind. Fruchtknoten frei 1-3fächerig, mit vielen Eichen. Frucht beerenförmig. Samen kugelig oder kantig mit vielem mehligem oder mit wenigem Eiweiß, in dessen Axe der gerade stielrunde Keim mit gespaltenem Keimblatt; in der Spalte das Federchen.

Staudenartige Sumpfpflanzen mit dicker, söhlig-knolliger, mehrreicher Wurzel, scheidenförmigen Bltt., blatlosem Schaft mit einer von einem grossen Deckblatt gestützten Kolbe. Die Wurzeln enthalten häufig ein scharfes, aber flüchtiges Gift, das durch Kochen entfernt wird, daher sie von vielen ausländischen Arten gegessen werden.

Arum L. *Arum*. Blütenkolben an der Spitze nackt, von einem tutenförmigen Scheidendeckblatt umgeben. Blumenhülle fehlt. Beere einsamig. xx, 7.

A. maculatum L. Bltt. spieß-pfeilförmig; Blütenkolben gerade, kürzer als das Deckblatt, keulenförmig, die Keule 3mal kürzer als der Stiel.

In Laubwäldern unter Eichen. Bisher nur um *Teschen* bei *Mönchhof*, *Guldau* und *Babek* von Kotschy gef. und mitgetheilt. Nach Sch n. auch am *Schönbrunner Berge* in der Lausitz. Mai. 2.

Wurzelstock eine eiförmige Knolle. Wurzelbltt. 2 - 3 gestielt, bald mit, bald ohne schwarze Flecken. Deckblatt innen weisslich. Blütenkolben oben röthlich. Zwischen den Staubgef. und Stempeln stehen 2 - 3 Reihen gestielter Drüsen mit fädlicher Spitze. Scharlachrothe Beeren mit 1 - 3 Samen. Die Wurzel ist scharf und ätzend, jetzt ausser Gebrauch.

Calla L. Sumpflöffel. Blütenkolbe ganz von Blüten bedeckt, von einem grossen Scheiden-Deckblatt umgeben. Blumenhülle fehlt. Beere aufrecht mit wenigen Samen. xx, 7.

C. palustris L. Bltt. herzförmig; Deckblatt flach-löffelfg.

In waldigen Sümpfen, sumpfigen Erlenbrüchen der Ebene hin u. wieder häufig und meist gesellschaftlich. Um *Br.* bei *Lissa*, *Oels*, *Bernstadt*, *Wohlau*, *Bunzlau* bei *Klitschdorf*, *Gröbel*, *Eckersdöf*, *Greulich* etc. Um *Hirschberg* bei *Herischdorf*, *N. Berbisdorf*, *Lomnitz*. Um *Creuzburg*, *Oppeln*, *Rosenberg*, *Wegschütz*, *Jacobsvalde*, *Briesau* bei *Grätz*. Mai, Juni. 2.

Wurzelstock söhlig, gegliedert. Bltt. auf geflügelten Stielen, eiherafg., spitz, lederartig, glänzend. Deckbltt. aussen grün, innen weiss. Fruchtknoten kugelig. Beeren roth.

Acorus L. Kalmus. Blütenkolben seitlich, sitzend, ganz mit Blüten bedeckt; das Deckblatt erscheint als Verlängerung des Stängels. Blumen zwittrig mit sechsblättriger Blumenhülle. Sechs Staubgefässe. Beerenkapsel mit 2 - 3 Samen. vi, 1.

A. Calamus L.

Im Wasser an den Rändern von Teichen u. stagnirenden Flüssen d. d. g. G. verbreitet und stets in grosser Menge die Ufer bedeckend. Wenn diese Pflanze wirklich ehemals aus dem Orient eingeführt wäre, so gäbe sie ein sehr merkwürdiges Beispiel von Ansiedelung und wahrer Einbürgerung. Mai, Juni. 2.

Wurzelstock dick, fleischig, söhlig, geringelt. Bltt. gebüschelt, lang, schwertfölg., sattgrün. Blüthenschaft dreiseitig, auf der inneren Seite rinnenfg., auf der äusseren zugeschräpft. Blütenkolben fast walzig, 2 - 3'' lang. Blumen grünlich. Die ganze Pflanze enthält ein aromatisch-bitteres ätherisches Oel, besd. die Wurzel, als *R. Calami aromatici* von jeher officinell, und in mancherlei Verdauungsbeschwerden ein treffliches Heilmittel. — Man stellt diese Pflanze wohl auch unter die vorige Familie.

Orchideae Jussieu.

Die Röhre der Blumenhülle mit dem Fruchtknoten verwachsen; der Saum gefärbt, kronenartig, tief-6 theilig, unre-

gelmässig, gewöhnlich rachenförmig oder zweilippig. Der obere Zipfel des inneren Kreises während des Blühens durch eine Drehung des Fruchtknotens nach aussen und unten gewandt, grösser als die übrigen, in einen Sporn auslaufend, eine untere Lippe darstellend; die beiden anderen des inneren und die drei des äusseren Kreises bilden eine obere Lippe oder den Helm. In der Mitte der Blume aus der Spitze des Fruchtknotens erhebt sich ein gemeinschaftlicher säulenförmiger Träger der Staubgefässe und des Stempels. Drei Staubgefässe, wovon meist nur der mittlere, selten zwei, nie alle drei Staubbeutel tragen. Der Staubbeutel besteht entweder aus zwei getrennten Fächern, welche seitlich am Säulchen befestigt sind oder aus einer mehrfächerigen Grube an der Spitze desselben, die sich mit einem Deckel öffnet. Der Blumenstaub, *Pollen*, bildet gesonderte Massen, welche bisweilen gestielt und mit einem drüsigen Halter versehen sind, entweder aus klebrigen verbundenen Körnchen bestehend, oder wachsartig oder pulverig. Die Narbe hat die Form einer klebrigen Scheibe und endigt sich nach oben in eine kleine Spitze oder Platte. Der Fruchtknoten einfächerig, gedreht mit 3 stärkeren und 3 schwächeren Ribben, und letzteren gegenüber an der inneren Wand drei Samenhaltern mit vielen Eichen. Kapsel dreiklappig. Samen sehr fein.

Standen mit söhligem oder scheibenförmigem Wurzelstock, im letzteren Falle oft mit jährlich sich erneuernden Trugknollen. Stängel mit scheidenförmigen oder nur schuppenförmigen Bltt.. Blumen in Trauben oder Ähren, jede mit einem einfachen Deckblatt. Die Wurzelknollen enthalten feines Stärkmehl und Schleim, mit ein wenig ätherischem Oel. Die Arten dieser Familie wachsen in allen Zonen und Höhenregionen, in wärmeren Ländern häufig parasitisch, meist vereinzelt und an feuchten oder dunklen und schattigen Plätzen, zum Theil von beschränktem Vorkommen und auf vereinzelt Standorten. Sämmtlich bei Linné in XX, 1.

1. *Malaxideae*. Ein Staubgefäss. Die Pollenmassen wachsartig; jede in zwei eng verbundene Massen getheilt, ohne Stiel an der Narbe sitzend.

Malaxis Swartz. *Weichkraut*. Lippe am Gr. ausgehöhlt. Die Zipfel des Helms von einander stehend. Staubbeutel an der Spitze sitzend, frei, je zwei Pollenmassen an der Spitze verbunden. Der Fruchtknoten nicht gedreht.

M. monophyllos Swartz. *Ophrys mon.* Linn. Der Stängel dreikantig, mit einem oder zwei eiförmigen Bltt.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen und grasigen Waldplätzen im Vorgebirge. Zuerst von Kotschy um *Ustron* auf der *Machowa* und *grossen Czantory*, dann von mir im *Niedecker Schlage* ebendasselbst gefunden. Neuerlich am *Urlich* im Gesenke von Scholtz gef. Juni. 2.

Stängel unten zwiebelig, 3 - 4" h., mit 2 weissen Scheiden, wovon die obere, selten beide, ein eiförmiges hellgrünes Blatt trägt. Aehre linealisch, etwas locker. Blumen klein, gelbgrün.

Stúrmia Reichenbach. *Sturmie*. Die Blätter der Blumenhülle auscinanderstehend, linealisch; die Lippe schief-aufrecht, rinnenförmig. Blumensäule aufrecht, vorn in der Mitte ausgebuchtet, mit deckelförmigem Staubbeutel an der Spitze. Zwei neben einander liegende eiförmige Pollenmassen.

S. Loeselii Rchb. *Ophrys* *Loes. L. Liparis L.* Rich. Der Stängel oben dreikantig, unter der Mitte mit zwei länglich-lanzettlichen Blättern; Traube 3-6blumig; Lippe länglich, vorn abgesehen, fein gekerbt.

Auf Torfwiesen zwischen Sumpfmöos. Nach v. Mückusch um *Wagstadt* bei *Troppau*. Einmal von mir um die *Giesemühle* bei *Wohlau*, neuerlich häufig um *Kl. Jeseritz* vor *Nimptsch* von *Wichura* gefunden. Juni, Juli. 2.

Gelblich-grün, 3 - 4" h. Am Gr. des Stängels zur Seite ein grüner Knollen. Stängel unten zweischneidig, von Blattscheiden bedeckt. Bltt. stumpf, nervig, ohne Adern. Blumen gelblich-grün. Die 3 äusseren Zipfel linealisch, gerollt; die 2 inneren ganz schmal, fadenfg. Lippe erst aufrecht, dann bogig-söhlig, am Gr. in der Mitte rinnig.

Corallorrhiza Haller. *Korallenwurz*. Die Lippe dreilappig, am Gr. mit 2 rinnenförmigen Vertiefungen. Die Zipfel des Helmes je 3 und je 2 gleichförmig. Blumensäule halbrund. Der Staubbeutel auf der Spitze, breiter als lang. Pollenmassen je zwei an der Spitze verbunden, übereinanderliegend, kugelig.

C. innata R. Brown. *Ophrys*. *Cor.* Linn. Aehre armlumig; Lippe länglich, mit 2 Schwielen an der Mitte; Zipfel des Helms spitz.

In schattigen und feuchten moosigen Wäldern des Vorgebirges und Hochgebirges, bis in die Ebene herabsteigend. Um *Wohlau* nach *Güntzel*, *Leobschütz* bei *Bratsch* und *Bauerwitz*, *Leisnitz*, *Mefersdorf*. Im Riesengebirge um *Agnietendorf*, *Stangenberg* b. *Stonsdorf*, am *Kochelfalle*, um die *Brodthau*, am *Kitzelberge* bei *Kaufung*. *Reinerz*. *Cudowa*. Gesenke um den *Bieberteich*, am Wege von *Carlsbrunn nach dem Altwater*. Am *Zor* bei *Ustron*. Juni, Juli. 2.

Wurzelstock söhlig, schuppig-gezähnt. Stängel braungrün mit 2 - 3 blattlosen scheidigen Schuppen. Blumen grüngelb. Fruchtknoten nicht gedreht. Früchte überhängend.

2. *Ophrydeae*. Ein Staubgefäss. Die Pollenmassen wachsartig, ungetheilt, durch netzartige Fäden verbunden, welche unten in einen Stiel zusammenlaufen.

Orchis L. *Knabenkraut*. Die Lippe 3-4 lappig, am Gr. in einen Sporn endigend. Die beiden anderen Zipfel des inneren und der mittlere des äusseren Kreises der Blumeuhülle neigen sich helmartig gegeneinander. Staubbeutel schräg-aufrecht. Jede Pollenmasse ist an eine besondere Drüse der Narbe angefügt, und diese Drüsen in zwei Vertiefungen des Narbenrandes eingesenkt.

a. Die Trugknollen ungetheilt.

O. militaris L. Die Lippe 3 theilig mit kurzhaarigen Punkten besetzt, die seitlichen Zipfel linealisch, vorn breiter zweispaltig mit einem borstlichen Zahn in der Mitte, die Lappen länglich, auseinanderstehend, vorn gezähnelte; der Sporn kaum halb so lang als der Fruchtknoten; die Deckbltt. häutig, einnervig, viel kürzer als der Fruchtknoten; die Bltt. länglich.

Auf fruchtbaren Waldwiesen in der höheren Ebene und dem Vorgebirge, selten. Um *Br.* bei *Koberwitz*. *Kl. Kniegnitz* bei *Zobten*, wo sie zuerst von *Leupold* gef. wurde. Um *Ustron* am *Tul* und bei *O. Lischna*. Auf der *Kreuzwiese* bei *Kupferberg* nach *N. v. E. Mai*, *Juni. 2.*

Stängel 1 - 1½' h., mit dichten länglichen Ähren. Bltt. oval, anfangs mit feinhaarigen Nerven, die unten genähert, die oberen viel kleiner, stets eingerollt. Blume schöngefärbt, der Helm fleisch- oder rosaf., die Lippe weisslich oder fleischf. mit purpurrothen Punkten, auf denen feine Härchen stehen, selten ganz weiss. Das Kraut der trocknen Pflanze riecht wie *Anthoxanthum*.

O. variegata Allione. Die Lippe 3 theilig, punktirt, kahl; die seitlichen Zipfel länglich, der mittlere breit-umgekehrt-herzfg. mit einer Stachelspitze in der Mitte, alle spitz gezähnt; der Sporn etwas länger als der halbe Fruchtknoten; Zipfel des Helms spitz; die beiden inneren etwas kürzer als der äussere; Deckbltt. einnervig, von der Länge des halben Fruchtknoten; Bltt. länglich.

Auf Bergwiesen. Um *Niedek* bei *Ustron* von *Kotschy* gef. *Mai, Juni. 2.*

Niedriger als die vorige und durch die spitzen Zipfel der Blüthenhülle ausgezeichnet. Der Stängel meist mit mehreren Bltt. besetzt.

O. ustulata L. Lippe mit feinhaarigen Punkten, 3 theilig, die seitlichen Zipfel lineal-länglich vorn schwachgekerbt, der mittlere zweispaltig, mit oder ohne Zahn in der Mitte, die Lappen lineal-länglich, verloren gekerbt; der Sporn um das 3 fache kürzer als der Fruchtknoten; die Zipfel des Helms eiförmig, die inneren stumpf; Blütenähre walzig.

Auf fruchtbaren Wiesen im Vorgebirge, hie und da auch in der Ebene, zerstreut. Um *Br.* bei *Schön-Ellgut*. Um die *Schauermühle* bei *Bunzlau*. *Striegauer B. Kitzelberg* bei *Kauffung*. *Galgenberg b. Hohenfriedeberg. Gr. Hennersdorf* bei *Görlitz*. Am *Hummel* bei *Reinerz. Tscherbeney*. Um *Troppau bei Meltsch*, zw. *Mösniq* und *Gotschdorf. Am Tul* bei *Ustron*. Mai. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' h. Bltt. länglich-lanzettlich oder eifg. Die obersten Blumen haben vor dem Aufblühen eine schwärzliche Farbe, so dass die Aehre wie oben angebrannt aussieht, woher der Name. Blumen klein. Helm bräunlich-roth, Lippe weiss mit purpurrothen kurzhaarigen Flecken.

O. coriophora L. Die Lippe zur Hälfte 3spaltig, herabhängend, die Zipfel fast gleichförmig, der mittlere länglich ungetheilt, die seitlichen fast rautenförmig; der Sporn kegelförmig, in einem Bogen niedersteigend; sämtliche Zipfel des Helms gegeneinandergeneigt, spitz; die Deckbltt. länger als der Fruchtknoten, die Aehre länglich.

Auf etwas feuchten Wiesen. Um *Br.* bei *Krittern, Kapsdorf* hinter *Hühnern, Koberwitz, Burgwitz* bei *Trebnitz*, um *Gr. Glauche*. Um *Wohlau. Woiselwitz* bei *Nimptsch. Hartmannsdorf* am *Gröditzberge. Matskirch* und *Hultschin* in *OS. Stremplowitz* bei *Troppau*. Juni. 2.

Stängel 1' h., beblättert, ziemlich steif. Bltt. lineal-lanzettlich. Helm braunroth; die Lippe hellroth mit dunkelrothen Punkten, die Zipfel grünlich mit rothem Bande. Die Blumen haben einen starken Geruch nach *Wanzen*.

O. globosa L. Die Lippe zur Hälfte 3spaltig, herabsteigend, die Zipfel länglich, der mittlere breiter, vorn gestutzt mit einer Ausrandung; der Sporn walzig in einem Bogen niedersteigend; die Zipfel des Helms glockig gegen einander geneigt, eifg. mit feiner Spitze; die Deckbltt. so lang als der Fruchtknoten; die Aehre fast kugelig.

Auf Wiesen des Vorgebirges, bis in die Region des Hochgebirges. Um *Reinerz. An der hohen Mense. Im Kessel* im *Gesenke. O. Lischna* bei *Ustron*. Mai, Juni. 2.

Stängel 1 - $1\frac{1}{2}$ ' h., steif, beblättert. Bltt. lanzettlich. Blumen rosenroth od. rosa-purpurf., Lippe purpurfarben-punktirt.

O. Merio L. Die Lippe dreilappig, die Lappen breit, der mittlere vorn abgestutzt mit einer Ausrandung; Sporn walzig oder keulenförmig, söhlig-abstehend oder aufsteigend, so lang als der Fruchtknoten; die Zipfel des Helms gegeneinandergeneigt, stumpf; Deckbltt. so lang als der Fruchtknoten; die Aehre etwas locker eiförmig-länglich.

Auf trocknen Wiesen, Triften, an hohen grasigen Wegrändern, in der Ebene und dem Vorgebirge häufig. Um *Br.* bei *Bischwitz a. W., Schleibitz, Sibyllenort, Lissa*, in der *Trebnitzer Hügelreihe* etc. Mai, die erste dieser Sippe. 2.

Trugknollen fast kugelig. Stängel $\frac{1}{2}$ ' h., am Gr. mit zusammengedrängten länglich-lanzettlichen Bltt. Aeusserer Zipfel des Helms stark-nervig, braun- oder grünröthlich. Lippe fleisch- oder purpurf., mit bisweilen nicht deutlich geschiedenen Lap-

pen. Blumen auch weiss. Die Knollen dieser und anderer Arten, unter dem Namen *R. Salep* officinell, bisher meist aus dem Orient bezogen, haben frisch einen eigenthümlichen Geruch, enthalten fast reines Stärkemehl, und werden als nährendes und reizmilderndes Arzneimittel angewandt.

O. pallens L. Die Lippe undeutlich dreilappig ganzrandig, der mittlere eingedrückt; Sporn walzig, söhlig-abstehend oder aufsteigend, kürzer als der Fruchtknoten; Zipfel des Helmes eigf., stumpf, die beiden äusseren auswärts gebogen; die Deckbltt. so lang als der Fruchtknoten; die Aehre eigf.; die Bltt. länglich-verkehrt-eigf.

Auf Waldwiesen des Vorgebirges, bisher nur um *Zeislowitz* und am *Tul* bei *Ustron* von *Kotschy* gef. und mitgetheilt. Juni. 2.

Stängel $\frac{3}{4}$ ' h., über dem Grunde mit 3-4 grossen Bltt., oben blattlos und dünn. Blumen gelblich-weiss mit bräunlichen Strichen. Hat entfernte Aehnlichkeit mit *O. sambucina*. Die Knollen gross, zeigen bisweilen Anfänge von Theilung.

O. mascula L. Die Lippe tief 3theilig, am Gr. kurzhaarig, die Lappen breit, gezähnt, der mittlere ausgerandet mit einem Zahn in der Mitte; der Sporn walzig, söhlig oder aufsteigend, so lang als der Fruchtknoten; die beiden inneren Zipfel des Helmes kürzer als der mittlere äussere, die beiden seitlichen auswärts gebogen; die Deckbltt. so lang als der Fruchtknoten; die Aehre länglich; die Bltt. länglich.

Auf fruchtbaren etwas feuchten Wiesen des Vorgebirges an grasreichen Hügellehnen, meist gesellschaftlich. *Ob. Weistritz*. Um *Charlottenbrunn* bei *Donnerau*, *Bärengrund*, *Reimswaldau*, *Salzbrunn*, *Bolkenhain*, *Kitzelberg* bei *Kauffung*, *Berbisdorf*, *Tiefhartmannsdorf*, *Ketschdorf* bei *Hirschberg*, *Schlackenthal* bei *Reichenstein*. Um *Tscherbeney*, *Kunzendorf* bei *Neustadt*. Um *Troppau* bei *Grätz*, *Neu-Erbersdorf*, *Dürstenhof*, an der *Bischofskoppe*, *Bauerwitz*. Um *Ustron* am *Tul* und an der *Czantory*. Mai, Juni.

Stängel 1 - $1\frac{1}{2}$ ' h., am Gr. mit 3-4 länglich-eigf., oberseits gegen den Gr. mit feinen rothen Punkten gezeichneten Bltt. Aehre vielblumig mit starker Spindel. Deckbltt. grünlich-purpuf. Blumen purpuf., bisweilen rosaf. oder scheckig. Die Zipfel des Helms bald stumpflich, bald kurz- oder lang-spitzig.

O. laxiflora Lamarck. *O. palustris* Jacq. W. et Gr. sil. Die Lippe 3lappig, die seitlichen Lappen vorn gerundet, der mittlere tief ausgerandet; der Sporn walzig, söhlig oder aufsteigend, kürzer als der Fruchtknoten; die Zipfel des Helmes stumpf, die seitlichen nach aussen gewandt; die Deckbltt. 3-5nervig; die Aehre locker, länglich; die Bltt. aufrecht-abstehend, lineal-lanzettlich.

Auf sumpfigen und torfhaltigen Wiesen, selten. Um *Br.* zw. *Neukirch* und *Pilsnitz* an der Strasse nach *Lissa*, um *Massewitz*. Wiesen bei *Krummhübel* n. Krause. Um *Zabrzeg* bei *Teschen*. Juni. 2.

Stängel 1' h., schlank, beblättert. Blumen gross, mit breiter grosser Unterlippe, purpurroth.

O. sambucina L. Die Lippe seicht dreilappig; der Sporn kegelförmig-walzig, niedergebogen, so lang als der Fruchtknoten;

die seitlichen Zipfel des Helmes absteheud; die Deckbltt. vielnervig und geadert, länger als die Blume; Bltt. länglich-lanzettlich, nach hinten verschmälert; die Knollen seicht 2-3 spaltig.

In lichten Vorhölzern und auf Waldwiesen in der Ebene und dem Vorgebirge. Um Br. bei *Lissa*. *Peterwitz* bei Jauer. *Charlottenbrunn* in den *Seifen*, am *langen Berge* bei *Donnerau*. *Sonnenkoppe*. *H. Mense*. *Kapellenberg* bei *Heinzendorf*. *Kupferberg*. *Schmiedeburg*. Um *Troppau* bei *Pikau*, *Mösning*, am *Pfaffenbg.* und bei *Jägerndorf*. Auf dem *Tul* und bei *Czeislowitz* bei *Ustron*. Mai. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ ' h. Trugknollen bisweilen ungetheilt. Bltt. breit, zungenfg., an der Mitte des Stängels zusammengedrückt. Blumen weissgelblich oder hellpurpurfarben, beide Varietäten meist unter einander.

b. Die Trugknollen handförmig-getheilt.

O. maculata L. Die Lippe 3lappig; der Sporn walzig-kegelförmig; die seitlichen Zipfel des Helmes absteheud; der Stängel innen dicht, beblättert; die oberen Bltt. deckblattförmig, das oberste weit von der Aehre entfernt.

In sumpfigen Wäldern, auf sumpfigen und torfhaltigen Waldwiesen von der Ebene bis auf das Hochgebirge in eine Höhe von 4000'. Um Br. bei *Friedewalde*, *Lissa*, *Skarsine*, *Trebnitz*, *Riemberg* etc. Vom *Zobten* durch das ganze Vorgeb. häufig. Juni. 2.

Stängel 1 - $1\frac{1}{2}$ ', schlank. Bltt. länglich oder lanzettlich-zungenfg., meist mit vielen viereckigen oder rautenförmigen, rothbraunen oder braunschwarzen Flecken bedeckt, selten ungefleckt. Aehre eig.-länglich. Blumen weisslich-rosenroth mit purpurf. Punkten und Strichen, selten weiss und ungefleckt.

O. latifolia L. *Gukuksblume*. Die Lippe 3lappig; der Sporn walzig-kegelförmig; die seitlichen Zipfel des Helms auswärts gebogen; die unteren Deckbltt. länger als die Blume, 3nervig und geadert; der Stängel röhrig, 4-6blättrig, die unteren oval oder länglich, stumpf; die oberen kleiner lanzettlich zugespitzt.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen d. d. g. G. bis an das Hochgebirge häufig, und unter allen dieser Sippe die verbreitetste und häufigste Art. Mai, Juni. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., dicklich, doch nicht sehr steif. Die Bltt. meist mit rothbraunen Flecken dicht besetzt, die unteren um vieles breiter, weit absteheud. Blumen fleisch- oder purpurroth, gefleckt. Der Mittellappen der Lippe ist bald länger bald kürzer.

O. angustifolia Wimm. u. Grab. Die Lippe 3lappig; der Sporn walzig-kegelfg.; die seitlichen Zipfel des Helms absteheud, später auswärts gebogen; sämmtliche Deckbltt. länger als die Blume, 3nervig und geadert; die Bltt. fast aufrecht, lang-lanzettlich, das oberste den Grund der Aehre erreichend.

Auf sumpfigen und torfigen Waldwiesen in der Ebene. Um Br. im *Goi* bei *Kapsdorf*, bei *Lissa*, *Nimkau*, *Riemberg*. Um *Wohrlau* an der *Giese*- und *Schindelmühle*. *Ohrlau*. *Oppeln*. Juni, fast um 8-14 Tage später als die vorhergehende. 2.

Stängel 1 - 2' h., steif, oft sehr dick. Bltt. meist ungefleckt, hohlkeelig und aufrecht. Blumen gewöhnlich blässer, fleisch- oder hellpurpurf. Hierher *O. incarnata* Wimm. Fl. v. Schles.

Anacáptis Richard. Lippe dreilappig, am Gr. mit zwei länglichen seitwärts gerichteten Kämmen. Die beiden äusseren Zipfel der inneren und der mittlere des äusseren Kreises der Blumenhülle sind helmartig gegeneinandergeneigt. Staubbeutel schräg-aufrecht. Beide Pollenmassen sind an eine gemeinschaftliche Drüse angesetzt.

A. pyramidalis Richard. *Orchis pyr.* Linn.

Auf fruchtbaren Wiesen des Vorgebirges. Um *Ustron* bei Teschen auf den Wiesen bei *O. Lischna* u. am *Tul.* zuerst von Kotschy gef. Juni, Juli. 2.

Stängel 1 - 1½' h., schlank. Bltt. lanzettlich-linealisch, die oberen scheidig-eingerollt. Aehre kurz, pyramidal, dicht, später länglich. Deckbltt. purpurf. Blumen satt-purpur-blutl. Sporn sehr dünn. Zipfel des Helms spitzlich, eif. Trugknollen eif., ungetheilt.

Gymnadénia RBrown. *Höswurz.* Character von *Orchis*, ausser: Jede Pollenmasse ist seitwärts einer besonderen nackten Drüse angefügt.

G. conopsea R. Br. *Orchis con.* Linn. Die Lippe 3spaltig mit eiförmigen, stumpfen Lappen; der Sporn fädlich, viel länger als der Fruchtknoten; die Bltt. lang-lanzettlich.

Auf fruchtbaren Wiesen der höheren Ebene selten, im Vorgebirge allgemein verbreitet und sehr zahlreich. Um Br. bei *Koberwitz*, *Süsswinkel*, *Bunzlau* b. d. *Schauermühle*, *Hartmannsdorf* u. *Warthau. Katscher.* Vom *Geiersberge* durch das Vorgebirge d. g. G. bis auf d. Hochgeb., *Riesengeb. u. Gesenke.* Mai, Juni. 2.

Trugknollen handfg.-getheilt, zusammengedrückt. Stängel 1 - 1½' h., schlank, beblättert, unten meist röthlich. Bltt. kohlkehlig. Aehre länglich, ziemlich dicht. Blumen fleisch- oder hell-purpurroth. Ausgezeichnet durch den sehr langen und faden-dünnen Sporn.

Coeloglossum Hartman. Die Lippe dreispaltig mit abgekürztem sackförmigem Sporn, am Gr. mit den Zipfeln des Helmes glockenförmig zusammengeneigt; letztere einander gleichlang. Die Pollenmassen getrennt, jede einer am Grunde befindlichen freien Drüse angefügt.

Tracht, Vorkommen und Gestalt der Blume schienen mir dafür zu sprechen, dass die beiden hier folgenden Arten zu einer Sippe gehören, die ich *Chlororchis* benannte und wie oben charakterisirte. Einer freundlichen Mittheilung Beilschmieds verdanke ich die Nachweisung des obenstehenden Namens, den Hartman in *Scandinav. Flor.* dieser Sippe gegeben hat.

C. albidum H. *Satyrinum alb.* Linn. *Orchis alb.* Scop. Koch Syn. *Habenaria alb.* RBr. Die Lippe tief 3spaltig, die Lappen ganzrandig; die seitlichen spitz, der mittlere länglich, stumpf; der Sporn

um das dreifache kürzer als der Fruchtknoten, die Trugknollen büschelförmig.

Auf grasigen Lehnen und Haidewiesen des Hochgebirges. Riesengeb.: am *Riesengrunde*, *Schneeegruben*, *Kesselkoppe*, *Elbwiese*, *Gl. Schneeberg*. Im Gesenke am *Allwater*, *Köpernik* und der *Bründelhaide*. Juni, Juli. 2.

Stängel 4 - 6" h., stoff, aufrecht, beblättert. Bltt. verkehrt-ei-lanzettlich. Aehre walzig, dicht. Blumen klein, weisslich.

C. viride H. *Satyrium vir.* Linn. *Habenaria vir.* RBr. *Gymmadenia vir.* Rich. *Himantoglossum vir.* Spr. Die Lippe linealisch, vorn 3 spaltig, der mittlere Zipfel sehr kurz; der Sporn sehr kurz, sackförmig; die Trugknollen handförmig-getheilt.

Auf feuchten Grasplätzen und Waldwiesen des Hoch- und Vorgebirges. Im *Riesengebirge* selten. *Gl. Schneeberg*. Gesenke: am *Leiterberge*, *gr. Keilich*, *Allwater*, auf der *Janowitz Haide*, an der *Bründelhaide*. Czantory bei Ustron. Vereinzelt um *Leobschütz* bei *Badewitz*, und *Schavermühle* bei *Bunzlau* nach Schn. Bei *Meffersdorf* u. *Niesky* n. *Rabenhorst*. Juni, Juli. 2.

Platanthéra Richard. *Kuckuksblume*. Lippe lang, schmal, ungetheilt mit langem fadenförmigem Sporn. Die äusseren Seitenlappen des Helms abstehend, der mittlere und die beiden inneren gegeneinandergeneigt. Staubbeutel schräg aufrecht; die Fächer von einander entfernt, durch eine breite Platte geschieden. Jede Pollenmasse seitwärts einer besonderen nackten Drüse angefügt.

P. bifolia Richard. *Orchis bif.* Linn. Der Sporn fadenförmig, anderthalbmal oder doppelt so lang als der Fruchtknoten; die Fächer des Staubbeutels parallel.

In Vorhölzern und lichten Laubwäldern, auf Waldwiesen in der höheren Ebene und dem Vorgebirge, d. d. g. G. verbreitet. Um *Br.* bei *Lissa* und d. d. g. *Trebnitzer* Hügelreihe sehr häufig. Juni. 2.

Stängel 1 - 1½', steif, aufrecht, am Gr. mit 2 grossen, dicht über einander stehenden, breit-ovalen Bltt. und darüber einem, selten mehreren kleinen lanzettlichen besetzt, eckig-stielrund. Aehre lang, locker. Kronen weisslich, wohlriechend, besd. gegen Abend. Ausgezeichnet durch die lange linealische Lippe und den langen dünnen Sporn. Zwei grosse rundliche unausgebildete Staubgefässe, staminodia.

P. chlorantha Custor. Der Sporn fadenförmig, am Ende schwach verdickt, doppelt so lang als der Fruchtknoten; die Fächer des Staubbeutels oben gegeneinandergeneigt, unten auseinandergehend.

In feuchten Wäldern. Am *Rummelsberge* bei *Strehlen* von Schummel, am *Zobtenberge* und bei *Thomasdorf* im Gesenke von Krause gefunden. Juni, Juli. 2.

Diese mir unbekanntete Art nehme ich hier nach der mündlichen Mittheilung ihrer Entdecker auf. Blumen grünlich-weiss. Aehre sehr locker. Die Lippe kürzer und breiter als an der vorigen, an der Spitze ganz grün.

Hermínium RBrown. Ragwurz. Lippe spießförmig-dreilappig, am Gr. sackförmig-eingesenkt, ohne Sporn, mit den Zipfeln des Helms glockenförmig zusammengeneigt. Staubbeutel schräg-aufrecht, mit abstehenden durch eine Platte geschiedenen Fächern. Jede Pollenmasse durch einen sehr kurzen Stiel einer nackten kappenförmig-ausgehöhlten Drüse angefügt.

H. Monorchis R. Br. *Ophrys M.* Linn.

Auf Wiesen. Am *Petranowitz* Windmühlenberge bei Wohlau von Güntzel d. j. entdeckt. Juni. 2.

Trugknollen kugelig. Schmächtige und zarte Pflanze. Stängel 3 - 5' h., über dem Grunde mit 2 genäherten elliptischen Bltt. Aehre linealisch, etwas locker. Blumen grüngelb, dann braungrün, wohlriechend. Auch die beiden oberen Zipfel des inneren Kreises sind am Gr. zweizählig, oder dreilappig.

3. *Neottieae.* Ein Staubgefäß. Der Staubbeutel hinter der Narbe mit genäherten Fächern. Die Pollenmassen körnig, ohne Stiel einer gemeinschaftlichen Drüse angeheftet.

Neóttia L. Vogelnest. Die Zipfel des Helmes gleichförmig, gegeneinandergeneigt. Die Lippe niedergebogen, vorn zweilappig, hinten mit zwei Seitenlappen, am Gr. sackförmig-eingesenkt. Blumensäule kurz, rund, auf einem Schnabelfortsatz der Narbe ruhend. Pollenmassen ungetheilt.

N. Nidus avis Richard. *Ophrys N. a.* Linn.

In feuchten und schattigen Laubwäldern der höheren Ebene u. d. Vorgebirges d. d. g. G., stets einzeln und sparsam. Um Br. bei *Osowitz*, *Arnoldsmühl*, *Lissa*, *Schosnitz b. Canth. Trebnitz*, *Vielgut*. Um *Wohlau*, *Beuthen a. O.*, *Bunzlau*, *Ohlau*, *Oppeln*, *Leobschütz*. Durch d. g. Vorgeb. Mai, Juni. 2.

Soll auf den faulenden Wurzeln der Baumstämme schwarotzen. Die ganze Pflanze sammt den Blumen gelbbraun ohne Bltt. Wurzel aus dichten büscheligen walsigen Fasern. Stängel bald 1, bald mehrere, $\frac{1}{2}$ - 1' h., mit ovalen Schuppen besetzt.

Lístera RBrown. Die Zipfel des Helmes gleichförmig, gegeneinandergeneigt. Die Lippe niedergebogen, zweitheilig, am Gr. eben. Blumensäule sehr kurz; der Staubbeutel auf einem aufrechten Fortsatze derselben, auf einem Schnabelfortsatz der Narbe ruhend. Pollenmassen ungetheilt.

L. ovata R. Br. *Ophrys ov.* Linn. *Epipactis ov.* Allione. Zwei eiförmige, fast gegenständige Bltt. über dem Grunde des Stängels; die Lippe linealisch-zweispaltig.

In feuchten Laubwäldern und Vorhölzern, auf Waldwiesen, in feuchten Gebüsch in der Ebene u. d. Vorgeb., d. d. g. G. verbreitet

und häufig. Um Br. im *Goi bei Kapsdorf*, bei *Schleibitz*, *Lissa*, *Koberwitz*, in der *Trebnitzer* Hügelreihe. Durch d. ganze Vorgebirge. Mai, Juni. 2.

Wurzel büschel-faserig. Stängel 1 - 2' h. Bltt. nervig, dicklich. Aehre verlängert, locker, bisweilen 6 - 10" lang. Blumen gelblich-grün.

L. cordata R. Br. *Ophrys c.* Linn. *Epipactis c.* Allione. Zwei herzförmige, fast gegenständige Bltt. in der Mitte des Stängels; die Lippe 3spaltig, die seitlichen Zipfel linealisch, kurz, der mittlere 2spaltig.

In moosigen schattigen Laub- und Nadelwäldern des Vorgebirges, auf moosigen Plätzen der Knieholzgend im Hochgebirge, mit der Wurzel in Sumpf- und Astmoos nistend, ausnahmsweise auch in der Ebene. Um *Wohlau* nach *Güntzel* d. j. Am *grossen See* an der *Heuscheuer*. Riesengeb. um *Agnatendorf*, am *Zacken- u. Kochelfalle*, auf der *Elb. und Iserwiese*, am *Steinboden*. Bei *Meffersdorf* nach *Rabenhorst*. Im Gesenke am *Altvater*, *Hungerberge* und auf den *Hirschwiesen*. An der *Baranio* u. d. *Ostrj* bei *Teschen*. Juni. 2.

Wurzel büschel-faserig. Stängel zart 4 - 6" h. Bltt. dünnhäutig. Aehre locker, 6 - 10blumig. Blumen klein, grün-bräunlich.

Goodyera RBrown. *Goodyere*. Die beiden seitlichen Zipfel des äusseren Kreises offen, der mittlere mit den beiden oberen des inneren Kreises zusammenneigend. Lippe vorge Streckt, am Gr. mit sackförmiger Einsenkung, vorn zugespitzt mit einer Mittelrinne. Narbe mit zweihörnigem Schnabelfortsatz, worauf die Pollenmasse an einer grossen Drüse. Staubbeutel nickend.

G. repens R. Br. *Satyrium r.* Linn. Wurzelbltt. eifg., gestielt, netzaderig; Stängel oben weichhaarig.

In moorigen und feuchten Nadelwäldern des Vorgebirges und der Ebene. *Glaucher Wald* bei *Skarsine*. *Garsuche* bei *Ohlau*. *Charlottenbrunn*. *Hahnhäuser* bei *Schönau*. Zw. *Buchwald* und *Lomnitz*. Oberhalb *Giersdorf* im Riesengeb. *Meffersdorf* n. *Rabenhorst*. *Neurode*. *Reinerz*. *Johannisberg*. OS.: *Radoscher Wald*, *Proskau*, *Leobschütz*. *Kamentz* bei *Troppau*. *Hegerwald* b. *Jägerndorf*. Juli, Aug. 2.

Wurzel schief. Bltt. grundständig, dicklich. Stängel 4 - 6" h., mit scheidigen Schuppen besetzt. Aehre walzig, locker. Blumen weisslich.

● *Spiránthes* Richard. Die Zipfel des Helmes zusammenschliessend; die seitlichen zuletzt rückwärtsgebogen. Die Lippe ohne Sporn, am Gr. rinnenförmig, vorn gefranzt und zurückgekrümmt. Die Narbe mit einem zweispaltigen Fortsatze; dahinter der sitzende endständige, nickende Staubbeutel mit 2

Fächern. Die Pollenmassen aus je vier Körnermassen bestehend.

S. autumnalis Richard. *Ophrys spiralis* Linn. Stängel blattlos, die Wurzelblt. eifg.-länglich, zur Seite des Stängels; die Aehre schraubenförmig-gedreht.

Auf Triften und Graslehnen im Vorgebirge und hie und da in der Ebene zerstreut. Um *Danckwitz bei Jordansmühl.* Um *Neurode. Falkenberge bei Fischbach.* Um *Görlitz.* In OS. um *Proskau, Ratibor, Bratsch bei Leobschütz.* Um *Troppau bei Zattig, Koschendorf, Seitendorf, Jägerndorf. Czantory bei Ustron.* Juli, Aug. 2.

Trugknollen eifg. Stängel mit Scheiden besetzt, oben feinhaarig. Bltt. schwach graugrün. Blumen weisslich. Lippe keilfg.

Epipactis Haller. *Sumpfwurz.* Die Zipfel des Helms gleichförmig, halb offen. Die Lippe aus zwei abgesetzten Stücken; das hintere hohl, das vordere breiter mit 2 Schwielen am Gr. Blumensäule stielrund. Der Staubbeutel liegt auf einem aufrechten fast vierkantigen Fortsatze der Narbe. Die Pollenmassen ungetheilt.

E. latifolia Allione. *Serapias lat.* Linn. Die Bltt. eiförmig; das vordere Stück der Lippe zugespitzt.

In schattigen Vorhölzern und feuchten Wäldern in hügeligen Gegenden und im Vorgebirge häufig d. d. g. G. Um *Br. bei Scheitnich Masselwitz etc.* Juli, Aug. 2.

Wurzel büschelfg. Stängel beblättert, 1 - 1½' h. Bltt. dunkelgrün, eifg., umfassend. Aehre locker, einseitwendig. Blumen grünlich oder grünlich-rothbraun. Deckblt. lanzettlich, länger als der Fruchtknoten.

E. palustris Crantz. *Serapias longifolia* L. Die Bltt. lanzettlich; das vordere Stück der Lippe rundlich, stumpf.

Auf sumpfigen und moorigen Wiesen in der Ebene zerstreut. Um *Br. bei Kapsdorf, Süsswinkel, Riemberg. Wohrlau. Hosenitz bei Bunzlau. Diehsa bei Görlitz. Oppeln. Leobschütz. Czenschkowitz.* Um *Ustron.* Juli, Aug. 2.

Stängel 1' h. Bltt. eilanzettlich, umfassend. Aehre locker, einseitwendig, mit feinhaariger Spindel. Aeussere Zipfel des Helms innen braun-purpurfarben, aussen braun, feinhaarig; innere rosaf. Lippe am Gr. bräunlich, vorn weiss.

4. *Arethuseae.* Ein Staubgefäss. Staubkolbe deckelförmig über der Narbe. Pollenmassen körnig, ohne Anheftungsdrüse.

Cephalanthéra Richard. Die Zipfel des Helms gleichförmig, halb offen. Die Lippe aus 2 abgesetzten Stücken bestehend; das hintere sackförmig eingesenkt, das vordere an der Spitze zurückgebogen. Die Blumensäule halbrund. Der Staub-

beutel gestielt. Die Pollenmassen in zwei nebeneinanderliegende keulenförmige Theile gesondert.

C. pallens Richard. Der Fruchtknoten kahl; das vordere Stück der Lippe herzeifg., breiter als lang; alle Zipfel des Helmes stumpf; die Deckbltt. länger als d. Fruchtknoten, die Bltt. eifg. u. eifg.-lanzettlich, spitz.

In Laubwäldern der Ebene und d. Vorgebirges, selten. Um *Br.* bei *Trebnitz* im *Buchenwalde*. Um *Cudowa*. Am *Annaberge* in OS. nach *Wenck*. Juni. 2.

Wurzel büschelfaserig. Stängel steif, aufrecht, 1 - 1½' h. Blumen aufrecht, weiss mit goldgelbem Fleck auf dem Grunde der Lippe.

C. ensifolia Richard. Der Fruchtknoten kahl; das vordere Stück der Lippe sehr stumpf, breiter als lang; die seitlichen Zipfel des Helmes spitz; die Deckbltt. viel kürzer als d. Fruchtknoten; die Bltt. lanzettlich, die oberen langspitzig.

In sonnigen Vorhölzern und auf belaubten Hügeln des Vorgebirges und der Ebene. Um *Br.* bei *Lissa*. Am *Rummelsb.*, *Gröditzb.*, *langen B.* bei *Habendorf*, um *Nimptsch*, *Fürstenstein*. In den *Folgen b. Freiburg*. *Gleiwitz*. *Leisnitz*. *Annaberg* bei *Kosel*. *Leobschütz*. *Gr. Herlitz*. Am *Tul* u. an der *Czantory* bei *Ustron*. Juni. 2.

Wurzel wie die vorige. Stängel 1 - 1¼' h. Bltt. fast 2reihig, nach oben allmählig kleiner. Blumen weiss; die Lippe viel kürzer als der Helm.

C. rubra Richard. *Serapias rubra* Linn. Der Fruchtknoten weichhaarig; die Zipfel des Helms sämtlich spitz; das vordere Stück der Lippe eifg., spitz.

In feuchten Laubwäldern der Ebene u. des Vorgebirges. Im *Buchenwalde* bei *Trebnitz*. *Geiersberg*. *Spitzberg* bei *Probsthain* nach *Schn.* Um *Hermannsdorf* am *Hessberge*. *Leobschütz*. Auf dem *Blagotitzer B.* u. d. *Godula* bei *Ustron* nach *Kotschy*. Juni, Juli. 2.

Wie die vorige. Die Bltt. lanzettlich. Blumen schön purpurroth.

Epipógium Gmelin. Die Blumen zurückgelehnt, offen. Die Zipfel des Helms fast gleichförmig, halb offen, nach unten gewandt. Die Lippe in einem Knie abgesetzt; das vordere Stück aufrecht hinten in einen aufgeblasenen aufrechten Sporn endigend. Der Staubbeutel kurz gestielt, dem dreispaltigen Ende der Narbe eingesenkt. Die Pollenmassen gelappt und gestielt.

E. Gmelini Richard. *Satyrium Epipogium* L. Blattlos; d. Stängel mit scheidigen Schuppen besetzt; Achse armblumig mit händchen Blumen.

In feuchten schattigen Wäldern des Hochgebirges. Zuerst am *Gl. Schneeberge* von *Seliger* i. J. 1810, später von *Beinert* in der Gegend des *Zackenfalles* u. von *Göppert* um *Silberberg* gef. Neuerlich in der *Müßergrube* von *Fuchs* und um *Carlsbrunn* im Gesenke

von Grabowski gef. Nach Wenck am *Annaberge* in OS. von Kölb-
 ing gef. Juni, Juli. 2.

♦ Soll auf den Wurzeln der Baumstämme schwarotzen. Stängel $\frac{1}{2}$ h., glasartig-
 durchscheinend mit eig.-abgestutzten bräunlich-weissen Schuppen. Aehre locker, fast
 einseitwendig. Blumen gelblich-weiss, wohlriechend, der Sporn licht-fleischfarben.

5. *Cypripedieae*. Zwei Staubgefässe. Pollen breitartig.

Cypripedium L. *Frauenschuh*. Lippe pantoffelförmig
 aufgeblasen. Die beiden seitlichen äusseren Zipfel des Helmes
 sind unter der Lippe theilweise mit einander verwachsen. Blu-
 mensäule dreitheilig; die beiden Seitenfortsätze tragen jeder
 unterwärts einen Staubbeutel, der mittlere ist blattartig.

C. Calceolus L. Stängel beblättert; der Mittellappe der Blu-
 menhülle eig., stumpf, niedergebogen; die Lippe kürzer als die
 lanzettlichen Helmzipfel.

In Wäldern auf Kalkboden. In den *Kalkgruben* bei *Vielgut* bei
Bernstadt, von Beinert i. J. 1817 gef. Mai, Juni. 2.

Stängel 1' h. mit breiteifg. gerippten Bltt. Blumen söhlig, 1 oder 2. Zipfel des
 Helms braunroth. Lippe gelb mit rothen Linienpunkten.

Anmkg. *Himantoglossum hircinum* Rich., oder *Satyrium hirc.* Linné giebt *Mat-*
tuschka am *Röllberge* in der *Polkwitzer Haide* an, und nach Schm. soll die-
 selbe von Eschenbach „in der *Haide*“ gefunden worden sein. Da es neuer-
 lich noch nie wiedergefunden und ich noch kein schlesisches Exemplar gesehen
 habe, so wage ich nicht es aufzunehmen. Auch sah ich noch kein Exemplar von
Nigritella angustifolia Richard, *Satyrium nigrum* Linné, welche nach R. u. M.
 von Kötchy auf der *Czantory* und *Praszyca* gefunden worden sein soll.

Irideae Jussieu.

Blumenhülle mit der Röhre mit dem Fruchtknoten ver-
 wachsen; der Saum sechstheilig, die Zipfel gleichförmig oder
 ungleichförmig. Drei Staubgefässe mit auswärts gekehrten
 Staubbeuteln hinter den drei äusseren Zipfeln. Fruchtknoten
 dreifächerig, mit zahlreichen Eichen in zwei Reihen an wand-
 ständigen Samenhaltern. Ein Griffel mit 3 geschlitzten oder
 blattartigen Narben hinter den Staubgefässen. Dreiklappige
 Kapsel. Samen mit fleischigem oder knorpelartigem Eiweiss.

Stauden mit meistens zwiebelig-knolliger Wurzel, schwertförmigen Bltt., schön-
 gefärbten Blumenhüllen; jede Blume von 3 Deckbltt. gestützt. Die Wurzeln enthalten
 Satzmehl und zum Theil einen aromatischen erregenden Stoff. Die mannigfaltigsten und
 zahlreichsten Formen sind am Vorgebirge d. g. H. einheimisch.

Crocus L. *Safran*. Blumenhülle mit langer Röhre; der
 Saum glockig, regelmässig 6-theilig. Narbe dreitheilig, die

Zipfel keulenförmig oben kappenförmig-eingerollt, gezähnt oder eingeschnitten.

C. vernus Allione. *C. sativus* β *vernus* Linn. Der Schlund der Blumenhülle bärtig, die Narbe kürzer als der Saum, deren Zipfel oben kammförmig-verbreitert, fein gezähnt.

Auf Wiesen. *Braunsdorf* bei *Troppau* nach v. Mückusch. *Gr. Herlitz* auf der *Horzina Wiese* n. Mayer. März, April. 2.

Wurzel zwiebelig von netzförmigen hellbraunen Faserhüllen umgeben. Bltt. linealisch, unterseits mit weissem Mittelstreif von weissen häutigen Scheiden umschlossen. Die Röhre der Blumenhülle unmittelbar aus der Zwiebel. Blume blass-violett. Narben safrangelb.

Gladiolus L. *Siegwurz*. Blumenhülle 6-theilig, mit ungleichförmigen fast zweilippig-gestellten Zipfeln. Drei vorn blattartig-verbreiterte Narben. Samen abgeplattet. III, 1.

G. communis L. Bltt. linealisch-schwertförmig., nervig; die Blumen einseitwendig, zweilippig, einander berührend; die Zipfel der Oberlippe gegeneinandergeneigt; die der Unterlippe länglich-spathelförmig., der unterste etwas kürzer; die Staubfäden $1\frac{1}{2}$ mal so lang als die Staubbeutel.

Auf sumpfigen Wiesen am Vorgebirge. Bisher nur *am Fusse des Geiersberges* bei *Klein Silsterwitz*. Juni, Juli, um 8-10 Tage früher als der folgende. 2.

Ein oder zwei übereinander befindliche Knollenzwiebeln in einer braunen Netzhaut eingeschlossen. Stängel 1 - $1\frac{1}{2}$ ' h., mit einer braunen Scheide am Gr. und einigen kurzen schwertförmigen, 2 - 3''' breiten Bltt. Blumen in einer Aehre, 1 - 5, um die Hälfte grösser als die der folgenden, karmoisinroth. Hieher gehört *G. Boucheanus* Schlechtendal, Koch Syn. Ich behalte den Namen *G. communis* bei, weil der in Gärten verbreitete von dieser Art abzustammen scheint. Wenigstens ist so viel gewiss, dass bisher nur zwei Arten dieser Sippe wild in Schlesien gefunden wurden; Koch a. a. O. führt deren drei auf.

G. imbricatus L. *G. rossicus* Persoon. *G. neglectus* Schultes. *G. galiciensis* Besser. Bltt. schwertförmig., nervig; die Blumen einseitwendig, zweilippig, zum Theil einander deckend; die beiden oberen Zipfel etwas zur Seite abstehend, die mittleren keilförmig; der unterste länger; die Staubfäden zweimal so lang als die Staubbeutel.

Auf feuchten, moosigen und sumpfigen Waldwiesen in d. Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. zerstreut. Um *Br.* bei *Schwoitsch*, *Kosel*, *Lissa*, *Riemberg*. *Wohlau*. *Ohlau*. *Rosenberg*. *Slavenczicz* u. *Ellguter Wald* in OS. Am *Geiersberge* mit d. vorigen. *Reinerz*. Um *Troppau* und im niederen Gesenke bei *Obergrund*, *Einsiedel* etc. *Czantory* bei *Ustron*. Juni, Juli. 2.

Wurzel der vorigen. Stängel $1\frac{1}{2}$ - 2' h. Bltt. 4 - 6''' breit, länger als an d. vor. Blumen 4 - 10 in dichter Aehre, purpurroth ins violette ziehend.

Iris L. Schwertel. Saum der Blumenhülle tief 6theilig; die 3 äusseren Zipfel rückwärts, die 3 inneren einwärts gebogen. Die Staubgef. unter den langen blattartigen, vorn 2lippigen Narben verdeckt. Samen abgeplattet. III, 1.

a. Die äusseren Zipfel am Gr. bärtig.

I. bohemica Schmidt. *I. nudicaulis* W. et Gr. sil. Bltt. sichel-schwertförmig, kürzer als der 2-3blumige Stängel; der unterste Blumenstiel entspringt nahe am Gr. des Stängels; die äusseren Zipfel der Blumenhülle verkehrt-eifg.

In lichten Gehölzen. Im Laubwalde zw. *Tschechnitz* und *Kottwitz* bei *Br.* Mai. 2.

Wurzelstock söhlig, knollig-gegliedert, weiss. Bltt. grangrün, 6''' breit. Blumen-deckbltt. scheidenförmig, kahnförmig, eilanzettlich, unten grün, oben violett. Blumenhülle violett, die Zipfel fast gleichgross. — Dieser Art ähnlich ist die häufig in Gärten gebaute *I. germanica*, deren Wurzeln scharf sind. Die Wurzeln anderer Arten, als *florentina* und *sambucina* haben getrocknet einen schönen Veilchengeruch und sind unter dem Namen *Veilchenwurzel* bekannt.

b. Die äusseren Zipfel kahl.

I. Pseud-Acorus L. Bltt. schwertfg., fast so lang oder länger als der Stängel; die äusseren Zipfel der Blumenhülle eifg. mit breitem Nagel, die inneren linealisch, schmaler und kürzer als die Narben.

In Gräben, Sümpfen, an sumpfigen Ufern von Teichen u. Flüssen in der Ebene häufig, seltner im südlichen Theile. Juni, Juli. 2.

Stängel 2-3'' h. Bltt. 1-1½'' breit, grau-bereift. Blumenhülle gelb. Die Wurzel war früher officinell, enthält Gerbestoff und wirkt drastisch.

I. sibirica L. *Wiesenschwertel.* Bltt. linealisch, spitzig, kürzer als der steif aufrechte, 2-3blumige Stängel; die äusseren Zipfel der Blumenhülle verkehrt-eifg.; die Kapsel 3kantig.

Auf fruchtbaren feuchten Wiesen in der Ebene zerstreut. Um *Br.* bei *Scheitnich*, *Oswitz*, *Bischofswalde*, *Lissa*, *Tschechnitz* etc. Um *Beuthen*, *Ohlau*, *Oppeln*. *Leutmannsd.* b. *Schweidnitz*. *O. Rathen* bei *Wünschelburg*. Um *Troppau* häufig. Mai, Juni. 2.

Wurzelstock schief, walzenfg., mit schopfliger Faserdecke. Bltt. gerade, 2-3''' breit. Deckbltt. lanzettlich, oben rostbraun. Blumenhülle violett(blau, geadert; sie giebt eine Malerfarbe.

I. graminea L. Bltt. linealisch, länger als der aufsteigende, 2schneidige, meist 2blumige Stängel; die äusseren Zipfel der Blumenhülle mit breitem Nagel und kürzerer, eiförmiger Platte; der Fruchtknoten 6kantig.

Auf Waldwiesen. Am *Tul*, bei *Czeislowitz* und *Brenna* um *Ustron* von *Kotschy* gef. und mitgetheilt. Mai, Juni. 2.

Bltt. bis 2' lang, stark-nervig. Stängel ½-¾' h. Deckbltt. grün mit weisshäutigem Rande. Innere Zipfel der Blumenhülle violett; die äusseren mit blasser, blaugeadeter Platte und purpurblauem Nagel. Blumen wohlriechend.

Amaryllideae RBrown.

Röhre der Blumenhülle mit dem Fruchtknoten verwachsen, Saum 6-theilig häutig mit einem Krönchen am Schlunde. Sechs Staubgefässe. Fruchtknoten 3fächerig, mit vielen Eichen an mittelständigen Samenhaltern. Griffel lang. Kapsel 3fächerig, 3klappig. Keim in fleischigem Eiweiss.

Meist Zwiebelgewächse mit blattlosem Stängel. Blumen endständig, einzeln (od. in Schirmen) mit häutigen, bald vertrocknenden scheidenförmigen Deckbltt.

Narcissus L. *Narzisse*. Blumenhülle mit langer Röhre und gleichmässig-6theiligem Saume, mit einem glockigen Krönchen am Schlunde. Sechs in der Röhre entspringende Staubgef., wovon drei länger und die drei dazwischen stehenden kürzer sind. VI, 1.

N. Pseudo-Narcissus L. Bltt. linealisch ohne Kiel; Schaft 2schneidig einblumig; das Krönchen vorn wellenförmig und ungleichgekerbt, so lang als die Zipfel der Blumenhülle.

Auf Waldwiesen des Vorgebirges. Am *schwarzen Berge* bei *Charlottenbrunn* von *Beinert* gef. und mitgetheilt. Mai. 2.

Stängel bis 1' h., nebst 3 Bltt. von einer weisshäutigen Scheide umschlossen. Blumen wagrecht, blassgelb mit orange-goldgelbem Krönchen. — Das Krönchen sehen manche für eine innere Blumenhülle, andere für umgewandelte Staubgefässe an. Die Blüthen schmecken bitter und schleimig, die Wurzeln wirken ökel- und brechen-erregend.

Leucóion L. *Knotenblume*. Blumenhülle ohne besondere Röhre, in 6 gleichförmige an der Spitze verdickte Zipfel getheilt. VI, 1.

L. vernalis L. Einblumig; d. Griffel keulenförmig.

Auf feuchten und sumpfigen Waldwiesen und in Gehölzen des Vorgebirges bis in die Ebene herabsteigend. *Polgsener Erlenbrüche* bei *Wohlau*. *Baunau* b. *Glogau*. *Hohlstein* bei *Bunzlau*. Um *Charlottenbrunn* am *langen B.* bei *Donnerau*, am *Freudenschlosse*. *Salzbrunn*, *Fürstenstein*, *Gottesberg*, *Jauer*. *N. Langenau* b. *Glatz*. *Spachendorf* und *Hockschar* im Gesenke. März, April. 2.

Wurzel eine weisse rundliche Zwiebel. Lineale hellgrüne Bltt. von dachziegel förmig übereinander liegenden engen Scheiden umgeben. Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h. Blumen überhängend, weiss mit rothgelbem Fleck unter den Spitzen.

Galánthus L. *Schneeglöckchen*. Blumenhülle ohne besondere Röhre, 6theilig; die 3 äusseren Zipfel abstehend, die 3 inneren aufrecht, kürzer. VI, 1.

G. nivalis L.

In Hainen, Vorhölzern und Laubwäldern der Ebene, seltner im Vorgebirge, gesellschaftlich und oft grosse Strecken bedeckend. Um *Br.* bei *Scheitnich* u. *Schwoitsch*, *Arnoldsmühl*, durch d. *Treb-nitzer* Hügelreihe gemein. *Wohlau*, *Ohtau*, *Oppeln*, *Leisnitz*. *Sukko-witz*, *Füllstein*. *Leobschütz*, *Troppau*, *Teschen*. Febr., März. 2.

Tracht der vorigen aber kleiner. Die Blume weiss; die inneren Zipfel ausgerandet mit grüner mondformiger Biade hinter dem Vorderrande und grünen Längsstrichen.

Smilacaceae R. Brown.

Blumenhülle unter dem Stempel, tief 6theilig, selten 4-8 theilig. Sechs oder 4 oder 8 Staubgef., mit aufrechten unbeweglichen nach innen gewandten Staubbeuteln. Der Fruchtknoten 3- selten 2- oder 4fächerig, mit je mehreren Eichen am inneren Winkel. Frucht beerenfg., 3fächerig oder durch Fehlschlagen 1 fächerig, mit je einem oder wenigen Samen. Samen mit dünner Schale und kleinem Keim in dichtem Eiweiss.

Begreift Gewächse von sehr verschiedener Tracht; meist mit söhligem Wurzelstock und häufig mit breiten, gestielten und gedarrten Bltt.

Aspáragus L. *Spargel*. Blumen oft 2 häusig. Blumenhülle glockig, 6 theilig, am Grunde in eine bisweilen stiel-förmige Röhre zusammengezogen. Sechs Staubgef. Drei ungebogene Narben. Fruchtknoten 3 fächerig. Frucht eine 3 fächerige 6 samige Beere. VI, 1.

Die Bltt. an den Zweigen selbst sind schuppenförmig, aus dem Winkel der Schuppe entspringt ein Büschel fadenförmiger Bltt.

A. officinalis L. Stängel krautig; Bltt. kahl, Staubbeutel länglich.

Auf sandigen unbebauten Waldplätzen besonders an Flussufern, d. d. g. G. hin und wieder. Das eigenthümliche auf bestimmte Oertlichkeit beschränkte Vorkommen lässt vermuthen, dass diese Pflanze wirklich einheimisch sei. Juni, Juli. 2.

Stängel 3 - 4' h., stielrund. Blumen weisslich. Beeren roth. — Die jungen aus der Erde hervorbrechenden Stängel geben ein angenehmes Gericht, daher die Pflanze häufig angebaut wird; sie enthalten einen eigenthümlichen Stoff.

Stréptopus Michaux. *Zapfenkraut*. Blumenhülle bis auf den Grund 6 theilig. Sechs Staubgef. Eine stumpfe Narbe. Dreifächerige Beere mit je vielen Samen. VI, 1.

S. amplexifolius De Cand. *Uvularia ampl.* Linn. Bltt. stängelumfassend, kahl.

In Wäldern, auf Waldwiesen, fruchtbaren Lehnen des Hochgebirges hie und da in die tiefere Region herabsteigend. Im *Riesengeb.* häufig. *H. Mense*. *Gl. Schneeberg*. Im Gesenke am *Hockschar* und in den *Schluchten des Altvaters*, im *Kessel*. *Babia Gora*. Ausnahms-

weise im *Wiesenschlunde bei Wachowitz bei Rosenberg*. Juni, Juli. 2.

Wurzel ein knolliger Wurzelstock. Stängel gabelig-getheilt, kahl. Bltt. eifg. Blumenstiele einblumig, gekniet. Blumen hängend, weiss. Zipfel mit auswärtsgebogener Spitze. Beeren roth.

Polygonatum Tournef. Weisswurz. Blumen winkeltständig in einer Traube. Blumenhülle röhrig, sechszählig. Sechs Staubgef. aus der Mitte der Blumenröhre. Griffel einfach. Beere 3 fächerig, 6 samig. VI, 1.

Keine Wurzelbltt. Wurzelstock söhlig, knollenförmig.

P. verticillatum Mönch. *Convallaria vert.* Linné. Stängel aufrecht, eckig; Bltt. quirlständig.

In Laub- und grasreichen Wäldern des Vorgebirges, *Zobten- und Geiersb. Rummelsb. Charlottenbrunn. Sattelwald. Sonnenkoppe. Warmbrunn*. Im *Gesenke* häufig, auch im *Hurkawalde* bei *Gr. Herlitz, Braunsdorf und Jägerndorf. Czantory* bei *Ustron*. Mai, Juni. 2.

Stängel unten rothpunktfirt, 1 - 2' h. Bltt. lanzettlich, langspitzig. Blumen klein, weiss mit grünlichen Zähnen. Beeren roth.

P. anceps Mönch. *Convallaria Polyg.* Linné. *Salomonssiegel*. Stängel eckig; Bltt. wechselständig; Blütenstiele 1 - 2blumig; Staubfäden kahl.

Auf buschigen Hügeln und in Laubwäldern der Ebene u. d. Vorgeb. zerstreut. Um *Br. b. Schwoitsch, Althof, Lissa, Marien Cranst. Wohlau, Hohlstein* bei *Bunzlau, Ohlau, Oppeln* bei *Wienow* u. *Malapane*, im *Gesenke* und um *Teschen. Geiersberg. Hartheberg* bei *Frankenstein, Fürstenstein. Fischerbg.* bei *Polsnitz*. Mai, Juni. 2.

Wurzelstock niedergedrückt, weiss wie bei allen Arten. Bltt. eifg., spitz oder stumpflich, umfassend. Blumen überhängend, weiss mit grünlichen beharteten Zähnen, wohlriechend, doppelt so gross als an der folgenden, einzeln selten 2 an einem Stiel.

P. multiflorum Mönch. Stängel stielrund; Blumen wechselständig; Blütenstiele 2 - 5blumig; Staubfäden haarig.

In schattigen und feuchten Laubwäldern der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Um *Br.* bei *Wildschütz, Lissa, Trebnitz, Koberwitz* etc. Mai, Juni. 2.

Stängel 1 - 2' h., unten aufrecht, oben bogenfg.-übergeneigt. Bltt. gross, eifg., spitz oder stumpf, umfassend. Blumen überhängend, schmal-röhrig, weiss mit grünen Zähnen. Eine besondere Varietät, mit 1 - 2 Deckbltt. an jedem Blumenstiel, fand *Zoellfell* bei *Scheltlich*.

Convallaria L. Springauf. Blumen in endständiger Traube. Blumenhülle glockenförmig 6zählig. Sechs Staubgef. aus dem Grunde der Blumenhülle. Griffel einfach. Beere 3 fächerig 6 samig. VI, 1.

Zwei Wurzelbltt. Blumenschaft blattilos. Wurzelstock walzig, kriechend.

C. maialis L. Blumenschaft halbrund.

In schattigen Wäldern der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G., meist in grosser Menge gesellschaftlich. Mai, Juni. ♀.

H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Zwei gestielte elliptische, beiderseits spitze, nervige, fettglänzende, nebst dem Blumenschaft von purpurrothen Scheiden eingeschlossene Bltt. Blumenstiele einblumig, von kl. schuppenf. Deckbltt. gestützt. Blumen nickend, weiss, wohlriechend. Das Pulver der getrockneten Blumen erregt Niesen. Die Pflanze war unter dem Namen *Lilium convallium* officinell.

Smilacina Desfontaines. Einblatt. Blumen in Trauben. Blumenhülle tief 4- (oder 6) theilig. Vier (oder 6) Staubgef. aus dem Grunde der Blumenhülle. Griffel einfach. Beere 5 fächerig mit je einem Samen. VI, 1.

S. bifolia Desf. *Convallaria bif. L. Majanthemum bif. De Cand.* W. et Gr. sil. Zwei endständige, gestielte, herzförmige Bltt. an der Mitte des Stängels.

In schattigen Wäldern und Vorhölzern der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig, stets gesellschaftlich. Mai, Juni. ♀.

Stängel 3 - 5'' h. unten von kurzen Scheiden umgeben. Achse endständig locker. Blumen kurzgestielt mit kl. schuppenfg. Deckbltt., weisslich, klein. Beeren kugelig, erst weiss und roth punktiert, zuletzt röthlich.

Páris L. Einbeere. Blumenhülle söhlig-ausgebreitet, tief 8 theilig; die inneren 4 Zipfel schmaler. Acht Staubfäden; die Staubfäden am breiteren Grunde unter sich verwachsen. Vier Griffel. Beere 4 fächerig, mit je 4-8 Samen. VIII, 4.

P. quadrifolia L. Vier Bltt. in einem Quirl.

In schattigen Laub- und Nadelwäldern der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. Um Br. in der *Strachate*, bei *Bleischwitz*, *Lissa* und *Arnoldsmühl*, *Skarsine* etc. Mai. ♀.

Wurzel ein walziger söhlicher Wurzelstock. Stängel aufrecht, 1' h., oben 4, selten 5 breit eiförmige, quirlständige Bltt. tragend, welche eigentlich als Deckbltt. anzusehen sind, zwischen denen sich die einzelne gestielte Blume erhebt. Blumenzipfel grünlich, lanzettlich. Narben purpurbraun. Beere kugelig, schwarzblau. Frisch hat die Pflanze einen betäubenden Geruch und ekelhaften Geschmack, und war ehemals officinell. Die Wurzel ist brechenerregend, das Kraut abführend und die Beeren wirken drastisch-narkotisch.

Liliaceae De Candolle.

Die Blumenhülle unter dem Stempel, gefärbt, 6spaltig oder tief 6 theilig. Sechs Staubgef. aus der Blumenhülle oder aus dem Fruchtboden entspringend, mit nach innen gewandten, häufig beweglichen und queraufliegenden Staubbeuteln. Fruchtknoten frei, dreifächerig, mit zahlreichen Eichen in zwei Reihen

an dem inneren Winkel. Griffel einfach, mit einer dreikantigen oder mit 3 Narben. Frucht eine dreiklappige Kapsel; die Scheidewände aus der Mitte der Klappen. Der Keim in einem fleischigen Eiweiss.

Stauden mit zwiebel förmiger, seltner stöhliger oder büscheliger Wurzel und blattlosem Stängel.

1. *Tulipeae*. Blumenhülle fast aus sechs Blättern. Viele Samen in jedem Kapselfach. Samen flach mit heller und zähhäutiger Samenschale.

Túlipa L. *Tulpe*. Blumenhülle tief 6theilig, Zipfel ohne Honiggruben. Dreilappige aufsitzende Narbe. VI, 1.

T. sylvestris L. *Wald-T.* Stängel kahl, einblumig; die Blume vor dem Aufblühen nickend; die inneren Zipfel der Blumenhülle und die Staubgefäße am Gr. bärtig.

Auf grasigen Plätzen in Laub-, besonders Eichen-Wäldern und Gras- und Obstgärten häufig mit *Gagea lutea* und *minima* um alte Bäume, hie und da in der Ebene. Um Br. im *Pilsnitzer Walde*, am *Haseldamme* zw. *Pilsnitz* u. *Kl. Masselwitz*, in Grasgärten in *Pilsnitz*, *Wildschütz*. In *Brieg an der Promenade*. Um *Leobschütz*. Um *Troppau* im *Stremplowitz Park* und bei *Geppersdorf am langen B.* Mai, Juni. 2.

Eiförmige Zwiebel mit brauner Deckhaut. Stängel 1' h. Bltt. mit graugrünem Reif, lineal-lanzettlich. Blume gelb, wohlriechend.

Lilium L. *Lilie*. Blumenhülle tief 6theilig, mit glockig-aufrechten oder mit ungerollten Zipfeln, jeder am Gr. mit einer Honiggrube. Griffel lang; Narbe 3kantig. VI, 1.

L. Martagon L. *Türkenbund*. Bltt. quirlig; Stängel scharflich behaart; Blumen nickend; Zipfel der Blumenhülle zurückgerollt.

Auf freien Waldplätzen, Waldwiesen und Gebirgswiesen, d. d. g. Vorgeb. bis auf das Hochgeb., hie und da auch in der Ebene. Um Br. bei *Arnoldsmühl*, *Riemberg*. *Wohlau*. *Ohtau*. *Slavencicz*. *Leobschütz*. *Geiersberg* u. *Zobtenb.* *Spitzb. b. Probsthain*. *Schlesierthal*. *Jauersberg*. *Sandgeb.* bei *Charlottenbrunn*. *Hausdorfer Geb.* *Reinerz*. *Landeck*. *Gzantory'* bei *Ustron*. Im *Riesengeb.* am *kl. Teiche*, im *Riesengr.* etc. *Gesenke* häufig bis auf den *Petersstein*. Juni, Juli. 2.

Goldgelbe schnppige Zwiebel. Zwei bis drei Quirle elliptisch-lanzettlicher Bltt. am fleckigen Stängel. Blumen in lockerer Aehre, ross-purpurf., gefleckt. Staubbeutel pomeranzengelb.

2. *Asphodeleae*. Blumenhülle fast aus 6 Blättern. Wenige Samen in jedem Kapselache. Samen häufig mit schwarzer krustiger Samenschale.

Anthéricum L. Graslilie. Blumenhülle offen, ohne Honiggefäße. Blumenstiele gegliedert. Staubgef. aus dem Fruchtboden entspringend; Staubbeutel auf d. Mitte d. Rückens befestigt. Samen eckig. VI, 1.

A. ramosum L. Bltt. linealisch, rinnenfg., kürzer als der üstige Blüthenschaft; Blumen in lockerer Rispe; Griffel gerade.

Auf sonnigen bewaldeten Hügeln und hohen Waldwiesen, im Vorgeb. und der Ebene. Um Br. bei *Carlowitz*, *Fuchsbg.* b. *Schwoitsch*, *Lissa*. *Obernigk*. *Weinberg* bei *Ohlau*. *Wohlau*. *Lichtenwaldau* und *Schönfeld* bei *Bunzlau*. *Ohlau*, *Königshuld* u. *Grosstein* bei *Oppeln*. *Geiersberg*. *Hartheberg* bei *Frankenstein*. *Guldau* bei *Teschen*. Juni, Juli. 2.

Schiefer kurzer, faser-schopfiger Wurzelstock. Stängel 1 - 2' h. mit 1 - 4 dünnen, meist abstehenden Aesten. Bltt. grundständig, grasartig. Blumenhülle weiss. Samen mit schwarzer zerbrechlicher Samenschale.

Ornithógalum L. Vogelmilch. Blumenhülle tief 6theilig, halb offen, ohne Honiggefäss. Die Staubgef. entspringen aus dem Fruchtboden; die Staubbeutel auf der Mitte des Rückens befestigt. Narbe stumpf. Blumenstiele einfach. Blumen in einem Strauss oder einer Traube. VI, 1.

O. umbellatum L. Blumen in endständiger Doldentraube; die Frucht weit abstehend mit gerader Spitze; Zipfel der Blumenhülle länglich, stumpf; Staubgefäße einfach; Bltt. linealisch, kahl.

Auf Aeckern, Brachen und Ackerwiesen in der Ebene u. d. Vorgeb. zerstreut. Um Br. bei *Püpelwitz*, *Oswitz*, *Lambsfeld*, *Sibyllenort* und *Dyhrenfurth*. *Wohlau*. *Zechäcker* u. *Schönfeld* bei *Bunzlau*. *Grünberg*. *Jauer*. *Ruppersdorfer Spitzberg*, *Folgenhäuser* bei *Freiburg*, *Kander*, *Rohnstock*. *Leobschütz*, *Stonsdorf*, *Weisskirch*, *Troppau* und *Jägerndorf*. April, Mai. 2.

Zwiebel. Bltt. innen mit weisser Bibbe. Stängel $\frac{1}{2}$ h.; die untersten Blumenstiele verlängert. Blumen grün mit weissem Hautrande.

O. nutans L. Blumen in endständiger zuletzt einseitwendiger Traube hängend; Staubgef. dreizählig.

In Gras- und Obstgärten, auf Aeckern; gew. mit *Gagea minima* und *Tulipa sylvestris*. Um Br. in der *Nikolaivorstadt*, im *Vierthürmegarten* in *Poln. Neudorf*, im *Schlossgarten* zu *Wildschütz*. *Ohlau*. *Warthe* u. *Hohlstein* bei *Bunzlau*. Um *Stremplowitz* u. bei *Teschen*. April, Mai. 2.

Zwiebel. Stängel 1' h. Blumenstiele kurz mit weisshäutigen Deckbltt. Blumen grün mit weissem Hautrande.

Gágea Salisbury. Goldstern. Blumenhülle 6theilig, oben offen, ohne Honiggefäße. Staubbeutel aufrecht. Narbe dreikantig. VI, 1.

Blumen gelb in endständigem Schirm mit stängelblattförmigen Deckbltt. Unter *Ornithogalum* bei Linné.

G. stenopetala Reichenbach. Ein einzelnes, linealisches, beiderseits verschmälertes, ebenes scharf gekieltes Blatt; 2 gegenständige Deckbltt., Blumenstiele kahl, einfach; drei söhligte Wurzelknollen, die beiden jährigen keulenförmig.

Auf trocknen Grasplätzen, an Dämmen, auf trocknen Triften, Ackerrändern und auf Aeckern, in der Ebene n. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. April, Mai, später als *G. lutea*. ♀.

Die 3 Wurzelkn. sind von keifer gemeinschaftlichen Haut umhüllt. Das Wurzelblatt länger als der Stängel. Blumen blassgelb mit lineal-elliptischen Zipfeln, 2 - 3.

G. arvensis Schultes. *Ornith. villosum* MBieb. Zwei linealische, rinnenförmige, stumpf gekielte, oben zurückgeschlagene Blätter; 2 gegenständige Deckbltt.; Blumenstiele schwachzottig, doldentraubig-ästig; Zipfel d. Blumenhülle lanzettlich, spitz; Zwiebel rundlich.

Auf Aeckern unter der Saat hie und da in der Ebene. Um *Bz. b. Scheitnich, Poln. Neudorf, Oswitz, Pilsnitz. Wohlau. Drüssel* und *Kirschnerbg. b. Bunzlau. Oppeln. Bei Friedek* nach R. u. M. April, Mai. ♀.

Die 2 aufrechten Wurzelknollen sind von einer gemeinsamen Haut umhüllt. Bltt. sehr schmal. Stängel und Blütenstiele zottig. Blumen gelb, 4 - 10.

G. bohémica Schultes. *Ornith. boh.* Zauschner. Zwei fadenförmige, rinnenfg. Bltt.; Deckbltt. wechselständig, lanzettlich, mit langer, bisweilen pfriemlicher Spitze; Blumenstiel meist einblumig; Zipfel der Blumenhülle spathelförmig, stumpf; Zwiebel rundlich.

Auf hügeligen steinigen Orten. Um *Troppau* n. v. *Mückusch* und um *Ustron* bei *Teschen* nach *Kotschy*. April, Mai. ♀.

Wurzel der vorigen. H. 1". Blume blassgelb, mit länglichen, vorn breiteren Zipfeln. Der Stängel bald behaart, bald kahl.

G. minima Schultes. *Ornith. min.* Linn. *Ornith. Sternbergii* Hoppe. Ein einzelnes, aufrechtes, linealisches, schwach rinnenförmiges Blatt; ein einzelnes lanzettliches, am Gr. umfassendes Deckblatt; Blumenstiel ästig, kahl; Zipfel der Blumenhülle lineal-lanzettlich langspitzig; Zwiebel eiförmig.

Auf grasigen Plätzen in Gebüsch, Vorhölzern, auf lichten trocknen Waldplätzen, in Obatgärten. Um *Br.* in der *Nikolaivorstadt*, im *Schlossgarten* zu *Wildschütz*, bei *Bruschewitz, Skarsine*, vor *Kl. Totschen. Naitschütz* bei *Beuthen a. O. Kittlitzreben* und *Hohlstein* bei *Bunzlau. Leobschütz*. März, April. ♀.

Zart und schwächig, 2 - 4" h. Wurzel sehr klein. Wächst gew. in dichten Büschen, indem unter vielen bloß blättertragenden Exemplaren sich gewöhnlich nur wenige blühende befinden. Zipfel der Blumenhülle an der Spitze umgebogen.

G. lutea Schultes. *Ornith. luteum* Linn. Ein einzelnes, aufrechtes, lineal-lanzettliches, ebenes, scharf-gekieltes, in eine stumpfe, stielrunde Spitze endigendes Blatt; 2 fast gegenständige

Deckbltt.; Blumenstiel kahl, ästig; Zipfel der Blumenhülle länglich, stumpf; Zwiebel eifg., einfach.

In Gebüsch, an schattigen Dämmen, in Gehölzen und Wäldern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. März, April, diese und die vorige Art fast gleichzeitig, früher als die übrigen. 4.

Zwiebel nur einfach. Stärker als die vorhergehenden, $\frac{1}{2}$ - 1' h.

Scilla L. Meerzwiebel. Blumenhülle tief 6theilig, halboffen oder offen, ohne Honiggefäße. Staubgef. am Gr. der Blumenzipfel entspringend; die Staubbeutel am Rücken befestigt. Narbe stumpf. Samen gerundet. Blumenstiele einfach; Blumen in einer Traube. VI, 1.

S. bifolia L. Zwei lineal-lanzettliche in eine stielrunde Spitze endigende, im Bogen zurückgeneigte Blätter; Schaft stielrund.

Auf Triften. An der *Oder bei Ratibor.* April, Mai. 4.

Zwiebel. Stängel $\frac{1}{2}$ ' h., von den Bltt. scheidig-umschlossen, mit endständiger arblumiger Traube. Blumen blau ohne Deckbltt.

Anmkg. *Sc. amoena*, welche häufig in Gärten kultivirt wird, wtrd von R. u. M. aus der Gegend von *Gr. Herlitz* und *Jägerndorf* aufgeführt, ist aber wahrscheinlich nur aus Gärten entkommen und nicht als eingebürgert zu betrachten.

Allium L. Lauch. Blumenhülle tief 6theilig, offen oder glockig, ohne Honiggefäße. Staubgefäße am Gr. mit den Blumenzipfeln und zugleich unter sich verwachsen; die Staubbeutel in der Mitte des Rückens befestigt. Narbe stumpf. Samen eckig. Blumen schirmförmig, von 1 oder 2 hinfalligen Deckblättern gestützt. VI, 1.

Blumen kopffg. Zwischen den Blumen bilden sich häufig kleine Zwiebelchen, als fehlschlagende Blumenknospen zu betrachten, zuweilen in solcher Menge, dass nur wenige Blumen zur Entwicklung kommen. Der Stängel ist blattlos, doch oft reichen die Scheiden so hoch hinauf, dass die Blattplatten vom Stängel ausgehen. Wurzel bald einfach, bald aus mehreren Zwiebelknollen, bald in einen länglichen oder walzigen Zwiebelkuchen verlängert. Alle Arten enthalten bald mehr, bald weniger, besonders in den Wurzeln, ein scharfes ätherisches Oel von schwach-drastischen Wirkungen, welches Geruch und Geschmack stark reizt, daher sie allgemein als Gewürz für die Küche benutzt werden.

a. Schiefer Wurzelstock trägt die Zwiebeln; Schaft blättertragend; Staubgefäße einfach.

A. Victoralis L. Siegllauch, Allermannsharnisch. Stängel stielrund, nach oben eckig; Bltt. gestielt, lanzettlich oder elliptisch, eben; ein Deckblatt; Schirm kugelig, Staubgef. länger als die Blumenhülle.

Auf moosigen Waldplätzen und grasigen Lehnen des Hochgebirges. Riesengeb. in der *grossen* und *Arnsdorfer Schneegrube*. Gesenke auf der *Bründelhaide*, am *Hockschar* und *Altwater*. Im Bie-

litzer Geb. an der Schindelbaude über Lebnitz. Babia Gora. Juli, Aug. 2.

Langer mit netzförmig-schöpfiger Schale bedeckter Wurzelstock. Bltt. meist drei. Blumen gelblich-weiss. Die Wurzel war ehemals als *Victorialis longa* officinell und galt dem Aberglauben als ein Mittel wider Hieb und Stich.

b. Wurzel zwieblig; Bltt. breit nur aus der Wurzel; Schaft nackt; Staubgefässe einfach.

A. ursinum L. Bärenlauch, Ramisch. Stängel stumpf 3eckig; Bltt. langgestielt, elliptisch-lanzettlich; ein Deckblatt; Blumen lang-gestielt; Staubgef. kürzer als die Blumenhülle.

In feuchten und schattigen Wäldern des Vorgeb. hie und da auch in der Ebene. Um *Br.:* *Schosnitz* bei *Canth.* In Erlenbrüchen bei *Oppeln. Sukkowitzer Wald.* Im Vorgeb.: *Freudenburg* b. *Charlottenbrunn, Sonnenkoppe, Zedlitzbusch bei Striegau. Grunwalder Thal* bei *Reinerz, N. Langenau, Dittersbach u. Schmiedeberg, Greifenstein, Kupferberg.* Am *rothen B.* im Ges. Mai, Juni. 2.

Zwiebeln elliptisch-walzig. Stängel 1 - 1½' h. Schirm locker, 8 - 12 blumig. Blumen weiss.

c. Söhliger Wurzelstock, worauf die Zwiebeln ruhen. Schaft zur Seite des Blattbüschels und sammt diesem von Scheiden umhüllt. Staubgefässe einfach.

A. fallax Don. A. senescens W. et Gr. sil. Schaft oben scharf-eckig, blattlos; Blätter lineal., eben, unterseits mit undeutlichen Nerven ohne Kiel; Schirm rundlich; Staubgef. länger als die Blumenhülle.

Auf sonnigen Felsen bewaldeter Hügel in der höheren Ebene und d. Vorgeb. Zuerst von Schummel am *Geiersberge*, dann am *Sakrauer Berge* bei *Oppeln* von *Grabowski* und am *Spitzberge* bei *Probstheim* von *Schneider* gef. Juni, Juli. 2.

H. 8 - 12". Blumen sattrosearoth.

A. acutangulum Schrader. A. angulosum Matt. et Krock. Schaft oben scharf-eckig; Bltt. lineal., unterseits fünfnervig, der Mittelnerv vorragend und einen starken Kiel bildend; Schirm oben fast eben; Staubgef. so lang als die Blumenhülle.

Auf feuchten tiefliegenden Wiesen der Ebene d. d. g. G. häufig. Juli, Aug. 2.

H. 1'. Blumen purpur-violett. Ist der vorigen sehr ähnlich, aber durch die Blumenfarbe und durch die Blattnerven, auch getrocknet, leicht zu unterscheiden.

d. *Scorodon.* Wurzel zwieblig; Schaft unten blättertragend; Bltt. eben oder stielrundlich, nie röhrig; Staubgef. einfach oder drei am Gr. gezähnt, am Gr. der Zipfel entspringend.

* **A. sativum L. Knoblauch.** Schaft stielrund; Bltt. breit-lanzettlich; eben, schwach-rinnenförmig; Deckbltt. hinfällig, mit langer Schnabelspitze; Schirm zwiebeltragend; Staubgef. je drei am Gr. beiderseits mit einem kurzen Zahne; Zwiebeln gehäuft.

In Südeuropa einheimisch; als Küchengewächs allgemein angebaut. Juli, Aug. 2.

Stängel vor dem Blühen gekrümmt. Bltt. blaugrün. Schirm convex, mit 20 - 30 Zwiebelchen. Blumen blass, selten vollkommen entwickelt. Diese Art besitzt den durchdringend scharfen Geruch und Geschmack im höchsten Grade.

e. *Porrum*. Wurzel zwieblig; Schaft unter blättertragend. Drei Staubgef. breiter, dreitheilig, der mittlere Zipfel trägt den Staubbeutel, die beiden seitlichen sind in eine fädliche, meist gedrehte Spitze verlängert.

* *A. Porrum* L. *Porrey-Lauch*. Schaft stielrund; Bltt. flach; Schirm kugelig; die Zipfel der Blumenhülle am Kiel scharflich; Staubgef. kürzer als die Blumenhülle.

Im südl. Europa einheimisch; bei uns als Küchengewächs angebaut. Juni, Juli. ☉.

Zwiebel länglich, etwas dünn. Blätter kahl oder am Rande gewimpert. Blumen weisslich mit rothem Kiele. Schirm ohne Zwiebeln. Besonders das junge Kraut wird benutzt.

Anmk. Von den verwandten Arten dürfte vielleicht auch *A. rotundum* L. in Schlesien vorkommen.

A. arenarium L. *A. vineale* Koch Syn. Schaft beblättert; Bltt. halb stielrund, auf der Innenseite nach oben rinnenförmig, innen hohl; der Schirm zwiebeltragend; die Staubgef. länger als die Blumenhülle, dreispaltig, die mittlere Spitze länger als der Staubfaden selbst.

Auf Aeckern, Brachen und sandigen Hügeln. *Fuchsberg* bei *Schwöitsch*. Um *Günterwitz* und *Pürbischau*. *Eilauer Felder* bei *Sprottau*. *Oppeln*. *Tarnowitz*. *Leobschütz*. Juni, Juli. 2.

Die Bltt. vor der Entwicklung des Stängels oben spiralisch-gerollt. Schirm gedrängt. Blumenhülle rosaf., auch dunkel-purpuf. und violettroth; bisweilen viele, bisweilen nur wenige Blumen entwickelt.

† *A. Scorodoprasum* L. Schaft beblättert; Bltt. eben, am Rande feinsägezählig-scharf; d. Schirm zwiebeltragend; die Staubgefäße kürzer als die Blumenhülle, dreispaltig; die mittlere Spitze kürzer als der Staubfaden selbst.

An buschigen Dämmen u. Waldrändern, vielleicht nur von angebauten Exemplaren stammend und durch Zufall verwildert. Um *Br.* bei *Kotel*. Um *Leobschütz* von *Schramm* gef. und mitgetheilt. Juni. 2.

f. *Codonoprasum*. Wurzel zwieblig; Schaft beblättert. Staubgef. einfach, aus den Zipfeln der Blumenhülle über dem Gr. entspringend. Zwei Deckbltt., das eine-langschnäbelig.

A. oleraceum L. *A. carinatum* Matt. Krock. Schaft beblättert; Bltt. röhrig, oberseits flach oder schwach-rinnenfg., unterseits von erhabenen Nerven eckig; Schirm zwiebeltragend; Staubgefäße einfach, so lang als die Blumenhülle; die Zipfel d. Blumenhülle stumpf mit einem Spitzchen, offen-glockig.

In Gebüsch und zwischen Gesträuch, an Hecken, buschigen Dämmen, Waldrändern d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Um *Br.* bei *Scheitnich, Bischofswalde, Oswitz* etc. Juni, Juli. 2.

H. 1 - 2'. Zur Blüthezeit sind die Bltt. gewöhnlich vertrocknet. Blumen langgestielt, weissgrünlich, mit röthlichem oder bräunlichem Anlauf. Meist sind nur wenige Blumen entwickelt.

× *A. carinatum* Smith. Schaft blättertragend; Bltt. eben; Schirm zwiebeltragend; Staubgef. einfach länger als die Blumenhülle; Zipfel der Blumenhülle gestutzt oder ausgerandet, oben gegeneinandergeneigt.

In Gebüsch. *Bei Cudowa.* Juli. 2.

So unterschied ich früher diese Form, welche ich jetzt nicht mehr zu vergleichen Gelegenheit habe, von dem ähnlichen *A. oleraceum*. Anders bei Koch Syn. Vielleicht ist unsere Pflanze doch nur eine Varietät der vorigen.

g. *Schoenoprasum*. Wurzel zwiebelig. Stängel am Gr. blättertragend. Bltt. röhrig. Zwei kurze Deckbltt.

* *A. Schoenoprasum* L. *Schnittlauch*. Schaft blattlos; Bltt. linealisch-pfriemlich, stielrund, röhrig; Deckbltt. so lang als der Schirm; Zipfel der Blumenhülle eilanzettlich, spitz; Staubfäden am Gr. häutig-verbreitert, ungezähnt; Kapsel scharf-dreikantig.

An Flussufern im westlichen Deutschland; bei uns als Gemüspflanze häufig angebaut. Juni, Juli. 2.

H. 6 - 10". Der Stängel nur wenig am Gr. beblättert. Zipfel der Blumenhülle rosaf., fast eifg., in der Mitte etwas breiter. Staubbeutel gelb. Kapsel mit scharfen Kanten und schwach-eingedrückten Flächen.

A. sibiricum Willdenow. Schaft am Grunde blättertragend; Bltt. linealisch-halbrund, nach oben plattgedrückt, röhrig; Deckbltt. so lang als d. Schirm; Zipfel d. Blumenhülle länglich-lanzettlich mit umgebogener Spitze; Staubfäden pfriemlich, ungezähnt; Kapsel stumpf dreikantig.

Auf quelligen Stellen und an Bächen des Hochgebirges. Im *Riesengeb.* am *kl. Teiche*, im *Riesengrunde*. Im *Gesenke* auf den *Knoblauchwiesen* am *Altwater* und *Peterssteine*, im *Kessel*. Juni, Juli. 2.

Fast in allen Theilen doppelt so gross als die vorige, daher in der Tracht sehr abweichend, weniger in den Merkmalen. Ob die zur Unterscheidung hier festgehaltenen sich beständig erweisen werden, muss fernere Beobachtung lehren. — Die Staubbeutel lilaf. Zipfel der Blumenhülle rosa-lilaf., fast purpurroth, mit violettem Kiel. Auch in der Gestalt der Zellen und Spaltöffnungen der Oberhaut zeigt sich diese Form von gebauten Expl. der vorigen verschieden. Im *Supagr.* auch mit weissen Blumen nach Krause; desgl. am *Altwater*.

* *A. ascalonicum* L. *Schalotten*. Stängel am Gr. beblättert; Bltt. pfriemlich-stielrund, röhrig; Deckbltt. kürzer als der bisweilen zwiebeltragende Schirm; Staubgef. am Gr. beiderseits mit einem Zahne versehen.

Im Orient heimisch, wird angebaut. Juli, Aug. 2.

Schirm kugelig. Kommt selten zur Blüthe. Blumen lilafarben. Die Zwiebelchen im Schirm dienen als ein feines Gewürz.

* *A. Cepa* L. *Zwiebel, Zipollen*. Stängel am Gr. beblättert, unter der Mitte bauchig-aufgeblasen; Bltt. röhrig, bauchig; Schirm kugelig; 3 Staubgefässe, am Gr. beiderseits mit einem Zahne.

Wird allgemein angebaut. Juni, Juli. 2.

Blumen weiss. Zwiebel etwas niedergedrückt, gelbhäutig.

* *A. fistulosum* L. *Winterzwiebel*. Stängel am Gr. beblättert, in der Mitte aufgeblasen; Bltt. röhrig, bauchig; Schirm kugelig; Staubf. ungezähnt.

Wird angebaut. Juni, Juli. 2.

Zwiebeln länglich, gehäuft. Blumen grünlich-weiss.

Anmk. In Koch Synops. wird *Allium descendens* L. von Gnadensfeld in OS. angeführt; ich sah noch kein Exemplar dieser Art.

3. *Hemerocallideae*. *Blumenhülle nicht bis zum Grunde getheilt. Kapselächer mit wenigen Samen mit schwarzer Samenschale.*

Muscári Tournefort. *Schopfhyazinthe*. Blumenhülle kugelig eiförmig oder walzig, vorn zusammengeschnürt, mit sehr kurzem 6 zähni gem Saum. VI, 1.

M. comosum Mill. *Hyacinthus com.* L. Die Blumenhüllen eckig-walzig, die unteren entfernt, söhlig-abstehend; die oberen aufrecht, gedrängt, leer, einen Schopf bildend; die Bltt. linealisch-rinnenfg.

Auf trocken etwas sandigen Triften, an Rainen und Ackerrändern, in der Ebene zerstreut und vereinzelt. Um *Br.* vor *Oswitz, Oltaschin, Mirkau, Masschwitz, Lissa, Trebnitz, Peilau, Warthe* am Bober. *Folghäuser* bei *Freiburg, Lomnitz* und *Mainwaldau, Eisersdorf* bei *Glaz, Troppau* bei *Stremplowitz, Johannsfeld* und *Milostowitz*. Um *Konska* und *Lischna* bei *Ustron*. Mai, Juni. 2.

Die eiförmige Zwiebel steckt sehr tief. Blumen in langer Aehre, kurz-gestielt, braunpurpurf. mit grünlichem Rande, die obersten ohne Stempel und Staubgef., länger-gestielt, violettblau.

M. racemosum Miller. Blumen eig., nickend, gedrängt, die obersten aufrecht, leer; Bltt. linealisch, rinnenförmig, zurückgebogen.

Auf Aeckern, Wiesenplätzen, in Weinbergen. Wird um *Grünberg* und *Beuthen a. O.* angegeben. Bei *Stremplowitz* und auf Rasenplätzen im *Herlitzer Park*, vielleicht verwildert. Mai. 2.

Zwiebel eig.-rundlich. Blumen in kurzer Aehre, sattblau mit weisslichen Zähnen.

Colchicaceae De Cand.

Blumenhülle sechsspaltig oder tief 6theilig mit eingeschlagener Knospenlage. Sechs Staubgefässe; die Staubbeu-

tel nach aussen gewandt. Fruchtknote frei, 3 fächerig, mit 3 Griffeln. Frucht eine Kapsel, welche sich in drei schlauchförmige Kapseln löst, mit zahlreichen Samen am inneren Winkel. Samen mit dünnhäutiger Samenschale; Keim in fleischigem Eiweiss.

Die erste Sippe weicht in Tracht und Wuchs bedeutend von den beiden folgenden ab.

Cólchicum L. Zeitlose. Blumenhülle trichterförmig, mit langer Röhre; an deren Spitze sechs Staubgefässe entspringen. Ein Fruchtknoten mit drei Griffeln. Kapsel aufgeblasen; die Fächer trennen sich von einander und springen an der Spitze auf. VI, 3.

Der Fruchtknoten liegt innerhalb der Zwiebel, und im Herbst bricht die Blume ohne Bltt. nur mit den Staubgef. und dem langen Griffel über die Erde hervor. Die Frucht mit den Bltt. kommt dann im nächsten Frühjahr über der Erde zum Vorschein.

C. autumnale L. Nackte Jungfer. Blätter spitz.

Auf feuchten Wiesen in der Hügellage der Ebene und im Vorgebirge, meist gesellschaftlich und oft grosse Flächen bedeckend. Um Br. bei Mahlen und Koberwitz. Bresa bei Bohrau. Um Trachenberg, Ohlau, Strehlen, Rothschloss, Reimsbach bei Charlottenbrunn, Freiburg, Glaz, Bolkenhain, Rohrbach, Schmiedeberg. Proskau in OS. Um Troppau bei Dürstenhof, Lodnitz, Dorfteschchen und um Teschen. Blüht im Sept. und Oct., Bltt. u. Früchte im Mai und Juni. 2.

Zwiebel in braune Deckhaut gehüllt, 1 - 2 Blüthen bringend. Blumen rosa-lilaf. Bltt. breit-lanzettlich. Früher war die Wurzel, neuerdings sind auch die Samen und Blüthen officinell. Die Wurzel enthält Veratrin und ist eins der gefährlichsten Gifte, ist aber durch seine drastischen Eigenschaften ein wirksames Arzneimittel.

Veratrum L. Germer. Blumenhülle tief 6theilig. Staubbeutel quer in 2 Klappen aufspringend. Drei am Grunde verbundene, vielsamige Kapseln, mit zusammengedrückten Samen. XXIII, 1.

Stäng. beblättert; Blumen in rispigen Trauben, durch Fehlschlagen oft polygamisch.

V. Lobelianum Bernhardi. Aeste weichhaarig; Bltt. elliptisch, nervig; die unteren auf einer gestutzten Scheide sitzend.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen, an sumpfigen Lehnen und in Wäldern des Hochgebirges bis in das Vorgebirge herabsteigend. Verbreitet auf den Kämmen und in der oberen Waldregion des Riesengeb., Gesenkes, Gl. Schneeberges bis in den Klessengrund. An der h. Mense, Heuscheuer, Sonnenkoppe. Um Kupferberg. OS. bei Slavenczicz. Hertz bei Troppau. Czantory und Baranio bei Teschen. Juli, Aug. 2.

Blüht nur in höheren Gegenden. Wurzelstock kurz, stark, innen weiss mit starken Fasern. Stängel 2 - 4' h., stark, stielrund, röhrig, oben schwach-zottig. Bltt.

nervig-gefaltet. Blumen ausgebreitet, grün; Zipfel länglich, spitz. — Wurde sonst als Abart des weissblühenden *V. album* angesehen, das bei uns nicht vorkommt. — Die Wurzel ist als *R. hellebori albi officinell*, von brennend-scharfem Geschmack und giftiger Wirkung.

Tofieldia Hudson. Toffeldie. Blumenhülle tief 6 theilig. Staubbeutel der Länge nach aufspringend. Drei bis über die Mitte verbundene, vielsamige Kapseln mit länglichen Samen. VI, 1.

Stängel fast blattlos; Blumen in endständiger dichter Traube.

T. calyculata Wahlenberg. *Anthericum cal.* Linn. Jeder Blumenstiel hat 2 Deckbltt., ein längliches am Grunde, ein klappiges kelchartiges nahe unter der Blume, Blätter vielnervig.

Auf sumpfigen und torfhaltigen Wiesen in der höheren Ebene und d. Vorgebirge. Um *Br.* bei *Riemberg* schon von *Matt.* gef. *Wohlau.* *Greulich,* *Hosenitz* und *Tiefenfurth* bei *Bunzlau.* Am *Geiersberge.* *OS.* um *Slavenczicz,* *Ludwigsdorf* bei *Creuzburg;* *Matskirch,* *Leobschütz.* *Schlackau* bei *Troppau* n. v. *Mückusch.* Juli, August.

Wurzel büschel-faserig. Bltt. grasartig, sehr spitz, fast alle grundständig. Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h., einfach. Blumen klein, blassgelb.

Junceae R. Brown.

Blumenhülle tief 6 theilig, trockenhäutig. Sechs oder drei Staubgef. hinter den äusseren Zipfeln der Hülle, aus deren Grunde entspringend; Staubfäden pfriemlich, Staubbeutel aufrecht. Ein Griffel mit 3 haarigen Narben. Frucht eine 3 klappige Kapsel, entweder mit drei aus der Mitte der Klappen entspringenden Scheidewänden, daher 3 fächerig und vielsamig, oder ohne Scheidewände daher einfächerig und dreisamig. Samen mit häutiger oft an den Enden schwammig aufgetriebener Schale und walzigem Keime in fleischigem Eiweiss.

Kräuter oder staudenartige Gew. mit schafförmigem Stängel, tutenförmigen Blatt-scheiden. Blätter schmal und die Platte oft unansehbildet, flach oder röhrig und dann geknötelt. Blumen in Trugdolden mit je zwei genäherten, doch nicht gegenständigen Deckblättchen an jedem Haupt- und Nebenaste derselben; immer neben einem Knäuel sitzender Blüthen an der Spitze eines Astes entspringt noch ein kurzer, seitlicher, knäueltragender Stiel; diese Form wird eine *Spirre* genannt. Mehrere Arten dieser Familie sind nur höheren Regionen eigen.

Juncus L. Binse. Kapsel dreifächerig, vielsamig. VI, 1.

a. Unfruchtbare pfriemliche Stängel neben den blühetragenden, am Gr. von blattlosen oder stachelspitzigen Scheiden umhüllt. Sa-

menschale ohne Auftreibung. Die Spirre scheinbar seitlich, indem das untere Deckblatt aufrecht steht und sich als Fortsetzung des Stängels darstellt.

J. effusus L. Schaft blattlos, ganz glatt, mit dichtem Mark erfüllt; blattlose Scheiden an der Wurzel; Spirre seitlich mehrfach-zusammengesetzt, gedrängt; Zipfel der Blumenhülle lanzettlich, mit vertieftem Kiel; das untere Deckblatt am Gr. eingeschnürt; Samen eiförmig.

β. conglomeratus. Die Spirre besteht aus genäherten und dichten Knäueln.

Auf feuchten unfruchtbaren Plätzen, an und in Gräben, Teich- und Flussrändern, auf sumpfigen Triften, in Lachen, auf Haide- und Waldplätzen d. d. g. G. bis an das Hochgeb. gemein. Juli, Aug. 2.

Söhlig-kriechender Wurzelstock. Halme steif aufrecht, gedrängt, mit braunen oder braunrothen Scheiden am Gr. Drei Staubgefäße. — Der Halm ist von einem feinen, weissen Mark erfüllt, das zu Lampendochten und Spielwerk gebraucht wird, und in Milch gekocht ein ausgezeichnet wurmtreibendes Mittel ist.

J. conglomeratus L. Halm nackt, fein-gestreift, mit dichtem Mark erfüllt; blattlose Scheiden an der Wurzel; Spirre seitlich mehrfach-zusammengesetzt, gedrängt; Zipfel der Blumenhülle lanzettlich ohne Vertiefung am Kiel; das untere Deckblatt am Gr. aufgeblasen; Samen länglich.

β. effusus. Die Spirre besteht aus lockeren, etwas entfernten Knäueln.

Mit der vorigen an gleichen Orten und häufig in deren Gesellschaft bis auf das Hochgebirge, gemein. Juli, Aug. 2.

Wie die vorige Art meist mit lockerer, so erscheint diese meist mit gedrängter Spirre; doch kommt jede auch auf die entgegengesetzte Weise vor, wodurch die Unterscheidung derselben schwieriger wird.

J. glaucus Ehrhart. Halm nackt, tief gestreift, von fächerig-unterbrochenem Mark erfüllt; blattlose Scheiden an der Wurzel; die Spirre seitlich mehrfach-zusammengesetzt, gedrängt; Zipfel der Blumenhülle lanzettlich; Griffel deutlich; Kapsel länglich-elliptisch, stumpf mit einer Stachelspitze.

Wie die vorige, aber seltner. Juli, Aug. 2.

Halme 2 - 3' h., graugrün. Scheiden braun-purpurroth, glänzend. Etwas schlanker und dünner als die vorigen. Sechs Staubgefäße.

J. filiformis L. Halm nackt, fadenförmig, oben übergeneigt, glatt; blattlose Scheiden an der Wurzel; die Spirre seitlich armblumig; Zipfel der Blumenhülle lanzettlich; Griffel sehr kurz; Kapsel rundlich mit kurzer Stachelspitze.

Auf sumpfigen Wiesen und in den Mooren des Vor- und Hochgebirges. Um Warmbrunn und Schreibershau. Riesengebirge. Heuscheuer. Gl. Schneeberg. Gesenke. Klokaczgeb. Juni, Juli. 2.

Viel schwächer und niedriger als die drei vorigen. Halm fadendick; die Verlängerung desselben über der Spirre ist oft länger als der Halm selbst. Blumen gelblich-grün. Höhe bei 1'. Bisweilen tragen die Scheiden ein kurzes, rinnenförmiges Blatt.

b. Unfruchtbare Blätterbüschel neben den blüthetragenden Halmen. Blumen kopfförmig oder einzeln, endständig. Samenschale aufgetrieben.

I. trifidus L. Halm nackt, fadenförmig, am Gr. von Scheiden umhüllt, wovon die oberste ein kurzes, pfriemlich-rinnenförmiges Blatt trägt; 2-3 wechselständige borstliche Deckbltt. an der Spitze.

Auf feuchten steinigten Plätzen der Kämme und Lehnen des Hochgebirges, an Wasserfällen und Bächen. Im Riesengeb. an der *Schneekoppe*, *Koppenplan*, *Schneeegrubenränder* etc. Im Gesenke am *Köpernik*, der *Bründelhaide*, dem *Altwater*, *Peterssteine*. Juli, Aug. 2.

In dichten Basen, 4-8" h, Bltt. meist rostbraun. Ein weisshäutiges zerschlitzenes Blatthütchen. Blumen braun. Kapsel dunkel kastanienbraun, länglich stumpf, so lang als die Blumenhülle, mit eiförmigen Klappen.

c. Unfruchtbare Blätterbüschel neben den blüthetragenden Halmen. Blumen in einem einzelnen oder mehreren in eine rispige Spirre geordneten, endständigen Köpfchen. Samenschale nicht aufgetrieben.

I. capitatus Weigel. Halm nackt, Wurzelbltt. borstlich, am Gr. rinnenförmig; ein einzelnes endständiges oder auch noch ein und das andere gestielte Köpfchen; Zipfel der Blumenhülle eilanzettlich, feinspitzig, länger als die eiförmige stumpfe Kapsel.

Auf feuchten Sandplätzen und sandigen Aeckern, in der Ebene zerstreut. Um *Br.* bei *Friedwalde*, *Petersdorf* bei *Oswitz*, hinter *Kl. Bischwitz*, *Lissa*, *Chmielowitz* bei *Oppeln*. *Jakobsvalde*. *Karlsberg* a. d. *Mora*. *Teschen*. Juli, Aug. 2.

H. 1-4". Stängel fädlich. Drei Staubgef.

? **I. obtusiflorus Ehrhart.** Halm beblättert; Scheiden und Bltt. stielrund, röhrig-geknötelt; Spirre endständig, mehrfach zusammengesetzt, ausgebreitet, die seitlichen Aeste niedergebroschen; Zipfel der Blumenhülle gleichförmig, vorn gerundet, so lang als die eiförmige spitze Kapsel.

Auf torfigen Wiesen. Von dieser Art sah ich bisher nur ein einziges Exemplar, angeblich aus der Gegend von *Gnadenfeld* b. *Oppeln*. Obwohl die Botaniker jener Gegend dieser Angabe widersprechen, führe ich doch diese Art hier auf, da auch sie höchst wahrscheinlich bei uns vorkommt. Juli, Aug. 2.

H. 1-2'. Blumen weisslich-grün.

I. sylvaticus Reichard. *I. acutiflorus Ehrh.* W. et Gr. sil. Halm steif-aufrecht, beblättert; Scheiden und Bltt. rundlich-zusammengedrückt, röhrig-geknötelt, mit aussen deutlichen Querwänden; Spirre endständig, mehrfach-zusammengesetzt; Zipfel der Blumenhülle spitzig-begrannt, die inneren länger an der Spitze zurückgebogen, kürzer als die eig. spitz-geschnäbelte Kapsel.

Auf sumpfigen Waldplätzen, feuchten unfruchtbaren Haideplätzen, sumpfigen und torfhaltigen Waldwiesen, in der Ebene u. d. Vorgeb. zerstreut, an den geeigneten Plätzen häufig und zahlreich. Um *Br.*

bei *Carlowitz, Lissa, Riemberg, Wohlau, Bunzlau, Kl. Silsterwitz, Oppeln, Troppau, Jägerndorf*. Juli, Aug. 2.

H. 1 - 3'. Blumen braungelb, rostbraun bis in das braunschwarze. Seitliche Aeste der Spirre niedergebroschen. Im Schatten zuweilen erbleichen.

I. atratus Krock. sil. Nr. 539. 1787. *I. melananthos* Rchb. Wimm. Fl. v. Schl. *I. acutiflorus* γ. W. et Gr. sil. Halm im Bogen aufgerichtet, beblättert; Scheiden und Bltt. rundlich-zusammengedrückt, röhrig-geknötelt, mit aussen undeutlichen Querwänden; Spirre endständig, mehrfach-zusammengesetzt, ausgebreitet; Zipfel der Blumenhülle fast gleich gross, lanzettlich, so lang als die eiförmige zugespitzte Kapsel.

Auf nassem Lehm Boden, in Gräben und Lachen der *Breslauer* Gegend zerstreut, bei *Scheitnich, Ransern, Schwöitsch, Bleischwitz*. Juli, Aug. 2.

H. 1 - 3' Halm und Bltt. stärker und dicker als an dem vorigen, aber weniger steif, lebhafter grün, der Länge nach fein gestreift. Blumen glänzend schwarz, fast doppelt so gross als an d. vorigen. Narben rosa- und purpürroth.

I. articulatus L. *I. lamprocarpus* Ehrhart. W. et Gr. sil. Halm aufsteigend, beblättert; Scheiden und Bltt. rundlich zusammengedrückt, röhrig-geknötelt, mit deutlichen Querwänden; Spirre endständig, mehrfach-zusammengesetzt, mit abstehenden oder ausgesperrten Zweigen; Zipfel der Blumenhülle gleich lang, lanzettlich stachelspitzig, die äusseren spitz, die inneren stumpf, kürzer als die eilanzettliche stachelspitzige Kapsel.

Auf feuchtem Lehm- und Sandboden, an Lachen u. Rändern von Gewässern, in Gräben, Löchern, auf sumpfigen Wiesen und Heideplätzen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juli, Aug. 2.

Halme stets bogenförmig, bisw. am Gr. warzelnd. Blumen erst grünlich, dann kastanienbraun, glänzend, in d. Grösse etwas veränderlich. Bisweilen auch im Wasser mit stehendem Stängel. Dieser Art als der gemeinsten und verbreitetsten, die Linné als α, folglich Hauptform, aufführt, scheidet mit Recht der Linnéische Name zu verbleiben.

I. alpinus Villars. *I. fuscoater* Schreber. W. et Gr. sil. Halm aufrecht, beblättert; Scheiden am Rücken gekielt; Bltt. röhrig-geknötelt mit deutlichen Querwänden; Spirre endständig, zusammengesetzt, mit aufrecht-abstehenden Aesten; Zipfel der Blumenhülle gleich lang, stumpf, die äusseren unter der Spitze stachelspitzig, kürzer als die eig.-längliche stachelspitzige Kapsel.

Auf sumpfigen Wiesen, an Teichrändern. Um *Br. zw. Kryzanowitz* und *Gr. Rake*, und bei *Lissa*. Am Fusse des *Geiersberges* bei *Kl. Silsterwitz*. Bei *Oppeln*. Am Fusse der *Heuscheuer* bei *Kaltwasser*. Um *Troppau* bei *Zattig, Dorftleschen* und *Spachendorf* nach R. u. M. Juli. 2.

H. bei 1'. Stängel schwach-gekrümmt, aber nie aufsteigend. Durch die aufrechte Spirre leicht kennlich. Blumen rostbraun.

I. supinus Mönch. *I. uliginosus* Roth. W. et Gr. sil. Halm fadenförmig; Bltt. fast borstlich, oberseits schmal-rinnenfg., unter-

seits erhaben; Spirre endständig mit verlängerten, meist einfachen Zweigen und entfernten Knäueln.

α. terrestris. Halme aufrecht oder aufsteigend, Spirrenäste kurz.

β. repens. Halme kriechend n. wurzelnd, Spirrenäste länger.

γ. sulcatus. Halme langgestreckt, stehend; Spirre weitläufig.

Auf sumpfigen Wiesen, Wald- und Haideplätzen, an Teichrändern, nassen Aeckern; *γ.* im Wasser; in der Ebene u. d. Vorgeb. nicht selten. Um *Br.* bei *Wildschütz, Lissa, Garsuche* bei Ohlau. *Wohläu. Buntzau. Swibedove* bei Militsch. *Oppeln.* Am *Hochwalde.* Um *Hernsdorf. Thomasdorf* im Gesenke. Juli, Aug. 2.

Ähnliche Varietäten kommen auch bei andern Arten vor, aber bei dieser am häufigsten und deutlichsten; H. 2" - 1'. Blumen grünlich.

c. Unfruchtbare Blätterbüschel neben den blüthetragenden Halmen. Blumen vereinzelt, entfernt, oder doldentraubig in einer Rispe. Samenschale nicht aufgetrieben.

I. squarrosus L. Halm schwach-eckig, am Gr. von Blattscheiden umschlossen; Bltt. linealisch-rinnenfg., abstehend starr; Spirre endständig mit doldentraubigen Aesten; Zipfel der Blumenhülle spitz oder stumpflich, so lang als die umgekehrt-eiförmige, stumpfe, stachelspitzige Kapsel.

Auf Sumpfmöos (*Sphagnum*) in Haiden, auf Torfwiesen, in der Ebene bis auf das Gebirge häufig. Um *Br.* bei *Friedewalde, Lilienthal, Lissa, Riemberg* etc. Juli, Aug. 2.

H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Die Bltt. stehen wagerecht ab, sind starr und steif. Deckbltt. weisshäutig. Blumenhüllen und Kapseln hell scherbenbraun, wie reifer Hirsesamen.

I. bulbosus L. Halm zusammengedrückt, beblättert; Bltt. linealisch, rinnenfg.; Spirre endständig, zusammengesetzt, mit aufrechten Aesten; Zipfel der Blumenhülle eifg.-länglich, stumpf, bei der Reife kürzer als die fast kugelige Kapsel.

Auf nassen Triften und Wiesen, an Teichrändern, d. d. g. häufig. Juli, Aug. 2.

Halme dünn, biegsam, von 4 - 12' H., meist mit einem Blatt in der Mitte. Narben rosenroth. — Gewöhnlich unterscheidet man von dieser Art noch den *I. Gerardi* Loiseleur, (*I. bottnicus* Wahlenberg, *I. consanguineus* Koch und Ziz), dessen Blumenhülle die länglich-ovale dreikantige Kapsel an Länge erreicht. Nach unserer Beobachtung ist dieser Unterschied nicht begründet.

I. bufonius L. *Krötenbinse.* Halm beblättert; Bltt. borstlich, am Gr. rinnenfg; Aeste der Spirre verlängert, 2spaltig, aufrecht; Blumen einzeln, entfernt; Zipfel der Blumenhülle lanzettlich, spitzig, länger als die längliche stumpfe Kapsel.

Auf feuchtem Sandboden, Gräben, Aeckern, überall häufig. Juni bis Sept. ☉.

H. 1" - 1'. Bald grün, bald bräunlich, und in der Höhe und der Vertheilung der Blumen veränderlich. Gewöhnlich keimen die Samen haufenweise und das junge Stängelchen trägt an der Spitze die braune Samenschale, so dass man irgend ein cryptogamisches Gewächs vor sich zu sehen glaubt.

Anmkg. Nach Tausch kommt *I. Tenageia* bei *Buschvorwerk* bei *Schmiedeberg* und nach *Babenhorst* um *Niesky* vor. Exemplare sah ich noch nicht, zweifle aber nicht, dass die Pflanze noch öfter in Schlesien gefunden werden wird.

Lúzula De Candolle. Marbel. Kapsel einfächerig mit drei Samen am Grunde der Klappen. VI, 1.

Bltt. eban. Unter *Juncus* bei Linné.

L. pilosa Willd. *L. vernalis* De Cand. *Juncus Luzula* Krock. sil. Samen mit einem sichelförmigen Anhängsel an der Spitze; Spirre doldentraubig, ziemlich einfach mit dreiblumigen Aesten, die oberen später zurückgeschlagen; Blumen einzeln; Wurzelbltt. lanzettlich.

In Kiefer- und Laubwäldern der höheren Ebene u. d. Vorgebirges. Um *Br.* in der *Trebnitzer* Hügelreihe, bei *Mahlen*, *Glauche*, *Skarsine*, *Trebnitz* etc. Um *Bunzlau* bei *Warthe*, *Drüssel*, *Krauschen*, *Wehrau*. *Kupferberg*. *Hirschberg*. *Troppau*. *Teschen*. April, Mai. ♀.

H. 1'. Bltt. am Gr. mit zerstreuten langen weichen Haaren, zuletzt fast kahl und breit-lanzettlich. Blumenhülle kastanienbraun mit weissem Hautrande. Blüht noch vor der vollständigen Entwicklung der Bltt., welche später viel grösser u. glänzend werden.

L. maxima De Cand. *Lechel*. Spirre mehrfach-zusammengesetzt, länger als die Deckbltt., mit ausgesperrten Aesten; Zipfel der Blumenhülle stachelspitzig, so lang als die Kapsel; Staubfäden sehr kurz; Bltt. lineal-lanzettlich, am Rande haarig.

In Bergwäldern des Vor- und Hochgebirges. Im Riesengeb. einzeln in d. *Melzegrube*, in den *Schnee gruben*, am *Zackenfall* und in der *Kesselgrube* nach N. v. E. *Saatwiesen* bei *Landeck*. *Gl. Schneeberg*. *Gesenke* am *Leiterberge*, *Altwater*, *Kessel* etc. häufig. *Baranio* bei *Teschen*. Mai, Juni. ♀.

Diese Art heisst bei den Bewohnern des Gesenkes *Lechel*, ist die grösste ihrer Sippe, mit langen breiten glänzenden und dicklichen Bltt.; von 1 - 3' H. Gewöhnlich sind die Stiele 3blumig; es giebt aber eine Varietät mit sehr weilkäufiger Blüthe und einblumigen Stielen; jene ist gelbbraun, diese blass-weissgrün.

L. spadicea De Cand. Spirre mehrfach zusammengesetzt, länger als die Deckbltt., Aeste abstehend; Stiele nach oben bogig, 3-4blumig; Zipfel der Blumenhülle stachelspitzig, so lang als die Kapsel; Staubfäden 4mal kürzer als die Staubbeutel; Griffel so lang als der Fruchtknoten; Bltt. lanzettlich-linealisch, am Gr. bärtig.

Auf Felsgerölle im Hochgebirge. *Gipfel der Babia Gora* um 4500'. Juni, Juli. ♀.

Stängel schlank, schlaff, 1' h. Deckbltt. rothbraun. Blumen schwarzbraun.

L. albida De Cand. *Juncus niveus* Krock. sil. Spirre mehrfach-zusammengesetzt, kürzer als die Deckbltt.; Aeste abstehend; Stiele 3-4blumig; Zipfel der Blumenhülle spitz, länger als die Kapsel; Staubfäden ganz kurz; Bltt. linealisch, am Rande haarig.

β. *rubella*. Blumen rüthlich oder kupferfarben.

Auf sonnigen Hügeln und lichten Waldplätzen im Vorgebirge d. d. g. G. häufig. *Zobtenberg, Rummelsberg, Kosemitzer B., Schlesiethal* etc. bis auf das Hochgeb. Juni, Juli. 2

Stängel 2 - 3' h., etwas aufsteigend. Bltt. schmal, stark-behaart.

L. campestris De Cand. *Hasenbrodt*. Blütenähren eifg., schirmfg., theils sitzend, theils gestielt; die letzteren zuletzt übergeneigt; Zipfel der Blumenhülle spitz, länger als die rundliche stachelspitzige Kapsel; Staubfäden 6mal kürzer als die Staubbeutel; Bltt. am Rande haarig, zuletzt kahl; Wurzelstock schief.

Auf Triften u. Wiesen d. d. g. G. gemein. April, Mai. 2.

Stängel 2 - 6'' h. Blütenstand bisweilen fast kopffg. Bei dieser und der folgenden ist die Samenschale am Gr. aufgetrieben.

L. multiflora Lejeune. *L. campestris* β et γ W. et Gr. sil. Blütenähren eifg., schirmfg., theils sitzend, theils gestielt; die Stiele steif; Zipfel der Blumenhülle spitz, länger als die rundliche stachelspitzige Kapsel; Staubfäden fast so lang als die Staubbeutel; Bltt. am Rande haarig; zuletzt kahl; Wurzel büschel-faserig.

β . *nigricans*. Ähren schwarzbrann; Bltt. fast kahl. *L. campestris* δ *nigricans* W. et Gr sil. *L. sudetica* Willdenow.

In Hainen, Vorhölzern, lichten Laub- und Nadelwäldern, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb. β . auf den Triften u. Wiesen der Gebirgskämme. *Riesengeb. Koppelman* etc. Gesenke am *Allwater*, im *Kessel*, am *Köpernik*. Mai, Juni. 2.

Hauptsächlich durch die längeren Staubfäden von der vorigen Art, womit wir sie früher vereinigten, zu unterscheiden. Vielleicht ist die auf den Gebirgskämmen vorkommende Form auch noch als Art zu unterscheiden; wenigstens zeigt die aufgetriebene Stelle der Samenschale eine abweichende Form. Diese Art ist höher und schlanker als die vorhergehende; auch findet sich eine Varietät mit kurzen Ährenstielen und sehr gedrängtem Schirm.

L. spicata De Cand. Ähre länglich, gelappt, nickend; Zipfel der Blumenhülle stachelspitzig, länger als die rundlich-eifg. stachelspitzige Kapsel; Bltt. rinnenfg., am Gr. haarig; die Staubfäden um die Hälfte kürzer als die Staubbeutel.

Zwischen Felsgerölle des Hochgebirges. *An der Schneekoppe*. Juni, Juli. 2.

Stängel $\frac{1}{2}$ - 1' h. Blüten schwarzbraun. Die Ähren sind sitzend und bilden eine längliche unterbrochene Ähre.

Cyperaceae Jussieu.

Blumen entweder dachziegelförmig oder zweireihig in Ährchen, welche wieder zu Ähren, Trauben, Büscheln oder auch zu Spirren und Rispen vereinigt und von Hülldeckblättern (involucria) gestützt sind. Blumen theils zwitterig, theils ein-seltener zwei-häusig. Die äussere Blumenhülle bildet ein schuppenförmiges, stets wenigstens zum Theil grünges

Deckblatt (bractea). Die eigentliche Blumenhülle fehlt, oder besteht aus Haarbüscheln, oder Borsten, oder Schuppen oder einer schlauchförmigen oben geöffneten Haut, welche noch die reife Frucht umgiebt. Staubgefässe drei; die Staubbeutelblätter sind an den Enden nicht getrennt. Ein einzelner freier Fruchtknoten mit einem einzelnen aufrechten Ei. Einfacher Griffel mit 2 oder 3 fadenförmigen Narben. Ein dreieckiges oder zusammengedrücktes, entweder nacktes, oder von der Blumenhülle d. h. den ausdauernden Borsten oder der Schlauchhaut umgebenes Nüsschen. Same aufrecht mit fest anliegender Samenschale und kleinem kreiselförmigem Keime im Grunde des fleischigen Eiweisses.

Kraut- und staudenartige Gewächse mit faseriger einjähriger oder stöhliger kriechender ausdauernder Wurzel, schaftförmigem, oft dreikantigem, von Mark erfülltem Stängel. Die Blattplatte entspringt aus einer tuteufg. den Stängel umgebenden, meist geschlossenen Blattscheide, ist rinnenf. und gekielt, selten eben; häufig fehlt sie ganz oder ist bis auf eine Stachelspitze verkümmert. Die innere Wand der Blattscheide ist mit einer besondern Oberhaut (d. i. einem mit der Blattscheide als Blattstiel verwachsenem Stützblatt) bekleidet, welche über den oberen Rand sich oft als ein eigenes Häutchen, das *Blatthäutchen*, *ligula*, erhebt. Der Blütenstand ist von einhüllenden Deckbltt. gestützt; so dass ein äusseres, stängelblattartiges, unter dem Grunde des Aehrchenstiemes, ein inneres häutiges, oft zu einer Tutenascheide verwachsenes, über dem Grunde des Aehrchenstiemes steht. Diese Familie ist durch die grosse Anzahl der Individuen für die Flora unserer Gegenden bedeutsam; die Mehrzahl wächst an feuchten Orten oder in und am Wasser; häufig bedecken sie grosse Wiesenstrecken. Mehrere sind nur in den höheren Regionen zu Hause, wie denn überhaupt diese Gewächse gegen den Norden an Zahl der Arten bedeutend zunehmen.

1. *Cyperaceae.* Blumen zwitterig, Aehrchen zweizeilig.

Cyperus L. *Cypergras.* Deckschuppen gekielt, alle blumentragend, oder die 2-3 untersten leer und kleiner. Blumenhülle fehlt. III, 1.

Die Mehrzahl der Arten dieser grossen Sippe ist in wärmeren Ländern einheimisch.

C. flavescens L. Halm stumpf, 3kantig; Aehrchen in Büscheln, länglich-lanzettlich; Deckschuppen stumpf; 2 Narben; drei Deckbltt.

Auf feuchten Sandplätzen, an Fluss- und Teich-Ufern, in der Ebene zerstreut. Um Br. hinter dem *Lehmdamme*, bei *Friedewalde*, *Leipe* bei *Oswitz*, *Trebnitz*, *Kl. Silsterwitz*, *Wohlauf*, *Hosenitz* b. *Bunzlau*, *Beuthen a. O.*, *Ohlau*, *Kreuzburg*, *Kalichteich* b. *Oppeln*, *Jacobsvalder Haide*, *Schönbrunn* bei *Jägerndorf*, *Teschen*. Juli — Sept. ☉.

Stängel in Basen, schief-aufrecht, 1 - 6". Aehrchen schmutzig-gelb.

C. fuscus L. Halme scharf-dreikantig; Aehrchen in gestielten und sitzenden Köpfchen, linealisch; Deckschuppen spitz; 3 Narben; 3 Hüllbltt.

Auf feuchten Sandplätzen, an Fluss- und Teichrändern, auf überschwemmt gewesenen Orten, d. d. g. G. in der Ebene zerstreut, an manchen Orten häufig. Um Br. gemein an der Oder, bei Marienau, Pöpelwitz, Masschwitz, Wildschütz etc. Wohlau. Beuthen a. O., Ohlau. Oppeln. Troppau. Juli — Sept. ☉.

H. 1 - 6". Halme schief-aufrecht, etwas schlaff. Deckschuppen braunroth bis ins schwärzliche, mit grünem Kiel; bisweilen fast ganz grünlich mit schmalen bräunlichen Streifen. Deckbltt. lang, schlaff.

2. *Scirpeae*. Blumen zwitterig. Deckschuppen dachziegelförmig um die Aehrensindel gelagert.

Dichostylis Palisot Beauvois. Die Aehrchen fast in drei Reihen dachziegelförmig-gelagert, armblumig. Deckschuppen weich. Blumenhülle fehlt. Griffel 2 spaltig. Nüsschen mit dem zwiebeligen bleibenden Grunde des Griffels gekrönt. III, 1.

D. Michelliana Nees ab Esenb. *Scirpus Mich.* Linné. W. et Gr. sil. Halme 3kantig; Aehren in einem endständigen kugeligen Köpfchen; Deckbltt. mehrere, sehr lang; Deckschuppen eifg. oder lanzettlich.

Auf überschwemmt gewesenen Plätzen an Flussufern. Zuerst i. J. 1822 am Ufer der Lohé bei Masschwitz, wo sie erst wieder nach 7 Jahren im J. 1830 u. dann 1834 erschien. Darauf erschien sie einzeln im Herbst 1835 nach zwei trocknen Sommern in einzelnen Exemplaren an der Oder bei Marienau und Neuscheitrich, an der Ohlau hinter dem Ziegelthore, bei Grüneiche und an einem Teiche bei Cosel. Juli — Octob. ☉.

Sieht in der Tracht dem *Cyperus fuscus* sehr ähnlich, doch sind die Deckbltt. spitziger. Halme unten röthlich. Aehrchen blass-gelbgrünlich. Schuppen spitz.

Holoschoenus Link. *Kugelriet*. Die Aehrchen ringsherum dachziegelförmig, in kugeligen Köpfen, die theils sitzend theils gestielt sind. Das grössere Deckblatt aufrecht. Blumenhülle fehlt. Griffel 3 spaltig. Nüsschen ohne Rest des Griffels. III, 1.

H. vulgaris Link. *Scirpus Holoschoenus* L.

Auf Sumpfwiesen. Bisher nur bei Wohlau von Güntzel d. ä. gef. und mitgetheilt. Juni, Juli. 2.

Wurzel kriechend. Halm stielrund, 1 - 1 $\frac{1}{2}$ h. Die Blattscheiden am Rande durch ein feines Fadennetz verbunden. Bltt. rinnenf.-zusammengerollt. Meist 3 Köpfe, ein sitzender, zwei gestielte. Deckschuppen rostbraun, gestutzt, mit einer Stachelspitze.

Isólepis R. Brown. Die Aehrchen ringsherum dachziegelförmig, in einem Büschel scheinbar seitenständig. Das grössere Deckblatt aufrecht. Blumenhülle fehlt. Griffel dreispaltig. Nüsschen vom fadenförmigen Griffel gekrönt. III, 1.

I. setacea R. Br. *Scirpus set.* L. Zwei bis drei sitzende und kurzgestielte Aehrchen; das Nüsschen zusammengedrückt, mit Längsstreifen.

Auf feuchten Sandplätzen, an Fluss- und Teichrändern, in d. Ebene d. d. g. G. nicht selten. Juli, Aug. 2.

In dichten Basen. Halm fädlich, 2 - 6' h., steif oder gekrümmt. Bltt. sehr kurz, borstlich. Deckschuppen stumpf mit einer Stachelspitze. Aehren eifg. Das Deckblatt als scheinbare Fortsetzung des Stängels bald länger, bald kürzer.

Scirpus L. *Simse.* Aehrchen ringsherum dachziegelförmig, in seitenständigem Büschel oder endständiger Spirre mit mehreren Deckblättern. Blumenhülle: 4-6 Borsten. Nüsschen vom fadenförmigen Griffel gekrönt. III, 1.

a. Büschel oder Spirre seitenständig, indem das grössere Deckblatt den Stängel fortsetzt.

S. lacustris L. *Pferdebinsen.* Halm stielrund; die Aehren büschelig-gehäuft; Deckschuppen glatt, gefranzt, ausgerandet mit einer Stachelspitze; 3 Narben; Nuss 3kantig, glatt; die Borsten der Blumenhülle rückwärts-stachelig.

Im Wasser am Rande von Teichen, Lachen und am Ufer langsamer Flüsse, in der Ebene, d. d. g. G. häufig. Juni, Juli. 2

Halme grasgrün, 3 - 4' h., steif aufrecht, innen mit lockerem Mark, unter den blüthetragenden einige unfruchtbare. Deckschuppen rostrothbraun mit dickem Mittelnerve. Staubbeutel meist an der Spitze bärtig.

S. Tabernaemontani Gmelin. Halm stielrund; Aehrchen büschelig-gehäuft; Deckschuppen mit scharfen Punkten, gefranzt, ausgerandet mit einer Stachelspitze; 2 Narben; Nüsschen erhaben, fast 3kantig; Borsten der Blumenhülle rückwärts-stachelig.

Im Wasser an den Ufern von Teichen und Lachen; bisher nur in der Gegend von *Breslau*, anderwärts vielleicht übersehen. Bei *Kl. Tschansch, Lohe, Lissa, Koberwitz, Wirwitz*. Juni, Juli. 2.

Halme seegrün, 1 - 3' h., stets kleiner als die vorige, auch mit kleinerem Blütenstande, bisweilen wenigen kopffg.-gehäuften Aehrchen. Deckschuppen rothbraun mit scharfen rostrothen Punkten. Staubbeutel meist an der Spitze ohne Bart. Die unterste Halmscheide pflegt bei beiden Arten ein kurzes pfriemliches Blatt zu tragen.

b. Büschel oder Spirre endständig, von seitlichen Hüllbltt. umgeben.

S. maritimus L. Halm 3kantig, beblättert; Bltt., am Stängel u. unter der Spirre lang-linealisch, eben; Spirre endständig, zusammengesetzt, die Aehrchen in sitzenden und gestielten Büscheln; Deck-

schuppen stachelspitzig und zweispaltig; 3 Narben; Schuppen der Blumenhülle rückwärts hakig.

In Gräben, an Teich- und Flussufern, in der Ebene zerstreut. Um Br. bei Graebchen, Lambsfeld, Koberwitz, Sayne bei Prausnitz, Wohlau, Buchwald bei Hirschberg, Oppeln, Troppau bei Palhanez, Kamenz, Jungferndorf. Juni, Juli. 2.

Wurzel in Absätzen knollig-verdickt. Halm 2 - 4' h. Deckblt. der Spirre sählig-abstehend, sehr lang. Aehrchen lanzettlich, rostbraun. Die Stiele der Spirre sind bald länger, bald kürzer. Auf Plätzen, wo das Wasser sich verloren hat, erscheint eine niedrige Varietät, mit $\frac{1}{2}$ - 1' hohem Halme und 1 - 2 Aehrchen; diese ist *Sc. compactus* Krock. sil.

S. sylvaticus L. Halm stumpf-dreikantig, beblättert; Bltt. am Halme und unter der Spirre eben; Spirre doldentraubig, mehrfach-zusammengesetzt, Aehrchen in sitzenden und gestielten Büscheln; Deckschuppen stumpf mit einer Stachelspitze; 3 Narben; Borsten der Blumenhülle gerade, rückwärts hakig.

Auf feuchten u. sumpfigen Waldwiesen, an Gräben, Teich- und Flussufern, in feuchten und sumpfigen Gebüsch, Wäldern, in der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Juni, Juli. 2.

Halm 1 - 3' h. Bltt. lang 5 - 6'' breit. Aehrchen klein, eirund. Deckschuppen schwarzgrün.

S. radicans Schkuhr. Halm stumpf-dreikantig, beblättert; die Bltt. am Halme und unter der Spirre eben; Spirre doldentraubig, mehrfach-zusammengesetzt; Aehrchen in sitzenden und gestielten Büscheln; Deckschuppen stumpf ohne Stachelspitze; 3 Narben; Borsten der Blumenhülle glatt, gedreht.

An Rändern von Lachen u. Teichen, in der Ebene zerstreut. Um Br. am Lehmdamme, bei Grüneiche, Goldschmiede. Wohlau. Warthe b. Bunzlau und am Wehre. Ohlau, Oppeln. Herlitz, Jägerndorf u. Troppau. Juli, Aug. 2.

Halme 2 - 3' h., unter den blüthetragenden einige unfruchtbare, welche sich bogengf. gegen die Erde oder das Wasser neigen, an der Spitze Wurzeln und Bltt. treiben. Aehrchen lanzettlich, spitz, schwarzgrün.

Heleócharis R. Brown. Aehre einzeln, endständig, ringsherum dachziegelförmig, ohne besonderes Deckblatt. Blumenhülle aus 3 oder 6 Borsten. Nüsschen mit dem verdickten am Grunde eingeschnürten Ueberrest des Griffels gekrönt. VIII, 1.

H. palustris R. Brown. *Scirpus pal.* Linné. Aehrchen länglich; Deckschuppen spitzlich, die unterste das Aehrchen halb-umfassend; 2 Narben; Nüsschen verkehrt-eifg., glatt, zusammengedrückt, an den Rändern stumpf-gerandet; Halm stielrundlich; Wurzel kriechend.

In Sümpfen, auf sumpfigen Wiesen, in sumpfigen Gräben, an überschwemmt gewesenen Orten, Teich- und Flussrändern d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Juni — Aug. 2.

Halm $\frac{1}{3}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h., gebogen oder aufrecht, mit blattlosen Scheiden, unten oft röthlich; einige unfruchtbar. Aehre länglich-kegelfg., 3 - 6'' lang. Deckschuppen in der Mitte grün, am Rande braun und häutig.

H. uniglumis Link. Aehre länglich; Deckschuppen spitzlich, die unterste halbrund, die Aehre ganz umfassend; 2 Narben; Nüsschen verkehrt-eifg., glatt, zusammengedrückt, an den Rändern stumpf gerundet; Halm stielrund; Wurzel kriechend.

Auf Moor- und Torfwiesen häufig. Um Br. bei *Rosenthal*, *Kapsdorf am Göi*, Wiesen vor und hinter *Lissa*, *Rienberg* etc. Ausserdem von *Bunzlau* bei *Hosenitz* u. *Klitschdorf*, *Ohlau*, *Kreuzendorf* b. Troppau angeführt, aber gewiss noch an vielen anderen Orten. Juni, Juli. 4.

Von der vorigen nur durch die Gestalt der untersten Schuppe verschieden. Doch scheint das besondere Vorkommen und eine kleine Verschiedenheit der Tracht für die Artverschiedenheit zu sprechen. Halme etwas schlanker, meist $\frac{1}{2}$ - 1' h.

H. ovata RBrown. *Scirpus ov.* Linn. Aehre rundlich oder breit-eiförmig; Deckschuppen gerundet, stumpf; 2 Narben; Nüsschen verkehrt-eifg., glatt, zusammengedrückt mit scharfen Rändern; Halm stielrund; Wurzel faserig.

Auf überschwemmt gewesenen Plätzen an Teich- und Flussufern, Fischteichen. Um Br. bei *Lissa*, vereinzelt auf Sandplätzen der *Oder* bei *Pöpelwitz* und *Marienau*. *Neuwerk* bei *Ohlau*. Um *Prausnitz*, *Trachenberg*. *Swibedove* bei *Militsch*. *Gnadenberger Teiche* bei *Bunzlau*. *Niesky*. *Bankau* b. *Kreuzburg*. *Giersdorf* u. *Buchwald* bei *Schmiedeberg*. *Oppeln*. Um *Troppau* bei *Gilschwitz*, *Zottig*, *Dorfleschen*. *Zeislowitz* bei *Teschen*. Juni, Juli. ☉

Halme in dichten Basen, schief-aufrecht, die untersten aufsteigend, schlaff, $\frac{1}{2}$ - 1' h. Deckschuppen grün, dann braun mit weisshäutigem Rande.

H. acicularis RBrown. *Scirpus acic.* Linn. Aehre eiförmig; Deckschuppen eifg., stumpf; 3 Narben; Nüsschen länglich, feingerippt; Halm fädlich, eckig; Wurzel kriechend.

Auf überschwemmt gewesenen Plätzen, an Teich- und Flussrändern, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. ☉

Halme dünn und zart, haarfg., 2 - 6'' h. Aehren klein, grünlich.

Limnochloë Reichenbach. Aehre einzeln, endständig, ringsherum dachziegelförmig, ohne besonderes Deckblatt. Blumenhülle aus 3-6 Borsten oder fehlend. Nüsschen ohne Rest des Griffels. III, 1.

L. caespitosa Rchb. *Scirpus caesp.* Linn. Halm von Blattscheiden umgeben, die oberste trägt ein kurzes Blatt; die unterste Deckschuppe grösser als die übrigen, so lang als die Aehre und dieselbe umfassend, mit einer dicken, grünen Stachelspitze.

Auf den Mooren des Hochgebirges. Im *Riesengebirge* auf dem *Koppenplane*, der *weissen Wiese*, *Elbwiese* etc. oft grosse Strecken überziehend. Mai, Juni. 2.

Halme in dichten Rasen, am Gr. von gelblichen Schuppen eingehüllt, $\frac{1}{2}$ - 1' h. im schwachem Bogen gekrümmt. Aehren klein, oval, rostfarben. Im Alter färben sich, die Halme oben schwärzlich.

L. pauciflora Lightfoot (als *Scirpus* p.); *Scirpus Baethryon* Ehrhart. W. et Gr. sil. Halm von blattlosen Scheiden umgeben; die unterste Deckschuppe länger als die Aehre, dieselbe umfassend, oben abgerundet.

Auf Moor- und Torfwiesen, in der Ebene u. d. Vorgeb. zerstreut. Um Br. auf Wiesen vor *Lissa*, *Bruschewitz* u. *Koberwitz* n. Krause. *Hauffen* bei Auras. *Wohlau*. Am *Geiersberge* bei *Silsterwitz*. *Hosenitz* u. *Greulich* b. *Bunzlau*. *Strzebowitz* bei *Troppau*. Juni, Juli. 2.

Halme meist vereinzelt, dünn, glatt, die blühenden stets von einigen unfruchtbaren umgeben, unten mit braunrothen Scheiden, 3 - 6" h. Aehren braun.

Blysmus Panzer, *Risch*. Aehrchen fast zweizeilig-dachziegelförmig, 4-5 blumig, zu einer zweizeiligen endständigen Aehre mit blattförmigem Deckblatt zusammengestellt. Blumenhülle aus 6 Borsten. Nüsschen vom fadenförmigen Griffel gekrönt. III, 1.

B. compressus Link. *Schoenus compressus* Linn. und *Carex uliginosa* Linn. Halm undeutlich-dreikantig; Bltt. unterseits gekielt.

Auf sumpfigen Wiesen hie und da in der Ebene. Um Br. bei *Friedewalde*, *Schleibitz*, *Lissa*, *Warteberg* bei *Rtemberg*. *Wohlau*. *Hosenitz* b. *Bunzlau*. *Cudowa*. *Ohlau*. *Oppeln*. *Troppau* um *Lichten*, *Larischau* etc. *Teschen*. Juni, Juli. 2.

Halm beblättert, $\frac{1}{2}$ ' h., schwach graugrün. Aehrchen rostbraun, das oberste ist zuweilen verlängert und dünn-walzig. Die Borsten der Blumenhülle rückwärts-stachelig.

Rhynchospora Vahl. *Moorsimse*. Aehrchen undeutlich-zweizeilig-dachziegelförmig armblumig, mit 2-3 Blumen und einigen leeren Deckschuppen darunter, in ein endständiges Büschel zusammengestellt. Blumenhülle aus 3 - 10 Borsten. Nüsschen mit einem langen am Gr. zusammengedrücktem Ueberreste des Griffels gekrönt. III, 1.

R. alba Vahl. *Schoenus a.* Linn. Aehrchen fast doldentraubig-gehäuft, mit Deckbltt. von gleicher Länge; Blumenborsten so lang als das Nüsschen; Wurzel faserig.

Auf Moorwiesen in der Ebene u. d. Vorgebirge. Um Br. bei *Friedewalde* und *Lissa*. *Rtemberg*. *Wohlau*. *Looswitz*, *Birkenbrück*, *Gr. Zeche* bei *Bunzlau*. *Garsuche* bei *Ohlau*. *Kreuzburg*. *Königshuld* b. *Oppeln*. Am *Geiersberge*. *Reinerz*. *Hermsdorf* b. *Hirschberg*. *Niedergrund* bei *Zuckmantel*. *Bladnitz* b. *Teschen*. Juli, Aug. 2.

Halme aufrecht, oder unten aufsteigend, schwach, 1' h., 3kantig, mit lineal-rinnenförmigen Bltt. Aehren weisslich, später strohgelb.

R. fusca Röm. u. Schultes. *Schoenus* f. Linn. Aehren kopfförmig-gehäuft, mit längeren Deckbltt.; Blumenborsten länger als das Nüsschen; Wurzel kriechend.

Auf Moorwiesen. Bei *Greulich* und *Hosenitz* b. *Bunzlau* von v. Albertini und Schneider gef. Juni, Juli. 2.

Halme schwach-gekrümmt, $\frac{1}{2}$ ' h. Aehren braun.

Anm. g. Nach mündlichen Mittheilungen wurde auch *Cladium Mariscus* E. Brown am *Peilau* bei *Reichenbach* hinter dem *Gladishofe* von Pauli gefunden. Expl. sah ich noch nicht. Siehe auch *Schneider* F. v. *Bunzlau* p. 26.

Eriophorum L. *Wollgras*. Aehrchen ringsherum dachziegelförmig. Blumenhülle aus wenigen oder zahlreichen Borsten, welche sich nach dem Blühen bis über das Aehrchen hinaus verlängern. Nüsschen ohne deutlichen Rest des Griffels. III, 1.

a. Ein einzelnes endständiges Aehrchen.

E. alpinum L. Halm dreiseitig, scharf; Bltt. sehr kurz; Aehre länglich; Blumenborsten gedreht.

Auf sumpfigen und moorigen Stellen der Gebirgskämme. Im *Riesengeb.* am *gr. Teichrande*, auf der *weissen Wiese* am *Brunnenberge*, im *Aupagrunde*, an der *Kesselkoppe*. *Gesenke* im *Kessel*. Mai, Juni. 2.

Basenfg. H. $\frac{1}{2}$ '. Sieht während der Blüthe der *Limnochloe caespitosa* ähnlich. Aehre röthlichgelb, 2" lang. Deckschuppen eifg., spitz. Blumenborsten zuletzt 3mal so lang als die Aehre.

E. vaginatum L. Halm glatt, oben 3kantig, mit aufgeblasen Scheiden, wovon nur die unterste ein kurzes Blatt trägt; Aehre länglich-eifg.; Blumenborsten gerade.

Auf moorigen und moosigen Waldwiesen und Gebirgsmooren, von der Ebene bis auf das Hochgebirge zerstreut. Um *Br.* bei *Lissa* u. *Riemberg*. *Wohlau*. *Bunzlau* bei *Buchwald*, *Aschitzau* u. *Zeche*. *Oppeln*. *Leobschütz*. *Geppersdorf* bei *Troppau*. *Heuscheuer*. *H. Mense*. *Riesengeb.* u. *Gesenke*. April, Mai. 2.

In dichten und festen Basen. Halme $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h., bis zur Fruchtreife sich sehr verlängern. Deckschuppen dünnhäutig, langgespitzt, schwärzlich-grau.

b. Mehrere nickende Aehrchen in einem Büschel oder einer Spirre.

E. latifolium Hoppe. *Faule Mäde*. **E. polystachyum** β . Linn. Halm fast dreikantig; Bltt. eben, nach oben dreiseitig; Aehrchenstiele scharf.

Auf nassen und sumpfigen Wiesen d. Ebene u. des Vorgeb., d. d. g. G. Um *Br.* bei *Kl. Bischwitz*, *Hühnern*, *Friedewalde*, *Lissa* etc. April, Mai. 2.

Halm $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h., beblättert. Der Stängel, die Aehrchenstiele und die Borsten der Blumenhülle verlängern sich nach dem Blühen bedeutend. Aehrchen eifg. Deckschuppen eilanzettlich, schmutzig-gelblich-grün mit weissen Hautrande.

E. angustifolium Roth. *E. polystachyum* α. Linn. Halm fast stielrund; Bltt. rinnenfg., nach oben dreiseitig; Aehrchenstiele glatt.

Auf sumpfigen Wiesen im Vor- und Hochgeb. hie und da auch in der Ebene. Um *Lissa*. *Königshuld* b. Oppeln. *Prieborn*. *Schlesierthal*. *Sonnenkoppe*. *Riesengëb.* April, Mai. 2.

Der vorigen durchaus ähnlich, und vielleicht nicht wirklich als Art davon verschieden. Die Bltt. ändern in der Breite ab. Die Anwesenheit dieser Gewächse zeigt einen wenig fruchtbaren (sauren) oft eisenhaltigen Boden an.

E. gracile Koch. Halm undeutlich dreikantig; Bltt. dreiseitig; Aehrchenstiele filzig-schärflich.

Auf Moorwiesen. Um die *Schindelmühle* bei Wohlau i. J. 1823 gef. Um *Garsuche* b. Ohlau von Beilschmied, *Königshuld* bei Oppeln v. Grabowski gef. Nach Schn. um *Hosenitz*, *Greulich* u. *Gröbelzeche* bei Bunzlau. Mai, Juni. 2.

Halm oben dünn, steif, 6 - 8" h. Zwei bis vier Aehrchen. Kleiner als die beiden vorgehergehenden.

3. *Cariceae*. Blumen einhäusig oder zweihäusig.

Carex L. *Segge*, *Rietgras*. Aehrchen aus ringsherum dachziegelförmigen Deckschuppen, einzeln endständig, oder zu einer Aehre, selten anders, zusammengesetzt. Der Fruchtknoten von einer schlauchförmigen bleibenden Blumenhülle umgeben. XXI, 3.

Die Arten dieser zahlreichén, besonders im Norden einheimischen Sippe wachsen grösstentheils auf sumpfigem und Moorboden, wenige im Sande oder auf Felsen. Das Hochgebirge hat mehrere eigenthümliche Arten.

a. Ein einzelnes endständiges Aehrchen.

C. dioica L. Zweihäusig; Nüsschen fast aufrecht; Bltt. und Halme glatt; Wurzel sprossentreibend.

Auf moosigen Sumpfwiesen in d. Ebene u. d. Vorgeb. *Riemberg*. *Wohlau*. *Hosenitz* b. Bunzlau. Am *Sattelwalde*. Auf d. *gr. See* an der *Heuscheuer*. Mai. 2.

Halm städlich, 3 - 6" h. Aehren der Staubgefässblumen linealisch, strohgelb. Aehre der Stempelblumen walzig, Deckschuppen eifg., rostbraun, am Rande weisshäutig.

C. Davalliana Smith. Zweihäusig; Nüsschen zuletzt zurückgekrümmt; Halm u. Bltt. schärflich; Wurzel faserig.

Auf Sumpfwiesen in d. Ebene u. d. Vorgeb. Um *Br.* bei *Heydelwizen* und *Koberwitz*. *Geiersberg* bei Silsterwitz. *Reimswaldau*. *Cudowa*. *Maiwaldau* b. Hirschberg. April, Mai. 2.

Etwas stärker als die vorige. Nüsse kastanienbraun-schwärzlich, langgespitzt.

C. pulicaris L. Aehre oben Staubgef. unten Stempel tragend; 2 Narben; Nüsschen länglich, beiderseits spitz zurückgeschlagen; Deckschuppen hinfällig; Bltt. borstlich.

Auf feuchten Wiesen und quelligen Stellen von der Ebene bis in d. Hochgeb. Um *Br.* bei *Süsswinkel* und *Hayffen* bei *Auras*. *Woh-lau*. *Neurode*. *Riesengeb. üb. d. Teichen*. *Seefeldern* an d. *h. Mense*. Bei *Niesky*. Gesenke am *Hockschar* u. *Altwater*. Mai, Juni. 2.

Halm dünn, 4 - 8" h. Deckschuppen rostbraun. Nüsse erst grünlich, dann scharbenbraun, glänzend.

C. pauciflora Lighthfoot. *C. Leucoglochis* L. Aehre meist 4blumig, die oberste mit Staubgef.; 3 Narben; Nüsse lanzettlich-pfriemlich, stielrund, zurückgeschlagen, deren Deckschuppen hin-fällig.

Auf moosigen und moorigen Stellen der Gebirgskämme. Auf den *Seefeldern* an der *Heuscheuer* u. auf d. *hohen Mense*. *Riesengeb.*: auf d. *weisen* u. *Elbwiese*, *Teichränder* etc. Gesenke bei *Reiwie-sen*, *Köpernik*, *Bründelhaide*, *Altwater*. Nach *Schneider* auch in der Ebene um *Hosenitz* b. *Sprottau* u. n. *Grabowski* bei *Kö-nigshuld*. Juni, Juli. 2.

Dünn, 3 - 6" h. Aehren strohgelb.

C. rupestris Allione. Aehre oben Staubgef. unten Stempel tra-gend; 3 Narben; Nüsschen verkehrt-eifg., zusammengedrückt-drei-seitig, kürzer als die Deckschuppe; Bltt. linealisch, eben.

An feuchten Felsen im Hochgeb. Bisher nur *am rothen Berge* im *Gesenke* von *Grabowski* 1829 entdeckt. Juni, Juli. 2.

Halm gekrümmt, sehr scharf, 3 - 4" h. Bltt. gekrümmt, am Rande scharf. Aehre 1 - 10blumig. Deckschuppen rostbraun, oben am Rande weisshäutig, die unterste stachelspitzig-begrannt.

b. Aehrchen gehäuft, in einen rundlichen Kopf zusammengestellt.

C. cyperoides L. Die Aehrchen tragen unten Staubgefbl.; ein kugelig Kopf mit drei hüllenden Deckbltt.; 2 Narben, Nüsse lang-geschnäbelt, 2spitzig; Wurzel faserig.

An grasigen Teichrändern, Lachen u. Sümpfen in d. Ebene, zer-streut. Um *Br.* einzeln bei *Kosel* u. *Lissa*. *Goldschmiede*. *Woh-lau*. *Gnadenberger Teiche* bei *Bunzlau*. *Gr. Hengersdorf* u. *Niesky*. *Stanowitz* u. *Neuvorwerk* b. *Ohlau*. *Kalichteich* b. *Oppeln*. Um *Warmbrunn* u. *Giersdorf*. Juli, Aug. 2.

Halm skantig, hohl. Kopf seitlich. Deckschuppen lineal-pfriemlich, durchaus grün. Diese Art weicht in der Tracht und Bildung der Deckschuppen von allen and-eren dieser Sippe ab, und möchte richtiger nach *Mönch* als eine eigene Sippe, *Schä-hammeria*, abzusondern sein.

c. Staubgefässblumen und Stempelblumen in jedem Aehrchen ver-einigt; zwei Narben.

α. Die Aehrchen tragen an der Spitze Staubgefbl. und sind in eine fort-gesetzte oder unterbrochene Aehre selten in eine Rispe zusammengestellt.

C. chordorrhiza Ehrhart. Aehrchen oben Stbgfbl. tragend, in ein eiförmiges Köpfchen zusammengedrängt; Nüsschen eifg., ner-viggestreift, mit kurzem glatten Schnabel; Deckschuppen spitz; Halm am *Gr.* aestig; Wurzel weit kriechend.

Auf Moorwiesen. Am grossen See an der Heuscheuer zuerst von Heinrich i. J. 1834 gef. Juni, Juli. 2.

Die Wurzel steigt schief auf und geht in den Halm über, und treibt aus den Gelenken Blätterbüschel und bisweilen auch Blüthenhalme, weshalb der Halm ästig erscheint. Bltt. fädlich-zusammengerollt. H. $\frac{1}{2}$ '. Aehrchen 2-3, 5-12 Blumen enthaltend, rostbraun.

C. disticha Hudson. *C. intermedia* W. et Gr. sil. Aehre doppelt zusammengesetzt, länglich, dicht oder am Gr. unterbrochen; die oberen und unteren Aehrchen Sttbl., die mittleren Stbgfbl. tragend; 2 Narben; Nüsschen eigf., flach-erhaben, mit 9—11 Nerven, einem schmalen, sägezählig-scharfem Rande und 2zähligem Schnabel; Deckschuppen kürzer als die Nuss, spitz; Halm an den Ecken scharf; Wurzel kriechend.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen, in Gräben, in der Ebene selten. Um *Br.* bei *Kritttern*, *Lambsfeld*, *Kapsdorf* b. *Hühnern*, Wiesen bei *Tschechnitz*, *Neukirch* u. *Lissa*, *Koberwitz* u. *Guhrwitz*. *Oppeln*. *Troppau*. Mai, Juni. 2.

Halme vereinzelt, von 1-4' H. Bltt. hohlkehlig oder eben, schmal. Aehrchen fast zweireihig. Deckschuppen rostbraun. Nüsschen blassbraun.

C. arenaria L. Aehre 2fach zusammengesetzt, länglich oder eigf., die oberen Aehrchen tragen Stgfbl., die unteren Sttbl., die mittleren an ihrer Spitze Staubgefbl.; Nüsschen flach-zusammengedrückt mit 7-9 Nerven, von der Mitte an mit einem gesägten Flügelrande umgeben; Deckschuppen langspitzig, so lang als die Nuss; Halm oben eckig und scharf; Wurzel kriechend.

Auf Feldern, welche mit Flugsand bedeckt sind. Bisher nur bei *Bunzlau* um *Tiefenfurth*, *Schönfeld* u. *Mühlbock* von *Schneider* i. J. 1832 entdeckt und mitgetheilt. Mai — Juli. 2.

Halme $\frac{3}{4}$ -1' h. Bltt. schmal-linealisch. Aehre bald dicht, bald am Gr. unterbrochen, strohgelb, dann rostgelb. Wurzel walzig, gleichmässig-gegliedert mit faseriger Hülle an jedem Knoten. Die Wurzel dieser Art ist officinell.

C. vulpina L. Aehre 2fach zusammengesetzt, eigf.-länglich; Aehrchen an d. Spitze Stbgfbl. tragend; Nüsschen sparrig-auseinanderstehend, eigf., flach-erhaben, mit 2spaltigem sägezähligem Schnabel aus 5-7 Nerven; Deckschuppen stachelspitzig, kürzer; Halm mit scharfen Ecken; Wurzel faserig.

In Gräben, an Fluss- u. Teichrändern, in feuchten Gebüschern u. Waldplätzen, an Lachen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Mai, Juni, auch bisweilen im Herbst. 2.

Die stärkste und grösste in dieser Abtheilung. Halm dreiseitig, 2-3' h. Deckbltt. bald kürzer, bald länger. Aehre länglich, meist am Gr. unterbrochen. Deckschuppen grün mit bräunlichem Bande. Bltt. 2-4''' breit.

C. muricata L. Aehre zusammengesetzt länglich; Aehrchen an d. Spitze Stbgfbl. tragend; Nüsschen sparrig-auseinanderstehend, eigf., flach-zusammengedrückt, mit sägezähligem Schnabel, ohne deutliche Nerven, Deckschuppen stachelspitzig, kürzer; Halm mit scharfen Ecken, Wurzel faserig.

In Gebüsch u. Hecken, Wäldern u. auf Waldwiesen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. Mai, Juni. 2.

Der vorigen sehr ähnlich, aber stets fast um die Hälfte kleiner, dünner und weniger scharf. Halme meist rasenfg. Bltt. 1 - 2'' breit. Aehre länglich, oft am Gr. unterbrochen. Deckbltt. länger oder kürzer. Deckschuppen grün-rostbraun mit grünem Kiel, oben gesägt.

C. teretiuscula Goodenough. Aehre zusammengesetzt, dicht gedrängt; Aehrchen oben Stbgfbl. tragend; Nüsse eifg., erhaben, mit gesägtem Schnabel und 3 undeutlichen Nerven; Deckschuppen so lang als die Nuss; Halm oben dreiseitig, scharf; Wurzelstock schief.

Anf sumpfigen Wiesen der Ebene. Um Br. bei *Friedewalde. Riemberg. G. Tarnau* b. Beuthen a. O. *Wohlau. Garsuche* b. Ohlau. Am *Geiersberge* bei Kl. *Silsterwitz. Zeche, Eckersdorf* u. *Birkenbrück* bei Bunzlau. Am *alten Bober* bei *Hirschberg. Königshuld* bei Oppeln. *Stremplowitz, Zottig, Kamentz* und *Palhanetz* b. Tropa. Mai, Juni. 2.

Halm unten, wo er von den Blattscheiden umgeben ist, rundlich, $\frac{1}{2}$ - 1' h. Deckschuppen rostbraun mit weissem Hautrand. Bisweilen sind die untersten Aehrchen auf kurzen ästigen Stielen.

C. paradoxa Willdenow. Aehrchen in eine fast rispige Aehre gestellt, oben Stbgfbl. tragend; Nüsschen eifg., erhaben, mit 2zäh-nigem-gesägtem Schnabel und beiderseits mit deutlichen Nerven; Deckschuppen so lang als die Nuss; Halm oben dreischneidig, sehr scharf; Wurzel faserig.

Auf Torfwiesen. *Lenschin* bei *Oppeln*, von Grab. 1830 gef. Nach *Rabenhorst* bei *Muskau* u. *Niesky*. Mai, Juni. 2.

Ist der vorigen sehr ähnlich, aber grösser, $1\frac{1}{2}$ - 2' h. Aehre grösser, weitläufiger, am Gr. etwas ästig. Nüsse fast doppelt so gross.

C. paniculata L. Aehrchen in eine Rispe gestellt; Nüsschen eifg., auf beiden Flächen erhaben, glatt mit feinen Streifen am Rücken u. mit 2zäh-nigem, sägezäh-nig-scharfem Schnabel; Deckschuppen von der Länge des Nüsschen; Halm dreiseitig, oben sehr scharf; Wurzel faserig.

In Waldsümpfen, Brüchen, an sumpfigen Flussufern in Wald-gegenden, in d. Ebene u. d. Vorgeb. zerstreut. Um Br. im *Goi* bei *Kapsdorf*, zw. *Wiesa* u. *Mahlen*, bei *Lissa, Riemberg, Wohlau. Garsuche* bei Ohlau. *Bunzlau* bei *Hosenitz* u. *Tiefenfurth. Malsch-witz* bei Beuthen a. O. *Rosenberg*. Am *Geiersberge*. Mai, Juni. 2.

In dichten Basen, 2 - 4' h. Bltt. 2 - 3'' breit. Deckschuppen rostbraun mit weiss-häutigem rispigem Rande. Nüsschen grünlich.

β. Die Aehrchen tragen am Grunde Staubgefässblumen und stehen wechselständig in einer einfachen Aehre.

C. brizoides L. Aehrchen länglich, am Gr. Stbgfbl. tragend, etwa 5, wechselständig und genähert, in eine Aehre geordnet; 2 Narben; Nüsse aufrecht, länglich; flach erhaben, am R. sägezäh-nig-gewimpert, mit 2spaltigem Schnabel; Wurzel kriechend.

α. campestris. Niedriger; die Aehrchen länglich-eifg., gerade, rostbraun; die Nüsschen länglich-eifg. — Hierher *C. Schreberi* Schrank u. d. a. A.

β. nemoralis. Höher und schlank; die Aehrchen länglich-lanzettlich, schwachgekrümmt, bleich; die Nüsse länglich-lanzettlich. — Hierher *C. brizoides* L. und aller Autoren W. et Gr. sil.

Auf trocknen, sandigen Plätzen, an Wegen d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. *β.* hie und da in Gebüsch und schattigen Wäldern. Mai, Juni. 2.

Weithin kriechend. Bltt. sehr schmal, am Gr. rinnenfg. Halm dünn, schlaff, meist 1' h. Aehrchen fast zweireihig. — Die var. *β.*, nämlich der eigentliche *C. brizoides* Linné unterscheidet sich von der andern, die man als die häufigere und allgemeiner verbreitete, als die Stammform ansehen muss, in keinem wesentlichen Stück; muss daher als eine Waldform betrachtet werden; doch scheint es angemessen, den ältern Linnéischen Namen dafür beizubehalten.

C. leporina L. *C. ovalis* Good. Aehrchen oval, meist 6, genähert; 2 Narben; Nüsschen aufrecht, flach-zusammengedrückt, eifg., mit 2zähniem Schnabel, feingesägtem Flügelrande, und Nervenstreifen; Wurzel faserig.

Auf feuchten, unfruchtbaren, sandigen Waldplätzen u. Triften, an Gräben, i. d. Ebene u. bis auf das Hochgebirge gemein. Juni, Juli. 2.

In dichten und festen Rasen. Halme aufsteigend, $\frac{1}{2}$ - 1' h. Bltt. lineal, spitzig, nach oben schärflich. Aehren gelbbraun.

C. stellulata Good. Aehrchen fast rundlich, meist 4, etwas entfernt; 2 Narben; Nüsschen sparrig-auseinanderstehend flach-erhaben, eifg., mit 2zähniem, sägezähniem-scharfem Schnabel und feinen Nervenstreifen; Halm glatt; Wurzel faserig.

Auf sumpfigen und torfhaltigen Wiesen von der Ebene bis auf die Kämme des Hochgebirges, meist in grosser Menge. Um *Br.* bei *Friedewalde, Kapsdorf, Lissa, Riemberg* etc. Juni. 2.

H. 4 - 10". Starr, etwas seegrün. Halme in Rasen, bisweilen aufsteigend oder schief-aufrecht. Die Nüsschen stehen sternförmig auseinander, nebst den Deckschuppen grün.

C. remota L. Aehrchen eifg., gesondert, die untern weit von einander entfernt, und von langem Deckblatte gestützt; 2 Narben; Nüsse aufrecht, flach-zusammengedrückt, eiförmig, mit 2zähniem, sägezähniem-scharfem Schnabel; Halm schwach, überhängend; Wurzel faserig.

In sumpfigen Wäldern, an Waldgräben und an Waldsümpfen, d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb. Um *Br.* im *Goi* bei *Kapsdorf, Arnoldsmühl, Lissa, Riemberg, Buchwald* bei Trebnitz. *Wohlau, Zeche, Gröbel* u. *Birkenbrück* bei Bunzlau. *Sattler* b. *Hirschberg, Ohlau, Oppeln.* Um *Troppau* bei *Benisch, Neu-Erbersdorf, Olbersdorf* etc. *Gr. See* an der *Heuscheuer.* Mai, Juni. 2.

Halme dünn und schlaff, $\frac{1}{2}$ - 2' h. Bltt. sehr schmal und schlaff. Die untern Deckbltt. der Aehrchen sind länger als der Halm. Aehrchen grün, sehr klein.

C. elongata L. Aehrchen länglich, genähert; 2 Narben; Nüsschen abstehend, lanzettlich, flach-zusammengedrückt, auf beiden Flächen nervig-gestreift, mit ungetheiltem, schärflichem Schnabel, länger als die Deckschuppe; Wurzel faserig.

In feuchtem Gebüsch, auf grasigen Waldplätzen d. d. g. G. nicht selten, aber mehr vereinzelt als andere Arten.

Halme aufrecht, sehr scharf, $\frac{1}{2}$ - 1' h. Aehrchen bis 8, erst gelblich, dann braungrün. Bisweilen verlängern sich die Aehrchen nach oben walzenf. mit Staubtbl.

C. canescens L. *C. curta* Gooden. Aehrchen eigf., meist zu 6, etwas entfernt; 2 Narben; Nüsschen eigf., fein gestreift, flach erhaben, mit kurzem, ungetheiltem Schnabel, wenig länger als die Deckschuppe; Wurzel faserig.

Auf sumpfigen Wiesen, in Sümpfen u. Mooren von der Ebene bis auf das Hochgebirge. Um Br. bei *Friedewalde*, *Lissa*, *Riemberg*, *Wohlau*, *Bunzlau*, *Ohlau*, *Oppeln*, *Troppau*. Auf den Mooren im Vor- und Hochgebirge in grosser Menge. Mai, Juni. ♀.

Halme 1 - 2' h., meist in dichten Rasen. Blaugrün. Bltt. sehr schmal. Aehrchen blaugrünlich, vor dem Blühen mit einem matten Schiller.

d. Eine, selten mehrere, Aehrchen mit Stbgfbl. am Ende; die seitlichen mit Stempelblumen. — Selten trägt die oberste Aehre an der Spitze oder am Grunde Stempelblumen.

α. Zwei Narben.

C. microstachya Ehrhart. Das oberste Aehrchen lineal, am Gr. Sttbl. tragend; die seitlichen 2-4, viel kürzer, walzig, gedrängt, sitzend; Deckbltt. ohne Scheide; Nüsschen eigf., kahl, flach-erhaben, angedrückt mit spitzem, 2zähniem Schnabel, Bltt. linealisch, eben.

Auf moorigen Wiesen. Zw. der *Schindel*- u. *Giesemühle* bei *Wohlau* von v. Floto w entdeckt. Juni. ♀.

Schlank und dünn, $\frac{1}{2}$ ' h. Halme einzeln. Bltt. borstlich. Aehrchen rostbraun.

C. rigida Good. *C. saxatilis* Willdenow. W. et Gr. sil., nicht Linné. Das oberste Aehrchen mit Stbgfbl.; 3 seitliche, aufrechte, walzenförmige, mit Stempelbl., das unterste gestielt, von lanzettlichen am Gr. gehörten, scheidenlosen Deckbltt. gestützt; Nüsschen kahl, elliptisch, linsenförmig-zusammengedrückt, fast dreikantig, glatt, mit sehr kurzem, ungezähntem Schnabel; Blattscheiden am R. häutig.

Auf Wiesen, steinig und sumpfigen Plätzen der Gebirgskämme. Riesengebirge auf dem *Koppenplane*, der *Schneekoppe*, *weisen* u. *Elbwiese*, am *hohen Rade*, den *Teichrändern* etc. *Gl. Schneeberg*. Gesenke auf d. *Hockschar*, *Köpernik*, *Altwater*, *Janowitzer Haide*, im *Kessel*. Juni, Juli. ♀.

Wurzelstock kriechend, treibt bogenförmig-aufsteigende Blatthalme an den Seiten. Halm fast aufrecht, stark und starr, dreiseitig. Bltt. starr, seegrün, 2''' breit. Aehrchen aufrecht, bald gedrängt, bald etwas entfernt und ste unteren gestielt, braunschwarz. Nüsschen grün, zuletzt bräunlichschwarz.

C. stricta Good. Das oberste Aehrchen mit Stbgfbl., drei seitliche, aufrechte, lang-walzenförmige, kurzgestielte mit Stplbl., u. a. d. Spitze oft mit Stbgfbl. von lanzettlichen a. Gr. geöhrt, scheidelosen Deckbltt. gestützt; Nüsschen kahl, elliptisch, flach, mit stielrundem, ungetheiltem, kurzem Schnabel; die Blattscheiden am Rande in ein Fasernetz aufgelöst.

In Gräben, Waldsümpfen, an Teich- und Flussufern, wahrscheinlich durch d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb. Um Br. nicht selten bei *Tschansch*, *Oswitz*, *Klettendorf*, *Lissa*, *Koberwitz* etc. Mai, Juni. 2.

Meist in grossen und dichten Rasen. Halme aufrecht, stark, sehr scharf, steif, schwach-gekrümmt, oben geneigt. Bltt. steif-aufrecht. Deckschuppen schwärzlich-gespitzt. Nüsschen grün. Die Halmbllt. reichen selten bis an die Aehre. Von den folgenden ähnlichen, leicht durch die netzartig-verbundenen feinen Fasern am Rande der Blattscheiden zu unterscheiden.

C. caespitosa L. Das oberste Aehrchen Stbgfbl. tragend; die seitlichen Stplbl. tragend, meist 3, aufrecht walzig, sitzend od. das unterste gestielt, mit scheidelosen Deckbltt.; Nüsschen kahl, elliptisch, stumpf, eben, mit feinen Nerven und kurzem, ungetheiltem Schnabel; Bltt. aufrecht, Blattscheiden am R. häutig.

β. compacta. Aehrchen sämmtlich sitzend, dicht-gedrängt. *C. compacta* Krock. sil.
γ. gracilis. Halm schlank und dünn; Aehrchen sehr schmal.

Auf feuchten und nassen, auch sumpfigen n. moorigen Wiesen, eine der häufigsten und verbreitetsten Arten, meist in grosser Menge, von der Ebene bis auf die Kämme des Hochgebirges, wo besonders *β.* vorkommt. *γ.* auf trockneren Wiesen hier und da. Mai, Juni. 2.

Halm meist etwas gekrümmt. In dichten Rasen, $\frac{1}{2}$ - 1' h. Halmbllt. reichen bis an die Aehren oder bis an die Spitze des Halmes. Selten zwei Aehren an der Spitze mit Staubgefässblumen. Deckschuppen schwarz; Nüsse blassgrün.

C. acuta L. Die 2-3 obersten Aehrchen Stbgfbl. tragend; seitliche Stplbl. tragende meist 4, lang-walzig, bei d. Blühen überhängend, mit sehr langen, scheidelosen Deckbltt.; Nüsschen kahl, elliptisch, zusammengedrückt, mit undeutlichen Nerven u. kurzem, ungetheiltem Schnabel; Bltt. aufrecht, Blattscheiden am R. häutig.

An Gewässern, in Gräben, an Teichen u. Flüssen, auf nassen u. sumpfigen Wiesen i. d. Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Mai, Juni. 2.

Der vorigen ähnlich, aber durch die langen und überhängenden Aehrchen leicht zu unterscheiden; überhaupt höher und schlanker, meist 2 - 3' h. Das unterste Deckbltt. ist länger als der Halm. Deckschuppen schwärzlich mit grünem oder blassem Kiele.

β. Drei Narben; Nüsschen ohne Schnabel oder mit einem ungerandeten Schnabel.

C. Buxbaumii Wahlenberg. *C. polygama* Schkuhr. Das oberste Aehrchen verkehrt-eifg., oben Stempelbl. unten Stbgfbl. tragend; die seitlichen Stplbl. tragenden meist 3, das unterste kurzgestielt mit einem zweiöhrligen Deckbltt.; Nüsschen kahl, dreiseitig, stumpf mit kurzem Schnabel; Blattscheiden am R. in ein Fasernetz aufgelöst.

Auf sumpfigen Wiesen, in der Ebene u. bis an d. Hochgebirge, zerstreut. Um *Br.* auf Wiesen bei *Sakerau*, vor u. hinter *Lissa*, zw. *Althof* u. *Tschechnitz*, *Koberwitz*, *Liebenau* vor *Riemberg*. *Wohlau*. *Försterbach* u. *Eckersdorf* b. *Bunzlau*. *Cavalierberg* bei *Hirschberg*. *Wienow* b. *Oppeln*. Auf dem *gr. See* a. d. *Heuscheuer*. *Kessel* im *Gesenke*. Mai, Juni. 2.

Halm seegrün, steif-aufrecht, 1 - 1½ h. Bltt. seegrün. Deckschuppen gespitzt, kastanienbraun mit breitem grünem Kiel. Nüsschen grün.

C. atrata L. Aehrchen zu 3-5 genähert; das oberste am Gr. Stbgefbl. tragend, die andern Stplbl. tragenden länglich, gestielt, zuletzt hängend; Nüsschen kahl, rundlich-eifg. mit kurzem Schnabel, Halm glatt.

Auf felsigen Abhängen und grasigen Lehnen des Hochgebirges. Im Riesengeb. an der *Schneekoppe*, im *Aupagrunde*, an der *Kesselkoppe* etc. Im *Gesenke* am *Allwäter*, *Peterstein*, im *Kessel*. Juni, Juli. 2.

Halm 1 - 2' h., fast aufrecht. Bltt. 1 - 3'' breit, schwach-seegrün. Deckschuppen schwarz. Nüsschen grünlich, zuletzt schwärzlich.

C. limosa L. Die oberste Aehre Stbgefbl. tragend; die seitlichen Stplbl. tragenden meist 2, genähert, überhängend auf feinen Stielen, länglich; Nüsschen rundlich-oval, stumpf, linsenförmig-zusammengedrückt, kahl, ohne Nerven mit winzigem Schnabel; Wurzel sprossentreibend.

In Moorsümpfen der Ebene, des Vor- und Hochgebirges. *Königshuld* bei *Oppeln*. Auf den *Seefeldern* an d. *hohen Mense* und a. d. *Heuscheuer*. *Tafelfichte* n. *Rabenhorst*. In den Hochmooren des *Riesengeb.* u. *Gesenkes* häufig. Juni, Juli. 2.

Schlank, 1' h. Bltt. schwach-seegrün. Deckschuppen ziegelroth oder rostbraun. Nüsschen grün.

C. pilulifera L. Die oberste Aehre Stbgefbl. tragend; die seitlichen Stplbl. tragenden meist 3, genähert, rundlich, sitzend; das unterste Deckblatt blattartig, aufrecht-abstehend; Nüsschen kugelig-eifg., 3kantig, kurz geschnäbelt, weichhaarig; Deckschuppen stachelspitzig; Halme zur Fruchtzeit zurückgelehnt; Wurzel faserig.

Auf trocknen Waldplätzen und in Haiden in d. Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Um *Br.* bei *Lissa*, *Skarsine*, *Riemberg* etc. April, Mai. 2.

In dichten Basen. Halme 6' - 8' h., schärflich. Aehren rostbraun. Nüsschen weisslich-grün.

C. tomentosa L. Die oberste Aehre Stbgefbl. tragend; die seitlichen Stplbl. tragenden 1-2 fast sitzend, walzig, stumpf; das unterste Deckbltt. blattartig, söhlig-abstehend; Nüsschen kugelig-eifg., 3kantig, kurz geschnäbelt, kurzhaarig-filzig; Deckschuppen spitz-stachelspitzig; Wurzel sprossentreibend.

An Gebüschern, Waldrändern u. auf Waldwiesen in d. Ebene u. d. Vorgebirge, d. d. g. G. häufig. Um *Br.* bei *Bischofswalde* u. *Treschen*, *Bischwitz* a. *W.*, *Kapsdorf*, *Lissa* etc. Mai, Juni. 2.

Halme aufrecht, 1' h., am Gr. mit purpurrothen Scheiden besetzt. Bltt. schmal, aufrecht. Deckschuppen braungrün. Nüsse fast weisslich.

C. montana L. *C. collina* Willd. Die oberste Aehre Stbgbfl. tragend; die seitlichen Stpbl. tragenden 1-2, genähert, eifg., die Deckbltt. umfassend, häutig; Nüsschen länglich-eifg., 3kantig, mit kurzem ausgerandetem Schnabel, kurzhaarig; Deckschuppen stumpf stachelspitzig; Wurzel faserig.

In Gebüsch und an Waldrändern in d. Ebene u. d. Vorgebirge zerstreut. Um *Br.* zw. *Arnoldsmühl* u. *Leuthen* u. bei *Koberwitz*. *Krauschen*, *Schönfeld* u. *Thomaswaldau* b. *Bunzlau*. *Ohlau*. *Winnow* b. *Oppeln*. *Herlitz*, *Zossen* u. *Hermersdorf* b. *Troppau*. *Leobschütz*. *Kl. Silsterwitz* am *Geiersberge*. April, Mai. 2.

In dichten Rasen mit dichten Büscheln hellgrüner aufrechter Bltt. Halme dünn mit purpurrothen Scheiden am Grunde, 4-6" h. Deckschuppen schwärzlich. Nüsse blass-grün.

C. ericetorum Pollich. *C. ciliata* Willd. Die oberste Aehre Stbgbfl. tragend; die seitlichen Stpbl. tragenden meist 2, genähert, eifg.; die Deckbltt. umfassend, häutig; Nüsschen verkehrt-eifg., 3kantig, weichhaarig, mit kurzem, gestutztem Schnabel; die Deckschuppen am R. schwach gewimpert, stumpf; Wurzel sprossentreibend.

Auf lockerem Sandboden in Kiefer- und Birkenwäldern, Haiden, in d. Ebene gemein, hie und da auch im Vorgeb. Um *Br.* bei *Lissa*, am *Sandberge* vor *Paschkerwitz*, *Skarsine* etc. April, Mai. 2.

Halme unten aufsteigend, $\frac{1}{2}$ -1' h. Bltt. etwas starr, am Bande scharf. Deckschuppen kastanienbraun, an den Staubgefässblumen rostbraun.

C. praecox Jacquin. Die oberste Aehre Stbgbfl. tragend; d. seitlichen Stpbl. tragenden bis 3, genähert, länglich-eifg., d. unterste oft gestielt; die Deckbltt. umfassend, häutig, bisweilen am Gr. scheidenförmig; Nüsschen verkehrt-eifg., 3kantig, weichhaarig mit kurzem, schwach ausgerandetem Schnabel; Deckschuppe stachelspitzig; Wurzel sprossentreibend.

Auf freien Waldplätzen, Grasplätzen in Gebüsch, an Waldrändern und schattigen Dämmen, auch im Vorgeb., d. d. g. G. häufig. April, Mai. 2.

Höhe und Gestalt der vorigen, weniger steif. Deckschuppen hell-rostgelb. Bltt. sattgrün. In Wäldern kommt diese Art bisweilen mit höherem Stängel und längeren Bltt. vor.

C. digitata L. Die oberste Aehre Stbgbfl. tragend; die seitlichen Stpbl. tragenden meist 3, linealisch, etwas entfernt, gestielt, locker mit häutigen scheidenförmigen Deckbltt.; Nüsschen verkehrt-eifg., 3kantig, weichhaarig, so lang als die Deckschuppe, mit sehr kurzem, schwach ausgerandetem Schnabel; Wurzel faserig.

In schattigen Laubholz- und Nadelwäldern in der Hügellage der Ebene u. dem Vorgebirge häufig. Um *Br.* bei *Arnoldsmühl* u. *Lissa*. *Trebnitzer Hügellage*. Vom *Zoltenberge* d. d. g. Vorgeb. Im *Teufelsgärtchen* n. *Krause*. April, Mai. 2.

Gestalt und Stellung der Aehrchen macht diese Art leicht kenntlich. H. $\frac{1}{2}$ ". Die Halme selbst nur mit sehr kurzen Blättern besetzt.

C. pilosa Scopoli. Das oberste Stgfl. tragende Aehrchen entfernt; die Stplbl. tragenden meist 2, entfernt, aufrecht, gestielt, locker mit blattartigen, am Gr. scheidenförmigen Deckblt.; Nüsschen kugelig-verkehrt-eifg., 3kantig, kahl, gestreift mit rundlichem, an d. Spitze häutigem u. schief gestutztem Schnabel; Halme fast blattlos; die Bltt. der Wurzelblattbüschel breit, länger als die Halme, haarig-gewimpert.

In Wäldern. Um *Leobschütz* von Schramm gef. u. mitgetheilt. Um *Sucholasetz* bei Troppau nach v. Mückusch. April, Mai. 2.

Wurzel weit kriechend. Bltt. 1 - 4''' breit, starknervig. Das Endährchen keulenförmig, rothbraun. Deckschuppen grün mit röthlichem Bande. Nüsschen blaugrün.

C. panicea L. Das obere Staubgefbl. tragende Aehrchen entfernt; die unteren Stplbl. tragenden meist 2 entfernt, aufrecht, locker, das unterste sichtbar-gestielt; Deckblt. blattartig, scheidenfg.; Früchte kugelig-eifg., glatt, mit kurzem gestutztem Schnabel; Halme glatt, am Grunde beblättert; Wurzel sprossentreibend.

Auf feuchten Wiesen in d. Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. gemein. Mai, Juni. 2.

Seegrün. Bltt. $\frac{1}{2}$ - 1 $\frac{1}{2}$ ''' breit. Deckschuppen rothbraun mit grünem Kiel. Nüsse gelbgrün, später oft braun- und schwarz-gefleckt.

C. vaginata Tausch. *C. subspathacea* Wormskioed. Das oberste Stbfl. tragende Aehrchen entfernt, vor dem Blühen unter schiefe Winkel gebrochen; die unteren Stplbl. tragenden 2-3, aufrecht, locker; Deckblt. blattartig am Gr. aufgeblasen-scheidenförmig; Nüsschen kugelig-eifg. 3kantig kahl, mit rundlichem schief abgestutztem ausgerandetem Schnabel; Halme gestreift am Gr. beblättert; Wurzel sprossentreibend.

An quelligen Abhängen des Hochgebirges. Wurde zuerst von Tausch im Riesengebirge am *Abhange des Steinbodens* in den *Aupengrund* i. J. 1821 entdeckt und in der bot. Zeitung 1821 p. 557 beschrieben. Im J. 1827 fand ich sie in der *Kesselgrube d. Rgb.* und 1834 Finke u. Krause im *Kessel* und ich am *Köpernik* im Gesenke wieder. Juni, Juli. 2.

Der vorigen ähnlich, aber grün und durch die schief-gestutzten aufgeblasenen Scheiden der Deckblt. bei dem ersten Blick zu erkennen. H. 6 - 10''.

C. glauca Scopoli. *C. recurva* Hudson. Ein oder zwei Aehrchen am Ende tragen Staubgefbl.; 2-3 untere Stplbl. tragende walzig, dicht, lang-gestielt, zuletzt hängend; Deckblt. blattartig die untersten am Gr. ein wenig scheidenfg.; Nüsschen elliptisch, stumpf, zusammengedrückt-erhaben, scharflich, ohne Nerven, mit sehr kurzem ausgerandetem Schnabel; Halm glatt; Wurzel sprossentreibend.

Auf nassen und sumpfigen Wiesen, besonders in Waldgegenden, in d. Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Um *Br.* bei *Bischofs-*

walde, Bischwitz a. W., Lambsfeld, Lissa, Riemberg etc. Mai, Juni. 2.

See grün. H. 1'. Deckschuppen rost- oder dunkelroth-braun. Nüsschen graugrün.

C. maxima Scopoli. *C. agastachys* Ehrhart. *C. pendula* Good. Sowohl die einzelne Stbgfbl. tragende endständige, als auch die unteren Stpbl- tragenden Aehrchen bogenförmig, zuletzt hängend; letztere meist 4, entfernt, langwalzig, dicht, gestielt; Deckbltt. blattartig die untersten am Grunde ein wenig scheidenfg. Nüsschen elliptisch 3seitig, glatt mit kurzem 3 kantigem ausgerandetem Schnabel; Halm 3seitig; Bltt. breit lanzettlich-linealisch.

An feuchten Waldplätzen u. in Hauen im Vorgeb. Zuerst von Seliger bei Wölfelsdorf, dann von Kotschy im *Niedecker Schläge* am Abhange der *Czantory* bei Ustron gefunden. Juni. 2.

Bis 4' h. Aehrchen sehr lang und dünn. Bltt. schwach-seegrün, steif und lang. Deckschuppen rothbraun mit grünem Kiel.

C. pallescens L. Die oberste Aehre Stbgfbl. tragend; die unteren Stpbl. tragenden 2-3, genähert, überhängend, länglich-eifg., dicht, sichtbar-gestielt; Deckbltt. blattartig, scheidenfg.; Nüsschen länglich, stumpf, auf beiden Flächen etwas erhaben, ohne deutliche Nerven und Schnabel; Bltt. haarig; Wurzel faserig.

In Gebüsch, Wäldern u. auf Waldwiesen d. d. g. G. gemein. Mai, Juni. 2.

In lockeren Basen. H. 1'. Bltt. scharflich, hellgrün mit haarigen Scheiden. Deckschuppen rostbraun mit breitem grünem Kiel, Nüsschen grün, daher die ganzen Aehren blass-grünlich.

C. capillaris L. Das obere Aehrchen Stbgfbl. tragend; die unteren Stpbl. tragenden 2-3 langgestielt überhängend, locker und arblumig, die beiden oberen gegenständig und länger als das End-Aehrchen; Deckbltt. blattartig, scheidenfg.; Nüsschen schwellend 3kantig, glatt, mit schief-gestutztem Schnabel; Wurzel faserig.

An Felsen im Hochgebirge. Im Riesengebirge im *Rübezahls-Garten* zuerst von Ludwig gef., weiter links an der höheren Felswand unter dem *Steinboden* von Lessing: Am *kl. Teiche* nach N. v. E. Neuerlich im *Kessel* im Gesenke von Schauer gef. Juni, Juli. 2.

H. dreischneidig, dünn, 4-6'' h. Bltt. schmal-linealisch. Das unterste Aehrchen gewöhnlich entfernt, langgestielt. Deckschuppen braun. Nüsschen braun u. glänzend.

γ. Drei Narben; Nüsschen mit einem gerandeten 2zähligen Schnabel und geraden Zähnen; ein endständiges Aehrchen mit Stbgfbl.

C. flava L. Aehrchen mit Stpbl. 2-3 genähert, rundlich eifg., d. oberen sitzend; Deckbltt. blattartig am Gr. etwas scheidenförmig, zuletzt söhlig abstehend oder zurückgeschlagen; Nüsschen kugelig-eifg., aufgeblasen, nervig mit am Rande sägezählig-scharfem Schnabel; Halm glatt; Wurzel faserig.

Auf moosigen u. Moorwiesen besd. in waldigen Gegenden, auf Heidemporen, von d. Ebene bis auf das Hochgeb. häufig und stets

in grosser Anzahl. Um Br. bei *Friedewalde*, *Lissa*, *Liebenau* u. *Riemberg* etc. Mai, Juni. 2.

Die gelbliche Farbe der ganzen Pflanze macht diese Art vor allen andern ¹¹⁴⁶ ~~ähnlich~~. In dichten Rasen. Halme bis zur Mitte beblättert, meist schief, scharflich oder glatt. Nüsse bei der Reife sparrig-auseinanderstehend. Aendert in der Grösse von 2" - 1½'. *C. Oederi* ist als Art von dieser nicht zu unterscheiden.

C. fulva Gooden. Aehrchen mit Stempelbl. meist 3, aufrecht, länglich-eifg., dicht, die beiden oberen genähert, das unterste entfernt sichtbar gestielt; Deckbltt. zur Hälfte scheidenfg.; Nüsschen eifg., auf beiden Flächen erhaben, nervig, mit 2spaltigem am Rande sägezählig-scharfem Schnabel; Halm scharf; Wurzel faserig.

Auf sumpfigen Moorwiesen, in Gräben, in der Ebene zerstreut. Um Br. bei *Krittern*, *Schmolz*, *Lissa*, *Koberwitz*. *Ohlau*. *Görzitz*. Mai, Juni. 2.

Halme ½ - 1' h., in dichten Rasen, aufrecht, bald glatt, bald scharflich, dreischnellig. Deckschuppen dunkelbraun. Unterscheidet sich von der folgenden Art durch niedrigere aufrechte Halme und näher aneinanderstehende Aehrchen, dunkelgrüne Farbe der Bltt., dunklere Deckschuppen ohne Spitze.

C. distans L. Aehrchen mit Stplbl. meist 3, weit von einander entfernt, eifg.-länglich, dicht, das unterste sichtbar-gestielt; Deckbltt. zur Hälfte scheidenfg., die untersten blattartig und länger als der Halm; Nüsschen eifg., 3kantig, innen flach, aussen erhaben, kahl, nervig, mit einem 2spaltigem sägezählig-scharfem Schnabel; Deckschuppen stumpf mit scharfer Stachelspitze; Halm glatt; Wurzel faserig.

Auf feuchten Wiesen und Triften mit unfruchtbarem, lehmsandigem Grunde, auf Rodeplätzen in Wäldern, in d. Ebene zerstreut. Um Br. an der *Pelzbrücke*, bei *Goldschmiede* u. *Lissa*, *Bischwitz a. W.*, *Kapsdorf* etc. *Wohlau*. *Zeche* b. *Bunzlau*. *Ohlau*. *Oppeln*. *Palhanetz* b. *Troppau* nach v. *Mückusch*. Mai, Juni. 2.

In dichten und festen Rasen. Halme 1 - 1½' h., seegrün, krumm-aufsteigend. Bltt. abstehend, seegrün, starr. Deckschuppen rostbraun. Nüsse blassgrün.

C. sylvatica Hudson. *C. Drymeia* Ehrhart. Aehrchen mit Stempelbl. meist 4, entfernt, linealisch, locker, lang-gestielt, überhängend und hängend; Deckbl. blattartig zur Hälfte scheidenfg.; Nüsschen länglich, 3kantig, ganz glatt, mit linealischem, 2spaltigem, glattrandigem Schnabel; Halm glatt; Bltt. breit-linealisch.

In feuchten u. schattigen Laubwäldern d. Ebene u. d. Vorgeb., d. d. g. G. nicht selten. Um Br. bei *Bischofswalde*, *Lissa*, *Skarsine*, *Kottwitz* b. *Ohlau*. *Wohlau*. *Gröditz* b. *Bunzlau*. *Oppeln*. *Kitzelberg* u. *Sattler* b. *Hirschberg*. *Troppau*. Mai, Juni. 2.

In lockeren Rasen. Halme 2 - 3' h., schwach, im Bogen überhängend. Bltt. scharf. Deckschuppen grün mit weissem Hautrande.

♂. Drei Narben; Nüsschen mit einem gerandeten 2spitzigen Schnabel, die Spitzen abstehend; meist mehrere Aehren mit Stbgfbl. an der Spitze.

C. pseudo-Cyperus L. Das oberste Aehrchen mit Stbgfbl.; die unteren Stplbl. tragenden 4-6, walzig, dicht, lang-gestielt und

hängend; die unteren Deckbltt. scheidenförmig; Nüsschen eilanzettlich, nervig, kahl; Deckschuppen linealisch-pfriemlich, scharf; Halm dreischneidig mit scharfen Ecken.

An Gräben und Waldsümpfen, in der Ebene selten. Um *Br.* bei *Gabitz*, *Arnoldsmühl*, *Lissa*. *Oppeln*. *Palhanetz* b. *Troppau* nach v. *Mückusch*. Juni, Juli. 2

Durchaus grün, 1-2' h. Halme und Blt. sehr scharf. Die Aehrchen je tiefer, desto länger gestielt. Deckschuppen am Gr. wimperig. Nüsschen gekrümmt.

C. ampullacea Good. Ein bis drei Aehrchen mit Stbgfbl.; 2-3 mit Stpbl. entfernt, walzig, dicht, kurz-gestielt, aufrecht; Deckbltt. nicht scheidenfg.; Nüsschen aufgeblasen fast kugelig, kahl, hinten nervig, mit linealischem Schnabel; Halm stumpkantig glatt.

Im sumpfigen Gräben, an Teichen, auf Mooren von der Ebene bis in das Hochgebirge nicht selten. Um *Br.* bei *Lilienthal*, *Friedewalde*, *Lissa*. *Riemberg*. *Wohlau*. *Försterbach* b. *Bunzlau*. *Strehlen*. *Oppeln*. *Seefelder* an der *h. Mense* u. *Heuscheuer*. Auf den Mooren des *Riesengebirges*. Um *Troppau* bei *Zossen* und *Grätz* u. im *hohen Gesenke*. Juni. 2.

Lockere Rasen. Halme aufrecht, 1-2' h., am Gr. ründlich. Blt. am Gr. hohlkehlig, scharf, schwach-seegrün. Deckschuppen braun mit grünem Kiel.

C. vesicaria L. Ein bis drei Aehrchen mit Stbgfbl., 2-3 mit Stpbl., entfernt, länglich-walzig, dicht, sitzend oder kurz-gestielt, aufrecht; Deckbltt. nicht scheidenfg.; Nüsschen eikegellig, aufgeblasen, kahl, hinten nervig; Halm dreiseitig mit scharfen Ecken.

In Sümpfen, an Teich- und Flussrändern in d. Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Juni. 2.

Halme $1\frac{1}{2}$ -2' h., unten mit röthlichen Scheiden. Deckschuppen grünlich-braun. Nüsschen braungrün, schwach-glänzend, mit starken Nerven.

C. riparia Curtis. Drei bis fünf Aehrchen mit Stbgfbl.; 3-4 mit Stmpelbl. walzig, dicht, sitzend und gestielt, aufrecht; Deckbltt. nicht scheidenfg.; beiderlei Deckschuppen lanzettlich, feinspitzig; Nüsschen eikegelförmig mit gerundeten Rändern, auf beiden Flächen erhaben, mit feinen Nerven, kahl; Halm dreiseitig mit scharfen Ecken.

In Gräben, an Fluss- und Teichrändern, in Waldsümpfen; in der Ebene nicht selten. Juni. 2.

Diese Art ist die stärkste der ganzen Sippe. Halme 2-4' h., steif und starr, schwach-seegrün. Blt. 3-6''' breit, steif, seegrün. Deckschuppen grünlich, nach oben brann.

C. paludosa Good. Zwei bis drei Aehrchen mit Stbgfbl. und stumpfen, unteren Deckschuppen; 2-3 mit Stempelbl., walzig, dicht; sitzend u. gestielt, aufrecht; Deckschuppen lanzettlich feinspitzig; Deckbltt. nicht scheidenfg.; Nüsschen eifg., zusammengedrückt undeutlich-3kantig, nervig, kahl; Halm dreiseitig mit scharfen Ecken.

Wie die vorige, aber häufiger. Juni. 2.

Durchaus schmaler als die vorige Art. Stark seegrün. Bltt. 2-3''' breit. Deckschuppen rothbraun. Nüsschen braungrün, starknervig.

C. filiformis L. Ein bis zwei Aehrchen mit Stbgfbl.; 2-3 mit Stplbl. länglich, dicht, sitzend, aufrecht; Deckschuppen feinspitzig; Deckbltt. kaum scheidenfg.; Früchte länglich-eifg., schwelend, kurzhaarig; Halm stumpfkantig; Bltt. hohlkehlig.

In Moorsümpfen. Zuerst i. J. 1823 von Fuchs bei *Rosenberg* in OS. gef. Dann *Königshuld* bei Oppeln v. Grabowski und Fincke. Auf d. *grossen See* an der *Heuscheuer*. *Moosebruch* bei *Reiwiesen* im Gesenke nach R. u. M. *Elbwiese* im Riesengeb. nach N. v. E. Um *Bunzlau* nach v. Albertini. Mai, Juni. 2.

H. 1-2'. Bltt. aufrecht, zusammengerollt. Deckschuppen rothbraun, oben gewimpert.

C. hirta L. Zwei Aehrchen mit Staubgfbl., 2-3 mit Stplbl., länglich-walzig, aufrecht, das unterste gestielt; Deckschuppen mit einer Grannenspitze; das unterste Deckblatt zur Hälfte scheidenfg.; Nüsschen eifg., kurzhaarig; Halm glatt; Blätter und Blattscheiden kurzhaarig.

β. Blätter und Blattscheiden fast kahl.

Auf sandigem, sowohl trockenem als feuchten Stellen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein. β. an feuchten Orten hin u. wieder, um Br. bei *Oswitz*. Mai, Juni. 2.

Wurzel weithin kriechend. Deckschuppen länglich-lanzettlich, grünlich mit weissem Hautrande. Nüsschen bleich. Von dieser Art wird bei uns häufig die Wurzel statt der ächten *C. arenaria* für die Apotheken gesammelt.

Anmkg. Da ich solche Arten, deren Vorkommen im Gebiet nicht genug sichergestellt ist, nicht gern weiter fortführen mag, so habe ich sowohl *C. humilis* Leysser, die von Ludwig auf der *Iserwiese* gefunden worden sein soll, aber so viel ich weiss seither von Niemandem wiedergefunden worden ist, als auch *C. extensa*, welche v. Mückensch bei *Braunsdorf* bei *Troppau* angab, wobei ich eine Verwechslung mit Grund vermuthete, hier nicht aufgeführt.

Gramineae Jussieu.

Blumen in Aehrchen, welche zu einfachen oder zusammengesetzten Aehren, Trauben oder Rispen, ohne gemeinschaftliche Hülldeckblätter zusammengestellt sind. Am Grunde jedes Aehrchens stehen zwei schuppenförmige grüne Deckblätter, wovon das eine tiefer und der Axe gegenüber steht, das andere höher, und der Axe anliegt und von jenem umschlossen wird: diese beide bilden nach Linné den Kelch. Jede Blume wird von zwei schuppenartigen Blättchen umgeben, wovon das äussere und untere mit einem Hauptkielnerven versehen, grün, und den Deckblättern des Aehrchens an Gestalt und Consistenz gleich ist, das innere und obere durch einen sehr

kurzen Stiel von jenem getrennt, am Rücken zweikielig, zärter häutig, meist durchscheinend-weisslich, und an der Spitze ausgerandet ist, so dass es aus 2 verwachsenen Blättchen zu bestehen scheint: diese beiden bilden nach Linné die corolla, nach R. Brown das perianthium. Bisweilen befinden sich innerhalb dieser dem inneren Blumenhüllblatt gegenüber, und neben einander zwei kleine häutige schuppenartige Blättchen, seltner drei oder nur eines, lodiculae genannt. Drei Staubgefässe aus dem Fruchtboden, mit dem inneren Blumendeckblatt und den beiden Nebenschuppen, wenn diese vorhanden sind, wechselständig; selten weniger, bisweilen 6. Die Staubbeutel an der Mitte des Rückens befestigt, die Fächer an beiden Enden auseinanderweichend. Fruchtknote einzeln frei, mit einem oder 2 Griffeln, und 2 fadenförmigen, sprengwedeligen oder fiederigen Narben. Frucht eine Kornfrucht, caryopsis, frei oder mit den Deckblt. verwachsen. Der Keim liegt vorn und aussen an dem mehligem Eiweiss.

Kraut- oder staudenartige Gewächse mit faseriger, einjähriger oder söhlig-kriechender ausdauernder Wurzel. Der Stängel ist gegliedert mit Knoten, innen von Knoten zu Knoten hohl. Die meist linealische Blattplatte geht in eine, an jedem Stängelgliede vom Knoten ausgehende und dasselbe theilweise umschliessende, gespaltene Blattscheide über, deren innere Oberhaut am Grunde der Blattplatte in Gestalt eines weissen Häutchens, *ligula*, hervortritt. Die oberen Blumen der Aehrchen verkümmern bisweilen bis auf ein kleines Stielchen. Bei vielen, besonders in den wärmeren Ländern einheimischen Sippen, sind die unteren Blumen stets unvollständig, indem der Stempel fehlt und nur Staubgef. vorhanden sind, oder auch beide fehlen, oder endlich nur ein Deckblatt als Ansatz dazu vorhanden ist. Die Spindel ist gewöhnlich verzweigt, da eine Rispe entsteht; bei einigen trägt sie aber die Aehrchen unmittelbar oder an sehr kurzen Stielen in Ausschnitten oder Höhlungen. Wenn der Kielnerv oder auch mehrere vereinigte Nerven der Blumendeckblt., so wie der Aehrchendeckblt., sich von der Blattfläche derselben lösen, was theils am Rücken höher oder tiefer, theils an der Spitze geschieht, und sich selbstständig verlängern, so heisst diese Verlängerung eine Granne. — Die Gräser sind eine der wichtigsten und bedeutungsvollsten Pflanzenfamilien durch die mehrlartigen nahrhaften Samen, und namentlich sind die Getreidearten von der höchsten Wichtigkeit. Auch für die Physiognomie des Landes sind sie dadurch wichtig, dass sie gedrängt wachsen und ganze Strecken und Flächen mit einem grünen Teppich überziehen, und auch sonst sich überall ansiedeln, viele auch mit magerem Boden und dürrer Nahrung ausreichend, an sonst unfruchtbaren Stellen, z. B. im Flugsande, sich ansetzen, verbreiten und denselben befestigen und nach und nach fruchtbar machen helfen. Differenten für die Arzneikunde wichtige Stoffe werden in ihnen nicht gefunden. Die Halme mehrerer enthalten Zucker, der Same Eiweiss und viel Satzmehl, die Knoten und Blt. der Halme eine bedeutende Menge Kieselerde. Sämmtlich, ausser *Zea*, *Anthoxanthum*, *Holcus* und *Nardus* bei Linné in III, 2.

1. *Olyraeae*. Die Stbgfbl. und Stempelbl. getrennt, in besonderen einander unähnlichen Aehrchen.

Zea L. Mays. Staubgef. endständig in traubigen Rispen; Aehrchen 2blumig. Stempelbl. in winkelständigen von Scheiden umschlossenen Aehren; Aehrchen 2blumig, die eine Blume leer; Blumendeckbltt. fleischig. Griffel sehr lang. Narbe gewimpert. Kornfrüchte, rundlich-nierenfg. in 8 paarweisen Reihen an einer fleischigen Spindel. XXI, 3.

*Z. Mays L.

Stammt aus *America* und wird häufig angebaut. Sommer. ☉.

2. *Alopecureae.* Aehrchen in eine ährenförmige Rispe oder Traube gestellt. Aehrchen von den Seiten zusammengedrückt, 1blumig mit oder ohne Ansatz zu einer zweiten Blume. Aehrendeckbltt. die Blumen fast ganz einschliessend. Griffel aufrecht, am Gr. einander sehr genähert oder verwachsen.

Alopecurus L. Fuchsschwanz. Rispe ährenförmig. Aehrchen einblumig mit halb-verwachsenen Deckbltt. Nur ein Blumendeckblatt, spreuartig, schlauchförmig, auf der inneren Seite gespalten, mit einer Granne am Rücken.

A. pratensis L. Halm aufrecht, kahl; Aeste der ährenförmigen Rispe 4-6blumig; Aehrendeckbltt. spitz, bis gegen die Mitte verwachsen, zottig-gewimpert.

Auf Wiesen und an Waldrändern, an Ackerrainen und Gräben, von d. Ebene bis auf das Hochgeb. gemein. Mai, Juni. ♀.

Halme mit schwärzlichen starken Knoten, am Gr. oft gekniet, 2-4' h. Die oberen Blattscheiden etwas aufgeblasen. Aehrendeckbltt. weisslich mit grünen Bandlinien und Ribben, zuweilen in das violette spielend.

A. agrestis L. Halme aufrecht, oben schärflich; Aeste der ährenfg. Rispe 1-2blumig; Aehrendeckbltt. bis zur Mitte verwachsen zugespitzt, auf dem Kiele schmal flügelrandig, kurz gewimpert.

Auf Aeckern. Um *Oppeln* von Grabowski i. J. 1829 gefunden. Juni. ☉.

Rasensg. Halme ansteigend, 1 - 1½' h. Rispe grünlich, violett angelaufen. Granne über dem Gr. entspringend, oben gekniet.

A. geniculatus L. Halme am Gr. niederliegend, kahl; Aehrendeckbltt. am Gr. verwachsen; stumpf; die Granne entspringt unter der Mitte des Blumendeckblatts und ist länger als das Aehrchen.

Auf feuchten Wiesen und Sandplätzen, an den Rändern von Gewässern, in Gräben, häufig d. d. g. G. in der Ebene u. d. Vorgeb. Mai — Juli. ☉.

Rasensg., 1' h. Rispe weisslich-grün. Obere Blattscheiden schwach-aufgeblasen. Granne fast doppelt so lang als das Aehrendeckbltt. Staubbeutel erst schmutzig-ocherf., dann gelbbraun.

A. fulvus Smith. *A. paludosus* Pal. de Beauvois. Halme am Gr. niederliegend, dann aufsteigend, kahl; Aehrchendeckbltt. am Gr. verwachsen, stumpf; die Granne entspringt aus der Mitte des Blumendeckblatts, und ist kaum länger als das Aehrchen.

Mit der vorigen oft in Gesellschaft, aber etwas sparsamer. Mai bis Juli. ☉.

II. 1'. Seegrün, besd. die aufgeblasenen Scheiden. Rispe fast weisslich. Staubbeutel orangefarben, nach dem Verstäuben bleich.

Phleum L. *Lische*. Rispe ährenförmig. Aehrchen einblumig, mit oder ohne stielartigen Ansatz zu einer zweiten Blume. Die beiden Aehrchendeckbltt. fast gleichgross. Zwei häutige Blumendeckblätter.

P. pratense L. Aehrchendeckblättchen quer-abgestutzt, mit aufgesetzter Grannenspitze, am Kiel borstig gewimpert; die Granne kürzer als das Aehrchen.

β. *nodosum*. Niedrig, am Gr. gestreckt; Aehre kurz; Wurzelstock knollig-aufgetrieben. *P. nodosum* Linné.

Auf Wiesen, an grasigen Wegrändern und an Waldrändern. β. auf trockneren Stellen. Juni, Juli. ♀.

Sehr lange, oft 4 - 6' lange, dünne und walzige Aehre. Halm 1 - 3' h. Die obere Blattscheide schwach-aufgeblasen.

P. alpinum L. Aehrchendeckbltt. quer abgestutzt, mit aufgesetzter Grannenspitze, am Kiel borstig-gewimpert; die Granne so lang als das Aehrchen.

Auf fruchtbaren Wiesen im Vor- und Hochgebirge. *Sonnenkoppe*. *Gl. Schneeberg*. *Riesengeb.* sehr häufig. Im Gesenke um *Einsiedel*, *Hermannstadt* u. *Reinwiesen* nach R. u. M.; bei *Carlsbrunn* u. auf den Kämmen des *Alt Vater*, *Hockschar* u. s. w., im *Kessel*. *Czantory* u. *Baranio* b. Teschen. Juli, Aug. ♀.

Aehre länglich-walzig. Aehrchendeckbltt. meist violett-angelaufen. Halme $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ ' hoch.

P. Boehmeri Wibel. Aehrchendeckbltt. schief-gestutzt in eine Stachelspitze zugespitzt, am Kiele borstig-gewimpert; Granne kurz.

Auf trocknen, sandigen Plätzen, auf Sandhügeln, an sandigen und steinigen Wegrändern in der Ebene. Um *Br.* bei *Carlowitz*, *Fuchsberg* b. *Schwöitsch*, *Lissa* etc. *Weinberg* b. Ohlau, *Wohlau*. *Tillendorf*, *Wehrau* u. *Schönfeld* bei Bunzlau. Um *Troppau* häufig. Juni, Juli. ♀.

Halme $1\frac{1}{2}$ - 2' h., steif, etwas seegrün, oft rötlich- oder violett-angelaufen. Rispe walzenförmig, grün. Gewöhnlich sind mehrere Blumen misgebildet, indem die Blumendeckbltt. sich in eine Röhre vergrössern, die ein krankhaftes schwärzliches Samenkorn enthält.

Beckmannia Host. *Beckmannie*. Rispe ährenförmig. Aehrchen zweiblumig. Aehrchendeckbltt. verkehrt-herzförmig.

mig, an den Seiten bauchig-gewölbt. Aeusseres Blumendeckblatt in eine Stachelspitze verlaufend.

† *B. erucaeformis* Host.

Auf sumpfigen Wiesen im östlichen Europa einheimisch. Schum- mel fand bei Br. in der *Odervorstadt bei Polnisch-Neudorf* i. J. 1814 eine Anzahl Exemplare, und Günther vermuthete, dass die Pflanze mit Waaren aus Russland eingewandert sei, da die russischen Fuhrleute dort zu stationiren pflegten. Sie ist seitdem nicht wieder gefunden worden. Juni. 2.

H. bis 2'. Stängel steif-anrecht. Bltt. 2 - 3''' breit. Rispe grün, unten aus zusammengesetzten, oben aus einfachen einseitwendigen, wechselständig-sitzenden Aehrchen zusammengesetzt.

3. *Oryzae*. *Aehrchen in einer Rispe, von den Seiten zusammengedrückt. Die Aehrchendeckblätter sind sehr klein, oder fehlen ganz.*

Leersia Solander. Aehrchen einblumig. Zwei papierartige, fast gleich-lange Blumendeckbltt. ohne Granne, das untere breiter, welche die Kornfrucht bei der Reife einschliessen.

L. oryzoides Swartz. Die Rispe abstehend mit bogigen Aesten.

An Gräben und Teichrändern, in d. Ebene an mehreren Orten zerstreut. Um Br. am *Lehmdamme*, bei *Marienau, Wildschütz, Schwöitsch, Paschkerwitz. Ohlau. Pasche* bei Beuthen. *Wohlau. Bunzlau* nach v. Albertini. Am *Hainwasser* bei *Herischdorf* nach N. v. E. *Katichteich* h. Oppeln. Am *Herlitzer Teich* u. b. *Dürstenhof* u. *Erbersdorf* nach R. u. M. Aug., Sept. 2.

Sieht der Reispflanze nicht unähnlich. H. 2 - 3'. Blattscheiden sehr scharf. Die Rispe tritt bei uns nur selten aus den oberen Scheiden vollständig hervor und kommt nur nach warmen Sommern zur völligen Entwicklung; die Aehrchen fallen sehr leicht ab. Es scheint daher zweifelhaft, ob die Pflanze bei uns ursprünglich einheimisch sei, aber als eingebürgert muss sie gelten.

4) *Aveneae*. *Aehrchen in einer Rispe oder Traube, von den Seiten zusammengedrückt, selten rundlich; 1-2 selten vielblumig. Das untere Aehrchendeckblatt gewöhnlich begrannt. Griffel seitwärts gebogen und von einander weit abstehend.*

Agrostis L. *Strausgrass*. Rispe offen. Aehrchen einblumig, ohne Ansatz zu einer 2ten Blume. Das untere Aehrchendeckblatt länger als das obere. Blumenstielchen kurz behaart. Das äussere Blumendeckblatt mit oder ohne Granne; das innere fehlt bisweilen. Griffel sehr kurz.

a. Blätter fleck. Zwei Blumendeckbltt.

A. vulgaris Withering. *A. rubra* W. et Gr. sil. Rispe länglich-eifg., vor u. nach dem Blühen sparrig-ausgebreitet; Rispenstiele schärflich; Blatthäutchen kurz, gestutzt; Bltt. linealisch.

An Wegen, Brachen, Ackerrändern, Waldrändern und in Gebüsch und Wäldern, auf trockenem u. feuchtem Boden, von der Ebene bis in die Schluchten des Hochgebirges, oft in grosser Menge, überall gemein. Juni — Aug. 2.

Mehr glatt und geschmeidiger als die folgende, meist 1 - 2' h. Rispenäste halbquirlich. Aehrchendeckbltt. grün und purpur-violett gemengt, bisw. ganz-violett und glänzend, am Kiele meist glatt. Häufig werden die Früchte vom Brande ergriffen; dann bleibt die Pflanze niedrig, 4 - 6" h.: *A. pumila* Linné. Varietät mit ganz grünen oder grüngoldglänzenden Aehrchen im Schatten.

A. stolonifera L. *A. alba* Schrad. W. et Gr. sil. Rispe länglich-kegelförmig, nach dem Blühen mit zusammengezogenen Nebenästen, Rispenstiele und Aeste scharf; Blatthäutchen länglich; Bltt. linealisch; Stängel am Gr. gekniet.

Auf feuchten Sandplätzen, an feuchten Weg- und Grabenrändern, Ackerrainen, in Gebüsch, häufig d. d. g. G. Juni — Aug. 2.

Aehrchendeckbltt. etwas grösser als die vorige, grünlich-purpurroth, beide an den Kielen scharf. Stängel meist 1' h., am Gr. oft niederliegend und wurzelnd, aber in Gebüsch auch aufrecht, hoch und vielblumig. Variirt ferner mit strohgelben Aehrchen an trocknen Stellen, wie dergleichen bleiche Abarten von vielen Gräsern vorkommen.

b. Trichodium. Wurzelbltt. zusammengerollt. Das obere Blumendeckblatt fehlt gewöhnlich.

A. canina L. Rispe eifg., schlaff; Aeste sparrig, schärflich; Aehrchendeckbltt. eilanzettlich spitz; d. äussere Blumendeckblatt feingekerbt mit einer am Rücken unter der Mitte entspringenden Granne.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen in sumpfigem und feuchtem Wald- und Haidelände, d. d. g. G. in d. Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Juni — Aug. 2.

Von *A. rubra* durch den sehr schwachen flatterigen Halm, die horstlich-zusammengerollten Wurzelbltt. und die Granne leicht zu unterscheiden; Höhe und Farbe wie bei jener. Die Granne über der Blumenhülle einwärts-gekniet. Var. mit goldgelben Aehrchen, bei *Oppeln* von Grabowski gef.

A. alpina Scopoli. Rispe offen; Aeste und Stiele scharf; Aehrchendeckbltt. eilanzettlich; d. äussere Blumendeckblatt vorn mit 2 kurzen Borsten und einer nahe am Grunde entspringenden Granne.

An felsigen Abhängen des Hochgebirges. Im *Kessel im Gesenke* i. J. 1832 von Grabowski gef. Juli, Aug. 2.

Der folgenden sehr ähnlich, etwas höher und schlanker, Aehrchen ein wenig grösser, rüthlich.

A. rupestris Allione. Rispe länglich, offen; Aeste und Stiele glatt; Aehrchendeckbltt. lanzettlich; das äussere Blumendeckblatt vorn feingekerbt mit einer am Rücken unter der Mitte entspringenden Granne.

Auf kiesigen und steinigten Plätzen der Kämme und in den Felssritzen des Hochgebirges. Nur im Riesengeb. an der Schneekoppe und längs des ganzen Kammes. Juli, Aug. 2.

In dichten Basen, 4 - 6' h. Bltt. borstlich-zusammengerollt, starrer als an *A. canina*. Aehrchen rüthlich, auch strohgelb. Zuweilen ist das innere Blumendeckblatt ausgebildet und grannentragend.

Apéra Adanson. *Windhalm*. Aehrchen 1blumig, mit einem stiel förmigen Ansatz zu einer zweiten Blume. Das untere Aehrchendeckblatt kürzer als das obere. Blumenstielchen kurz-behaart. Das äussere Blumendeckblatt mit wellenförmiger Granne unter der Spitze.

A. Spica venti P. de Beauvois *Agrostis* S. v. Linné. Rispe weit; Staubbeutel lineal-länglich.

Auf Aeckern unter d. Saat u. auf Brachen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. gemein, bisweilen in uermesslicher Menge. Juni, Juli. 2.

Halm aufrecht, 1 - 2' h. Aehrchen grünlich, bisweilen rüthlich-angelaufen. Granne $2\frac{1}{2}$ mal so lang als das Blumendeckblatt, scharflich.

Calamagrostis Roth. *Schilf*. Rispe offen. Aehrchen einblumig, mit oder ohne einen stiel förmigen behaarten Ansatz zu einer 2ten Blume. Aehrchendeckblatt. fast gleichlang. Blumenstiel mit einem Büschel langer nach dem Blühen sich verlängernder Haare besetzt.

C. lanceolata Roth. *Arundo Calamagrost.* L. Rispe offen; Aehrchendeckblatt. lanzettlich zugespitzt; Haarbüschel länger als das äussere Blumendeckblatt, welches aus einer kleinen Ausrandung eine gerade und dasselbe nicht überragende Granne trägt.

In feuchten Gebüschern, an buschigen Gräben und Flussufern, in d. Ebene zerstreut. Um Br. bei Marienau, Bleischwitz, Schweinern, Merzdorf u. Kottwitz bei Ohlau, im Walde hinter Lissa. Juli, Aug. 2.

H. 4 - 5'. Rispe $\frac{1}{2}$ ' lang. Aehrchendeckblatt. rüthlich- oder violett-angelaufen. Granne sehr kurz und zart.

C. Epigeios Roth. *Arundo Ep.* Linn. Rispe straff, etwas offen, knäuelig-gelappt; Aehrchendeckblatt. lanzettlich in eine pfriemliche Spitze auslaufend; Haarbüschel länger als das Blumen-Deckblatt*); die Granne aus der Mitte des Rückens, gerade.

Auf sandigem Grunde in Gebüschern, Wäldern, Haiden, an Flussufern, gemein bis in das Vorgeb. Juli, Aug. 2.

H. 3 - 5'. Steif und starr. Bltt. straff, mehr oder minder zusammengerollt. Rispe länglich, grün mit violettem Anlauf.

*) nämlich: das äussere, welches hier stets verstanden wird, wenn nicht ausdrücklich das innere bezeichnet wird.

C. Halleriana De Candolle. Rispe offen; Aehrchendeckbltt. lanzettlich zugespitzt; Haarbüschel länger als das äussere Blumen-deckblatt, welches eine am Rücken unter der Mitte entspringende und dasselbe ein wenig überragende, gerade Granne trägt.

Auf sandigen und unfruchtbaren Waldplätzen u. Wiesen an Hügeln, Lehnen u. Kämmen des Vor- und Hochgebirges. Um *Charlottenbrunn* am schwarzen, spitzigen und langen Berge. *Zentnerberg* bei Neurode. *Heuscheuer. Gl. Schneeberg. Kämme des Riesengeb. und Gesenkes* häufig bis in die niedere Waldregion herab, noch um *Schreibershau* und *Carlsbrunn*. Juli, Aug. 2.

H. 2-3'. Rispe grünlich, meist stark mit violett gemischt, oder ganz dunkelviolett, mit gleichförmig-vertheilten Aehrchen. Bltt. im Schatten und Wald eben, auf freien sonnigen Kämmen zusammengerollt.

C. sylvatica De Cand. *Arundo sylv.* Linn. Rispe offen; stiel-förmiger Ansatz zu einer 2ten Blume; Aehrchendeckbltt. spitzig, Haarbüschel viel kürzer als das äussere Blumendeckblatt, welches am Rücken eine gekniete, das Aehrchen überragende Granne trägt.

In trocknen und steinigen Wäldern u. Haiden, sparsam in der Ebene, häufiger im Vorgeb., bis auf das Hochgebirge. Um *Br.:* *Waldmühle* bei *Kritschen. Ohlau. Wohlau*. Juli, Aug. 2.

Rispe lang und schmal, gelbgrünlich mit fleischf. oder rosaf. Anlauf. Granne fast doppelt so lang als das Aehrchen. Nur diese Art unter den unsrigen hat einen Ansatz zu einer zweiten Blume.

Arrhenatherum P. de Beauvois. *Wiesenhafer*. Rispe offen. Aehrchen 2blumig; die untere Blume nur Stbgf. enthaltend, das äussere Deckbltt. mit knieförmig-eingebogener Granne aus dem Rücken; die obere zwitterig, ohne oder mit kurzer Granne unter der Spitze.

A. elatius Mert. u. Koch. *Avena elatior* L. Bltt. eben.

Auf feuchten Wiesen, grasigen Hügeln, in lichten Gehölzen, in d. Ebene u. d. Vorgeb. nicht selten. Mai, Juni. 2.

H. 3-4'. Grün. Rispenäste kurz. Das äussere Aehrchendeckbltt fast um die Hälfte kürzer. Die äusseren Deckbltt. dreinervig.

Holcus L. *Honiggras*. Rispe halb offen. Aehrchen 2-3 blumig; die untere Blume zwitterig, ohne Granne; die obere nur Stbgf. tragend mit einer Granne auf dem Rücken des äusseren Deckblattes. XXIII, 1.

H. lanatus L. Granne rückwärts-gebogen, im Aehrchen ver-borgen; Bltt. u. Blattscheiden zottig; Wurzel faserig.

Auf Wiesen, Triften u. freien Waldplätzen, d. d. g. G. häufig Jun. — Aug. 2.

H. 1-2'. Durchaus mit kurzem weichem sammtartigem Zottenüberzuge. Aehrchendeckbltt. am Gr. rosafarben, nach oben grünlich-strohgelb.

H. mollis L. Granne gekniet, über das Aehrchen herausragend; Bltt. u. Blattscheiden fein sammthaarig; Wurzel kriechend.

An Rainen, in trocknen Gehölzen u. Wäldern, zerstreut d. d. g. G. Um Br. bei *Lilienthal*, *Lissa*, *Skarsine* etc. Juli, Aug. 2.

Die Aehrendeckbltt. etwas spitziger als an der vorigen, strohgelb mit grünen Nerven, am Gr. schwach lilaf.

Corynéphorus P. de Beauvois. *Silbergras.* Rispe halb-offen. Aehrchen 2-3 blumig, sämmtliche zwitterig. Das äussere Blumendeckblatt trägt aus dem Rücken eine keulenförmige in der Mitte gegliederte und daselbst mit einem Haarkranz versehene Granne.

C. canescens Beauv. *Aira can.* Linn. Rispe gedrängt; Aehrendeckbltt. länger als die Blume; Bltt. borstlich.

Auf Sandboden, sandigen Hügeln u. Feldern, in sandigen Kieferwäldern und Haiden in der Ebene. Um Br. bei *Carlowitz*, *Schwoitsch*, *Paschkerwitzer Sandberg*, *Lissa* etc. *Wohlau*. *Beuthen a. O.* Bei *Bunzlau* und um *Tillendorf*, *Wehrau*, *Tiefenfurth*. *Ohlau*. *Oppeln*. *Troppau*. Juli, Aug. 2.

Rasen dicht, leicht trennbar. II. $\frac{1}{2}$. Bltt. starr, zusammengerollt-borstlich, so wie der Halm graugrün mit purpurf. Anlauf. Obere Scheiden schwach-aufgeblasen. Deckbltt. fleischfarben. Staubbeutel violett. Das dritte Blümchen ist bald ausgebildet bald nur ein Ansatz dazu da.

Aira L. *Schnele.* Rispe offen. Aehrchen 2 blumig, mit oder ohne Ansatz zu einem dritten. Das untere Aehrchendeckblatt kürzer als das obere. Das äussere Blumendeckblatt mit einer geraden oder nur am Grunde gedrehten Granne.

A. caespitosa L. Bltt. flach, gefurcht; Rispe schlaff, Stiele scharf, Anheftungspunkt und Länge der Granne wechselnd.

α. vulgaris. Aehrchen grüngelb, violett-angelaufen, Granne länger als die Blume.

β. virescens. Rispe fatterig; Aehrchen blassgrün, klein, oft einblumig mit einem Ansatz zur zweiten Blume.

γ. varia. Aehrchen aus gelb, violett und silberweiss gescheckt, Rispe zusammengezogen, Granne oft sehr kurz oder fehlend.

δ. aurea. Aehrchen gross, gelblich; Deckbltt. wimperig-zerrissen, oft ohne oder mit sehr kurzen Grannen.

Auf Wiesen, an Waldrändern, in Gebüsch, Wäldern, Haiden gemein. *β.* in schattigen Wäldern; *γ.* auf feuchten und fetten Wiesenplätzen der Gebirgskämme, um die Bauden im *Riesengebirge* u. *Gesenke*; *δ.* auf steinigten Plätzen der Gebirgskämme zerstreut, auf dem *Koppenplane*, am *Altwater*. Juni — Aug. 2.

In dichten und festen Rasen. Bltt. starr, scharflich. Rispe oft übereineigt. Deckbltt. abgestutzt, gezähnt. Die Grannen entspringen bald aus dem Grunde, bald aus oder über der Mitte, sind selten etwas länger als die Aehrchen, und fehlen bisweilen an dem inneren Blumendeckblatt, selten in der oberen Blume, noch seltner in beiden.

Avéna L. Hafer. Rispe offen oder halb offen. Aehrchen zwei- oder vielblumig. Das untere Aehrchendeckblatt kürzer als das obere. Das äussere Blumendeckblatt mit einer knieförmig-gebogenen unten gedrehten Granne aus dem Rücken.

a. Aehrchen nach dem Verblühen hängend, mit 5-9 nervigen Deckbltt. Fruchtknoten an der Spitze haarig.

* *A. sativa L.* Rispe gleichförmig, offen; Aehrchen zweiblumig; die Aehrchendeckbltt. länger als die Blumen, das obere 9nervig; Blumen kahl mit lanzettlichen an der Spitze 2spaltigen und gezähnelten Deckbltt., das obere ohne Granne; die Spindel kahl, am Gr. der untersten Blume ein kleiner Haarbüschel.

Wird allgemein gebaut. Juli. ☉.

Diese und die folgenden drei bilden die eigentlichen Haferarten, welche sich von den anderen durch eine eigenthümliche Haltung der Rispe und Aehrchen auffallend unterscheiden, jedoch durch einige Uebergangsformen sich an jene anschliessen.

* *A. orientalis Schreber.* Rispe einseitwendig, zusammengezogen; Aehrchen meist 2 blumig; die Blumendeckbltt. länger als die Blumen, das obere 9nervig; die Blumen kahl, die Deckbltt. lanzettlich an der Spitze 2spaltig und gezähnelte, das obere ohne Granne; die Spindel kahl, an dem Gr. der untersten Blume ein Haarbüschel.

Wird hie und da angebaut. Juli, Aug. ☉.

† *A. strigosa Schreber.* Rispe fast einseitwendig; Aehrchen meist 2 blumig; die Aehrchendeckbltt. so lang als die Blumen, das obere 7-9nervig; die Blumen kahl, die Deckbltt. lanzettlich mit geknieter Granne am Rücken, oben in 2 begrannete Spitzen gespalten; Spindel kahl, am Gr. der oberen Blume ein Haarbüschel.

Kommt hin u. wieder unter *A. sativa* und unter anderem Getraide vor. Juli, Aug. ☉.

† *A. fatua L.* Rispe gleichförmig, offen; Aehrchen meist 3 blumig; das obere Aehrchendeckblatt 9nervig; die Blumendeckbltt. unterhalb borstenhaarig mit geknieter Granne am Rücken, an der Spitze 2zählig; Spindel haarig.

Unter der Saat, wie die vorige. Juli, Aug. ☉.

b. Aehrchen aufrecht, mit 1-3nervigen Deckbltt. Fruchtknoten an der Spitze haarig.

A. paniculata Schrader. Rispe zusammengezogen, lang, mit je 2-4 Aesten, wovon die längeren 2-3 Aehrchen tragen; Aehrchen 4-6 blumig, mit 3nervigen Deckbltt.; Spindel haarig; Bltt. kahl am R. scharf, die stängelständigen lineal-lanzettlich; die Blattscheiden zusammengedrückt-zweischneidig.

Auf quelligen abhängigen Wiesen des Hochgebirges. Am *Gl. Schneeberge* um die Quellen der Mora am südwestl. Abhänge. Im Gesenke am *Hockschar*, *Köpernik*, der *Bründelhaide*, dem *Altwater*, dem *Leiterberge* u. im *Kessel*. Juli, Aug. ☉.

Halm steif-aufrecht, nur am Gr. ein wenig aufsteigend, von Blattbüscheln umgeben, woran lang-linealische Bltt. Die Halmblätter kurz, viel breiter, an der Spitze kappenf.-zusammengezogen. Scheiden scharf. Rispenäste aufrecht. Aehrchen lineal-lanzettlich. Die Aehrchendeckbltt. und die äusseren Blumendeckblätter am Gr. violett; an der Spitze mit weissem Hautrande. Grannen lang, gekniet.

A. pubescens L. Rispe gleichförmig, fast traubig; die kürzeren Aeste mit einem, die längeren mit 2 Aehrchen; die unteren zu 5; Aehrchen 2-3 blumig; das obere Deckblatt 3nervig; Spindel haarig; Bltt. linealisch, flach.

Auf Wiesen, in d. Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Mai, Juni. 2.

Gewöhnlich sind die unteren Blattscheiden u. Bltt. fein sammthaarig, doch kommt auch eine kahle Abänderung vor. Rispe grün oft mit violettem Anflug. Diese so wie die vorhergehende und folgende Art werden durch die Tracht und im Leben leicht unterschieden, bieten aber für die Diagnose wenige hervorstechende Merkmale dar.

A. pratensis L. Rispe zusammengezogen, fast traubig, die unteren Aeste gepaart, die oberen einzeln, mit je einem oder einige untere mit 2 Aehrchen; Aehrchen 4-5 blumig, das obere Deckblatt 3nervig; Spindel haarig; Bltt. linealisch; Scheiden stielrund oder schwach zusammengedrückt.

Auf trocknen Wiesen, an Hügellehnen, in lichten Gehölzen, in d. Ebene u. dem Vorgeb. zerstreut. Um *Br. zw. Tschechnitz u. Kottwitz, Mirkau. Hartmannsdorf u. Wartha* bei Bunzlau. Am *Geierb., Kosemitzer B. Grossstein* bei Oppeln. *Teschen.* Juni, Juli. 2.

Die unteren Bltt. sind stets eingerollt, am B. sehr scharf. Rispe meist grünlich. Die Haare an der Spindel sind kürzer als bei der vorigen Art.

c. Deckbltt. 1-3nervig. Fruchtknoten kahl. Bltt. eben. Granne aus oder über der Mitte.

A. flavescens L. Rispe weitläufig, gleichförmig; Aehrchen 3 blumig, das obere Deckblatt eilanzettlich mit einer über der Mitte entspringenden geknieten Granne; Spindel haarig; Bltt. flach.

Auf fruchtbaren Wiesen, zwischen Gebüsch, an grasreichen Wegrändern in der Ebene u. d. Vorgeb. selten, Um *Br. bei Scheitnich, Friedewalde* hinter *Klettendorf*, um *Domslau. Bunzlau* nach v. *Albertini. Görlitz. Salzbrunn. Charlottenbrunn.* Um *Herlitz. Lodnitz. Dorfteschchen u. Jägerndorf.* Juni, Juli. 2.

Halme stets einzeln, schlank und schlaff. Bltt. oberseits weichhaarig. Aehrchen gold-grünlich, glänzend, bisweilen violett-gescheckt.

d. Deckbltt. 1-3nervig. Fruchtknoten kahl. Granne unter der Mitte entspringend. Bltt. zusammengerollt-borstlich.

A. flexuosa Mert. u. Koch. Aira fl. L. Rispe offen, vor dem Blühen zusammengezogen, oben übergeneigt; Aehrchen 2 blumig, Deckbltt. so lang als die Blume; Blumendeckbltt. 4zählig mit einer nahe am Gr. entspringenden langen Granne; Bltt. borstlich.

Auf trocknen, sonnigen und sandigen Hügeln, an trocknen Bergelehnen, in Hauen und Haiden u. auf den Kämmen des Hochgebirges,

oft grosse Strecken bedeckend; hie und da auch in der Ebene. Juni, Juli. 2.

Halm 1' h., in lockeren Basen, aufsteigend. Spindel und Aeste stark-bogig, dünn und flatterig. Rispe rosafarben oder im Schatten grüngelblich-verblichen.

A. caryophylla Wiggers. *Aira car.* Linn. Rispe offen; Aehrchen 2blumig, Deckbltt. länger als die Blume; Blumendeckbltt. 2spitzig mit einer unter der Mitte entspringenden Granne; Blätter borstlich.

In lockerem Sande, auf sandigen Aeckern u. Hügeln, an Kieferwäldern u. in Kieferhauen in d. Ebene u. dem Vorgeb. Um *Br.* bei *Carlowitz, Lissa* etc, Juni. ☉.

Dünn und zart. Halme einzeln, oder wenige vereinigt, 3-6' h. Bltt. sehr kurz. Rispe sammt Halm rosafarben. Blüthen sehr klein.

A. praecox P. de Beauv. *Aira pr.* Linn. Rispe länglich, ährenförmig zusammengezogen; Aehrchen 2blumig; Deckbltt. länger als die Blume; untere Blumendeckbltt. 2spitzig mit einer unter der Mitte entspringenden Granne; Bltt. borstlich.

Auf etwas feuchten Plätzen in Haidegegenden und Kieferwäldern. Im Kieferwalde zwischen *Liebenau* u. *Riemberg* b. Breslau am Fahrwege. Um *Oppeln* bei *Wängern* u. *Grosstein*. *Klitschdorfer Haide* bei Bunzlau nach Schneider. Mai. ☉.

H. 1-3". Rispe gelbgrün.

Koeleria Persoon. *Kölerie*. Rispe ährenförmig-zusammengezogen. Aehrchen zusammengedrückt, 2-vielblumig. Das untere Aehrendeckblatt kürzer als das obere. Das äussere Blumendeckblatt mit einer Stachelspitze oder geraden Granne aus der Spitze.

K. cristata Persoon. *Aira cr.* Linn. Rispe am Gr. unterbrochen; Aehrchen 2-4blumig; äusseres Blumendeckblatt mit oder ohne Stachelspitze; Bltt. eben.

β. glauca. äusseres Blumendeckblatt stumpflich; Bltt. kahl.

Auf Wiesen, Triften, an Weg- und Ackerrändern, d. d. g. G. gemein. *β.* auf lockerem Sande hin u. wieder; um *Br.* bei *Carlowitz* u. *Lissa*. Um *Tiefenfurth* u. in der *Haide* b. Bunzlau. Um *Herlitz, Zossen* u. *Hermersdorf* b. Troppau. Juni, Juli. 2.

Bald einzeln, bald in Basen. H. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ '. Rispe grün, auch gelbgrün, meist mit schmutzig-violettem Anflug, bisweilen sehr gross und pyramidal, gewöhnlich länglich. Aehrchen bisw. nur 2blumig, auch feinhaarig. Die Blumendeckbltt. spitz und die Bltt. und Blattscheiden fein weichhaarig. Die var. *β.* hat eine seegrüne Färbung, grau-violette oder röthliche Rispe, steife Haltung und stumpfliche Aehrendeckblätter.

Trifodon R. Brown. *Dreizahn*. Aehrchen 3-5blumig, mit beinahe gleichlangen, bauchigen, kiellosen Deckblättern. Das äussere Blumendeckblatt 2spaltig, mit einer kurzen geraden Granne in der Spalte.

Tr. decumbens P. d. Beauv. *Festuca dec.* Linn. Rispe traubig; Bltt. und Scheiden haarig; Halme schief, zur Blüthezeit emporsteigend.

Auf unfruchtbaren und kiesigen Grasplätzen in Haiden u. Wäldern; d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Juni, Juli. 2.

Halme vor dem Blühen niederliegend oder schief, $\frac{1}{2}$ ' h. Aehrchen grün mit violettem Anflug.

Mélica L. Perigras. Aehrchen 1-2 blumig, mit bauchigen kiellosen, fast gleich-langen Deckblättern. Ein oder zwei vollständige Blumen, mit grannenlosen erst häutigen dann knorpeligen Deckblättern. Darüber ein Ansatz zu 1 oder mehreren Blumen, aus kleinen Deckblättern zwischen denen sich die Spindel in einem länglichen oder keulenförmigen Stiel endigt.

M. ciliata L. Rispe ährenförmig-gedrängt; das äussere Blumendeckblatt am Rande wimperig-zottig.

An steinigen Hügeln im Vorgeb. Bei *Wartha* am *Kapellenberge*. Am *Kirchberge* b. *Jägerndorf*, *Ziegenkoppe* b. *Hermersdorf*, *Hohenstein* b. *Eckersdorf*. *Dzینگelau* b. *Teschen*. Juni, Juli. 2.

H. 1-1 $\frac{1}{2}$ '. Rispe weissgrünlich, dann strohgelb.

M. uniflora Retzius. Rispe schlaff, einseitwendig; Aehrchen aufrecht, mit einer vollkommenen Blume.

In schattigen Wäldern, besd. auf steinigen Hügeln u. Bergen im Vorgeb. Um *Br.* im *Goi* bei *Kapsdorf* v. *Krause* gef. *Mittelberg* b. *Zobten*. *Gröditzberg*. *Wartha* b. *Glatz*. Am *Hirschfelde* bei *Briesnitz* b. *Silberberg*. *Langer B.* b. *Habendorf*. *Cudowa*. Mai, Juni. 2.

H. 1'. Halm schlaff, gew. kürzer als die Blätter. Rispe arblumig, die unteren Aeste mit 2 Aehrchen. Aehrchen eifg., röthlich.

M. nutans L. Aehrchen hängend in einer einseitwendigen Traube mit 2 vollkommenen Blumen.

In Laubwäldern in der Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Um *Br.* bei *Schwoitsch*, *Wildschütz* hinter d. Mühle, *Müncher Haid* bei *Bischwitz*, *Lissa*, *Skarsine* etc. Mai, Juni. 2.

H. 1'. Halm aufsteigend unten mit purpurrothen Scheiden. Wurzel kriechend. Bltt. linealisch, lang-spitzig. Aehrchendeckbltt. nur Hälfte violett-purpurroth mit durchscheinendem weissen Hantrande.

5. *Festuceae.* Aehrchen meist in einer Rispe, meist vielblumig; die Aehrchendeckbltt. decken nur die untersten Blumen, oder sind kürzer als die unterste, das untere stets kürzer als das obere. Grannen fehlen oder haben die Form von Stachelspitzen.

Phragmites Trinius. Rohr. Rispe ausgebreitet. Aehrchen vielblumig, ohne Grannen, kegelförmig. Die Blumen am Rücken gerundet; die unterste nur Stbfg. tragend, die andere zwittrig; die Stiele mit langen Haaren besetzt. Das äussere Blumendeckblatt zugespitzt. Narben sprengwedelig.

P. communis Trinius. Arundo Phragmites L. Deckenrohr. Aehrchen 4-5 blumig.

An Rändern von Teichen, Flüssen und Gräben, auch in Waldsümpfen und auf sumpfigen Wiesen, d. d. g. G. auch im Vorgeb. häufig. Aug., Sept. 2.

Grosse Rispe mit stahlblauen langspitzigen Aehrchen. Die Haare der Blumenstiele verlängern sich nach dem Blühen und geben der Fruchthöhle das Ansehen eines wolligen Büschels. Die Halme 5-8' h. werden nach dem Blühen strohgelb und hart, fast holzig und werden zur Berohrung der Mauern und Wände verwandt.

Molinia Schrank. Aehrchen meist 3 blumig, ohne Grannen, aus einem verdickten Grunde kegelförmig-zugespitzt. Das untere Blumendeckblatt am Gr. bauchig mit vorgestreckter Spitze. Griffel am Grunde einander genähert, aus der Spitze des Fruchtknotens.

M. coerulea Mönch. Melica coer. Linn. Rispe etwas zusammengezogen; Aehrchen aufrecht ohne Spur einer Granne; Blumendeckblatt 3nervig; Halm fast blattlos.

Auf sumpfigen und torfhaltigen Wiesen, besd. in Wald- u. Haidegegenden, bis auf die Kämme des Hochgebirges, meist in Menge und oft grosse Strecken bedeckend. Juli, Aug. 2.

Wurzelhals knollig-verdickt. Bltt. steif, aufrecht, 2-3''' breit. Aehrchen grünlich-stahlblau. H. 2-4'. In Gebirgen bisweilen zwergig, kaum 1' h. und dann mit sehr breiten Blättern.

Glyceria R. Brown. Schwaden. Rispe offen. Aehrchen 2- vielblumig, beinahe walzenförmig, ohne Grannen. Die Aehrchen- und Blumen-Deckblätter stumpf, mit halb-walzenförmigem Rücken.

G. spectabilis Mert u. Koch. Poa aquatica L. Rispe gross, gleichförmig, vielästig; Aehrchen 5-9 blumig; Blumendeckblatt stumpf mit 7 starken vorragenden Nerven; Wurzel kriechend.

An Gewässern, Teich-, Fluss- u. Grabenrändern, in d. Ebene d. d. G. g. häufig. Juli, Aug. 2.

Stark und feist, 3-5' h. Bltt. bis 4''' breit. Rispe länglich-pyramidal. Aehrchen grün mit rötlich violetter Anlauf.

G. fluitans R. Brown. Schwaden, Mannagras. Festuca fl. Linn. Rispe fast einseitwendig, Aeste zur Blüthezeit söhlig-abstehend; Aehrchen 6-10 blumig dem Ast anliegend; Blumendeckblätter stumpf mit 7 starken vorragenden Nerven; Wurzel kriechend.

In und an Gräben, Teichen, Lachen u. langsam fließenden Gewässern überall, auch im Vorgeb. Juni, Aug. 2.

H. 1-4'. Die langen linealischen an der Spitze kappenförmig-zusammengezogenen Bltt. schwimmen im Frühling auf dem Wasser. Rispe weisslich-grün, sehr lang und oben schmal. Aehrchen schmal und lang. — Die Samen werden besonders in der nordöstlichen Gegend gesammelt und sind sehr wohlschmeckend.

G. distans Wahlenberg. *Poa dist.* Linn. Rispe gleichförmig mit söhlig-abstehenden nach d. Blüten abwärts gerichteten Aesten; Aehrchen 3-6 blumig; Blumendeckbltt. eifg.-länglich stumpf, mit 5 undeutlichen Nerven; Wurzel faserig.

In den Gräben und Angern der Vorstädte und Dörfer, besonders an Dunghaufen und Abzugsgräben der Ställe, wahrscheinlich nur an Stellen, wo der Boden oder das Wasser salzhaltig ist. Um Br. in der *Schweidnitzer* und *Nikolaivorstadt*, um *Kleinburg*, *Gräbschen* u. vielen anliegenden Dörfern. In der Ebene aber nicht überall. Juli bis Sept. 2.

In lockeren Rasen, schwach graugrün, 1-1½' h. Rispe grünlich, seltner violett angelaufen. Aeste meist zu drei.

G. aquatica Presl. *Aira aq.* Linn. Rispe gleichförmig, ausgebreitet, Aehrchen linealisch meist 2 blumig; Blumendeckbltt. länglich stumpf mit 3 vorragenden Nerven; Wurzel sprossentreibend.

In Gräben, an Teichrändern, um Quellen, in der Ebene nicht selten. Um Br. bei der *Odervorstadt*, um *Schmolz*, *Hühnern Wohlau*, *Beuthen*, *Bunzlau*, *Ohlau*, *Jägerndorf*, *Meltsch*, *Karls thal*, *Teschen*. Juni, Juli. 2.

Schlaff, bis 2' h. Bltt. lineal-lanzettlich, 3''' breit. Aehrchen violett. Blumendeckbltt. goldbraun mit weisshäutigem Rande.

Briza L. *Zittergras*. Rispe offen. Aehrchen vielblumig, eiförmig, ohne Grannen. Aehrchen- und äussere Blumendeckbltt. eiförmig, fast herzförmig, bauchig, oben abgerundet ohne Kiel.

B. media L. Rispe aufrecht; Aehrchen herzeifg., 5-9 blumig; Blatthäutchen sehr kurz, gestutzt.

Auf Wiesen, überall gemein. Juni, Juli. 2.

Halme einzeln, 1-1½'. Rispe grün mit violett. Die Rispenäste dünn, gegen die Spitze bogig, daher bei leisem Winde zitternd.

Poa L. *Rispengras*. Rispe offen. Aehrchen 2- vielblumig, grannenlos. Die Aehrchen- und äussere Blumendeckbltt. ei- oder lanzettförmig am Rücken kielförmig-zusammengedrückt.

Eine feste Gränze zwischen *Poa* und *Festuca* so wie zwischen *Festuca* und *Bromus* ist nicht vorhanden.

a. Bei der Reife lösen sich die Blumen von der stehengebliebenen Aehrchenhäutchen ab.

P. Eragrostis L. *Eragrostis poaeoides* P. de Beauvois. Rispenäste einzeln oder zu 2; Aehrchen lineal-lanzettlich, 8-20 blumig; Blumendeckbltt. stumpf mit starkem Seitennerv; Blattscheiden am Rande mit einem Haarkranz; Wurzel faserig.

Auf Gemüseäckern hinter *Neudorf bei Breslau*, i. J. 1838 von Scholtz gef., wahrscheinlich durch eingeschleppten Samen verbreitet. Aug., Sept. ☉.

Halme 1-2' h., niederliegend-aufsteigend und aufrecht, rasenfg., bisweilen aus dem unteren Knoten ästig. Rispe länglich; Aehrchen 3-4''' lang, grünlich-kastanienbraun.

b. Bei der Reife lösen sich die Blumen sammt dem Theile der Spindel, dem sie ansitzen.

P. annua L. Rispe fast einseitwendig, ausgesperrrt, Aeste glatt bei der Reife abwärts gerichtet, einzeln oder paarweise; Aehrchen eiförmig, 3-7 blumig; Blatthäutchen länglich; Wurzel faserig; Halm zusammengedrückt; Blumendeckbltt. stumpflich.

Aller Orten auch auf den unfruchtbarsten Stellen sich einnistend, selbst zwischen dem Strassenpflaster der Städte; blüht das ganze Jahr hindurch. ☉.

Halme niederliegend, oben aufsteigend. Bltt. an der Spitze kappenfg. Blumendeckbltt. grün; vorn weisshäutig, mit violetter Mittelbinde. Man bemerkt Zwergexemplare von kaum 1'' Grösse auf trocknen Brachen, und eine schöne Abart mit gedrängter Rispe und huntschkeigen Aehrchen auf dem Hochgebirge um die Bänder.

P. laxa Haenke. Rispe zusammengezogen, an der Spitze seitwärts geneigt, Aeste gepaart etwas bogig, glatt; Aehrchen eifg. meist 3 blumig; Blumendeckbltt. eilanzettlich; Blatthäutchen länglich vorgezogen; Halme schlaff aufsteigend, Wurzel faserig.

An felsigen Abhängen zwischen den Felsritzen im Riesengebirge: an der *Schneekoppe*, dem *kl. Teiche*, *Mittagsteine*, *Grubenstein* etc. *Babia Gora*. Juli, Aug. 2.

H. $\frac{1}{2}$ -1'; in Rasen. Bltt. schwach seegrün, schmal, gekielt. Rispe dicht, rosenroth.

P. alpina L. Rispe gleichförmig, ausgebreitet; Aehrchen eifg., meist 6 blumig; Blumendeckblatt spitz; Blatthäutchen länglich spitz, an den unteren Scheiden kurz und stumpf; Wurzel schief-absteigend.

An Wiesenlehnen auf felsigen Abhängen des Hochgebirges. Im *Kessel im Gesenke* 1830 von Grabowski gef. Juli, Aug. 2.

Die Wurzel ist ein kurzes schiefes nach unten Fasern treibendes Rhizom. Halme und Blätterbüschel aufsteigend, 1-1 $\frac{1}{2}$ ' h. Rispe breit eifg., 4-6 blumig, gewöhnlich grün violett und rothbraun, seltner grünlich oder strohgelb.

P. bulbosa L. Rispe gleichförmig, eifg., abstehend, Aeste paarweise, schärflich; Aehrchen eifg. 4-6 blumig; Halm am Gr. zwiebelig-aufgetrieben; obere Blatthäutchen länglich; Wurzel faserig.

Auf Grasplätzen. Bei *Guhrau* von Starke, um *Warmbrunn* von Günther, am *Gröditzberge* von Schneider, und bei *Dyhrenfurth* von Krause gefunden. Juni. 2.

Die Halme meist einzeln, 6-8' h. Spelzen blassgrün mit rosaf. Anhauch. Die Blumen sind sehr häufig missgebildet, in pfriemliche Röhren ausgewachsen, *spiculae viviparae*, eine Erscheinung, die an *Phleum Boehmeri* gewöhnlich, und an vielen andern Gräsern z. B. *Aira caespitosa*, *Festuca duriuscula*, nicht selten vorkommt.

P. sudetica Haenke. Rispe gleichförmig, länglich oder pyramidal; Aeste zu 5 abstehend, scharf; Aehrchen länglich-eifg., meist 3blumig; äusseres Blumendeckblatt nervig; Stängel und Blattscheiden zusammengedrückt; Blatthäutchen kurz; Wurzelhals ästig.

β. hybrida. Rispe weitläufig mit langen flatterigen Aesten; die Blumenstielchen mit kurzem Wollhaar besetzt. *P. hybrida* Gaudin. W. et Gr. sil. Koch Syn.

In Bergwäldern, auf Wiesen und in Schluchten des Hochgebirges. An d. *Heuscheuer am gr. See*. Im Riesengeb. im *Riesengrunde*, den *Schneeegruben*, in der *Kesselgrube*, im *Elbgrunde*. *Gl. Schneeberg*. Im Gesenke am *Altwater* u. *Peterstein*, *Hockschar*, *rothen Berge*. *β.* in den tieferen Stellen u. im Waldschatten. *Zobtenberg* unter d. Gipfel. *Schlesierthal*. *Charlottenbrunn*. *H. Mense*. *Cudower-Thal*. *Gl. Schneeberg*. Gesenke am *Hockschar* u. b. *Carlsbrunn*. *Baranio* b. Teschen. *Babia Gora*. Juni, Juli. 2.

Ausgezeichnet durch Höhe von 3-4', und durch die zusammengedrückten Blattbüschel neben dem Halme. Bltt. an der Spitze kappenfg. Rispe grünlich bis in das dunkel-violettbraune. Meine Vermuthung, dass die *Poa hybrida* nur eine Varietät der *P. sudetica* sei, ist durch vollständige Uebergangsformen bestätigt worden; sie verdankt ihren schlaffen Wuchs und weitläufigen Blütenstand ihrer Oertlichkeit; auf die wenigen Haare an der Aehrchenspindel lässt sich nicht wohl eine Art begründen, und auch diese sah ich bis auf eine kleine Spur reducirt. Die Var. *β.* hat entfernte Aehnlichkeit mit *Festuca sylvatica*.

P. trivialis L. Rispe gleichförmig, ausgebreitet; Aeste zu 5, scharf; Aehrchen eifg.; äusseres Blumendeckblatt nervig, spitz; Halm und Scheiden scharf; Blatthäutchen hervorgezogen, spitz; Wurzel faserig.

β. tenuis. Halm schwach, sammt den Scheiden beinahe glatt; Aehrchen 1-2blumig.

γ. rigida. Halm steif, sammt den Scheiden sehr scharf, nebst der Rispe purpurviolett.

Auf Wiesen, in Gebüsch, an Weg-, Wald- und Grabenrändern überall gemein. Juni, Juli. 2.

H. 2-3'. Blatthäutchen stets lang. Die Blumendeckbltt. stark nervig. Scheiden meist scharf, doch ist, wie var. *β.* beweist, dieses Merkmal auch hier veränderlich.

P. pratensis L. Rispe gleichförmig, ausgebreitet; Aeste zu 5, scharf; Aehrchen eifg., 3-5blumig; Blumenstielchen zottig; Blumendeckblatt nervig am Rücken und Rande feinhaarig, spitz; Halm und Scheiden glatt; Blatthäutchen kurz, gestutzt; Wurzel kriechend.

α. humilis. Halm am Gr. zusammengedrückt, niedrig; Blätter kurz und breit.

β. ciliar. Halme höher; alle Bltt. breit, schwach seegrün.

γ. heterophylla. Halme höher; Wurzelbltt. zusammengerollt; Halmsbltt. eben.

Ueberall verbreitet; *α.* auf feuchten Sandplätzen, *β.* auf fetten Waldwiesen, *γ.* auf trockneren Wiesen u. an Wegrändern. Juni, Juli. 2.

Halme aufrecht oder wenig aufsteigend, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ' h. Rispe grün, auch violett.

P. nemoralis L. Rispe gleichförmig, Aeste zu 2-5, scharf; Aehrchen elliptisch, 2-5 blumig; Blumenstielchen schwach zottig; Blumendeckblatt mit undeutlichen Nerven, stumpflich; Halm und Blattscheiden glatt; Blatthäutchen veränderlich; Wurzel sprossentreibend.

a. vulgaris. Halme schlaff, Aehrchen 1-2 blumig; Blatthäutchen meist sehr kurz oder fehlend. — In Hainen und schattigen Wäldern sehr häufig, und meist in grossen Gruppen. Bisweilen mit wenigen Aehrchen, und diese sehr klein 1 blumig mit einem Ansatz zur zweiten Blume; Rispe stets blaugrünlich, die Halme glatt, die Bltt. schlaff und fast wagrecht-abstehend.

β. fertilis. Halme steif, Aehrchen 3-5 blumig; Blatthäutchen bald kurz, — bald länglich-vorgezogen. — Auf Wiesen und Wiesenrändern, an Waldändern, wo sie oft durch die Sichel im Frühjahr abgeschnitten Ästig wird. Rispe grünlich mit violetter Binde, oft noch mit rothgelber Färbung unter dem weishäutigen Bande; die Halme glatt oder scharflich; die Bltt. etwas schlaff, fast wagrecht-abstehend. Hierher gehören *P. fertilis* Host und *P. nem. γ. rigidula* bei Koch Syn.

γ. maxima. Halme steif und hoch, Rispe pyramidal, reichblüthig, Aehrchen 3-5 blumig; Bltt. breit. — Auf Wiesen mit lockerem fruchtbarern Boden und aufgeworfener Erde an Grabenrändern. Rispe grün mit violett. Halme stark. Hierher *P. nem. β. firmula* Koch Syn.

δ. montana. Halme schlank, Rispe armblumig; Aehrchen gross 3-5 blumig, auf langen dünnen Stielen. — An grasreichen steinigten und felsigen Stellen im Gebirge: um *Agneten* und am *kl. Teiche* im Riesengebirge.

ε. glauca. Halme starr; Rispe armblumig; Aehrchen 2 blumig auf dünnen steifen Stielen; Bltt. seegrün. — In den Felsritzen des Hochgebirges. Am *kl. Teiche*, u. *Mittagssteine* im Riesengebirge. Im Gesenke am *Köpernik*, *Allwäter*, *Peterssteine*, im *Kessel*. *Babia Gora*. Bisweilen nur 4-6" hoch und dann steif, kaum 6-8 Aehrchen tragend, meist mit scharflichen Rispenästen: *P. aspera* Gaudin *P. nem. δ. glauca* Koch Syn., oder bei feuchterem Standort höher und schlaffer und der vorigen Varietät näher: *P. caesia* Smith. Koch Syn.

Durch das ganze Gebiet von der Ebene bis auf das Hochgebirge. Juni, Juli, bisweilen auch später. 2.

Die aufgeführten Abänderungen sehen einander zum Theil sehr unähnlich, doch glaube ich für diese Zusammenstellung der Formen hinreichende Gründe zu haben, die zum Theil schon an anderen Orten auseinandergesetzt worden sind. Die Gestalt des Blatthäutchens, worauf man hier so viel Gewicht legt, ist hier zur Unterscheidung durchaus nicht anwendbar.

P. compressa L. Rispe fast einseitwendig, gedrängt; Aeste zu 2-5 scharflich; Aehrchen länglich-eifg., 5-9 blumig; Blumenstielchen zottig; Blumendeckbltt. undeutlich-nervig; Halme zusammengedrückt-zweischneidig, am Gr. niederliegend; Wurzel sprossentreibend.

Auf trocknen Sandplätzen, Mauern, Dächern. Mai, Juni. 2.

Halme 1' h. Rispe länglich mit kurzen Aesten, grün oder schmutzig-röthlich. Blumendeckbltt. stumpflich, oben mit einer rothgelben Binde.

Dactylis L. Knautgras. Rispe lappig, halb-einseitwendig. Aehrchen vielblumig, lanzettförmig, auf einer Seite ver-

tieft auf der anderen erhaben. Aeusseres Blumendeckblatt kielförmig-zusammengedrückt, an der Spitze einwärts gebogen in eine kurze Granne verschmälert.

D. glomerata L. Aeusseres Blumendeckblatt 5nervig; Wurzel faserig. 2.

In Gebüschern u. Wäldern, an Hecken, u. auf Wiesen d. d. g. G. gemein. Juni, Juli. 2.

Halme 2-4' h., oberhalb und die Bltt. am Rande und Kiele scharflich. Die Rispe besteht aus gelappten Knäueln, die indessen an feuchten und schattigen Stellen bisweilen sehr locker werden. Oberes Blumendeckblatt am Kiel fein gewimpert. Schmutzig grün, selten die Aehrchen mit rüthlichem Anflug.

Festuca L. *Schwingel*. Rispe oder Traube. Aehrchen vielblumig, lanzettförmig. Aeusseres Blumendeckblatt lanzettlich oder pfriemlich-lanzettlich, am Rücken gerundet mit oder ohne vorragenden Nerven, zugespitzt oder in eine Endgranne verschmälert; inneres sehr fein gewimpert. Griffel sehr kurz; fiederige Narben welche am Grunde der Blume seitwärts herausstehen.

a. *Vulpia* Gmelin. Rispenstiele dick nach oben stark verdickt. Blumen pfriemlich-lanzettlich mit langer Granne.

F. pseudo-Myurus Soyer-Willemet. *F. Myurus* W. et Gr. sil. Rispe zusammengezogen, fast ährenfg., einseitwendig; das untere Aehrendeckblatt viel kürzer als das obere; d. äussere Blumendeckblatt scharf, pfriemlich-lanzettlich in eine Granne endigend, welche es an Länge übertrifft; Wurzel faserig.

Auf trocknen Grasplätzen, sandigen Triften, in trocknen Gräben. Zuerst von Günther bei Warmbrunn gef. Um Br. bei Pöpelwitz, Riemberg. Nischwitz Kalkbruch u. Klitschdorf b. Bunzlau. Ohlau. Oppeln. Proskauer Haide und Gnadenfeld in OS. Wünschelburg. Um Hertz, Stremplowitz und Neplachowitz bei Troppau. Mai, Juni. ☉.

II. von $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ '. Zart und schwächig, aber steif. Die oberste Blattscheide bedeckt bald den oberen Theil der Rispe, bald ist sie weit von dieser entfernt, und die Länge des unteren Aehrendeckblatts ist sehr veränderlich. Ueberhaupt zweifle ich nicht, dass die meisten nach Soyer-Willemet unterschiedenen Arten sich fernerer Beobachtung als Formen einer Art ausweisen werden.

b. *Festuca*. Rispenstiele dünn nach oben schwach verdickt. Blumen lanzettlich; mit kurzer oder ohne Granne. Blatthäutchen zweiöhrig.

F. ovina L. *F. ovina* L. sp. 108. *F. ovina* α Koch Syn. *F. tenuifolia* Schrader. Rispe zusammengezogen, aufrecht; Aehrchen länglich, meist 4blumig; äusseres Blumendeckblatt mit einer Granne von $\frac{1}{3}$ seiner Länge; Bltt. borstlich; Wurzel faserig.

β. villosa. Blumendeckbltt. am B. gewimpert, auf der Oberfläche feinhaarig.

γ. glauca. Halm und Bltt. seegrün; Rispe am Gr. von der obersten Blattscheide bedeckt, Aehrchen 2-3blumig.

Auf trocknen Wiesen, Triften, an Rainen und Dämmen, d. d. g. G. häufig, doch nicht so allgemein verbreitet als die folgende. Mai, Juni. 2.

Diese Art ist die kleinste dieser Abtheilung, meist nur 1' h., in dichten Basen Bltt. sehr fein-borstlich, zuweilen haardünn, kurz, im Schatten länger. Von der folgenden Art unterscheidet sie die Haltung der Rispe, die stets kleineren länglichen Aehrchen, die weniger zugespitzten und mit weniger gekrümmtem Rande begränzten äusseren Blumendeckbltt. nach unserer Beobachtung constant. Vielleicht gehören auch einige der unter d. Namen *F. alpina* cursirenden Formen hierher.

F. duriuscula L. sp. *F. ovina* Schrader. *F. ovina* β — ι Koch
Syn. Rispe fast einseitwendig, unterhalb geöffnet mit weitabstehenden Aesten; Aehrchen länglich-lanzettlich, 4-5blumig; äusseres Blumendeckblatt mit einer Granne von $\frac{1}{2}$ seiner Länge; Wurzelbltt. zusammengerollt-borstlich; Wurzel faserig.

β. nemoralis. Wurzelbltt. sehr lang und fädlich; Rispe grün und schlaff.

γ. violacea. Wurzelbltt. fädlich; Rispe schmal aus grün violett und gold gescheckt; Grannen etwas länger. *F. viol.* W. et Gr. sil.

δ. alpina. Halm niedrig; Bltt. lang; Rispe eng, grün; Aehrchen oft vielblumig.

ε. glauca. Halm und Bltt. starr, seegrün. *F. glauca* Schrader.

Auf Wiesen, Triften, an Wegrändern, überall verbreitet. *β.* im Waldschatten. *γ.* auf Gebirgswiesen: an der *Babia Gora*. *δ.* auf den Kämmen des Hochgebirges: *Schneekoppe*, *Koppenplan*, am *hohen Rade* etc. *Altwater*, *Petersstein*, *Kessel*. *ε.* auf lockerem Sande in der Ebene häufig, z. B. um *Br.* bei *Carlowitz*, *Fuchsberg bei Schwoitsch*, *Paschkerwitzer Sandberg* etc. Mai, Juni. 2.

H. 1-1 $\frac{1}{2}$ '. Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch höheren stärkeren Halm, fast doppelt so grosse Aehrchen, spitzigere und von einem mehr gekrümmten Rande begränzte äussere Deckblätter so wie meist längere Grannen. Letztere sind jedoch auch bisweilen oder an einigen Blumen sehr kurz oder fehlen ganz, zumal bei var. *ε.* Die var. *ε* zeichnet sich durch eine sehr steife Tracht aus; Bltt. und Halme wie auch die Rispe sind fast weisslich seegrün, bisweilen mit röthlichem Anlauf; jedoch lassen sich die Uebergänge leicht auffinden. Die Gebirgsform *δ* zeigt sich in manchen Gestalten, häufig mit röhrig-ausgewachsenen Blumen. Wahrscheinlich gehört *γ.*, welche zwar haardünn aber ebene und nicht zusammengerollte Bltt. und deutlich dreinervige Blumen nebst abweichender Tracht hat, nicht hierher.

F. heterophylla Lamarck, nicht W. u. Gr. sil. Rispe offen; Aehrchen 4-5blumig; äussere Blumendeckbltt. lanzettlich, mit längerer oder kürzerer Granne; Wurzelbltt. zusammengerollt-borstlich, Halmbltt. eben; Wurzel faserig.

In Wäldern, besonders Hauen. Zwischen *Silstérwitz* und *Zobten* am Fusse des *Zobtenberges* und bei *Skarsine* von Krause gef. Mai, Juni. 2.

H. 2-3' h. Wurzelbltt. sehr lang. Rispe gross, reichblüthig. — Vielleicht ist auch diese Form, die ich nicht lebend beobachtete, sondern nur aus trocknen Expl. kenne, nur eine Form der vielgestaltigen vorigen Art.

F. rubra L. Rispe zur Blüthezeit offen; Aehrchen länglich 4-5-blumig; äussere Blumendeckbltt. lanzettlich mit kürzerer oder längerer Granne; Wurzelbltt. zusammengerollt borstlich; Halmbltt. eben; Wurzel durch sprossen lockere Rasen treibend.

Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, an Waldrändern, häufig. Mai, Juni. 2l.

Diese Art ist an der sprossentreibenden Wurzel sogleich v. d. vorigen zu unterscheiden. Sie blüht etwas später, die Aehrchen sind ein wenig grösser, länger, die äusseren Blumendeckblätter länger und schmaler. Auch von dieser giebt es Abarten mit seegrünen Halmen und Blättern, mit feinbehaarten Blumendeckblättern und Waldformen mit sehr langen Bltt. und schmalen flatteriger Rispe. Zu letzterer gehört *F. heterophylla* W. et Gr. sil. um *Leobschütz* und *Gnadenfeld* in OS.

c. *Schedonorus*. Rispenstiele dünn nach oben schwach verdickt. Blumen lanzettlich mit kurzer oder ohne Granne. Blatthäutchen abgestutzt, oder länglich.

F. varia Hänke. Rispe zur Blüthezeit offen, Aeste einzeln oder gepaart; Aehrchen 5-8 blumig; äusseres Blumendeckblatt lanzettlich von der Mitte nach oben verengert, mit 5 undeutlichen Nerven; Fruchtknoten oberhalb haarig; Bltt. zusammengerollt-fädlich; Wurzel faserig.

In Felsritzen an steilen Abhängen des Hochgebirges. Im Riesengeb. im *Teufelsgärtchen* u. in der *kleinen Schneegrube*. Im *Kessel* im Gesenke. Auf der *Babia Gora*. Juli, Aug. 2l.

In lockeren oder dichten Rasen. Halme oben geneigt $\frac{1}{2}$ -1'. Blumen gewöhnlich bunt und hellviolett, gelblich und grün.

F. sylvatica Villars. Rispe weitläufig, aufrecht oder überhängend; Aeste scharf, die unteren zu 3 und 4; Aehrchen 3-5 blumig; äusseres Blumendeckblatt verschmälert, spitz, ohne Granne, scharflich, mit 3 vorragenden Nerven; Fruchtknoten oberhalb haarig; Bltt. lineal-lanzettlich am Rande scharf, Wurzel faserig.

In schattigen Wäldern des Vorgebirges. Am *Zobtenberge*. *Charlottenbrunn*. *Hochwald* und *Sattewald*. *Cudower-Thal* bei Reinerz. Juni, Juli. 2l.

Grün. H. 3-5'. Rispenäste scharf. Blumendeckbltt. lineal-lanzettlich. Die Blattbüschel neben den Halmen sind am Gr. von blattlosen scheidigen Schuppen umgeben.

F. gigantea Villars. *Bromus gig. L.* Rispe weit offen, die Aeste vorn übergeneigt; Aehrchen 5-8 blumig; äusseres Blumendeckblatt mit einer bogigen doppelt so langen Granne unter der Spitze; Bltt. lineal-lanzettlich, eben, kahl; Blatthäutchen sehr kurz.

In schattigen Wäldern, Vorhölzern u. Gebüsch in d. Ebene u. d. Vorgeb. häufig. Juli. 2l.

Maugrün, 2-4' h. Bltt. 4''' breit. Rispe lang, flatterig, mit schäfflichen Aesten.

F. arundinacea Schreber. *F. elatior* Smith. Rispe weitläufig, nickend; Aeste scharf, paarweise, mit Nebenästen, 1-15 Aehrchen tragend; Aehrchen eilanzettfg., 4-5 blumig; das äussere Blumendeckblatt mit oder ohne eine Stachelspitze unter der Spitze; Fruchtknoten kahl; Bltt. eben lineal-lanzettlich.

Auf fetten Wiesen, in feuchten Gebüschern u. an Grabenrändern, in der Ebene u. im Vorgeb. nicht selten. Um *Br.* bei *Scheitnich*, *Pöpelwitz*, am *Goi* bei *Kapsdorf*, an der *Strasse nach Lissa* u. m. Juni, Juli. ☽.

H. 2-4'. Rispe weitläufig; Aehrchen grün und schmutzig-violett.

F. elatior L. succ. *F. pratensis* Hudson. W. et Gr. sil. Rispe fast einseitwendig, zur Blüthezeit offen; Aeste scharf, gepaart, der eine kurz mit einem Aehrchen, der andere länger 3-4 Aehrchen tragend; Aehrchen linealisch 5-10blumig, Aehrchendeckbltt. stumpf; äusseres Blumendeckblatt an der Spitze gezähnt mit oder ohne Stachelspitze unter der Spitze; Fruchtknote glatt; Bltt. eben, lineal-lanzettlich.

Auf guten Wiesen, an Graben- und Wegrändern, d. d. g. G. Juni, Juli. ☽.

Der vorigen Art sehr ähnlich, aber niedriger, 1-3' h., mit mehr einfacher Rispe und stumpferen Blüten.

Bromus L. Trepse. Rispe oder Traube. Aehrchen vielblumig, lanzettlich oder walzenförmig. Aeusseres Blumendeckblatt am Rücken kielförmig oder gerundet, mit einer geraden oder gebrochenen Granne unter der Spitze. Fruchtknoten an der Spitze haarig. Griffel kurz seitwärts über der Mitte entspringend. Narben fiederig über dem Grunde der Blume seitwärts-heraustretend.

a. Fruchtlöhren an der Spitze schmaler. Aeusseres Aehrchendeckblatt 3-5nervig, inneres 5-vielnervig. Inneres Blumendeckblatt am Rande kämmig-gewimpert.

B. secalinus L. Rispe offen, bei der Reife nickend; Aehrchen länglich, Blumen breit elliptisch, bei der Reife am R. eingezogen, stielrund, entfernt; äusseres Blumendeckblatt 1nervig, so lang als das innere; Grannen kürzer als das Blumendeckblatt; Blattscheiden kahl.

Auf Aeckern unter der Saat, besonders unter dem Roggen, häufig, hie und da in sehr grosser Menge u. ein äusserst lästiges Unkraut. Juni, Juli. ☽.

Rispe stets grün. Granne oft sehr kurz oder fehlend. — Die Samen sollen nachtheilig sein; wenigstens verderben sie, wenn sie in Menge beigemischt sind, den Geschmack des Brodtes.

B. racemosus L. *B. pratensis* Ehrh. Rispe ziemlich aufrecht, bei der Reife zusammengezogen; Aehrchen eig.-länglich, kahl; Blumen breit-elliptisch, bei der Reife einander dachziegelfg. deckend; äusseres Blumendeckblatt 7nervig länger als das innere; Grannen gerade kurz; untere Bltt. und Blattscheiden weichhaarig.

Auf fruchtbaren u. feuchten Wiesen, selten. Um *Br.* bei *Kapsdorf* u. *Rischeley* auf den Wiesen links und rechts von der Strasse nach *Mahlen*, bei *Schön-Ellgut* u. *Bischwitz a. W.* und bei *Strehlen*. Um *Salzbrunn* nach *Schneider*. Juli, Aug. ☽.

Halme oben scharflich, aufrecht, 1 - 2' h. Die Rispe ist bisweilen arblüthig und traubenförmig, auch kommen Expl. mit einem einzigen Aehrchen vor. Die Aehrchen und die Knoten des Halms sind kahl.

B. mollis L. Futtertrespe. Rispe aufrecht, bei der Reife zusammengesogen; Aehrchen eig.-länglich, mit weichen Haaren bekleidet; Blumen breit-elliptisch, bei der Reife einander dachziegelfg. deckend; äusseres Blumendeckblatt 7nervig, länger als das innere, der Rand über der Mitte in einem stumpfen Winkel gebrochen; Granen fast so lang als das Blumendeckblatt; Bltt. und Blattscheiden haarig.

An Wegrändern, auf Wiesen u. Triften d. d. g. G. gemein. Mai, Juni. ☉.

H. $\frac{1}{2}$ - 2'. Steif. Rispenäste kurz, daher die Rispe gedrängt und dick. Die Knoten des Halmes zottig. Eine Abänderung mit kahlen Aehrchen wurde hier noch nicht beobachtet. Kommt ebenfalls mit niedrigem, arblüthigem und einährigem Halme vor.

B. arvensis L. Rispe offen, zuletzt oben übergeneigt; Aehrchen lanzettlich; Blumen lanzettlich, dachziegelförmig einander deckend; äusseres Blumendeckblatt 7nervig fast so lang als das innere, der Rand über der Mitte in einem stumpfen Winkel gebrochen; Granen lang, gerade, später nach aussen gebrochen; Blätter und Blattscheiden haarig.

β. patulus. Rispe weitläufiger, Aehrchen breiter, Blumen etwas gesondert. *B. patulus* Mert. u. Koch. W. u. Gr. sil.

An Wegen, Ackerrainen und auf Aeckern. Um Br. bei Kleinburg v. Krause, um Trebnitz v. Schummel gef. *β.* auf Aeckern bei Oppeln von Grabowski gef. Juni, Juli. ☉ und vielleicht ☉.

H. 1 - $1\frac{1}{2}$ '. Aehrchen zusammengedrückt, grün und violett gescheckt. Nachdem ich von *B. patulus* eine Menge Exemplare verglichen und den *B. arvensis* neuerdings lebend beobachtet habe, vermag ich diese beiden Arten nicht mehr zu trennen. Jedoch soll nach Koch der *B. patulus* zweijährig sein, früher blühen, dreimal kürzere Staubbeutel und das äussere Blumendeckblatt länger (in der Anmerkung Synops. p. 821 lin. 30 steht „*brevior*“) als das innere haben.

b. Fruchtfähren an der Spitze schmaler. Unteres Aehrchendeckblatt ein-, oberes dreinervig. Inneres Blumendeckblatt am Rande kurz-feinhaarig.

B. asper Murray. Festuca a. Mert. u. K. W. u. Gr. sil. Rispe ästig, flatterig oben überhängend; Aehrchen lineal-lanzettlich, 7-9-blumig; Blumen lineal-lanzettlich, spitz; äusseres Blumendeckblatt vorn 2zählig mit einer kurzen Granne aus der Mitte, mit 3 deutlichen und 2 undeutlichen Nerven; Bltt. und untere Scheiden langhaarig.

In Wäldern des Vorgebirges. Fürstenstein. Wilhelmshöhe bei Salzbrunn. Gröditzberg. Spitzberg. Charlottenbrunn. Sattelwald. Kupferberg. Kitzelberg b. Kauffung. Um Troppau bei Herlitz, Grätz, Meltsch, Jägerndorf etc. nach R. u. M. Juni. 2.

H. 2 - 4'. Bltt. eben, 2 - 3''' breit, schlaff und im Bogen überhängend.

B. erectus Hudson. Festuca montana Savi. Rispe gleichförmig, aufrecht, untere Aeste zu 3-6; Aehrchen lineal-lanzettlich; Blu-

men lanzettl.; äusseres Blumendeckblatt vorn 2zählig, m. einer kurzen Granne a. d. Mitte, 3-5nervig; Wurzelbltt. schmaler, a. R. gewimpert.

An Wegrändern. An der Chaussee vor *Kl. Tinz* b. *Br. Mai*, Juni. 2.

Wurzel sprossentreibend. Halm $1\frac{1}{2}$ - 2' h., unten schief, dann aufrecht. Wurzelbltt. gebüschelt, zusammengerollt fädlich; Halmbltt. breiter. Aehrchen grün mit schwachvioletter Färbung.

B. inermis Leysser. Rispe gleichfg., aufrecht, untere Aeste zu 3-6; Aehrchen lineal-lanzettlich; äusseres Blumendeckblatt vorn 2zählig mit oder ohne Stachelspitze aus der Mitte, 3-5nervig; Bltt. eben kahl.

An Weg- u. Ackerrändern, Dämmen und hohen Wiesen, in der Ebene zerstreut, hie u. da häufig. Um *Br.* häufig bei *Marienau*, *Scheitnich* etc. Juni, Juli. 2.

H. $1\frac{1}{2}$ - 2'. Rispe stets aufrecht. Aehrchen lang. Blumendeckbltt. stumpf, blassgrün, vorn mit einer rothgelben Binde. Staubbeutel goldgelb.

c. Fruchtlöhren an der Spitze breiter. Unteres Aehrchendeckblatt 1-, oberes 3-nervig. Inneres Blumendeckblatt kämmig-gewimpert.

B. sterilis L. Rispe schlaff, zuletzt überhängend; Aeste sehr lang an der Spitze nickend; Aehrchen länglich, vorn breiter; Blumen linealisch - pfriemlich; äusseres Blumendeckblatt mit 2theiliger Spitze und einer längeren Granne; Halm kahl.

An Wegrändern, Zäunen, Mauern, auf Schutthaufen und Brachen. Um *Br.* in den *Vorstädten*, um *Schwoitsch*, *Marienau* etc. Mai, Aug. ☉.

H. 1 - 2'. Blattscheiden haarig; Halm und Blüten kahl. Aehrchen fast zolllang, grün, auch violett oder rüthlich.

B. tectorum L. Rispe fast einseitwendig, überhängend; Aehrchen linealisch, bei der Reife vorn breiter; Blumen lanzettlich - pfriemlich; äusseres Blumendeckblatt mit 2theiliger Spitze u. einer gleichlangen Granne; Halm nach oben weichhaarig.

Auf Mauern, Dächern, an trocknen Wegen und auf ungebautem Ackerland, besonders in sandigem Boden d. d. g. G. verbreitet. Juni, bis Aug. ☉.

H. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ '. Grün, bei der Reife meist rüthlich. Blumendeckbltt. meist weichhaarig.

6. *Hordeinae*. Aehrchen in einer Aehre. Spindel ausgeschnitten, mit Höhlungen in denen die sitzenden oder kurz-gestielten Aehrchen vor dem Blüten liegen. Aehrchen meist mehrblumig. Griffel sehr kurz. Narben seitwärts am Gr. der Blume heraustretend.

Brachypodium Pal. de Beauvois. *Zwenke*. Traube zweizeilig. Aehrchen einzeln an den Zähnen der Spindel, kurzgestielt, walzenförmig, 5- und mehrblumig. Aehrchendeckbltt.

kürzer als die unteren Blumen, das untere kürzer als das obere. Aeusseres Blumendeckblatt mit drei in eine breite Granne zusammenlaufenden Nerven; inneres am Rande kämmig-gewimpert.

B. sylvaticum Roem. et Schultes. *Bromus pinnatus* β . Linn. Traube überhängend; die oberen Grannen länger als das Blumendeckblatt; Bltt. schlaff; Wurzel faserig.

In schattigen Laub- und Nadelwäldern d. Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. zerstreut. Um *Br.* bei *Bischofswalde, Oswitz, Arnolds-mühl, Skarsine* etc. Juli, Aug. 2.

H. 3 - 5'. Die Traube stets im Bogen überhängend. Die Aehrchen bald kahl, bald sammtartig-weichhaarig. Matt-dunkelgrün.

B. pinnatum P. d. Beauv. *Bromus p.* Linn. Traube fast aufrecht; die oberen Grannen kürzer als das Blumendeckblatt; Blätter steif; Wurzel kriechend.

In lichten Vorgehölzen u. Waldrändern, an buschigen Dämmen u. Hügeln, d. d. g. G. auch im Vorgeb. zerstreut und nicht selten. Um *Br.* bei *Carlowitz, Oswitz, Fuchsberg bei Schwoitsch, Skarsine* etc. Juni, Juli. 2.

H. 3 - 4'. Steifer als die vorige Art. Die Aehrchen bald kahl, bald weichhaarig. Hellgrün.

Cynosurus L. *Kammgras*. Aehre einseitig, zweizeilig. Aehrchen je zwei nebeneinander an jedem Zahn der Spindel; d. eine 3-5 blumig mit zugespitzten gekielten äusseren Blumendeckbltt. und Zwitterblumen; das andere leer aus einzelnen spitzen doppel-kammförmig gestellten Deckblättern zusammengesetzt.

C. cristatus L. Die Deckbltt. des leeren Aehrchens mit granlosen Spitzen.

Auf trocknen Triften, Wiesen, Rainen u. Dämmen, d. d. g. G. zerstreut. Um *Br.* bei *Scheitnich, Oswitz, Ransern* etc. Juni, Juli. 2.

Höhe 1 - 3'. Bltt. schmal. Aehre dicht, 1" lang. Staubbeutel violett. Das zweite leere Aehrchen wurde ehemals als eine Reihe äusserer Deckbltt. beschrieben.

Triticum L. *Waizen*. Aehre zweizeilig. Aehrchen einzeln mit der Seite gegen die Spindel gewandt, zusammengedrückt, 3- oder mehrblumig. Aehrendeckbltt. unten bauchig oben abgestutzt und gezähnt. Aeusseres Blumendeckblatt mit oder ohne Granne aus der Spitze.

* **T. vulgare** Villars. *Sommer- u. Winter-Waizen*. Aehre vierkantig mit zäher Spindel; Aehrchen dachziegelfg., meist 4blumig; Aehrendeckbltt. eifg. stachelspitzig, unter der Spitze zusam-

mengedrückt, am Rücken rundlich-erhaben mit stumpf vorragenden Nerven; Früchte frei.

Wird allgemein angebaut. ☉ und ☽. Ausser dieser Art werden noch *T. turgidum* und *T. polonicum*, hie und da auch *T. dicoccum* und *T. Spelta* angebaut.

Secale L. Roggen. Aehre zweizeilig. Aehrchen einzeln, dachziegelfg., mit der Seite gegen die Spindel gewandt, zusammengedrückt, 3- mehrblumig. Aehrchendeckbltt. pfriemlich. Aeusseres Blumendeckblatt mit kürzerer oder längerer Granne aus der Spitze.

* S. Cereale L. Roggen.

Stammt wahrscheinlich aus dem mittleren Asien. ☉ und ☽.

Agropyrum Gärtner. Quecke. Aehre zweizeilig. Aehrchen einzeln, dachziegelfg., mit der Seite gegen die Spindel gewandt, zusammengedrückt, 3- mehrblumig. Aehrchendeckbltt. zugespitzt. Aeusseres Blumendeckblatt mit oder ohne Granne aus der Spitze.

A. repens Gärtner. Quecke. Triticum rep. L. Aehrchen meist 5blumig; Aehrchendeckbltt. lanzettlich, 5nervig, spitzig; Blumendeckbltt. spitz oder stumpf, mit oder ohne Granne; Bltt. oberseits von feinen Punkten schärflich; Wurzel kriechend.

In Gebüsch und Gesträuch, an Hecken, Weg- und Ackerrändern, überall. Juni, Juli. 2.

H. 1 - 3'. Erscheint in vielen, durch die Gestalt der Blume und Länge der Granne sehr abweichenden Gestalten; ausserdem bald grün, bald grau oder seegrün. Die Wurzel ist als *E. Graminis* officinell und enthält den sogenannten Graswurzelzucker.

A. caninum Gärtner. Aehrchen meist 5blumig; Aehrchendeckbltt. lanzettlich, 3-5nervig, zugespitzt; Blumendeckbltt. spitz mit einer Granne; Spindel von feinen Borsten scharf; Bltt. beiderseits scharf; Wurzel faserig.

In feuchten Gebüschern u. schattigen Wäldern d. Ebene zerstreut. Um *Br.* bei *Scheitnich*, *Marienu* etc. *Ohlau*. *Beuthen a. O.* *Bunzlau*. Juni, Juli. 2.

Aehre schlanker als an der vorigen. Grannen sehr lang und bogig.

Elymus L. Haargras. Aehre zweizeilig. Aehrchen 2-4 an jedem Zahne der Spindel, mit der Seite gegen dieselbe gewandt, 2- vielblumig. Aehrchendeckbltt. schmaler als die Blumendeckbltt., an der Aussenseite der Aehrchen neben einander stehend.

E. arenarius. Aehre aufrecht, dicht; Aehrchen meist 3blumig weichhaarig; äusseres Blumendeckblatt am Rücken gewimpert; Bltt. zusammengerollt, starr.

Auf Sandfeldern. Zwischen *Galgast* u. *Freyhan* von Wessel entdeckt und mitgetheilt. Juli. 2.

Ganz steif und starr, strohgelb mit graugrünem Anflug, 3-4' h. Aehrchen- und Blumendeckbltt. starr, lederartig.

E. europaeus L. Aehre aufrecht; Aehrchen meist 2blumig; Aehrchendeckbltt. linealisch-pfriemlich mit einer Granne; Bltt. eben, Blattscheiden haarig.

In Wäldern vorzüglich im Vorgebirge. Um *Guhrau* v. *Starke* gef. Um *Charlottenbrunn*, *Hochwald* u. *Sattelwald*, *Reinerz*, *Cudowa*. *Neu-Erbersdorf* b. *Troppau*. Juni, Juli. 2.

H. 3-4'. Ganz grün. Sieht dem *Secale* ähnlich. Die Aehrchendeckbltt. scharf.

Hördeum L. Gerste. Aehre zweizeilig. Drei Aehrchen an jedem Zahne der Spindel, mit der Seite gegen dieselbe gewandt, einblumig, bisweilen mit einem Ansatz zu einer zweiten Blume. Die mittlere Blume zwitterig, die seitlichen gewöhnlich nur Staubgef. enthaltend. Aehrchendeckbltt. schmaler als die Blumendeckbltt. an der Aussenseite der Aehrchen neben einander stehend.

* **H. vulgare L. Sommer- und Winter-Gerste.** Sämmtliche Aehrchen zwitterig, bei der Reife in 6 Reihen gestellt, wovon zwei auf jeder Seite mehr hervorragen.

Stammt vielleicht aus dem *Orient* und wird allgemein angebaut. ○ u. ○.

Die Frucht ist von den theilweise angewachsenen Blumendeckbltt. bekleidet. Doch giebt es auch eine Varietät mit freien Früchten: *H. vulgare β coeleste* L., Himmelsgerste. Die Gerste ist unter den Getraidearten in medicinischer Hinsicht die wichtigste; als Malz zu Bädern, als Gerstenschleim und Gerstenmehl.

* **H. hexastichon L. Sechszellige G.** Sämmtliche Aehrchen zwitterig, gleichmässig in 6 Reihen gestellt.

Wird ebenfalls häufig angebaut. ○.

H. murinum L. Mäuse-G. Die seitlichen Aehrchen nur Staubgef. enthaltend oder leer, mit borstlichen scharfen Deckbltt.; das mittlere mit lineal-lanzettlichen gewimperten Deckbltt.

An Mauern, auf Schutt, in den Strassen der Städte, an Gräben u. Wegrändern gemein. Juni — Sept. ○.

H. $\frac{1}{2}$ - 1'. Die oberen Blattscheiden ein wenig aufgeblasen. Aehre dicht, eiglänglich, sämmtliche Aehrchendeckbltt. in lange Grannen ausgehend.

Lolium L. Lolch. Aehre zweizeilig. Aehrchen einzeln, mit beiden Seiten von der Spindel abgewandt, 3- vielblumig. Beide Aehrchendeckbltt. nur an dem obersten Aehr-

chen vollständig; an den übrigen das obere ganz oder zum Theil verkümmert.

L. perenne L. Aehrchen länger als ihr Deckblatt; äusseres Blumendeckblatt lanzettlich mit kurzer oder ohne Granne; Wurzel sprossentreibend.

Auf Wiesen, Triften, an Wegen, Ackerrändern u. auf Aeckern gemein. Juni — Sept. ☽.

Grün, 1 - 2' h., bisweilen mit ästiger Aehre. Das obere Aehrchendeckblatt ist bisweilen in Form eines kleinen zweispaltigen oder zwei sehr kleiner Blättchen an den seitlichen Aehrchen vorhanden. Hierher gehört wahrscheinlich auch *L. festucaceum* Link, *L. multiflorum* Wimm. Fl. v. Schles., eine noch nicht hinlänglich aufgeklärte Form.

L. arvense Withering. Aehrchen $\frac{1}{3}$ länger als ihr Deckblatt, 4-8blumig, länglich; äusseres Blumendeckblatt eilanzettlich mit einer sehr kurzen Granne; Halme einfach; Wurzel faserig.

Auf Aeckern u. zwar bei uns unter dem Lein, d. d. g. G. nicht selten. Juni, Juli. ☽.

H. 1 - $1\frac{1}{2}$ '. Schwächlig. Aehrchen klein, eiförmig.

L. temulentum L. Aehrchendeckblatt so lang als das 5-7blumige Aehrchen; äusseres Blumendeckblatt elliptisch, mit langer Granne; Wurzel faserig.

Unter der Saat, besd. unter Hafer, allgemein verbreitet. Juni, Juli. ☽.

H. 1 - 2'. Die Spindel ist bogig. Fast das einzige Gras, welches in den Samen schädliche Stoffe enthält. Diese erregen Schwindel und werden, wenn sie in Menge in das Brodt verbacken worden sind, der Gesundheit gefährlich.

7. Nardoideae. Aehrchen in einer Aehre, in den Höhlungen der ausgeschnittenen Spindel sitzend. Narben fädlich, feinbehaart, aus der Spitze der Blume heraustretend.

Nardus L. *Borstengras*. Aehre einseitwendig, zweizeilig. Aehrchen einzeln, einblumig, ohne Aehrchendeckblätter. Das äussere Blumendeckblatt pfriemlich, lederartig, das innere häutige einschliessend. III, 1.

N. stricta L. *Wolf, Nätsch*.

Auf unfruchtbaren Sumpf- und Haidewiesen, in Moorgegenden, d. d. g. G., von der Ebene bis auf das Hochgeb. häufig. Juni, Juli. ☽.

In dichten und festen Rasen, deren untere Hälfte im Sumpfmoose versteckt ist Wurzelstock schief, ästig. Bltt. zusammengerollt-borstlich, steif, söhlig-abtöndend. Aehre fädlich. Blumendeckblatt in eine Granne endigend, schmutzig violett-grün.

8. Paniceae. Aehrchen vom Rücken her zusammengedrückt, vorn flach, hinten erhaben; entweder zweiblumig, die obere zwitlerig, die untere Staubgefässe enthaltend, oder einblu-

mit einem dritten Deckblatt als Ansatz zu einer unteren Blume. Das äussere Aehrdeckblatt kleiner als das innere, bisweilen fehlend. Blumendeckblätter knorpel-, leder- oder papierartig. Griffel lang; Narben sprengwedelig, unter der Spitze aus der Blume heraustretend.

Digitaria Scopoli. Fingergras. Aehrchen in mehreren einfachen fast fingerförmig an einer kurzen allgemeinen Spindel befindlichen Aehren. Aehrchen paarweise, eines sitzend, das andere kurz gestielt, beide einblumig mit einem einfachen Deckblatt als Ansatz zur unteren Blume. — *Panicum* Linn.

D. sanguinalis Scop. Aehrchen zu 5, abstehend; Bltt. und Blattscheiden haarig; Aehrchen länglich-lanzettlich; das unterste Deckblatt feinhaarig ohne Wimpern an den seitlichen Nerven.

Auf Garten- und Acker-Land, in der Ebene, hin und wieder häufig. Um Br. um die Vorstädte auf der Kräuterei. Bei Wohlau, Beuthen, Bunzlau, Oppeln. Um Herlitz u. Zottig b. Troppau. Juli, Aug. ☉.

In lockeren Basen. Halme schief-aufsteigend, 1 - 1½' h., schlaff. Spindel gefüllt. Aehrchen schmutzig-grünroth. Ein lästiges Unkraut der Blumengärten.

D. filiformis Köler. Panicum lineare Krock sil. Aehrchen zu 3; Bltt. und Blattscheiden kahl; Aehrchen elliptisch, weichhaarig mit kahlen Nerven.

Auf lockerem Sande, auf Sandfeldern und sandigen Aeckern bisweilen in grosser Menge, in der Ebene häufig. Um Br. bei Carlowitz, an der Passbrücke, bei Scheitnich etc. Juli, Aug. ☉.

In dicken Basen. Halme erst gestreckt, meist blutroth, nie behaart.

Echinóchloë Palis d. Beauv. Grannich. Aehrchen in einseitwendigen traubig-verbundenen Aehren, zweiblumig: d. untere Blume Staubgef. enthaltend oder leer mit einer Granne oder Stachelspitze auf dem äusseren Deckblatt. — *Panicum* Linn.

E. Crus galli L. Aehrchen theils wechsel-, theils gegenständig, linealisch; Aehrchen gedrängt; Spindel am Gr. fünfeckig.

Auf Acker- und Gartenland, an Gräben, Dungplätzen, d. d. g. G. in der Ebene gemein. Juli, Sept. ☉.

Halm dick, 1 - 1½' h., aufrecht oder schief. Bltt. linealisch, 4 - 5'' breit, am Bande oft wellig. Rispe grün oder schmutzig braun-roth. Granne rau, oft bogig, selten zu einer Stachelspitze verkürzt.

Setaria Palis. de Beauvois. Fennich. Rispe ährenförmig, mit zahlreichen Borsten am Grunde der einzelnen Rispen-

stiele. Die untere Blume jedes Aehrchens enthält nur Staubgef. oder ist ganz leer. — *Panicum* Linn.

S. verticillata P.B. Aehre gedrängt, am Gr. meist unterbrochen; die Borste von abwärts gerichteten Zähnen scharf; die Blumendeckbltt. der oberen Blume glatt.

Auf Garten- und Ackerland in der Ebene nicht selten, aber weniger gemein als die folgenden. Juli, Aug. ☉.

H. 1 - 1½'. Grün, seltner roth-angelaufen. Die Aehre hängt sich wegen der abwärts gerichteten Spitzen an Kleider u. a. an.

S. viridis P.B. Aehre walzig; die Borsten von aufwärts gerichteten Zähnen scharf; Blumendeckblätter der oberen Blume glatt, so lang als das Deckblatt der unteren.

Auf Aeckern, Sandplätzen, in Gärten, gemein. Juli — Aug. ☉.

H. 2" - 1'. Meist mehrere aufrechte, an Höhe ungleiche, aber auch gestreckte Halme. Durchaus grün.

S. glauca PB. Aehre walzig; die Borsten von aufwärts gerichteten Zähnen scharf; Blumendeckbltt. der oberen Blume querunzellig, doppelt so lang als das Deckblatt der unteren Blume.

Auf sandigen Aeckern, Sandplätzen, auf Gemüsebeeten d. d. g. G. sehr gemein.

H. ½ - 1'. Blatt und Halme graugrün. Borsten gelblich, zuletzt fuchsroth.

† *S. italica* PB. Aehre doppelt-zusammengesetzt, gelappt; die Borsten von aufwärts gerichteten Zähnen scharf, Blumendeckbltt. der oberen Blume glatt.

Im südlichen Europa heimisch, bei uns hie und da gebaut und verwildernd. Juli, Aug. ☉.

Aehre grösser als an der vorigen, meist schmutzig braunroth. Borsten an Länge veränderlich. H. 2 - 3'.

Panicum L. *Hirse*. Rispe offen ohne Borsten. Die untere Blume jedes Aehrchens trägt nur Staubgef. oder ist leer.

* *P. miliaceum* L. Rispe weitläufig, überhängend, Bltt. lanzettlich sammt den Scheiden haarig.

Stammt aus dem *Orient* und wird allgemein angebaut. Juni, Juli. ☉.

H. 1½ - 2'. Halme dick. Die Aehrendeckbltt. in eine Stachelspitze zugespitzt. Die Frucht ist von dem Blumendeckbltt. schalenförmig umhüllt. Die Samen geben eine nahrhafte Speise.

Milium L. *Flattergras*. Rispe offen, ohne Borsten. Aehren einblumig, ohne Ansatz zu einer zweiten unteren Blume. Aehrendeckbltt. fast gleich lang oder das untere etwas länger. — Die Uebereinstimmung mit *Panicum* giebt die Frucht, die Gestalt der Aehren, welche vom Rücken her zu-

sammengedrückt sind und die knorpelartige Consistenz der Blumendeckbltt. zu erkennen.

M. effusum L. Blumendeckblatt spitz; Halm kahl; Bltt. lineal-lanzettlich.

In schattigen Wäldern der Ebene u. d. Vorgeb. d. d. g. G. häufig. Mai, Juni. 2.

H. 2 - 3'. Halme einzeln. Bltt. bis 4'' breit, 4'' lang, mit kappenförmig-zusammengezogener Spitze, schwachseegrün. Rispenäste wagrecht, oft ein wenig abwärts- geneigt. Blumendeckbltt. nervig, die Frucht schalenförmig einschliessend.

9. *Phalarideae*. Rispe offen oder ährenförmig. Aehrchen von den Seiten zusammengedrückt, mit einer zwittrigen Endblume und einer oder zwei unteren, welche entweder nur Staubgef. enthalten oder leer sind oder zu denen nur deckblattförmige Ansätze vorhanden sind.

Baldingera Fl. der Wetterau. Rispe gelappt. Aehrchen einblumig mit zwei behaarten Schuppen als Ansatz zu zwei unteren Blumen. Blumendeckblätter mit einem scharfen ungeflügelten Kiel.

B. arundinacea Fl. der Wetterau. *Phalaris arund.* L. W. et Gr. sil.

β. picta. Bandgras. Bltt. der Länge nach grün- und weiss-gestreift.

An Fluss-, Teich- und Grabenrändern besd. zwischen Gebüsch, in der Ebene und dem Vorgeb. *β.* wird häufig in Gärten gehalten, wild um Lomnitz bei Charlottenbrunn und bei Schreiberhau von Remer gef. Juni — Aug. 2.

Halme 4 - 5' h., rundlich, kahl, an den unteren Knoten schwach gekniet. Bltt. sehr lang, 6 - 8'' breit. Aehrchen grün, rosaf. oder blassviolett-angelaufen, dreinervig.

Phalaris L. Glanzgras. Rispe ährenförmig. Aehrchen einblumig mit 2 behaarten Schuppen als Ansatz zu zwei unteren Blumen. Blumendeckblätter mit geflügeltem Kiel.

* *P. canariensis* L. Kanarienhirse. Aehre oval; Blumendeckbltt. zugespitzt am Rande einnervig mit ganzrandigem Flügel am Kiele; die Deckblätter der unteren Blumen feinhaarig, halb so lang als die vollständige obere Blume.

Im südlichen Europa einheimisch; bei uns auf Kräutereien angebaut. Juli, Aug. ☉.

H. ½ - 1'. Aehren grünlich-weiss.

Anthoxanthum L. Ruchgras. Rispe zusammengezogen. Aehrchen dreiblumig; die mittlere und obere Blume zwittrig, mit 2 Staubgefässen; die beiden seitlichen unteren leer aus einem am Rücken begrannnten Deckblatte bestehend. II, 2.

A. odoratum L. Rispe ährenförmig länglich, etwas locker; die Scheiden am Rande mit einem Haarkranz.

Auf Wiesen und Grasplätzen durch d. g. G. bis auf das Hochgeb. gemein. April, Mai. 2.

H. 1'. Im Schatten ist die Rispe bisweilen sehr locker. Der untere Theil des Krautes entwickelt gelieben und beim Trocknen einen angenehmen Geruch, daher der angenehme Duft des Heues, wo die Pflanze in Menge wächst.

Hieróchloë Gmelin. Mariengras. Rispe halboffen. Aehrchen dreiblumig: die obere mittlere Blume zwittrig mit zwei Staubgef.; die beiden seitlichen unteren bestehen aus zwei Deckblättern und enthalten drei Staubgefässe aber keine Stempel.

H. odorata Wahlenberg. Holcus borealis Schrader. Die Zwitterblume ohne Grannen; das äussere Blumendeckblatt der beiden unteren Blumen mit ganz kurzen Grannen unter der Spitze.

β. Die Blumenstiele nach oben hakig-scharf.

Auf sandigen Grasplätzen an Dämmen und Flussufern, in der Ebene zerstreut. An der *alten Oder* bei *Scheitnich* zuerst von Schimmel gef. An Dämmen bei *Althof*, β., an der *Oder* bei *Sandberg*, *Kottwitz* bei *Ohlau*, *Steinau*. April, Mai. 2.

H. 1—1½'. Aehrchen grünlich-gelb, dann bräunlich-strohgelb. Die Rispenstiele meist glatt, bisweilen schärflich. Wurzel kriechend. Der untere Theil der Pflanze riecht, besonders getrocknet, genau wie *Anthoxanthum*.

Nachtrag

zur

Flora von Schlesien,

welcher die seit 1840 neu aufgefundenen
oder neu unterschiedenen Arten, die wichtigeren seitdem
bekannt gewordenen Standorte, und Berichtigungen in der
Nomenclatur, Synonymie und Beschreibung enthält.

Nachträge.

Zur Seite 5.

Ranunculus auricomus fallax.

Diese Form, durch welche ich dem falschen *R. cassubicus* aus dem mittleren und westlichen Deutschland seine richtige Stelle angewiesen habe, ist auch von Fries (Novit. Fl. Suec. Mant. alt. 38.) in Schweden, wo gleichfalls der ächte *R. cassubicus* gefunden worden ist, nachgewiesen worden. Ich bedaure, dass Koch neuerdings (Regensb. Bot. Zeitg 1842. p. 436.) diese Varietät des *R. auricomus* für eine Form des *R. cassubicus* angesehen wissen will, eine Zusammenstellung, welche nach unseren Beobachtungen der Natur zuwider ist. — Im Schnabel der Frucht sehe ich kein genügendes Unterscheidungsmerkmal dieser beiden Arten; es finden sich Exemplare der var. *fallax* mit gesadem Schnabel. Diese Form beurtheilt man überhaupt nur richtig, indem man sie als eine durch Schatten, feucht-warme Frühlingswitterung und lockere Holzerde bedingte wuchernde Form betrachtet.

Ranunc. cassubicus. Im Holzgrunde bei *Leutmannsdorf* (Hepche), also am Fusse des Vorgebirges.

Zur Seite 11.

Anemone patenti-vernalis Lasch Linnaea IV. 429.

Ich zweifle jetzt nicht mehr, dass die Formen der *A. vernalis* mit langgestielten Endblättchen der Blätter und fünfzählig gefiederten Blättern, so wie mit violetten Blumenkronen, dergleichen ich jetzt selbst um *Deutsch-Hammer* gesammelt habe, zu diesen auch anderwärts beobachteten Bastard-Formen gehören. Der Mittelstufen sind mehrere, wie Pritzel, „Revisio Anemonarum“ p. 7 bemerkt.

Anem. patens. Auf Torfboden bei *Bruch* bei *Neumarkt* nach *Hallganns*, von *Güntzel-Becker* mitgetheilt. *Jacobswalde* in *O. S.* nach *Wetschky*.

Anemone Pulsatilla L. Bei *Birnbäumel*, wo *A. vernalis*, *patens* und *pratensis* wachsen, habe ich vergeblich die *A. Pulsatilla* gesucht, auch aus dem *Teschnischen* sah ich noch keine Exemplare. Nun sagt Pritzel (a. a. O. p. 14 u. 29.), dass ein im *K. Berliner Herbarium* von *Günther* aus *Schlesien* als *A. Pulsatilla* mitgetheiltes Exemplar zur *A. Hackelii* Pohl. d. i. *A. Halleri* β . *bohemica* gehöre. Es fragt sich daher, ob *A. Pulsatilla* wirklich in *Schlesien* vorkomme und mögen diese Arten weiterer Beobachtung empfohlen sein.

Zur Seite 12.

A. sylvestris. In der Diagnose muss es „Kronenbltt. 5—6“ heissen, statt „Kronenbltt. 6—9“.

Zur Seite 14.

Th. sylvaticum. Koch (Bot. Zeitg. 1841 p. 426.) Stängel gefurcht; Blattstiele ohne Stützblättchen, zusammengedrückt-stielrund, undeutlich-eckig; Blättchen rundlich-dreizählig oder dreispaltig und fünfzählig; die Blattscheiden mit kurzen, rundlichen, umgerollt abstehenden Ohren; Rispe ungleichmässig, Blumen oft schirmförmig gruppiert; Wurzel ohne Ausläufer.

Th. elatum Cent. sil. 7. Enum. Stirp. Sil. p. 96. *Th. minus* γ . *elatum* W. et Gr. Sil. *Th. minus* β . *elatum* Wimm. Fl. von Schl. 1832. *Th. minus* β . Wimm. Fl. Schl. 1840.

Auf waldigen Hügeln und Dämmen, bis in das Vorgebirge. Zuerst im Walde bei *Lissa* von Schummel gefunden. *Kessel im Gesenke, Gross-Stein b. Oppeln* (Grabowski). *Skarsine b. Br.* (Krause) Ende Mai und Anfang Juni. 2.

Diese Art, zuletzt mit *Th. collinum* vereinigt, wurde von Schummel stets als besondere Art unterschieden. Nach Koch sind die Verästelungen des Hauptblattstiels zusammengedrückt-stielrund, kaum kantig und nicht mit erhabenen Linien belegt. Ausserdem zeichnet sie sich aus durch einen compacten Wurzelstock mit büscheligen, gelben langen Fasern (Koch dagegen a. a. O. sagt: weit umherkriechende Wurzel), hellgrünes, bisweilen unterseits schwach grauschimmerndes Laub, grössere! dickliche, stets rundliche Blättchen, ungleichmässige Rispe, deren Aeste meist gerade zuletzt sählig-abstehend sind, und die Blumen zerstreut gegen die Spitzen schirmförmig gehäuft tragen. Die Früchte gross, bei der Reife gelblich (ob immer?); die beiden verwandten Arten haben schwarz-grünliche Früchte.

Th. minus. Diese Art, ohne Stützblättchen, und mit weit umherkriechender Wurzel, aus der neue Pflanzen empor sprossen, hat bei uns stets kleinere Früchte als die folgende, während Koch a. a. O. dieser grössere, der folgenden dagegen kleinere zuschreibt.

Th. collinum. Diese Art, welche Koch jetzt *Th. Jacquianum* nennt, und bisweilen auch ohne Stützblättchen vorkommen soll, wurde auch auf dem Kupperberge bei *Danckwitz* und um die *Gypsgruben bei Dirschel* gefunden.

Zu *Ranunculaceae*, p. 15. als dritte Zunft dieser Familie (so dass dann 4 *Helleboreae* heisst):

3. *Clematideae*. Blumen regelmässig. Krone fehlt. Kelchblätter kronenartig mit klappiger Knospenlage. Blätter gegenständig.

Clematis L. Waldrebe. Der Kelch besteht aus 4 bis 5 kronenblattartigen Blättchen. Kronenbltt. fehlen. Einsamige Nüsschen mit stehenbleibendem Griffel.

C. recta L. Stängel aufrecht; Bltt. gefiedert; Blättchen eiförmig zugespitzt; Kelchbltt. länglich, stumpf, aussen am Rande feinhaarig.

Auf trocknen, hügeligen Waldplätzen. Am *Weinberge* b. *Hultschin* i. J. 1840 von Kelch gefunden. Juni, Juli. 2.

Stängel kahl, 2—3' h. Bltt. gestielt, die obersten dreizählig. Blumen endständig in aufrechten Rispen. Nüsschen mit gefiedertem Griffel. Kelchbltt. weiss.

Zur Seite 16.

Helleborus viridis. Nach Mittheilungen von Siebenhaar am *Molkenbache* bei *Hirschberg* sehr zahlreich und ohne Zweifel einheimisch. Nach Kelch auch um *Neugarten* bei *Ratibor*, nach Matzeck bei *Kieferstädtel*, nach Reinhold um *Struwitz* b. *Neisse*.

Zur Seite 17.

Aquilegia vulgaris var. *micrantha* v. Uechtritz, mit über die Hälfte kleineren Blumen als gewöhnlich, bei *Cudowa* gesammelt und mitgetheilt von v. Uechtritz.

Zur Seite 20.

Aconitum Lycoctonum. Auch am *Urlichberge* im *Gesenke*, nach Scholz im Herb. d. v. Uechtritz.

Reseda Luteola neuerlich auch am Salzmagazin bei *Krapitz* von Finke gef.

Zur Seite 21.

Polygala depressa *Wenderoth* P. *serpyllacea* *Weithe*. Bltt. länglich-lanzettlich; Blüthentrauben arblumig, zuletzt seitenständig; Kelchflügel elliptisch-verkehrt-eiförmig, dreinervig, die Seitennerven ästig-gedert, oben durch Quernerven verbunden.

Auf Torfboden des Isergebirges nach Tausch und Elsner; Exemplare von diesem Standorte sah ich noch nicht. Sommer.

Sehr ästig, mit dünnen gestreckten Zweigen. Blumen blau. Stellt sich als eine von *P. vulgaris* und *P. comosa* durchaus verschiedene Art dar.

Zur Seite 30.

Armoracia austriaca. Statt „nobis“ ist zu setzen „Auctor. Compend. Fl. Germ. ed. alt. II. p. 27.“, und bei *A. amphibia* ist statt *E. Meyer* zu setzen *F. W. Meyer Chlor. Hanoveran.* 138.

Zur Seite 32.

Nasturtium officinale. Das Fragezeichen vor dem Namen ist zu streichen. Die Pflanze wächst in ziemlicher Menge in Quellsümpfen bei *Grunau* bei *Hirschberg* (v. *Flotow*, *Elsner*) von woher sie mir Siebenhaar neuerdings mitgetheilt hat.

Zur Seite 34.

Barbarea stricta. Da Fries dieser Art früher diesen Namen gegeben hatte (1822) als *Andrzejowski*, so muss Fries als Auctor des Namens gesetzt werden.

Zur Seite 35.

Arabis sudetica. Tausch (*Bot. Zeitg.* 1836. p. 407.) Stän-

gel fast kahl, aufrecht, einfach; die Wurzelblätter verkehrt-eiförmig, gegen den Grund lang verschmälert, fast kahl; die Stängelständigen kahl oder schwach-wimperig-behaart, elliptisch, am Gr. geöhrt, unregelmässig schweifig- oder buchtig-gezähnt; Schoten mit vorragendem Kiel und von gestielter Narbe gekrönt; Samen unpunctirt, oben mit breitem dreieckigen Flügelrand.

Ar. hirsuta var. *glaberrima*. Koch Syn. 39 (Wahlenb. Suec. I. 415?) Wimm. Fl. v. Schl. 1840. p. 35.

An kräuterreichen Gebirgsteilen. Im *Kessel im Gesenke* zuerst von Grabowski gefunden, im *Kessel an der Kesselkoppe im Riesengebirge*. ☉. Juni, Juli.

Diese Art unterscheidet sich von den beiden ähnlichen durch mindere Behaarung des Stängels und der Blätter, von *A. Gerardi*, durch die grösseren Blumen, minder reichblättrigen Stängel, breitere Schoten mit starken Mittelnerven, von *A. hirsuta*, durch mehr verschmälerte Wurzelblt., breitere Stängelblt. mit krummliniger Randung und minder regelmässiger Einzahnung u. s. w. Die Enden der Schotenwände bilden oben über der Fruchthöhle einen kleinen Schnabel von 1''' Länge, der die Narbe trägt. — Die demnach abgeänderte Charakteristik der *A. hirsuta* lautet:

Arabis hirsuta Scop. Stängel aufrecht, einfach, von abstehenden kurzen Haaren rauh; Wurzelblt. länglich, gegen den Grund ein wenig verschmälert; Stängelblt. länglich buchtig-gezähnt, am Gr. geöhrt, kurzhaarig-rauh; Schoten mit vorragendem Kiel und mit der fast sitzenden Narbe gekrönt; Samen unpunctirt, oben mit breitem gerundeten Flügelrand.

Auf feuchten, zumal moosigen Wiesen. Um *Br. bei Schleibitz, Sibyllenort, Riemberg, Kadlau, Gr. Jeseritz; Lewin; Oppeln bei Grudschütz, Proskau, Kruppitz* nach Grab. Juni ☉.

Nachdem die var. *glaberrima* davon entfernt worden ist, scheint die dichte Behaarung dieser Art ein beständiges Kennzeichen abzugeben. Ausserdem sind die Blt. am Stängel stets schmal-länglich, mit ziemlich geraden Seitenrändern, und regelmässigen, gleich-weit entfernten und gleich-grossen Zähnen, die Schoten stehen auf $\frac{1}{3}$ kürzeren Stielen als die vorhergehende, und ihre Wände endigen oben, unmittelbar über der Fruchthöhle, so dass die Narbe fast aufsitzend erscheint. — Nach dieser Anordnung ergibt sich auch für jede dieser drei Arten ein eigener Standort, indem die dritte *A. Gerardi* bei uns stets nur in feuchten, niedrigen Waldungen zumal an der Oder beobachtet wurde.

Zur Seite 40.

Erysimum repandum L. Blt. lanzettlich-zugespitzt, buchtig-oder schweifig-gezähnt, an der Spitze niedergebogen, mit einfachen und getheilten Haaren sparsam besetzt, die Blumenstiele halb so lang als der Kelch; die Schoten stumpf-viereckig, fast stielrund, kaum dicker als der verdickte wagrecht-abstehende Stiel, im Bogen aufsteigend, oben in die gestutzte Narbe verschmälert.

Auf Brachfeldern bei *Ottaschin* von Siegert im Juni 1843 gef.

Von 1— $1\frac{1}{2}$ ' Höhe. Von allen unseren Arten durch die weit abstehenden Schoten verschieden. Blumen schwefelgelb.

Zur Seite 43.

Viola palustri-uliginosa. Stängellos; Blt. nieren-herzför-

mig, mit etwas vorgezogenem Vorderrande; Blattstiel schwach-geflügelt....

Mit *V. uliginosa* und *palustris* bei *Winow* bei *Oppeln* (Grabowski).

Als ich diese Form in Grabowskis Herbarium sah, erkannte ich sie bald als eine Mittelform (wahrscheinlich doch Bastard) dieser beiden Arten, worauf sie dann Gr. in der Fl. v. Oberschl. p. 64 unter diesem Namen beschrieb. Vermuthlich ist die *V. epipsila* Ledeb. bei Fries Novit. Mant. 2. p. 51 dieselbe, wo es heisst: „Medium inter *V. uliginosam* et *palustrem* tenet locum.“ Ueber die Beschaffenheit der Stützblätter und Blumenblätter kann ich nichts mittheilen, da mir kein Exemplar zur Vergleichung vorliegt.

Zur Seite 44.

Viola arenaria.

Zur Verbreitung dieser Art ist noch anzuführen, dass sie kaum in irgend einem der grösseren, sandigen Kieferwälder Schlesiens, besonders der rechten Oderseite, fehlen dürfte. Ihr häufigeres oder sparsameres Erscheinen, auch zeitweiliges Ausbleiben hängt von der Umgebung und Bodenbeschaffenheit ab. Auf gelichteten Waldplätzen und Rodeplätzen, so wie in jungem Anwuchs erscheint sie meist in Menge und in kräftigster Gestalt; je höher dann die Stämme und je schattiger und moosbewachsener der Platz wird, desto mehr verliert sie sich und verändert ihre Tracht, aber nicht die wesentlichen Kennzeichen! — In Oberschl. im *Chroster Walde* nach *Wenck* und bei *Jakobsvalde* nach *Wetschky*.

Zur Seite 45.

Viola Ruppilii Allioni.

Wird mit *Fries* und *Koch* (Bot. Zeit. a. a. O.) nunmehr besser als *V. stricta* *Hornemann* zu bezeichnen sein, da es wahrscheinlich ist, dass jener Name der folgenden Art, nämlich der *V. persicifolia* *Rupp.* gebührt. — Die erste Form, α *humilis*, kommt auch sehr niedrig, zumal in trockneren Jahren und auf höheren Stellen vor, daher es richtiger „Stängel 3—6“ hoch“ heissen muss. Wir sahen diese Art auch aus Oberschlesien von *Krappitz* (*Fincke*), und von *Bolko* bei *Oppeln* (*Herb. Grabowski*).

Zur Seite 46.

Viola pratensis. *Mert. u. Koch.* *V. lactea*. *Fries* *Novit.* 2. p. 276. *V. elatior* α . *pratensis* *Wimm.* Fl. v. Schles. 1840. p. 46. Stängel aufrecht, steif; Bltt. aus eiförmigem Grunde lanzettlich, am Gr. mit keilförmigem Zuschnitt in den breitgeflügelten Blattstiel verlaufend; Stützbltt. blattartig, breit lanzettlich, eingeschnitten-gesägt, die mittleren und oberen länger, als der Blattstiel; Kelchbltt. spitz; Kronenbltt. länglich; Sporn kegelförmig, etwas länger als die Anhängsel der Kelchbltt.

Auf fruchtbaren, etwas trocknen Wiesen mit lehmigem Grunde, um *Br.* zerstreut und oft vereinzelt um *Leerbeutel*, *Scheitnich* und *Schwoitsch*, *Bleischwitz*, *Ransern*, *Rienberg*. Mai, Juni. 2.

Obwohl auch *Fries* a. a. O. die Hinneigung dieser Art zur *V. elatior* anerkennt, bin ich doch jetzt veranlasst meine frühere Ansicht, nach der die *V. pratensis* eine niedrigere Wiesenform, die *V. elatior* eine höhere Schatten- und Wald-Form ein und

derselben Art darstellen, anzugeben, da ich nach wiederholter Beobachtung der *V. pratensis* keinen Uebergang in die *V. elatior* gefunden habe. Der keilförmige Verlauf des Blattgrundes in den Flügelrand des Blattsfels scheidet dieser Art eigenthümlich zu sein; ausserdem sind die Blumenkronen um vieles kleiner, milchweisslich mit dunkleren violetten Adern. Die Stützblt. sind oft sehr gross und breit, und dann gewöhnlich fast ganzrandig oder mit 1—2 tieferen Einschnitten.

Zur Seite 48.

Parnassia palustris geht bis in das Hochgebirge nahe an 4000' am *Kiesberge im Riesengrunde, und im Teufelsgärtchen*; schon Ende Juli 1841.

Zur Seite 51.

Elatine Hydropiper L. Blätter gegenständig, spatelförmig, kürzer als der Stiel in den sie sich verschmälern; Blüten sitzend oder kurz gestielt mit 4 Kronenblättern und 8 Staubgefässen; Samen halbkreisförmig-gekrümmt.

Auf überschwemmten Stellen. *Tamplitzer Felder bei Leobschütz (Schramm)* und in der *Uttiger Lache bei Bunzlau* nach Schneider. Sommer. ☉.

„Die sehr zarten Stängel kriechen im Schlamm. Die Blätter gegenständig, verkehrt-eiförmig oder spatelförmig, in den Stiel verschmälert, dicklich, durch zarte Würzchen etwas rauh. Die Blumen tragen an jedem der vier Kronenblätter einen pfriemlichen Staubfaden mit kleinen Külbchen, und zwischen je zwei Kronenblt. einen dergleichen etwas kürzeren. Kronenblt. umgekehrt-eiförmig, weisslich, an der Spitze violett, hinfällig wie der zarte Kelch. Frucht vierklappig. Blüten in den Blattwinkeln, selten gegenständig.“ Schramm. Die selteneren Pflz. etc. p. 20. — Sollten die ehemals von Seliger bei *Wölfelsdorf* gefundenen Exemplare, welche mir jetzt nicht zur Vergleichung zu Gebote stehen, gestielte Blumen haben, so dürften diese zur *E. hexandra* DC. gehören, was weiterer Beachtung empfohlen sein soll.

Elatine triandra Schkuhr. Blätter gegenständig, spatellinienförmig, länger als der Stiel in den sie verlaufen; Blüten sitzend [mit drei Kronenblt. und drei Staubgefässen]; Samen bogenförmig gekrümmt.

An der *Klodnitz bei Gleiwitz* von Kabath im Herbst 1842 entdeckt.

Die Samen sind schwach gekrümmt, etwa $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ eines Kreisbogens. Die Zahl der Kronenblt. und Staubgef. war in den getrockneten Expl. nicht mehr zu erkennen. — Auch von Reissek erhielt ich einige als *E. triandra* bezeichnete Pflänzchen von *Unter-Lomna* bei *Teschén*, deren Kleinheit keine Untersuchung gestattete.

Zur Seite 64.

Vaccaria pyramidata. Um *Neugarten bei Ratibor* nach Kelch.

Zur Seite 69.

Alsine verna. *Kiesberg im Riesengrunde* an Kalkfelsen. Mitte Juli 1842.

Zur Seite 70.

Arenaria (*Moehringia*) *mucosa*. Blätter fadenförmig halbrund ohne Nerv, kahl; Stängel rasenartig, niederliegend; die endständigen Blumenstiele 2—7 blumig; Kelchbltt. eilanzettlich, spitz, einnervig; Kronen vierblättrig, länger als der Kelch; Staubgefäße meist acht.

An felsigen Lehnen. An der *Kesselkoppe im Riesengebirge* von Elsner entdeckt. (Herb. Grabowski.) 2. Juli, Aug.

Zur Seite 73.

Cerastium.

Die beiden Formen, welche bei Fries Novit. ed. 2. p. 132. 134 als Arten unter dem Namen *C. glutinosum* Fries und *C. semidecandrum* L. unterschieden waren, und welche ich in meiner Fl. v. J. 1832 gleichfalls unterschieden hatte, wusste ich später nicht mehr genügend zu sondern und vereinigte sie daher 1840 unter dem Namen: *C. semidecandrum*. Ich sehe jetzt aus Fries Mant. 2. p. 36, dass er unser *C. semidecandrum* für eine niedrige Form seines *C. glutinosum* erklärt, und bemerke, dass er dieses durch fast walzige Kapseln, welche doppelt so lang als der Kelch sind und auf abstehenden Stielen stehen, das *C. semidecandrum* dagegen durch eiförmig-walzige Kapseln, welche länger als der Kelch sind und auf zurückgeschlagenen Stielen stehen, charakterisirt. — Dass *C. brachypetalum* Desp. bei Persoon und *C. strigosum* Fries ein und dieselbe Pflanze seien, ist kaum zu bezweifeln; wir fanden es allerdings an grasigen Ackerrändern, mit am Grunde röthlichem Stängel und rosettenförmigen unteren Blättern.

Zur Seite 76.

Sagina.

Unserer Ansicht, dass *Spergula saginoides*, *subulata* und *nodosa* zu der Sippe *Sagina* gebracht werden müssen, stimmt auch Koch, Bot. Zeit. a. a. O bei, wie zum Theil auch schon Ernst Meyer (Preussens Pflanzengattungen) und John Torrey et Asa Gray (A Flora of North-America I. 1. p. 177. 178. 1838) gethan hatten. Die beiden letzteren sind daher bei *Sagina subulata* und *S. nodosa* statt „nobis“ und „E. Meyer“ als die früheren Autoren dieser Namenbestimmung hinzuzusetzen. — *Sagina subulata* neuerdings häufiger in Oberschlesien bei *Kleinstejn, Nieder-Ellgut am Annaberger, Öttnuth bei Krappitz* (nach Grabowski), und am *Rozwader Vorwerk bei Leschnitz!* von Hertzsch gefunden. Die Exemplare von letzterem Orte sind an den Blättern, Blumenstielen und Kelchen mit zahlreichen Drüsenhaaren besetzt.

Zur Seite 79.

Herniaria hirsuta L. Bltt. länglich, gegen den Grund verschmälert, nebst den Stängeln und Kelchen mit kurzen, steifen Haaren besetzt.

Auf sandigen Feldern und Aeckern und Haideplätzen. Bei *Lesch-*

niz und Zyrowa in Oberschlesien im Sommer 1842 von Hertzsch entdeckt. ○.

Durchaus von dem Aussehen der *H. glabra*. Von den vom Entdecker uns mitgetheilten Exemplaren zeigen die früher gesammelten eine dichte Bekleidung, wodurch die Pflanze ein weissgraues Ansehen erhält. An den später gesammelten dagegen stehen die Haare weniger dicht, und die Pflanze ist mehr grün. — Die Blätter sind länglich und gegen den Grund verschmälert, so dass sie in eine Art von kurzem Blattstiel übergehen, während die der *H. glabra* elliptisch und sitzend sind; doch weiss ich nicht, ob dieses Merkmal beständig ist. Getrocknet riecht die Pflanze nach *Anthoxanthum*.

Zur Seite 84.

Chenopodium ficifolium. Bei *Pobnisch-Neukirch* nach *Wetschky*. *Um Krittern bei Br.* zahlreich am Rande eines Gemütsackers 1841, und in vereinzeltten Exemplaren auf dem Sande der alten Oder 1842. Diese Art gehört zu denjenigen, welche hie und da und von Zeit zu Zeit erscheinen und daselbst wieder verschwinden, oder auch nach Jahren wiederkehren.

Krause fand im Herbst 1842 an Mauern am Exerzierplatze bei *Br.* einige Exemplare eines *Chenopodium*, welches zwischen *Ch. album* und *Ch. Vulvaria* in der Mitte steht, und dessen weitere Beobachtung wir uns vorbehalten.

Zur Seite 87.

Atr. latifolia. *Wahlenberg*.

Diese Art muss ihren ursprünglichen Namen *A. hastata* Linn., den sie auch bei *Mattuschka* und *Krocker* hatte, wieder erhalten, nachdem *Fries* die Synonymie dieser Pflanzen gelichtet hat. Vordem verstand man diese Art vielleicht allgemein in Deutschland unter dem Namen *A. hastata*, bis dieser Name einer anderen, um *Berlin* wachsenden, in *Schlesien* noch nicht gefundenen, vindiziert wurde, welche *Fries* jetzt *A. calotheca* nach *Rafn* nennt. Diese unsere Art hiess früher *A. patula* *Smith* und als die Unrichtigkeit der *Smithschen* Benennungen offenbar geworden war, erhielt sie den *Wahlenbergischen* Namen *A. latifolia*, wie in unseren *Fl. v. Schl.*

Zur Seite 92.

Saxifraga Aizoon. Hat zwei Varietäten:

- a) *brevifolia*. Wurzelbltt. elliptisch oder länglich, scharfgesägt; Stängel niedriger, Aeste armbtumig. *S. Aizoon* der Autoren.
- β) *longifolia*. Wurzelbltt. lang, lineal-zungenförmig, stumpfgekerbt; Stängel hoch, Aeste vielblumig. *S. longifolia* *Host*, *austr. S. Hostii* *Rchb. Exc.* *S. elatior* *M. u. Koch.*

Die Varietät β. entdeckte *G. Reichenbach fil.* im Herbst 1842 schon verblüht an den Felsen des Kessels im *Gesenke*. Nachdem ich zahlreiche Exemplare der *S. Aizoon* und eines der *S. elatior* aus den *Savoyer Alpen* von *de Notaris* verglichen, glaube ich letztere nicht mehr als Art unterscheiden zu können, da weder Höhe des Stängels und Zahl der Blüten, noch die Länge der Blätter, noch auch deren Randung sich beständig erwiesen.

Zur Seite 105.

Conioselinum Fischeri, auch im Kessel im Gesenke von Grabowski und Fincke gefunden.

Zur Seite 109.

Heracleum sibiricum. Neue Beobachtung hat mich überzeugt, dass diese, in den Gebirgsschluchten des Riesengebirges wachsende Art von *H. Sphondylium* β *elegans*, welche gleichfalls daselbst vorkommt, durch die in der Diagnose angegebenen Merkmale, wie auch durch den schlankeren Wuchs und schmutzig-weiße ins gelbliche oder grünliche spielende Farbe der Kronenblätter merklich verschieden ist. Die Blattabschnitte sind schmaler und mehr in die Länge gezogen. Wie von *H. Sphondylium* giebt es aber auch von dieser zwei Formen, eine mit breiteren und eine mit schmälern Blattzipfeln; letztere ist das *H. angustifolium* Linn. Mant. Man vergleiche Koch, Synops. p. 308.

Zur Seite 120.

Epilobium Dodonaei verbreitet sich nach den Beobachtungen Kelchs dem Laufe der *Oder* folgend fast mit jedem Jahre weiter abwärts. Es wurde i. J. 1829 zum erstenmale einige Stunden oberhalb Ratibor, 1833 aber schon bis $\frac{1}{2}$ Meile unterhalb und 1837 bis $1\frac{1}{2}$ Meilen unterhalb Ratibor gesehen.

Zur Seite 121.

Epilobium roseo-montanum. Blätter länglich, scharf-sägezählig, fast kahl, die unteren gegenständig, kaum gestielt; Stängel rundlich mit ein wenig herablaufenden Linien; Narben oben viertheilig-geöffnet.

An Grabenrändern, um *Kleinburg* und *Gräbschen bei Br.* von Krause gefunden, August. 4.

Bis 2 und 3' hoch, stark, oben rispig-kstig und an den Aesten mit feiner dicht anliegender Bekleidung bedeckt. Stängel röthlich. Bltt. gross, elliptisch. Die Kronen halten in Grösse und Farbe zwischen beiden Arten das Mittel.

Zur Seite 122.

Epilobium palustre. Blätter lanzettlich, fast ganzrandig, sitzend, die unteren gegenständig; Stängel stielrund, feinhaarig, ohne deutliche Linien; Narben vereinigt-keulenförmig.

Auf sumpfigen und moorigen Wiesen, in Gräben und an Grabenrändern, von der Ebene bis ins Hochgebirge, wo sie mit der folgenden in Gesellschaft wächst, durch das ganze Gebiet. Juli, Aug. 4.

Von 2" bis $1\frac{1}{3}$ ' Höhe, einfach, oben nickend. Von Farbe dunkel und schmutzig-grün, oft braunroth überlaufen; die Blätter matt. Der Stängel ist stielrund, rundum mit feinem krausen Haar besetzt, das in zwei, jedoch nicht erhabenen Linien dichter steht, aber weniger regelmässig als bei der folgenden. Nur selten sieht man an diesem beblätterte Seitenriebe aus dem Grunde des Stängels.

Epilobium alpinum. Blätter länglich, stumpf, fast ganzrandig, kurz-gestielt, die unteren gegenständig; Stängel aus einer krie-

chenden Wurzel aufgerichtet, stielrund, mit zwei haarigen Längslinien; Narben vereinigt-keulenförmig.

E. palustre β *alpinum* W. et Gr. sil. Wimm. Fl. von Schl. 1832 und 1840.

Auf quelligen und moorigen Stellen des Hochgebirges. Im *Riesengebirge* und *Gesenke an quelligen Lehnen und moosigen Bachrändern*, zwischen *Sphagnum* und *Bartramia* verbreitet und häufig. Juli, Aug. 2.

Nachdem ich diese Art lange als eine Abart mit *E. palustre* vereinigt hatte, habe ich mich nunmehr nach fortgesetzter Beobachtung davon überzeugt, dass diese Ansicht unrichtig war. Die niedrigen Formen des *E. palustre*, welche mit dem wahren *E. alpinum* oft in Gesellschaft oder dessen nächster Nähe gefunden werden, (z. B. an den Lehnen des kl. Teiches, in der Kesselgrube, im Kessel und am Hungerberge im Gesenke) galien mir früher als das Bindeglied. Allein Wachstum, Farbe und Konsistenz des Krautes und selbst die Gestalt der Blätter, die bis auf einen gewissen Grad bei jeder dieser beiden Arten beständig ist, scheiden sie hinreichend. Höhe 2' bis 1' und drüber. Der Stängel treibt am Grunde in und auf dem Moose zahlreiche behäuterte Seitentriebe, mit ovalen oder runden Blättern, steigt am Gr. ein wenig auf, von da anrecht bis zur Spitze, welche bis zur Blüthezeit überhängt oder zurückgekrümmt ist; grösstentheils kahl, mitten mit zwei feinhaarigen nicht erhabenen Linien. Blätter hell — und freudig grün, etwas saftig und mit schwachem Glanz, die unteren und mittleren deutlich, letztere nur kurz gestielt, elliptisch oder länglich, die oberen länglich-lanzettlich, der Rand ganz oder mit wenigen entfernten und sehr seichten Zähnen, mit gerundet-stumpfer Spitze. Kelchbltt. spitz. Krone doppelt so lang als der Kelch, einfarbig-lila-violett. Kapseln meist feinhaarig, selten kahl. Man kann die Form mit feinhaarigen Kapseln nicht als Varietät aufführen, da diese Bekleidung sich allmählig gegen die Reife verliert; am wenigsten aber *E. nutans* Schmidt. Boëm. dazu citiren, wo es ausdrücklich „*capsulae glabrae*“ heisst. Was ich als *E. nutans* Tausch gesehen, war *E. palustre* var. minus Fries Nov. Mant. 2.

Zur Seite 123.

Circaea Lutetiana. Zum Charakter ist hinzuzusetzen Früchte kuglig-knopfförmig, dicht mit Hakenborsten besetzt.

Circaea alpina. Früchte schief, keulenförmig, mit spärlichen Hakenborsten besetzt.

Zur Seite 127.

Sorbus Aria. — Auch am Krkonos, wo Zlik in meiner Gegenwart einige Sträucher im Jahre 1842 fand. — Ein Exemplar von Hoppe, vermuthlich aus *Salzburg*, weicht zwar im Aussehen von der unseren ab, etwa so wie die var. β *tomentosa* der *Pyrus communis* und *P. Malus* von var. α *glabra*, aber ohne wesentliche Unterschiede zu zeigen. Die Blattstiele, welche an unserer sehr kurz sind, haben hier bis $\frac{1}{4}$ " Länge und sind wie die Blumenstiele dicht weissfilzig; der Blattrand scharfer und regelmässiger eingeschnitten. An der unarigen sind die Blumenstiele fast kahl oder mit flüchtigem Filz, und die Einschnitte des Blattrandes seichter, die Blätter kleiner und fast lederartig.

Zur Seite 130.

Rubus. Nachdem in der Monographie der deutschen Brombeeren von Weihe und Nees die mannigfaltigen Formen dieser schwierigen Sippe durch Beschreibungen und Abbildungen näher erläutert worden waren, versuchten wir an denen in Schlesien beobachteten Formen zuerst eine Sonderung der Arten. Mit Ausnahme von einigen, die ich damals auf Weihe's Aussage noch unterschied, haben sich mir die damals unterschiedenen Arten als beständige und wohl unterschiedene erwiesen, daher ich die in der Fl. v. Schl. von 1840 beschriebenen als zuverlässige Arten betrachte und als die hauptsächlichsten in Deutschland wachsenden Formen annehmen zu können glaube. Ausser denjenigen Schriftstellern, welche die Mehrzahl der Weihe'schen Arten auf- und annahmen, ist nur in dem *Compendium Florae Germanicae* Edit. altera von Bluff, N. a. Esenbeck und Schauer in der Abtheilung der *Eglandulosi* ein Versuch gemacht worden, die Weihe'schen Formen auf die wahren Arten zurückzuführen: in der A. der *Glandulosi* dagegen sind die Mehrzahl der Weihe'schen Arten adoptirt. Neuerdings hat diese verwickelte Sippe eine neue Beleuchtung durch die Monographie der Schwedischen Rubi von J. P. Arrhenius in Upsala erhalten, worin zuerst die allgemeinen Eigenthümlichkeiten der Sippe treffend gewürdigt und die Arten scharf auseinandergesetzt sind. — Ich glaube jedoch, dass vielleicht auch in Schlesien noch ein und die andere Art unterschieden werden wird. Namentlich ist es *Rubus Radula*, der vielleicht noch von *R. vulgaris* zu trennen und als eige Art aufzustellen sein wird; er steht in mancher Hinsicht dem *R. thyrsoides* sehr nahe. — *Rubus Bellardi* W. et N. wird von Arrhenius und Fries, wie auch von Schauer a. a. O., als *R. glandulosus Bellardi* aufgeführt, welchem Beispiele wir künftig folgen wollen.

Zur Seite 144.

Poterium Sanguisorba fand ich neuerlich auch in den Umgebungen von *Breslau* an buschigen Dämmen bei *Carlowitz*.

Zur Seite 150.

Cytisus capitatus. Die verschiedenen Zustände dieser Art hat Grabowski mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt und darnach zwei Hauptformen aufgestellt: a) *verus* mit endständigen, kopfförmigen Blüten (mit vier Unterformen nach der Lage und Verästelung des Stängels, wohin auch *C. supinus* Linn. gezogen wird,) und b) *lateriflorus* mit seitenständigen, gehäuften oder traubigen Blüten. Von dieser Form werden vier Unterformen unterschieden: α) *prostratus*. Stängel niederliegend, oft weit ausgebreitet, Blüten seitenständig zu 2, 4–6. *C. prostratus* Scopoli. β) *bis florens*. Dieselbe Pflanze macht später neue Triebe mit kopfförmigen Blüten, während die früheren seitlichen nunmehr als Fruchthüllen erscheinen. *C. bis florens* Host. γ) *racemosus*. Stängel mit vielblüthigen gedrungenen oder unterbrochenen langen Trauben. *C. hirsutus* L.? δ) *alternifolius*. Stängel niedergedrückt mit

langen Aesten und einzelnen wechselständigen und blattwinkelständigen grossen Blüten. Es wurde beobachtet, dass diese Formen durchaus nur von äusseren Einflüssen entstehen, namentlich die vier letzteren, und zum Theil durch den Standort bedingt sind. *Wiener Berge bei Oppeln*. Grab. Fl. v. Oberschl. p. 204.

Zur Seite 153.

Die Arten von *Melilotus* haben in der Flora von Deutschland von Koch wieder eine Veränderung ihrer Namen erhalten, ohne dass ihre Umgränzung oder ihr Charakter geändert ist.

Zur Seite 169.

Euphorbia platyphyllos L. Die Enddolde fünf-strahlig, die Stiele gabelig-getheilt; Kapseln mit kurzen, dicken, unregelmässig-gestellten Warzen besetzt; die Samen linsen-eiförmig; Bltt. länglich-lanzettlich, fein-gesägt, unterseits haarig, die untersten verkehrt-eiförmig; die Bltt. der ersten Hüllen dreieckig-eifg., fein gesägt.

E. platyphyllos $\alpha \beta \gamma \delta$ W. et Gr. Fl. sil. III. 279.

An angebauten Orten, in Dörfern auf Angern, Weideplätzen an Gräben und Zäunen, in der Ebene d. d. g. G. häufig. Juli. Aug. ☉.

Euphorbia stricta L. Die Enddolde drei-strahlig, die Stiele dreitheilig; Kapseln mit walzenförmigen, unregelmässig-gestellten Warzen besetzt; die Samen walzig-eiförmig; Bltt. länglich-lanzettlich, fein-gesägt, kahl, die unteren verkehrt-eiförmig; die Blätter der ersten Hülle länglich, fein-gesägt.

E. platyphyllos s. *gracilis* W. et Gr. sil. III. 279.

An buschigen Dämmen, in Hecken und an Waldrändern, zumal in der Nähe der *Oder um Br., bei Scheitnich, Bischofswalde. Oderwälder bei Margareth, Jeltsch*. Juli, Aug. ☉.

Auf die Verschiedenheit dieser Art, die wir bisher als eine Abart der *E. platyphyllos* betrachtet hatten, (Form mit schlankem Stängel in Wäldern. Fl. v. Schl. 1840. p. 169), wies Schauer an Schlesischen Exemplaren in einem Vortrage in der Schlesischen Gesellschaft hin. Der Stängel, oft mehrere aus einer Wurzel, am Grunde schwach aufsteigend, oben vollkommen gerade, unten sammt den unteren Bltt. gewöhnlich purpurroth angelaufen, schlank und nach Maassgabe der Höhe dünn. Die Bltt. sowohl am Stängel als die der Hüllen sind etwas länger und schmaler, mehr länglich, während sie bei der vorigen mehr in das Eiförmige gehen. Die Stiele des Blütenstandes sind um vieles dünner. Die Kapseln sind um die Hälfte kleiner, mit dünneren fast walzenförmigen Warzen, welche fast ohne Ordnung stehen, besetzt; bei der vorigen sind die Warzen viel kürzer und dick. Die Saamen sind um die Hälfte kleiner und nach Verhältniss der Länge dünner, mehr eiförmig, hell castanienbraun; die der vorigen zusammengedrückt-eiförmig, scherbenbraun.

Zur Seite 170.

Euphorbia pilosa. Auch im Thale zwischen *Katscher* und den *Gypsgruben* nach der Fl. v. Gnadenf.

E. amygdaloides. Um *Haatsch* und *Schillersdorf bei Rattibor* nach der Fl. v. Gnad.

Zur Seite 171.

Euphorbia lucida γ *linearifolia* W. Fl. v. Schl. 1840 p. 171. Diese Form bin ich nunmehr, nachdem ich in einigen anderen Sippen mich von dem nicht seltenen Vorkommen hybrider Formen vollständig überzeugt habe, veranlasst ebenfalls für eine solche anzusehen, die ich als *E. lucido-Cyparissias* bezeichne, ein Name, der, wie bei vielen hybriden Arten, eine gewisse Formenreihe ausdrückt, deren äusserste Glieder einerseits der *E. lucida*, andererseits der *E. Cyparissias* näher stehen. Auf diese Weise werden diese Formen auch allein erklärlich, nämlich durch Vermischung dieser beiden Arten, da es sonst unbegreiflich bleibt, wie zwei so offenbar gesonderte Arten durch eine fast continuirliche Reihe von Mittelformen verknüpft werden, was uns nach der Analogie anderer Pflanzen nöthigen würde, sie zu einer Art zu vereinigen, wogegen sich aber Blick und Gedanke sträubt. — Vielleicht geht auch *E. Esula* mit *E. lucida* ein solches Verhältniss ein; wenigstens schienen dergleichen an buschigen Dämmen zwischen *Kesel* und *Pilsniz bei Br.* gesammelte Formen eher auf eine Betheiligung der *E. Esula* als der *E. Cyparissias* hinzuweisen.

Zur Seite 179.

Linnaea borealis wurde neuerlich von Freytag in der Haide um Polgsen bei Wohlau gefunden und von Güntzel d. ä. mitgetheilt.

Zur Seite 183.

Asperula tinctoria. An zahlreichen Exemplaren vom *Geiersberge* waren die Mehrzahl der Blumenkronen dreispaltig mit drei Staubgefässen; nur hin und wieder zeigte sich eine Blume mit vier-spaltiger oder auch mit zweispaltiger Krone.

Zur Seite 187.

Valerianella dentata De Cand. Kelchsaum schief-gestutzt, der hintere Zahn grösser, dreieckig, spitz, oft mit zwei seitlichen Zähnen, die drei vorderen sehr klein; Früchte fast kugel-eiförmig, mit einer Furche und fünf feinen Riefen.

Unter der Saat. Um *Oppeln* von Grabowski entdeckt. Vielleicht auch anderwärts, aber bisher übersehen. Juli. ☉.

Diese Art gleicht im Aussehen und der Gestalt der Frucht vollkommen der *V. Auricula*. Höhe 1—1½'. Die Früchte am Grunde bauchig; die leeren Fächer sind so gross oder etwas grösser als das den Samen enthaltende, ein wenig grösser als an jener.

Zur Seite 188.

Dipsacus sylvestris. Bltt. verwachsen-stängelumfassend, die grundständigen kahl mit Blasenstacheln; der Stängel unter dem Kopf mit zerstreuten Stacheln besetzt; die Hüllblätter aufsteigend, linealisch am Gr. frei, 2—3 länger als der Kopf; die Spreuschuppen in eine gerade Spitze genodigt.

Dipsacus laciniatus. Bltt. verwachsen-stängelumfassend, die mittleren fiederspaltig-geschlitzt, kerbig-geägt, die grundständigen mit hakerigen Haaren besetzt; der Stängel unter dem Kopf mit dichten Stacheln und Borsten besetzt; die Hüllbltt. lanzettlich, weit abstehend am Gr. verwachsen, sämtlich kürzer als der Kopf; die Spreuschuppen in eine gerade Spitze geendigt.

Beide Arten auf trocknen Angerplätzen an der Oder bei Baumgarten bei Ohlau. Juli bis Sept.

Hier gebe ich genauere Diagnosen dieser beiden Arten, welche sich schon an den blossen Wurzelbltt., welche bei dem ersteren haarlos, aber mit starken, aus Blasen entspringenden Stacheln besetzt sind, bei dem zweiten aber auf der ganzen Fläche mit Haaren besetzt sind, erkennen lassen. Der *D. laciniatus* unterscheidet sich ausser noch durch doppelt so breite Spreuschuppen (Deckblätter) und fast halbmal grössere Blumenkronen, von lila Farbe (bei *D. sylv.* violett); von den vier Lappen des Saums ist der grössere $\frac{1}{2}$ länger, als die anderen, bei *D. sylv.* $\frac{1}{3}$ länger. Die Stacheln am Stängel zumal am oberen Theile sind feiner und länger mit dünner haarförmiger Spitze. Die Spreuschuppen am blühenden Kopf stehen söhlig, so dass die schwach gebogene Spitze ein wenig nach unten gerichtet ist; bei *D. silv.* dagegen schief nach oben.

Zur Seite 193.

Z. 9. v. o. lies: Nach Elsner's Beobachtungen hat sich diese Pflanze in neuerer Zeit allmählig und in bemerkbarem Fortschreiten über das *Hirschberger Thal* verbreitet.

Zur Seite 197.

Hypochoeris uniflora β *crepidifolia*. Höher, Blätter buchtig-gezähnt.

Diese an feuchten Abhängen vorkommende, von Sadebeck an kleinen Teiche in Riesengebirge gesammelte Form zeichnet sich von der gewöhnlichen Form der Käme des Gebirges so aus, dass sie eine Hervorhebung verdient. Der Stängel schwach aufsteigend, Höhe von $1\frac{1}{2}$ ', mit zahlreichen grossen und langen stark- und buchtig-gezähnten Blättern, so dass die ganze Pflanze in ihrer Tracht der *Crepis grandiflora* ähnlich wird.

Zur Seite 201.

Bei *Crepis succisifolia* und *C. paludosa* ist „Juni, Juli“ statt „Juli, Aug.“ zu setzen.

Zur Seite 203.

Intybus. Kann als besondere Sippe nicht gehalten werden, da der Charakter „Strahlen der Federkrone ganz glatt,“ (bei Fries Novit. Succ. „Pappus laevissimus“) unrichtig ist. Bei einiger Vergrösserung zeigt sich der Pappus bei *Hieracium praemorsum* eben so mit feinen Härchen besetzt als bei anderen Arten von *Crepis* oder *Hieracium*. Gegenwärtig glaube ich übrigens, dass die ehe-

maligen *Hieracia*, nämlich *succisifolium*, *grandiflorum* und *paludosum* mit Unrecht unter *Crepis* gestellt werden.

Hieracium.

Diese Sippe gehört zu denjenigen, welche reich ist an Arten und Abänderungen, die sich dem Blicke, der das Ganze der Art aufzufassen gewöhnt ist, leicht in ihrer Bestimmtheit darstellen, aber bei dem Mangel an einzelnen Kennzeichen sehr schwer in Worten zu charakterisiren sind. Und so ist sie eine Quelle immer neuer Belehrung, die uns die fortgesetzte Beobachtung giebt. Daher sehe ich mich veranlasst, da sich mir theils einiges Neue von Belang darin dargeboten hat, theils die Anordnung der Arten, wie ich sie in der Flora von 1840 gegeben, mir gegenwärtig nicht durchaus richtig erscheint, eine neue Uebersicht der Arten dieser Sippe hier folgen zu lassen.

Wer die *Hieracia* aufmerksam und lange beobachtet hat, dem kann es nicht entgehen, dass gewisse Formen in einer fast unwandelbaren Beständigkeit und Gleichförmigkeit, die geringen Abweichungen abgerechnet, erscheinen: diese sind die wahren und ächten Species, die man in seiner Gegend sehr bald herausfindet. So wird es z. B. nicht schwer werden, aus der Gruppe der Afterdoldigen bei uns *H. collinum* Gochnat, *praealtum* Vill. und *cynosum* L. (*Nestleri* Vill.) als ächte und beständige Arten zu erkennen. Ausser diesen findet man zwar oft zahlreich neben einander, aber stets an vereinzelt Standorten abweichende Formen, an denen ein geübtes Auge sehr bald ein fremdartiges Wesen erkennt und deren Bestimmung aus Büchern in der Regel unmöglich ist. Es ist ein durchaus unrichtiger Weg, den viele Autoren eingeschlagen haben, die Kenntniss dieser und ähnlicher Sippen durch Untercheidung und Benennung möglichst vieler Formen fördern zu wollen: sie wird im Gegentheile dadurch verhindert und verdunkelt; denn jeder Erfahrene weiss, dass dieses schlecht empirische Verfahren in infinitum fortgeht und dass solche Diagnosen wohl für einzelne Exemplare ausreichen und sich auf dem Papier gut ausnehmen, aber keine Wahrheit enthalten. Das rechte Studium hat es damit zu thun, die Natur und den Zusammenhang dieser Formen auszumitteln und die Kenntniss der wahren Arten dadurch herbeizuführen, dass man den Umfang ihrer Veränderungen darlegt und die hybriden Bildungen aussondert. Meine Beobachtungen in anderen Sippen haben mich auf den Gedanken gebracht, dass es auch unter den *Hieracia* hybride Formen giebt, wofür man die in ihnen sich ausprägende Doppelnatur und gleichsam vereinigte Gestalt und die Nachbarschaft der Stammarten als Argumente anführen kann. Wenigstens ist kein Grund vorhanden, zu zweifeln, dass bei den *Hieracia* hybride Formen vorkommen, wenn man diese bei *Cirsium* zugiebt, bei welcher Sippe die meisten Autoren mit dieser Ansicht einverstanden sind.

Die nachstehende Uebersicht dient theils als Ergänzung, theils als Berichtigung der in der Flora von 1840 gegebenen Bearbeitung.

I. Pilosella. Wurzel abgeissen.

a) Blasse, mit grauweisser Bekleidung, Schaft mit einer Blasse oder gabelförmig getheilt mit wenigen Blumen.

1) *H. pilosella*. Schaft blattlos, einblumig, Blätter unten von einem zusammenhängenden, anliegenden, mehrlartigen Filz weissgrau;

b) die älteren Bltt. unten kahlwendend. c) Schaft zweiblumig.

d) die Peitschen tragen aus den Blattwinkeln Blumenköpfe.

In Haiden, sandigen Waldplätzen, Hügeln und sonnigen Dämmen, bei *Weinberg bei Ohlau*, mit der gewöhnl. Form. c) bei *Barteln* (Schummel). *Obernigk am Bade, Pangel bei Nimptsch* (Wichura). d) bei *Ohlau* (Wichura).

× *H. praealto-pilosella*. Schaft mit 1—2 Bltt. am Grunde, gabelig getheilt, 2—6 blumig, mit langen Stielen. Bltt. länglich-lanzettlich, oberseits von dünnem, zerstreutem Sternhaar wie schuppig, graugrün, unterseits von einem dünnen, gleichförmigen, mehrlartigen Filze grau.

Auf trocknen Grasplätzen und Mauern. Auf der Stadtmauer in *Nimptsch*. In *Reinswaldau* an einem Zaune.

Der Schaft bald unten, bald über der Mitte gabelig getheilt, meist 3—4 blumig, mit dünnem oder dichtem Sternhaar, wenig oder vielen Borsten besetzt, niedrig oder höher. Bltt. oberseits bald mit wenigen bald mit mehreren Borstenhaaren. Die Köpfe rundlich-eiförmig, kleiner als an *H. pilosella*. Diese Form erscheint stets nur vereinzelt und giebt sich deutlich als eine Mittelbildung zu erkennen.

2) *H. stoloniflorum*. Schaft beinahe blattlos, etwas aufsteigend, 2—5 blumig, gabelig-getheilt, oder mit einigen Blumenstielen an der Spitze. Bltt. verkehrteifg. länglich, stumpf, mit einer kleinen Spitze, nach dem Grunde etwas verschmälert, unterseits von dünnem unterbrochenem Sternfilz grauschimmernd. Köpfe gross, fast kugelig.

Auf grasigen Stellen an Dämmen, Ackerrändern, auf Hügeln, an sonnigen Orten und in gutem Boden. Von der Ebene bis an die Lehnen des Hochgebirges z. B. am *Bärenkamm, Ochsenstall* und im *Kessel im Gesenke*, bis nahe an 4000'; aber nicht im *Riesengebirge*.

Diese Art hat keine bedeutenden Abänderungen. Höhe $\frac{1}{4}$ —1'. bald mit einem bald mit vielen blühenden Stängeln aus einer Wurzel, wovon dann die seitlichen im Bogen ansteigen. Das Kraut hell und blaus-grün, bisweilen fast gelbgrün. Die Bltt. sind bisweilen unterseits fast kahl, oberseits bald ohne bald mit mehreren zerstreuten weichen Borsten besetzt. Es erscheint ohne und mit Flagellen, letztere richten sich bisweilen empor und tragen 1—3 Blütenköpfe, sind weiss-grau, filzig und rauhhaarig. Blüht später als *H. pilosella*. Hierher gehören als Synonyme: *H. pilosa pedunculata* α *latifolium* W. et Gr. *Sil. H. bifurcum* Ehb. Exc. (obwohl „*ligulis concoloribus*“), wahrscheinlich auch *H. bifurcum* N. Sieb. und *H. collinum* Besser.

× *H. stolonifloro-praealtum*. Schaft blattlos, gabelig-getheilt, 3—10 blumig, Blütenstiele lang. Bltt. länglich lanzettlich mit Haaren oder Borsten besetzt, unterseits mit dünnem Sternhaar bekleidet, bisweilen kahl werdend. Köpfe ziemlich gross, fast kugelig.

H. pilosella pedunculata β *angustifolium* W. et Gr. *Sil. III. p. 202. H. floribundum* α *pedunculata* W. *Fl. v. Schl.*

1840. p. 204 Grab. Fl. v. O. S. *H. pedunculare* Wallr.! Sched. cr. *H. bifurcum* Koch Syn. (obwohl „*floribus concoloribus*“). *H. flagellare* Rchb. Exc. *H. Pilosella* & *Collino-Pilosella* Fries. Novit. ed. 2.

Auf trocknen Wiesen, an Hügel- und Grabenrändern. Um *Br. Oltaschin, Krittern*, (Sadebeck) *Grüneiche* (Siegert). *Schmelzberg bei Cudowa und Bladen bei Leobschütz* von Grab. gef. *Weinberg bei Ohlau. Um Graefenberg* von Vogel mitgetheilt. Juni 2.

Am letztgenannten Orte fand ich i. J. 1842 eine Menge von Individuen, welche durch ihre Annäherung zu jeder der beiden in der Nähe befindlichen Stammarten mir den Ursprung dieser Form enthielten, nachdem das seltene und zerstreute Vorkommen des sogenannten *H. pedunculare* mir schon längst die Vermuthung gegeben hatten, dass diese Form keine ächte Art sei. — Der Schaft ist anrecht $\frac{1}{2}$ —1' hoch, meist am Gr. mit langen weisshaarigen auch bisweilen weissfilzigen Flagellen, die sich auch bisweilen aufrichten und blühen, gerade wie bei den Stammarten. Der Schaft ist oft mit sählig-abstehenden zerstreuten Borstenhaaren bekleidet, bald von der Mitte zweispaltig, mit einem kleinen einköpfigen Nebenschaft aus dem Wurzelhalse, bald unter der Mitte mit einem Blütenstiel und oben in 3—6 fast gleichlange Stiele getheilt. Die Köpfe fast kugelig, am Gr. schwach bauchig wie bei *H. stoloniflorum*, $\frac{1}{3}$ kleiner als dessen Köpfe; die Hülle meist borstig-gewimpert. Die Zungen des Strahls unterseits bald gelb bald röthlich.

b) Grüne, kurzhaarig oder haarig mit hohem Stängel und Blüten in Aferdolden.

× *H. stolonifloro-collinum*. Stängel einblättrig. (rauhhaarig), gabelig, die Zweige 2—3 blumig, die Stiele kurz, Bltt. länglich, etwas stumpf, haarig, unterseits mit dünnem Sternhaar. Köpfe ziemlich gross, am Grunde eiförmig.

Auf Wiesen und Grasplätzen. *Krittern bei Br.* (Krause). *Am Oderwalde bei Ohlau* (Wichura 1839). *Weinberg bei Ohlau, Strachate bei Treschen*. 1842.

Nur aus den vollkommenen Exemplaren, die ich am *Weinb. bei Ohlau* sammelte, wo etwa 12 auf einem kleinen Raume bei einander wuchsen, gelang es mir den Ursprung dieser bisher unbekannt und unbeschriebenen Form zu erkennen. Die Verwandtschaft mit *H. stoloniflorum* zeigen die hellgrüne Farbe der Bltt. und die Sternhaarbekleidung, die Theilung des Stängels, und die Grösse der Köpfe, welche zwischen beiden Arten die Mitte hält, mit *H. collinum* die Tracht, die zahlreichen weichen Haare am unteren Stängel und der Bltt., die Häufung von 2—3 Köpfen, die Gestalt der Köpfe, die schwarzlichen Hüllen. Stängel $\frac{1}{2}$ —1' hoch. Bltt. bisweilen schwach und entfernt gezähnt, auch oberseits stark borsthaarig. Flagellen sind meist vorhanden.

3) *H. collinum* Gochnat. Stängel 1—2 blättrig, aufrecht, haarig, vielblumig, Blüten fast in einer Aferdolde. Bltt. länglich-lanzettlich, schwach-gezähnt, hakerig oder haarig. Köpfe mässig gross, am Gr. eiförmig.

H. pratense W. et Gr. sil. III. 209. Koch Syn. Rchb. Exc. *H. dubium* Linné nach Fries und Ehrhart. *H. cymosum* Willd. Sp. pl.

Auf Grasplätzen, Wiesen, an Ackerrändern u. s. w. die häufigste Art.

Der Stängel am Gr. stets mit weisslichen ziemlich langen Haaren dicht besetzt, meist schmutzig-roth, 1—1½' hoch, Farbe des Krautes etwas dunkel und schmutzigrün. Hüllen schwärzlich. Blumen goldgelb. Afterdolde dicht, selten lockerer; bisweilen darunter ein vereinzelter Ast mit einer kleineren Afterdolde. Ist wenig veränderlich. — Der Name *H. pratense* kann dieser Art auf keine Weise bleiben, indem Tausch darunter nur eine besondere Form verstanden hat und ausser dieser noch andere Formen dieser selbigen Art durch besondere Namen ausgezeichnet hat. Auch ist kein triftiger Grund dieser längst und allgemein bekannten Art den alten Gochnat'schen Namen zu entziehen. — Auch von dieser Art und der folgenden scheinen Bastardformen vorzukommen, die ich jedoch noch länger beobachten muss.

4) *H. cymosum* L. nach Fries und Reichen b. Stängel aufrecht, unten beblättert, vielblumig, Blüten in Afterdolde. Blätter zungenförmig, am Gr. verschmälert, unterseits oft mit zerstreuten Sternhaaren. Köpfe klein, walzig, am Gr. keilförmig.

H. Nestleri und *H. echioides*. Wimm. Fl. v. Schl. 1840 und Koch Syn. *H. collinum*, *fallax*, *setigerum*, *echioides*, *cymigerum* und *cymosum* Rchb. Exc.

α) *pubescens* W. et Gr. Sil. III. 212. Bltt. und Stängel ohne oder mit wenigen kurzen Haaren, Blüten in Afterdolde.

H. cymosum α. *viride* Fries Nov. *H. cymosum* β. *longifolium* Rchb. Icon. I. 116. *H. Nestleri* γ. *Vaillantii* Koch Syn. *H. cymigerum* Reichb. Exc.

β) *hirtum* W. et Gr. l. l. Bltt. und Stängel mit kurzen Haaren und Sternhaar; Bltt. fein gezähnt, Stängel stark und hoch, mit rispiger Afterdolde.

H. cymosum α. *Columnae* Rchb. Ic. I. 34. *H. Nestleri* α. *hirsutum* Koch Syn.

γ) *poliotrichum* W. (Fl. v. Schl. 1840 Nachtrag). Gelblichgrün; Bltt. und Stängel haarig, Bltt. fast ohne Sternhaar; Afterdolde regelmässig; Hüllen und Blütenstiele mit grauweissen Zottenhaaren.

H. praealtum γ. *hirsutum* W. Fl. v. Schl. 1840. *H. cymosum* δ. *malacotrichum* W. et Gr. Sil.

δ) *echioides* Fries Nov. Gelblichgrün, Stängel beblättert und die Blätter borsthaarig; Afterdolde gedrängt; Hüllen graufilzig ohne Drüsen.

Auf Wiesen, an Dämmen, Hügeln und Berglehnen. α. Um Br. bei Krittern, Ransern, Kosel. Schlesierthal, Lehwasser und am langen B. bei Charlottenbrunn, Strehleber Berge, Schobergrund bei Nimptsch, langer Berg bei Carlswaldau, Reichenstein, Wilhelmsthal, Cudowa und Bad Kunzendorf bei Neurode, Hungerlehne im Gesenke, Hohwalder Berg, Schmiedeberg und Brückenberg im Riesengeb., Gr. Czantory bei Ustron, β. Um Br. bei Krittern und im Uebergange zu γ bei kl. Silsterwitz, γ. Um Br. bei Kopsdorf (Krause), Gnadenfeld i. O. S. (Hasse u. Wenck), Kösling bei Leobschütz (Wenck). Gipfel des Geiersberges u. kl. Czantory. δ. Am Riesengrabe in Fürstenstein (Kaiser, Unverricht).

Die Abänderungen sind hier nach der Ansicht von Fries geordnet (Novit. Fl. Suec. ed. 2.) ausser der var. δ, daselbst, welche ich nach den Synonymen zu *H. praealtum* rechne, und ε, die ich für Bastardform halte. Das *H. echioides*

Lumn. sammt seiner Variet. *H. setigerum* Tausch, ist in der That eine Abänderung des *H. cymosum*, welche durch die Form *poliotrichum* mit den übrigen Formen verbunden ist. — Das *H. cymosum* ist gleichsam die Central-Art dieser Abtheilung, und durch viele Gestalten ausgezeichnet. Bei uns gehört diese Art zu den selteneren und wächst sehr zerstreut, doch an vielen Orten. Die Köpfe sind kleiner als an *H. collinum*, in α und β beinahe goldgelb, in γ citrongelb. — Eine sehr schöne Auseinandersetzung der Formen dieser Art hat Lindblom in Botaniska Notiser 1841 Nr. 3 gegeben, jedoch fürchte ich, dass einige Formen zu dieser Art gerechnet sind, die ihr nicht angehören, und dass der Formen zu viele sind und die Characterisirung zu sehr ins Einzelne geht. Wenn man bei den Hieracia nicht typische Dinge haben will, die immer kurz sein müssen, so wird man weder mit den Varietäten in Ordnung kommen, noch feste Benennungen erreichen. Wir bemerken in Beziehung auf eine am genannten Orte gemachte Bemerkung p. 30, dass allerdings *H. fallax* DC. und Willd. zu *H. cymosum* gehört.

× *H. stolonifloro-cymosum*. Stängel fast blattlos, aufsteigend, 4—10blumig; Aferdolde schlaff, fast rispig. Bltt. zungen-lanzettfg., am Gr. verschmälert, wimperig, oberseits mit weitläufigen Borsten, unterseits mit dünnem, fast mehrlartigem Sternhaar bedeckt. Köpfe ziemlich gross, am Gr. kugelig.

An Dämmen, Grabenrändern. Um Br. bei der Lohebrücke vor Lissa 1841, an einem Graben hinter Kleinburg 1842.

Der Stängel hat bisweilen aus der Mitte einen langen Stiel, der einen Kopf trägt, sonst an der Spitze eine sehr schlaffe Aferdolde mit langen Stielen; am unteren Theil ist er mit dickem aber dünnem Sternfilz bedeckt, ohne Borsten. Die Köpfe fast so gross wie an *H. pilosella*. Die Hüllen aschgrau. Die Blumen hell-goldgelb. — Diese Form mag von manchen Autoren unter dem Namen *H. fallax* verstanden werden, lässt sich aber mit Gewissheit in den Beschreibungen nicht nachweisen.

c) Graugrüne, kahle; Stängel hoch, mit doldentraubiger Aferdolde, vielarmblumig.

5) *H. praealtum*, Vill. Stängelarmblättrig, aufrecht, schlank, vielblumig, Blüthen in doldentraubiger Aferdolde. Bltt. lanzettlich, spitz, graugrün, am Rande und der Hauptribbe borstig-gewimpert. Köpfe klein, Hüllen eiförmig walzig.

b) Blätter oberseits borstig. *H. praealtum* γ *fallax* Koch Syn. (nicht *H. fallax* DC. et Willd.) *H. pr. s* *setosum* W. et Gr. Sil. 206.

c) Stängel haarig, oberwärts bisweilen filzig. *H. pr. grande* W. et Gr. Sil.

H. piloselloides, *praealtum*, *Bauhini*, *obscurum* und *glaucescens* Rchb. Exc.

Auf trocknen Wiesen, an Dämmen, an Wegen, häufig.

Diese Art ist zwar veränderlich, aber bleibt sich in der Tracht so getreu, dass man sie stets leicht wieder erkennt. Sie ist viel kahler als alle vorigen; die Bltt. ausser den Borsten stets ganz kahl (nur höchst selten unterseits mit einigem Sternhaar), etwas glänzend, mehr oder weniger graugrün; der Stängel meist kahl, oder hier und da mit sühlig-abstehenden Borsten besetzt. Auch der obere Theil, und die Stiele und Hüllen sind mehr kahl und grün als die vorigen. Exemplare mit oben filzigem Stängel und schwärzlichen Hüllen (auch grösseren Köpfen) sind vielleicht nicht echt. Der Wuchs ist schlank, höher als alle früheren. Köpfe klein, Blüthen hellgelb. Der

Blüthenstand schlaff, bisweilen fast rispig. Flagellen bisweilen keine, meist lange, bisweilen aufsteigende und Blüthenköpfe tragende.

H. floribundum W. et Gr. Sil. III. 294. Stängel meist einblättrig, aufrecht, mit lockerer, doldentraubiger fast rispiger Afterdolde. Blätter zungenförmig oder länglich-lanzettförmig, graugrün, kahl, borstig-gewimpert, die untersten stumpf, an der Spitze wellig-faltig. Köpfe ziemlich gross. Hüllen schwärzlich, kugelig-eiförmig.

a) *subcymosum*. Blüthen in doldentraubiger Afterdolde, zahlreich.

b) *furcatum*. Stängel armlüblig, gabelig-getheilt.

Auf Wiesen. Um Br. an Dämmen an der *alten Oder* bei **P. Neudorf**, zw. *Scheitnich* und *Schwoitsch*. *Weinberg* und *Zedlitz bei Ohlau*. *Schlesierthal*. *Reimswaldau* b. *Charlottenbrunn*, *Bankwitz* und *Silsterwitz* bei *Zobten*, *Brückenberg* im *Riesengeb.*, *Opeln*, *Krappitz*, *Gnadenfeld* in *O. S.* Im *Gesenke* bei *Freiwalde*, *Einsiedel*, am *Pass des rothen Berges*. b, nur bei *Bankwitz*.

Diese Form, in derselben Umgränzung wie ich sie in der Fl. Sil. beschrieb, hat sich nach einer langen fortgesetzten Beobachtung als sehr beständig und im Wesentlichen gleichförmig erwiesen, ohne Uebergang in andere. Sie gleicht in den Blättern und deren Bekleidung dem *H. praesaltum*, fast noch mehr dem *H. Auricula*, von graugrüner Farbe etwas dunkler als an *H. pr.*, und stets kahl, die Borsten abgerechnet, welche oft nur am Rande und der Hauptrippe, bisweilen auch oberseits stehen. Der Stängel ist fast immer schmutzig-roth, bald fast kahl mit sparsamen Haaren, bald mit borstenförmigen söhlig-abstehenden zahlreichen Haaren besetzt, nach oben wie *H. collinum* nebst den Hüllen kurzhaarig filzig und drüsig. Die Afterdolde ist bald regelmässig armlüblig mit 5—10 Blumen, bald locker vielblüblig mit 1—3 besonderen 1—3 blübligen Stielen darunter, so dass der Blüthenstand fast rispig mit bogig-aufsteigenden Stielen; selten ist der Stängel gabelig-getheilt, 4—6 bisweilen langen Stielen. Die Köpfe sind ziemlich gross, etwas grösser als an *H. collinum*. Die Blumen doppelt so lang als die Hülle, goldgelb. Flagellen sind meist vorhanden. — Ungeachtet des oben Gesagten habe ich nie gezweifelt, dass diess eine alte Art sei, deren Ursprung mir jedoch bisher unklar war. Gegenwärtig vermüthe ich, dass sie ihre Entstehung dem *H. collinum* und *H. Auricula* verdankt. — *Lindbloom* führt unsere Art fraglich zu seinem *H. cymosum* β , *macrocephalum* *sphaerocephalum*. Ich kann indess versichern, dass unsere Pflanze von *H. cymosum* durchaus verschieden ist.

6) **H. Auricula**. Stängel aufrecht, einblättrig, armlüblig. Blätter graugrün, gewimpert, zungenförmig mit schiefer, gefalteter oder schwachwelliger Spitze. Köpfe ziemlich gross, eiförmig; kriechende Ausläufer.

a) Stängel 1—2blüblig. b) Afterdolde 3—6blüblig. **H. Aur. β majus** Fries l. l. c) Stängel gabelig-getheilt 3—4blüblig.

Wuchs niedrig. Die eigenthümliche Gestalt der Blüthe unterscheidet die vollständigen Individuen von allen anderen Arten. An zwergigen einblübligen Exemplaren fehlen die Ausläufer; an wuchernden richten sie sich auf, werden zu Seitenstängeln und tragen Blüthen.

d) Blumen orangefarben.

7. **H. aurantiaeum**.

II. Pulmonariaeae. Wurzel stockig, aestig-vieltheilig, Frucht-

boden mit vertieften Feldern und franzenartig gezähnten Rändern derselben.

a. Die Köpfe nach dem Verblühen zusammengezogen, am Grunde **bauchig**; Hülschuppen in wenigen Reihen, die äusseren kürzer, **dachziegelförmig**.

8. *H. villosum* L. Stängel beblättert, mit 1—3 Köpfen, von weissen Zotten **rauhhaarig**. Bltt. **länglich-lanzettlich**, **weisshaarig**, die oberen **halbstängelumfassend**. Hülle **zottig-rauhhaarig**, die äusseren Blättchen **schlaff**, etwas **abstehend**, grün, am Gr. **eifg.**, mit **lanzettlicher Spitze**.

β. *dentatum* **schwächer behaart**, Stängel **hoch**, mit mehreren Köpfen; Bltt. **länglich-eifg.**, **buchtig-gezähnt**; Hüllbltt. **angedrückt**.
H. dentatum Hoppe!

H. villosum β *intermedium* Grab. Fl. v. O. S. p. 229.

An Felsen in Gebirgen. *Kessel im Gesenke*.

Kraut ein wenig **graugrün**. Diese Art ist dem *H. alpinum* etwas ähnlich, aber doch in Tracht und durch die Beschaffenheit der Hülle und die Gestalt der Bltt. wohl zu unterscheiden. Die Abart β entfernt sich zwar im Charakter, gehört aber doch zu dieser Art. Der Umfang der Variation scheint bei dieser Art noch nicht hinreichend bekannt zu sein.

9. *H. alpinum*. Stängel **zottig**, mit einem **Blüthenkopf**, oder **aestig-vielköpfig**, mit **achselständigen Stielen**. Bltt. **spatelförmig**, nach dem Grunde in einen **geflügelten Stiel verschmälert**, die ersten **stumpf**, die späteren **länglich-lanzettlich**, **schwach gezähnt**. Hüllen **grauhaarig** oder **dicht-zottig**.

a) *genuinum*. Stängel **schaftförmig**, **fast blattlos**, **niedrig**, mit einem **Blüthenkopfe**; Bltt. **spatelfg.**; Hüllen **dicht**, **grauzottig**.
H. Schraderi Rchb. Exc.

b) *foliosum*. Stängel beblättert, meist mit einem **Blüthenkopfe**; Bltt. **länglich-lanzettlich**, etwas **gezähnt**; Hüllen **zottig** oder **haarig**. — Diese Form findet sich mit **zusammengerollten Zungen** (*H. alpinum* γ *inapertum* W. Fl. v. S. 1840.) und mit **fehlenden Zungen der Blumen**, **langherausragenden Griffeln** und **stets geschlossenen Köpfen** (*H. alpinum* δ *stylosum* W. a. a. O.)

c) *sudeticum*. Stängel beblättert, Bltt. **länglich** meist **gezähnt**; Köpfe **2—8** auf **achselständigen Stielen**. *H. alpinum sudeticum* W. et Gr. Sil. und Koch Syn. Wimm. Fl. v. S. 1840, so wie auch *H. sudeticum* Sternberg und Koch Syn. No. 26.

Auf **Triften**, **Grasplätzen** und **zwischen Felsgerölle** des **Hochgebirges**. *Riesengebirge, Glätzer Schneeberg, Gesenke, Babilia Gora*.

Ich halte die Form a für die wahre centrale und typische Form, weil sie die häufigste, vollständig entwickelt, an entfernten und sonst unähnlichen Orten stets gleichförmig erscheint und die anderen als aus ihr modifizierte sich darstellen; Fries dagegen sieht diese für eine „*proles incrassata alpina*“ an. Die Formen b und c halte ich für wuchernde, durch fetteren Boden, Wasserfülle u. s. w. erzeugte. Nachdem ich zwei früher mit dieser verbundene Varietäten davon entfernt habe, möchte ich diese Art jetzt für richtig umgränzt ansehen. Treffend bemerkt Fries, dass man sich

vor allem hüten muss, analoge Formen zu vermengen. — Unsere Var. *c.* ist an denselben Orten beobachtet, wo Sternberg sein *H. sudeticum* gesammelt hat.

10. *H. Halleri* Vill. (et Rehb. Exc.) Stängel behaart oder kahl werdend, mit einem Blütenkopf oder aestig-vielköpfig mit Deckblättern an den Stielen. Blätter länglich gestielt, am Grunde gerundet oder keilförmig und buchtig gezähnt, Hüllen schwärzlich.

a) *genuinum*. Stängel mit einem Kopfe, fast ohne Bltt.; die untersten Wurzelbltt. oval-länglich, ganz schwach gezähnt; Blattstiele lang, etwas zottig. *H. alpinum* *3* *Halleri* *α. oblongifol.* et *β spathulatum* (eine Form mit schwächeren am Gr. mehr verschälerten Bltt.) W. et Gr. Sil. H. alp. *γ oblongifol.* W. Fl. von Schl. 1840. *H. alp. γ Halleri* Koch Syn.

β) *nigrescens*. Stängel in 2—4 Blütenstiele getheilt, 2 bis 3blättrig; die unteren Bltt. länglich, am Gr. keilförmig, fast buchtig-gezähnt. *H. nigrescens* Willd. Hort. Berol. 10. *H. alp. 5. nigr.* W. et Gr. Sil. W. Fl. v. Schl. 1840. Koch Syn.

Auf grasreichen Kämmen und Lehnen des Hochgebirges. *Riesengebirge und Gesenke, Babia Gora.*

Nachdem ich lange geglaubt hatte, dass diese Formen zu *H. alpinum* gehören, muss ich sie jetzt dennoch davon trennen. Die Formen *H. alpinum β* und *γ* einerseits und *H. Halleri α* andererseits sind analog aber nicht verwandt. Diese Art unterscheidet sich, wenn man die Entwicklungsreihe verfolgt, ziemlich beständig von der vorigen. Die Blätter immer deutlich gestielt! die ersten vollkommen oval oder fast ründlich, am Gr. und an der Spitze gerundet; die späteren länglich-eiförmig oder länglich am Gr. keilförmig, nach oben bald stumpf bald spitz, alle am Grunde mehr oder weniger buchtig-gezähnt, nie zottig, sondern mit gekrümmten, kurzen zerstreuten Haaren besetzt. Die schmalblättrigen Formen verähnlichen sich dem *H. alpinum*. Der Stängel ist bisweilen blattlos, oder mit 1—2 Bltt., fein-haarig oder haarig-einfach mit einem Kopf, oder ästig-vielköpfig: die Stiele bald aus gabelig-getheiltem bald aus der Spitze des getheilten Stängels entspringend, nie achselständig, sondern von einem lanzettlich-linealischem kleinen, oft verkommenen Deckblatte gestützt, aufrecht oder aufrecht abstehend. Die Hüllen schwärzlich! Blumen fast goldgelb. — An schattigen, feuchten und fruchtbaren Berglehnen wird diese Form wuchernd und dem *H. vulgatum* oder *H. murorum* ähnlich, aber giebt sich durch die Tracht und das wucherhafte Aussehen als von jenen verschieden zu erkennen. — Wenn wir bemerken, dass manche Autoren unter dem Namen *H. sudeticum* Sternberg unser *H. alpinum c. sudeticum*, andere hingegen fette Exemplare des *H. Halleri β nigrescens* verstehen, so wird dies zur Erläuterung dieses mehrdeutigen Namens hinreichen.

11. *H. rupestre* Allioni. Graugrün; Stängel meist mit einem Blatt und zwei Blütenköpfen, Blütenstiel steif, aufrecht-abstehend, Bltt. elliptisch-länglich, schwach-gezähnt oder grob-gezähnt mit vorgestreckten Zähnen, wimperig-rauh-haarig. Köpfe gross. Hüllen weissgrau.

a) *Schmidtii*. graugrün; Bltt. am Gr. rosettenfg., elliptisch oder länglich, schwach-gezähnt, oder grob und am Gr. fast fiederspaltig gezähnt; Blattstiele zottig-rauhhaarig. *H. Schmidtii* Tausch W. et Gr. Sil., Koch Syn. *H. pallescens* W. Fl. v. Schl. 1840.

H. diaphanum Lawsonii v. *montanum* Fries N. S. Mant. 2. 47.

β) *dentatum*. Graugrünlich, Bltt. länglich, spitz, mit groben, vorstehenden Zähnen, haarig-gewimpert, am Stängel meist eines; Stängel 1—3köpfig, Hüllen ohne Drüsen. (*H. diaphanum genuinum* var. *collinum* Fries l. l. 46.?)

γ) *molle*. Graugrünlich, Stängel beblättert, Bltt. länglich, mit weichen, wimperigen Haaren und wenigen Zähnen, Stängel meist 3köpfig, Hüllen ohne Drüsen.

An felsigen Gebirgslehnen. α . Auf dem Prudelberge bei Stonsdorf am Riesengebirge. β . in Rübzahl's Garten. γ . an Felsen im Kessel im Gesenke. Juni, Juli.

Dieser Art musste ihr ältester Name wiedergegeben werden; siehe auch Reichenb. Exc. Nr. 1758, wo die Synonyme treffend angegeben sind; doch ist Nr. 1759 *H. pallescens* nicht verschieden. Am ausgezeichneten ist die Form α ; β et γ weichen ab, gehören aber zu derselben Grundform. Man hat diese Art von allen Formen der folgenden durch fast doppelt so grosse Köpfe zu unterscheiden. Die Hüllen sind schwärzlich-weissgrau. Die Hauptform α hat die ersten Bltt. vollkommen elliptisch, am Gr. fast herzförmig, die späteren länglich-elliptisch oft spitz, am Rande schwach gezähnt, am Gr. bisweilen fiederspaltig gezähnt, gerade wie *H. murorum* β , von etwas dickhäutiger Substanz, unterseits oft purpurroth; bald mit borstenförmigen bald mit weicheren Haaren gewimpert, die oft auch einen Theil der Fläche einnehmen. Der Stängel oft 2—3köpfig, auch 1köpfig, selten 5—6köpfig. — Die Form β weicht durch die Gestalt der Bltt., welche stets grob gezähnt, unten und oben spitz, von dünnerer Substanz und mit weicheren Haaren bekleidet sind, von α ab, kommt aber in den Blumen und der Verästelung überein; die Bltt. sind bald breiter bald schmaler denen von *H. vulgatum* sehr ähnlich. Es kommen auch niedrige, $1\frac{1}{2}$ ' hohe, 1—2blumige Exemplare vor, mit 3—4 fast kahlwerdenden grob buchtig-gezähnten Bltt., welche von α sehr abweichen, und von den ähnlichen Formen der benachbarten Arten durch die grossen weissgrauen Köpfe und die geraden (d. i. gegen die Mittelrippe senkrechten) Zähne der Bltt. zu unterscheiden sind; diese sind mit unter β begriffen. Diese Varietät hat häufig braunroth-gefleckte Blätter. Treffend sagt Fries, dass diese Form den Uebergang macht zum *H. Lawsonii*, der zweiten Hauptform seines *H. diaphanum*; daher halte ich auch das fragweise angeführte Synonym desselben für richtig. Allein das *H. vulgatum* α *litigiosum* W. et Grab. sil., was Fries zu seinem *H. diaphanum* zitiert, gehört der hier beschriebenen Art zuverlässig nicht an, sondern ist eine in trockenem und schattigen Boden entstehende Form des *H. sylvaticum* (= *vulgatum* Fries), ein magerer Zustand derselben. Die Form γ hat wenige Wurzel- und 3—4 blass-graune (caesia) Stängelblätter. — An allen Formen ist der Stängel in der Mitte ziemlich kahl, am Gr. haarig, an der Spitze grau-filzig. Die Hüllen sind mit langen weissgrauen am Gr. schwärzlichen Borsten bekleidet, dazwischen bald viele bald wenige bald gar keine kurze drüsentragende Borsten. — Uebrigens sei hier bemerkt, dass das eigentliche *H. diaphanum* Fries eine sehr ausgezeichnete, durch „*corymbo divaricato, involuvis atrovirentibus siccitate nigricantibus*“ kennliche, in den Bltt. dem *H. vulgatum*, in den Hüllen dem *H. rigidum* ähnliche Form ist, welche bei uns noch nicht beobachtet worden ist.

12. *H. murorum*.

13. *H. vulgatum* Fries. Stängel beblättert, rispig-aestig,

vielköpfig — Blätter länglich-lanzettlich, beiderseits verschmälert, die oberen am Stängel sitzend, schwach- oder grob- auch buchtig-gezähnt, Köpfe mässig gross. Hüllen weissgrau-grünlich.

H. vulgatum Fries Nov. Suec. et Mant. 2. W. et Gr. Sil.
H. vulgatum und *H. ramosum* Koch Syn. *H. sylvaticum* u.
H. Lachenalii Rchb. Exc. *H. sylvaticum* Wimm. Fl. v. Schl.
 1840 p. 209.

a) *latifolium*. *H. vulgatum* β *latifol.* W. et Gr. Sil. Fries
 a. a. O.

b) *angustifolium*. *H. vulg.* γ *angustifol.* W. et Gr. Sil.
 Fries a. a. O.

In trocknen Waldgegenden, Hauen der Hugelgegend der Ebene
 und des Gebirges hufig.

Ist von den hnlichen Formen der vorigen Art durch die Tracht (beblattert, stig, bis 3' hoch, grun) die Verastung und die kleineren Kopfe zu unterscheiden. Die Hullen grunlich, die Schuppen besonders in der Mitte von Sternhaaren mehr oder weniger grau, ausserdem mit schwarzen (nicht an der Spitze grauen, noch verlangerten) bald drusentragenden bald drusenlosen Borsten besetzt. Die Stangelblt. sitzend mit schmalem Grunde. An vollstandig entwickelten Exemplaren ist stets die rispige Verastung vorhanden, mit aufrecht-abstehenden Zweigen. Wurzelblt. sind bald vorhanden, bald fehlen sie. — Wenn die breitblattrige Form unter ungunstigen Verhaltnissen verkummert, so entsteht das *H. vulgatum* α *litigiosum* W. et Gr. Sil., welches mit dem *H. murorum* zusammen zu fliessen scheint. Wegen des Namens vergl. Fries Mant. 3. p. 101.

b) Kopfe fast walzig; Hullenblattchen in mehreren Reihen dachziegelformig gereiht.

14. *H. rigidum* Hartman. Stangel beblattert, rispig-estig, vielkopfig, Blt. fast sitzend, lanzettlich oder langlich-lanzettlich, buchtig-gezahnt, meist 3zahnnig, die unteren zur Bluthezeit verwelkt. Kopfe mittelgross. Hullen grunlich, fast kahl, die usseren Blattchen abstehend.

H. rigidum Hartm. Scand. 3. p. 187. Fries Nov. Mant. 2.
 p. 48.

H. lativigatum Koch Syn. *H. asperum* Rchb. Exc.

Auf trocknen Waldplatzen. Um *Br. bei Lissa und Riemberg, Zobtenberg, Charlottenbrunn. Schonwalde bei Zuckmantel.* An den Teichen *bei Warmbrunn* (Sadebeck). Um *Grafenberg* (Vogel).

Obwohl Fries diese Art zu der vorigen Abtheilung zieht, so habe ich doch nicht Bedenken getragen, unserer Pflanze denselben Namen beizulegen, da sie im ubrigen damit vollig ubereinstimmt. Der Hulle nach ist diese Art dem *H. boreale* am nachsten, der Frucht nach gleicht sie dem *H. vulgatum*, womit wir sie fruher verwechselt haben. Die Blatter sind stets schmaler und gegen den Grund enger als an *H. boreale*, mit breiterer Basis ansitzend als bei *H. vulgatum*, von der Mitte bis gegen den Grund buchtig-gezahnt, gewohlich mit drei Zahnen, die bisweilen verlangert sind (*H. laevigatum* β *coronopifolium* Koch Syn.) bisweilen unregelmassig fieder-spaltig-zerrissen sind (*H. boreale* β *lacerum* W. et Gr. Sil.). Die Blattchen der Hullen sind oft kahl, meist sehr fein behaart, oder mit kleinen Drusen, vor dem Aufbluhen uberragen sie das Kopfschen und sind uber dessen Scheitel zusammengeneigt.

15. *H. boreale* Fries. Stangel beblattert mit endstandiger fast

rispiger Doldentraube, vielblumig. Bltt. fast sitzend, eiförmig, die mittleren und oberen halbumbfassend, gezähnt und buchtig-gezähnt. Köpfe ziemlich gross. Hüllen dunkelgrün, kahl, die äusseren Blättchen abstehend.

In Wäldern und Gebüschen der Ebene. Um *Br. bei Goldschmiede, Lissa, Mahlen, Skarsine etc.*

Herbstpflanze. Der Stängel am Gr. oft kurzhaarig oder raubhaarig. Die Bltt., wenigstens die mittleren, eiförmig, gegen den Grund sehr breit, dann plötzlich zusammengezogen, halbumbfassend-ansitzend. Die äusseren Blättchen der Hüllen nach dem Blühen an der Spitze abstehend und am Stiele hinabgehend, so dass dieser nach oben von kleinen Deckblättchen schuppig erscheint.

16. *H. umbellatum.*

17. *H. prenanthoides.* — Diese Art wird vielleicht richtiger unter die vorige Abtheilung zu stellen sein. — Beobachtete Formen, welche aus dieser und *d. H. Halleri nigrescens* entsprungen zu sein scheinen (*Riesengrund etc.*), werden noch genauer Untersuchung vorbehalten.

Zur Seite 212.

Homogyne alpina b. mit aestig-2köpfigem Stängel.

Am schwarzen Berge bei Charlottenbrunn, im Gesenke (Grabowski.)

Zur Seite 222.

Artemisia pontica. Stängel aufrecht, in eine aus traubigen Aesten zusammengesetzte gedrängte Blütenrispe endigend. Bltt. oberseits graubehaart, unterseits weissgraufilzig, doppelt-gefiedert mit linealen Zipfeln, am Gr. mit zwei ohrförmigen Stützblättchen; Köpfe fast kugelig nickend, von Hüllblättchen grau filzig, mit trockenhäutigem Rande, verkehrt-eiförmig, stumpf.

Auf einem Dorfanger in *Straupitz bei Hirschberg*, von v. Flotow und Körber i. J. 1840 entdeckt. Juli 2.

Stängel dicht beblättert, 1—1½' hoch, oben in traubig-ährige Blütenäste sich theilend von denen die untere länger, und am Grunde beblättert, die oberen kürzer, nur mit einfach-linealischen Blütenblättchen besetzt, alle fast aufrecht sind. Blumen gelb. — Ob diese Art, welche an vielen Orten Deutschlands, jedoch sehr zerstreut, vorkommt (siehe Koch Syn. und Rech. Exc.) auch bei uns als einheimisch anzusehen oder nur durch einen Zufall sich angesiedelt habe, wage ich nicht zu entscheiden. Leider wurde der Platz, wo sie wuchs, bald nach der Entdeckung durch eine Feuersbrunst verwüstet.

Zur Seite 224.

Chrysanthemum segetum. Neuerlich fand ich einige Exemplare an einem Damme bei *Karlowitz*.

Zur Seite 226.

Cineraria crispa. Schummel fand i. J. 1841 ein einziges Exemplar im Sumpfe am Fusse des *Fuchsberges bei Schwoitsch*, ein höchst merkwürdiges Beispiel von vereinzelt Vorkommen.

Zur Seite 231.

× *Cirsium cano-palustre*. Bltt. herablaufend, schmal-lanzettlich, am Rande buchtig, mit dreieckigen, oft zweispaltigen Lappen, die sich in einen Dorn endigen, am ganzen Rande mit feinen Dornborsten, unterseits mit dünnem Spinnwebenfilz; Stängel oben blattlos, meist dreiblumig; die Köpfe kurz gestielt, Stiele spinnwebenfilzig; Hüllen-Schuppen kahl, am Rande zottig, mit zurückgekrümmter, in einen mässigen Dorn sich endigender Spitze.

Auf einer Wiese, zwischen der *Lohebrücke* und *Lissa* in Gesellschaft von *C. palustre* und *canum* i. J. 1841. von Wichura gefunden.

Wurzel büschelig mit starken Fasern. Stängel $1\frac{1}{2}'$ hoch, am unteren Theile beblättert mit dünnem Spinnwebenhaar. Blätter oberseits kahl oder feinhaarig, unterseits schwach grauschimmernd, herablaufend; die oberen lineal-lanzettlich; die Lappen der Blt. fast auseinandergespart. Drei Blüthenköpfe, zwei endständige, wovon eines auf einem $\frac{1}{3}''$ langen Stiele, der dritte $1\frac{1}{2}''$ tiefer auf einem zolllangen Stiele. Die Schuppen der Hülle bleichgrün, an der Spitze braun, die äusseren mit zurückgekrümmter dorntragender, die inneren mit borstenhäutiger röthlicher Spitze. Blumen purpurfarben.

× *Cirsium oleraceo-palustre*. *Cnicus palustri-oleraceus* Schiede. *Cirsium hybridum* Koch. Bltt. zerstreut-haarig, die grundständigen länglich-lanzettlich, buchtig-fiederspaltig, die mittleren etwas herablaufend, buchtig-gelappt, die Zipfel fast zweilappig, dornig-gewimpert; die Köpfchen in endständiger Doldentraube; Deckblatt lanzettlich, länger als das Köpfchen.

Auf feuchten Wiesen an Bachrändern in Lehmwasser bei *Charlottenbrunn*, im Juli 1843.

Der Stängel steif aufrecht, 2' hoch, gefurcht-eckig, mit stumpfen Kanten, der ganzen Länge nach mit gegliederten durchsichtigen borstenförmigen Haaren besetzt, welche an den Blattansätzen dichter, oben sparsamer stehen. Die Blätter hellgrün, am ganzen Rande dornig-gewimpert, die Dornen grösser und kleiner, letztere borstenförmig, beiderseits haarig wie der Stängel, die obersten unterseits dünn spinnwebenhaarig; die grundständigen länglich-lanzettlich, spitz, unten in einen breiten Stiel verschmälert herablaufend, der Mittelnerv dick dreikantig, am Rande buchtig-fiederspaltig, die Zipfel länglich und rhombisch-länglich, meist 2spaltig, ausgespart, am Rande ein wenig wellig, die mittleren grösser; die mittleren Blt. jenen ähnlich, mit lang vorgezogener Spitze, am Gr. halbumbfassend, mit halbmondförmigen buchtig-geschlitzten etwas krausen, dem Stängel parallelen Ohren, die unteren kaum, die oberen ein wenig herablaufend. Der Blüthenstand endständig, doldentraubig, die Aestchen achselständig, genähert, 3—5blumig; die Zahl der Blumen überhaupt bis 15; Deckblt. lineal-lanzettlich, buchtig, dornig-gewimpert. Köpfe vor dem Blühen elliptisch-kugelig; dann walzig mit dickerem Grunde; die Hüllschuppen lanzettlich, die unteren mit dorniger abstehender röthlicher Spitze, die untersten etwas spinnwebflockig, die oberen in eine trockenhäutige purpurfarbene, weiche Spitze verlängert. Kronen schmutzig-gelb mit linealischen an der Spitze knorpelig-ausgehöhlten Zipfeln; die Staubbeutelröhre schmutzig-roth.

Zur Seite 232.

C. prämosum Michx. Statt dieses Namens ist nunmehr, wie bei allen hybriden Arten geschehen sollte, *C. rivulari-oleraceum* zu setzen, indem die jetzt hier folgende Form wegen einiger auffallender Abweichungen davon getrennt werden musste.

× *C. oleraceo-rivulare*. Bltt. länglich, fiederspaltig, mit einem grossen, dreieckigen, dornig-gezähnten Endzipfel; am Rande borstendornig-gewimpert, die unteren in einen langen, geflügelten Stiel zusammengezogen; Köpfe 2—4 endständig, gehäuft, ohne Deckblätter; Schuppen der Hüllen angedrückt.

Auf Wiesen. In der *Dombrowa bei Gleiwitz*, von Kabath 1843 gefunden.

Die Pflanze ist ein deutliches Mittelding der beiden Stammarten, zumal in der Gestalt (er Bltt. sieht man eine deutliche Verschmelzung der beiden Grundgestalten. Stängel $2\frac{1}{2}$ ' hoch, bis $\frac{2}{3}$ beblättert, aufrecht. Die unteren Bltt. langgestielt, länglich, an der Spitze gezähnt, in der Mitte buchtig, an dem verschmälerten Gr. buchtig-fiederspaltig; die mittlere fiederspaltig mit lineal-lanzettlichen ganzrandigen Zipfeln, der Endzipfel grösser und dornig-gezähnt, sonst der ganze Rand mit stärkeren und feineren Dornenborsten gewimpert, die Flächen ausser den Adern kahl, oder am Rande etwas hakig; nach unten verengern sie sich zu einem kurzen blattartig geflügelten Stiel, der am Stängel ohrförmig erweitert halbumbfassend ansitzt; die oberen schmaler, kleiner, fiederig-getheilt. Köpfe gehäuft, 2—4' sitzend, ohne Deckblätter (ob immer?) Schuppen der Hüllen lineal-lanzettlich, kahl, schmutzig-grün mit bräunlicher oder röthlicher Spitze. Blumenkronen purpurfarben.

C. rivulare, auf Waldwiesen bei *Seifersdorf bei Ohlau*. 1842.

Zur Seite 237.

Centaurea nigra L. Die Anhängsel der Hüllblätter aufrecht, lanzettlich, fiederig-gefranzt, die Franzen borstlich, doppelt so lang als die Platte breit ist, sämmtlich genähert und die Hülle bedeckend; die der inneren rundlich, rissig gezähnt; die Federkrone von dem dritten Theile der Länge der Frucht; Bltt. breit-lanzettlich, etwas rauh, die unteren gezähnt oder buchtig.

Im Gebüsch um *Freiburg* von G. Reichenbach fil. i. Sept. 1842 gefunden und mitgetheilt.

Die gegebene Diagnose ist ganz nach Koch's Syn. gegeben, welcher diese Art von der verwandten *C. phrygia* unterscheidet, von der sie allerdings durch einen schlankeren Wuchs, kleinen runde Blüthenköpfe, die fast schwarzen Franzen der Hüllblätter und die schmäleren nicht breitansitzenden Blätter abweicht. — Es ist fast unzweifelhaft, dass *C. Jacea* und *C. phrygia* zwei verschiedene Arten sind; und dennoch scheint es so viele Mittelstufen zu geben, dass die Grenze schwer anzugeben, wenigstens in den bisher gefundenen Charakteren nicht ermittelt ist. Daher darf man vorläufig herauspringende Formen, wie die vorliegende, noch unterscheiden.

Zur Seite 238.

C. solstitialis wurde i. J. 1837 auf dem *Teichfelde bei Gnadenfeld* von Mettetal gefunden nach d. Gnadenf. Fl., neuerlich auch vor dem Oderthore bei *Breslau* an Ausladeplätzen bei der Kohlenstrasse.

Zur Seite 239.

Xanthium spinosum neuerdings an mehreren Plätzen um *Grünberg* von Weimann und um *Br.* an der alten Oder von Leizner und vor dem Nicolaithore von Krause beobachtet. Weimann vermuthet, dass die Pflanze um *Grünberg* aus durch Zufall verstreuetem Samen entstanden und dieser mit spanischer Wolle eingeführt worden sei.

Zur Seite 244.

Adenophora suaveolens. In O. S. zwischen *Deutsch-Neukirch* und *Nassiedel* von Kelch gefunden nach der Gnadenf. Fl.

Zur Seite 246.

Erica Tetralix. Im *Ratiborer Wald* nach Wittwer in litt.

Zur Seite 250.

Syringa vulgaris. Vor den Artnamen ist ein $\times$ zu setzen.

Zur Seite 252.

Vinca minor. In Wäldern am *Schlackenthal bei Reichstein* nach Goepfert 1842.

Zur Seite 271 vor *V. latifolia* ist einzureihen:

V. aphylla L. Bltt. verkehrteifg.-elliptisch, in einem kurzen Stiel verschmälert, schwach kerbzählig; aus den oberen Blattwinkeln ein oder zwei Blumenstiele mit 2—4blumiger Traube; die Fruchstiele aufrecht, länger als die verkehrt-herzförmige Kapsel.

Im Felsgerölle des Hochgebirges. Auf der Nordseite der *Babia Gora* i. J. 1840 von Kelch entdeckt und mitgetheilt. Juli 2.

Der untere Theil des Stängels söhlig kriechend und wurzelnd, der obere trägt genäherte, fast rosettenartige Blätterpaare, wovon die oberen grösser sind. Die Bltt. fast stumpf, oberseits und am Rande mit zerstreuten weisslichen Haaren. Der Blumenstiel, meist nur ein einzelner, selten zwei, $1\frac{1}{2}$ " lang, etwas gekrümmt kurzhaarig, oben drüsig. Zwei bis vier kurze Blumenstielchen mit Deckblättchen, drüsig. Kelchbltt. drüsig, spatel g. Kronenbltt. rundlich, gegen den Grund keilförmig, röthlich-blau.

Zur Seite 279.

Orobanche. Nach dem Gattungscharakter ist hinzuzufügen: Die Arten dieser Sippe sind parasitische oder Schmarotzer-Gewächse ohne Wurzeln, sondern welche mit dem mehr oder weniger verdickten Grunde des Stängels auf den Wurzeln und zwar häufig auf seitlichen Aesten verzweigter Wurzeln) mehrerer anderen krautartigen Pflanzen aufsitzen, wie es scheint mit ihren Gefässbündeln in den fremden Wurzelkörper eindringen und daraus wenigstens theilweise sich ernähren. Ueber die Unterscheidung der Arten, und was für Art, was für Varietät zu halten sei, herrscht noch grosse Verschiedenheit der Ansichten.

Orobanche stigmatodes. Da ich weder bei Reichenbach

noch bei Koch von irgend einer Art von Orobanche als Mutterpflanze *Centaurea Scabiosa* angegeben fand, und da keine der gegebenen Arten-Diagnosen der von Kelch bei *Dirschel* auf *C. Scab.* gefundenen und mir lebend übersandten Orobanche zukam, so sah ich mich genöthigt, derselben einen neuen Namen zu geben. Allein schon nachdem ich Fries Fl. Scan. gesehen hatte, wo *O. major* Linn. auf *C. Scab.* schmarotzend angegeben wird, vermuthete ich, dass meine *O. stigmatodes* mit der schwedischen *O. major* eins sei; und jetzt, nachdem ich die *Mantissa III. Novit. Fl. Suec.* verglichen, ist diese Vermuthung zur Gewissheit geworden, indem auch die daselbst von Fries gegebene Beschreibung, einige unbedeutende Abweichungen abgerechnet, genau auf diese unsere Pflanze passt. Auch von den fragweise zu derselben Art gerechneten Exemplaren vom Tul bei Ustron, bin ich jetzt durch die Mittheilungen *Zlik's* vergewissert, dass sie auf *C. Scab.* schmarotzen.

Unter den von Kelch an den *Gypsgruben bei Dirschel* gefundenen Orobanche-Arten befanden sich auch zwei Exemplare einer Art, welche nach den Kennzeichen mit *O. pruinosa* Lapeyr. bei Koch Syn. übereinstimmte. Leider war nicht zu ermitteln, welche Pflanzenart dieser Orobanche zur Grundlage gedient hatte. Ich begnüge mich daher von dieser Art nur die Diagnose beizufügen.

O. pruinosa Lap. Kelchbltt. 5nervig, in zwei schmale, ziemlich gleiche, der Kronenröhre an Länge gleiche Zipfel gespalten; Krone glockig, am Rücken schwach-gekrümmt, mit ausgebreiteten, wellig-gefalteten krausen, stumpf-gezähnelten Lippen mit farbigen Adern, die obere 2lappig; die Zipfel der Unterlippe gerundet, der mittlere doppelt so gross, die Staubgef. entspringen über dem Grunde der Röhre, unterhalb zottig, an der Spitze, wie auch der Griffel, mit einigen Drüsen. — Krone gross, dünn und papierartig, mit bläulichen Adern. Narbe violett.

Zur Seite 283.

Lindernia Pyxidaria. In dem trocknen Herbst 1842 häufig an verschiedenen Stellen der Oder, auch bei *Treschen*; an dem Wasser hinter der Passbrücke. Um *Gnadenfeld* von F. W. Kölbing mitgetheilt.

Zur Seite 287.

× *Verbascum Thapsiformi-Lychnitis*. *V. ramigerum* Schrader. Bltt. doppelt-gekerbt, oberseits von anliegenden, dichteren Sternhaaren graugrün, unterseits dünn weissgrau-filzig, die untersten länglich-eiförmig, am Gr. in einen Stiel verschmälert, die mittleren eiförmig, spitz, mit kurzen, halbangewachsenen Ohren halb-umfassend; Blütenstand rispig-ährrig, Ähren aus unten entfernten, oben gedrängten Büscheln; Staubfäden mit weiss-gelber Wolle besetzt, die beiden längeren oben und unten kahl.

Einige Exemplare fand Krause im Juli 1843 an den Wallgrabenrändern in *Breslau*.

Von 3—4' Höhe. Der ganze Stängel ist mit feinem abwischbarem Sternfilz beklei-

det. Die Bekleidung der Bltt. ist bald schwächer, bald stärker, etwas gelblich-leuchtend. Die Bltt. laufen $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{6}$ " herab, die oberen breitförmig in eine schmale lange Spitze vorgezogen. Aus den obersten Blattwinkeln 6—8 aufrecht-abstehende Aeste. Die Blumenbüschel an der Hauptähre bis 8 blumig. Die Kelche dicht weissfilzig. Die Kronen aussen weissfilzig, die Zipfel goldgelb, länglich-rund, $\frac{1}{2}$ " lang. —

Zur Seite 290.

Mentha viridis. Dunkelthal im Riesengebirge, am Ufer der Aupa nach Wagner!

Zur Seite 291.

Salvia glutinosa. Einige Exemplare fand Letzner in einem lichten Berggehölz unfern des Bades in Carlsbrunn 1842.

Zur Seite 304.

Pinguicula vulgaris. Wiegschützer Sümpfe in O. S. von Seidel gef. nach der Gnadenf. Fl.

Zur Seite 305.

Utricularia minor. Neuerlich sah ich blühende Exemplare vom Altleiche bei Wohlau, von Gützel-Becker mitgetheilt.

Zur Seite 312.

Rumex. Nach den Auseinandersetzungen von Fries in Linbloms Botaniska Notiser und in der Mantissa III. der Novit. Fl. Suec. bieten die Höcker oder Körner der Fruchtklappen kein beständiges Merkmal, wohl aber die Beschaffenheit des Blattstiels. Da nach demselben der *R. aquaticus* des Linné mehrere Arten begreift, so giebt er unserer Art dieses Namens den Namen *R. Hippo-lapathum*. Wahrscheinlich finden sich noch einige der jetzt unterschiedenen Arten, als *Rumex domesticus* Hartman, *cristatus* Wallr., *maximus* Schreb. bei uns.

Zur Seite 327.

Was wir *B. pubescens* nannten, galt bei den Schweden als *B. alba*, denn diese ist in ganz Lappland und Norwegen allein zu finden. Linné verstand unter *B. alba* beide Arten, welche er nicht als solche unterschied. Erst neuerdings ist unsere *B. alba* in Schweden häufiger beobachtet worden: siehe Fries Mant. II. p. 60. Darnach ist die unter *B. pubescens* befindliche Anmerkung zu berichtigen. — Die var. β *carpathica* findet sich fast in allen Schluchten und Gründen des Riesengebirges an der Gränze des Baumwuchses mehr oder minder häufig, namentlich auch in der Melzergrube, Kesselgrube, im Elbgrunde und am Ausgange der Schneegruben.

Zur Seite 328.

Salix. Unter allen Sippen der Schlesischen Flora hat keine so vieles Neue und Merkwürdige in den letzten Jahren für die Beobachtung geboten als die so zu sagen unerschöpfliche Gattung der Wei-

den. Neue Arten sind zwar vielleicht nur eine einzige aufgefunden worden, aber die Entdeckung einer Anzahl von Bastard-Formen hat uns ein ganz neues Licht über die Arten dieser Sippe, über ihr Vorkommen und die Differenz ihrer Arten verschafft, wodurch viele, früher durchaus nicht zu beseitigende, Schwierigkeiten und Räthsel entfernt worden sind und, wie wir uns schmeicheln, die Kenntniss der Arten dieser Gattung eine festere Begründung erhalten hat und noch mehr erhalten wird, auch viele andere schwierigere Arten und Sippen noch eine richtigere Deutung erfahren werden. Die erste Ahnung einer Hybridität verdanken wir der Mittheilung Schummels, welcher von jeher die *Salix rubra* für einen Bastard von *S. viminalis* und *S. purpurea* erklärt hat: siehe W. et Gr. Sil. III. p. 367. Eine zweite hybride Art, deren Ursprung auch schon von anderen erkannt war, ist *S. ambigua* Ehrh., a. a. O. p. 382. Eine dritte neue wurde 1840 entdeckt, in welcher ich alsbald ein Mittelding von *S. cinerea* und *repens* erkannte. Von der Zeit an, als ich die Gewissheit von der Richtigkeit dieser Bestimmung erlangt hatte, gelang es unseren fortgesetzten Bemühungen, denen des umsichtigen Krause und den meinigen, noch eine Anzahl von Bastardbildungen zu entdecken, indem wir diesen Gewächsen eine besondere Aufmerksamkeit widmeten; so ist eine Reihe dieser Bildungen bekannt geworden, welche sowohl einander gegenseitig aufklären, als auch die Arten der Sippe überhaupt erläutern. Dadurch nämlich, dass sich manche vereinzelt erscheinende, daher nur wenigen Beobachtern bekannte, und in ihrem Charakter nicht deutlich heraustretende bisherige Arten der Botaniker als Bastard-Formen ausgewiesen und aus dem Kreise der ächten Arten herausgesondert haben, werden die ächten Arten deutlicher und bestimmter begränzt, so dass sie auch bei einem grossen Umfange der Variation dennoch in einem schärferen Charakter heraustreten. Die nähere Begründung und Auseinandersetzung unserer Beobachtungen muss ich mir für einen anderen Ort versparen. Ich weiss zwar, dass ich mich hier mit einigen bedeutenden Autoritäten in Widerspruch befinde: allein die aus der Beobachtung mir entstandene und ohne Zuthun vorgefasster Meinung gewonnene Ueberzeugung darf ich nicht aufgeben.

Die hier aufgeführten Weiden-Bastarde sind grösstentheils in vereinzelt Exemplaren meist an Wegrändern und in feuchten Niederungen oder Brüchen, stets in Gesellschaft der Stammarten gefunden worden und verdanken ihre Entstehung höchst wahrscheinlich den bienenartigen Insecten, welche im ersten Frühlinge an den genannten Orten zahlreich auf den Weidenblüthen umherschwärmen. Die Weiden-Bastarde konnten am allerersten für Arten angesehen werden, da sie bei ihrer holzigen Beschaffenheit und Dauerhaftigkeit sich der Beobachtung lange Zeit hindurch darstellen, auch leicht vermehren. Dass ich nicht Varietäten für Bastarde angesehen habe, dafür bürgt die von mir in der Flora Silesiae des breiteren auseinandergesetzte Angabe der Varietäten jeder Art. So viel ist gewiss, dass jede Weidenart, wie überhaupt jede Pflanzenart auch bei den zahlreichsten Abweichungen einem gewissen Typus treu bleibt, welcher durch lange und aufmerk-

same Beobachtung erkennt dem so geübten Blicke stets gegenwärtig ist: so wie dass die meisten Arten von gewissen äusseren Ursachen auf ähnliche Weise afficirt werden, z. B. die gleichartigen Blattriebe bei fast allen Arten dieselbe Beschaffenheit zeigen.

× *S. fragili-pentandra*. Drei Staubgef. in jeder Blume; Bltt. eiförmig-lanzettlich in eine lange Spitze vorgezogen, kahl, am Rande mit vielen und dichten drüsigen Sägezähnen; die Blattstiele oben mit ein paar Drüsen.

Einige hohe Bäume mit Staubfädenblumen hinter *Klein-Weigelsdorf* am Wasser zwischen *S. fragilis* und *S. pentandra*, zwischen welchen sie auch in der Blüthezeit genau die Mitte hält. Vielleicht gehören auch die von Krause bei *Bunckey* beobachteten Bäume hierher. Mai.

Diese Form ist unter dem Namen *S. Meyeriana* Willd. und *S. cuspidata* Schultz Stargard. bekannt, dessen Beschreibung genau übereinkommt. Sie ist im Glanz, in der Gestalt und Serratur der Blätter, in der Dicke der Staubfädenkätzchen, der Zahl der Staubgefässe und der Blüthezeit so in der Mitte beider Arten, dass ich an ihrer Bastard-Natur nicht zweifeln kann. Die Zweige brechen leicht ab. Die Stempelblumen sah ich noch nicht. Während sie blüht hat *S. fragilis* daneben schon verstäubt, an *S. pentandra* sollen die Staubbeutel noch über die Deckschuppen heraus treten.

× *S. undulato-amgdalina*. Deckschuppen fast kahl; Kapseln kahl, lang-gestielt, eikegelförmig mit sehr kurzem Griffel und sählig abstehenden Narben; Blätter lanzettlich, langspitzig, gegen den Grund allmählig verschmälert, unterseits graugrün, fein-drüsig-gesägt.

Bisher nur ein einziger Strauch mit Stempelblumen in der *Strachate bei Treschen*.

Nur um diese Form der Beachtung zu empfehlen, erwähne ich dieselbe, die ich unbedenklich als eine Varietät der *S. amygdalina* aufgeführt haben würde, wenn nicht der Blattschnitt durchaus widerspräche. Denn an allen auch den schmalblättrigsten Formen derselben ist weder die Basis noch die Spitze des Blattes so lang verschmälert und vorgezogen, wodurch sie wie durch den eigenthümlichen Glanz der Oberseite und die unregelmässige Auszahnung des Randes auf die *S. undulata* unzweifelhaft hinweist. Die Stützblätter sind schief und halbherzförmig. Die Deckschuppen sind anfangs hin und her behaart, an der Spitze bärtig: später werden sie fast kahl, ganz wie bei *S. amygdalina*.

Zur Seite 330.

S. hippohaifolia Thuillier. Statt dieses sehr unpassenden Namens ist der ältere Name Ehrharts, *S. undulata* zu setzen. Denn sollte auch Ehrhart eine Varietät derselben mit schwach-welligen Blättern unter diesem Namen beschrieben haben, so gehörte sie doch unbedenklich zu dieser Art.

× *S. viminali-purpurea*. Zwei bis gegen die Hälfte verwachsene Staubfäden in jeder Blume; Kätzchen am Gr. von Deckbltt. gestützt; Kapseln eikegelförmig, sitzend, mit seidenartigem Filz; Griffel deutlich, Narben länglich; Bltt. lang, lineal-lanzettlich, lang-

spitzig, seicht schweifig-gezähnt, schwach-feinhaarig, zuletzt ganz kahl.

An feuchten Flussufern, Waldrändern, in Weidengebüschen häufig, doch meist in vereinzeltten und zerstreuten Exemplaren. An den Ufern der *alten Oder* bei *Br.* fast überall zerstreut bei *Pöpelwitz, Rosenthal, Scheitnich, Grüneiche. Pilsniz. Arnolds Mühl.* In *Ziegelei-Sümpfen zw. Margareth und Jannowitz. Bei Salzbrunn und Hirschberg* nach *Schneider. Schönbrunn bei Teschen* nach *R. u. M. April. t.*

Diess ist die bisher unter dem Namen *S. rubra* Huds. oder *S. fissa* Hoffm. bekannte Weidenform, deren zuerst von Schummel ausgesprochene hybride Natur durch die unzweideutigsten Beobachtungen vieler Jahre bestätigt ist. Schon wenn man im Frühling die männlichen und weiblichen Kätzchen dieser Art zwischen *S. viminalis* und *S. purpurea*, welche beide Arten bei uns besonders an Flussufern am häufigsten durch einander wachsend angetroffen werden, blühen sieht, springt es in die Augen, wie sie zwischen jenen Arten in der Mitte steht. Daher denn auch die gespaltenen Staubfäden, deren Verwachsung bald höher bald tiefer ist; denn alle Weidenformen mit halbverwachsenen Staubfäden sind nichts anderes als Bastarde aus *S. purpurea* mit einer anderen Art. Noch mehr leuchtet aber die Entstehung dieser Form ein, wenn man die Blätter in ihrer Gestalt, Bekleidung, Farbe, Glanz und in ihren verschiedenen Zuständen beobachtet; worin sie die Aehnlichkeit bald mit *S. purpurea* bald mit *S. viminalis* erkennen lassen, während sie doch keiner von beiden gleich sind, sondern stets ein sichtlich Mittelwesen darstellen. Was man auch bei anderen Bastard-Weiden sieht, dass sie mehrere Formen zeigen, von denen die eine der einen die andere der anderen Stammart näher steht, je nachdem der Einfluss dieser oder jener bei der Befruchtung vorherrschend gewesen ist: dasselbe zeigt auch *S. rubra* deutlich; es giebt Formen die der *S. purpurea* sehr nahe stehen, so wie andere, von denen zur *S. viminalis* nur wenige Schritte sind. Die letzteren sind es, welche in *W. et Gr. Sil. 3, 366.* und *W. Fl. v. Schles. 1840* als β *pubescens*, bei *Koch Syn. p. 647* als β *sericea* aufgeführt ist. Das häufige Vorkommen dieser Art erklärt sich daraus, dass die meisten unserer Weidengebüsche durch Pflanzung von Stecklingen oder aus Faschinen entstanden sind; daher kann sie leicht auch in Gegenden vorkommen, wo die eine oder die andere Stammart fehlt. Zu der a. a. O. gegebenen Beschreibung finde ich nichts Wesentliches hinzuzusetzen.

× *S. cinereo-purpurea*. Je zwei bis gegen die Mitte verwachsene Staubfäden in jeder Blume; Kapseln — —; die Bltt. länglich-lanzettlich nach oben etwas breiter, kurz gespitzt, am Gr. keilförmig, kurz gestielt, schwach sägezählig, unterseits graugrün mit vorstehenden Adern und sehr zerstreuten feinen Haaren.

Von dieser Art wurde erst in diesem Jahre ein einziger, aber ansehnlicher Strauch mit Staubgefässblumen, in der Gegend von *Gr. Masselwitz* von *Krause* entdeckt.

Die Kätzchen der Staubgefässblumen sind länglich, bis 6'' lang; die Schuppen gelb mit rothem oder schwärzlichem Vorderende. Staubfäden unten mit krauser Wolle besetzt; die Staubbeutel roth, nach dem Verstäuben gelbbraun. Die jungen Bltt. zur Blüthezeit lanzettlich nach unten stark verschmälert, kurz gestielt, oben gegen $\frac{2}{3}$ breiter, mit dreieckiger Spitze, ganzrandig, beiderseits besonders unterseits runzelig und feinhaarig. Die erwachsenen Bltt. sehen denen der *S. amygdalina discolor* nicht unähnlich, eiförmig- oder länglich-lanzettlich, bis unter die Mitte seicht schweifig-

sägezählig, gegen den Grund keilförmig verschmälert, mit blasser Mittelrippe, unterseits hervortretenden Adern, an denen sich zuletzt sehr wenige kurze und feine Haare befinden, oberseits dunkelgrün und matt oder mit nur schwachem Glanz. Die Stützblätter eiförmig-spitz oder eilanzettlich kurz-gestielt. — Nach einem Exemplar von Willdenow, welches Günther cultivirte, so wie nach lebenden Exemplaren, des botanischen Gartens zu *Breslau*, und nach getrockneten aus Koch's Garten zu *Kaiserlautern* ist dies unzweifelhaft die *S. Pontederana* Willd. und Schleicher. Somit wäre dieser Art, deren Berechtigung mir stets verdächtig gewesen ist, ihre wahre Stelle angewiesen.

× *S. aurito-purpurea*. — Blätter verkehrt-eiförmig, gegen den Grund lanzettlich-verschmälert mit kurzem Stiel, kurz zugespitzt, grob sägezählig und bisweilen schwach-wellig, oberseits matt und schmutzig-grün, unterseits schmutzig grün-grau, mit vortretenden Adern, schwach flaumhaarig, zuletzt kahl; Stängelbltt. halbmondförmig fast sitzend.

Bisher drei Sträucher in der Umgegend von *Breslau*, zwei zwischen *Margareth* und *Janowitz*, ein dritter, jetzt ausgerotteter bei *Rosenthal* von Krause entdeckt.

Wiewohl es uns bisher noch nicht gelang diese Form in der Blüthe zu beobachten, so zeigen doch die Bltt. den Ursprung derselben so unverkennbar an, dass wir sie aufzuführen kein Bedenken tragen. Von den beiden bei *Margareth* beobachteten Sträuchern ist der eine der *S. purpurea*, der andere der *S. aurita* näher, wodurch die Erkennung dieser Form erleichtert und ihr Ursprung vergewissert wurde. Die letztere ist von dunklerer Farbe, hat braunröthliche oder olivenbraune dickere Zweige, etwas grössere dunklere und dickere Bltt., an der Mittelrippe der Oberseite zeigt sich gewöhnlich ein zarter Flaum; der Blattschnitt weist deutlich auf *S. aurita* hin, wenn auch das ganze Blatt mehr in die Länge gezogen, schmaler und zumal nach unten verschmälert ist; am auffallendsten zeigte sich die Mittelbildung an den langen und jungen Trieben, nachdem der Stock an der Wurzel abgehauen worden war: hier erschien besonders die eigenthümliche Randzählung der *S. aurita*, während auf der Unterseite das eigenthümliche Grau der *S. purpurea* und an einigen Bltt. die Form derselben deutlich hervortrat; diese wurden auch beim Trocknen schwärzlich. Bei dem anderen Strauche waren die Merkmale der *S. purpurea* in Gestalt, Consistenz der Bltt., in den dünneren hin und wieder röthlichen Zweigen und dem der *S. purpurea* eigenen Graugrün noch schärfer hervortretend. Wiewohl sich in der Diagnose dieser Form und der vorigen kein grosser Unterschied herausstellte, so sehen sie doch im Leben einander nicht sehr ähnlich.

Zur Seite 332.

S. Smithiana Willd. Kätzchen der Stempelbl. fast sitzend, dick, von Deckbltt. gestützt; die Kapseln aus eiförmigem Grunde pfriemförmig, kurz-gestielt, seidenhaarig-grau; mit kurzem Griffel und vierspaltiger Narbe, deren lineale Zipfel zusammengeneigt sind; Honigdrüse sehr kurz; Bltt. lanzettlich, beiderseits spitz, kurz gestielt, ganzrandig oder leicht schweifig, oberseits fein flaumhaarig, später kahl, unterseits von angedrücktem Flaum mattseidenartig grauschimmernd.

Ein hoher Strauch bei *Janowitz* bei *Br.* April 1842.

Diese Art gehört zur Gruppe der *S. acuminata* und unterscheidet sich von dieser, wie sie bei uns beobachtet ist, nur durch die schmälere Blätter und die dünnere

Bekleidung der Unterseite. Die Bltt. dieser Art sind schmal länglich-lanzettlich, dem linienförmigen näher, unterseits mit einem dünnen seidenartigen Haar, welches die Fläche zwar grau überzieht, aber die grüne Farbe durchschimmern lässt; die Zweige fast kahl, um vieles dünner und zarter. Bei *S. acuminata* sind die Blätter durchaus breiter und im ganzen Umriss dem Eiförmigen näher, nach oben und unten weniger lang zugespitzt, die Bekleidung der Unterseite ist dicht-seidenhaariger, fast filzig, daher mehr silberweiss; die Zweige dicker, die ein- und zweijährigen fein wollig. Die alten Blätter der jungen saftreichen Triebe sind zwar bei beiden Arten mehr lineal-länglich, unterseits mit dichtem grauweissen Filz (auch bei dieser Art), aber bei *S. acuminata* um vieles grösser. — Demnach kann ich diese Art durchaus nicht für eine schmalblättrige Abart der *S. acuminata* ansehen, wie man zu glauben verleitet sein könnte, siehe Reichenb. Exc. Nr. 1034, die *S. lanceolata* Fries ist genau unsere *S. acuminata*. — Hierbei ist zu bemerken, dass den Merkmalen der zwei- oder viertheiligen Narben wohl zu viel Gewicht beigelegt ist; ich sah an Exemplaren der *S. viminalis* von *Malapane* (welche in d. Fl. von 1832 für *S. stipularis* angesehen worden ist) sowohl ungetheilte als zweitheilige Narben, an *S. acuminata* von *Bischofswalde* meist zweitheilige, zum Theile auch ungetheilte, endlich an der vorliegenden Art oft ungetheilte oft zweitheilige Narben. Bei allen diesen schien es, dass die Theilung zwar da sei aber nicht verwirklicht sei, weil die Lappen der Narben aneinander klebten. — Beiläufig sei es hier erwähnt, dass die *S. mollissima* Ehrh., auch Koch u. Fries, höchst wahrscheinlich ein Bastard von *S. undulata* und *S. viminalis* ist. — Die von Mückusch bei *Troppau* gesammelte Weide, welche Koch als *S. mollissima* aus *Schlesien* aufführt, von der mir in diesem Augenblicke noch vollständige Exemplare vorliegen, ist von der um *Breslau*, zwar selten doch an mehreren Stellen wachsenden *S. acuminata* nicht verschieden. Diese halte ich auch für eine ächte Art. Ob aber die vorliegende, als *S. Smithiana* aufgeführte eine wahre Art, oder nicht vielmehr ein Bastard der *S. acuminata* mit *S. viminalis* sei, lasse ich unentschieden.

Zur Seite 333.

S. nigricans Fries. Kätzchen sitzend, bei der Fruchtreife kurz gestielt, Kapseln aus eiförmigem Grunde pfriemförmig verlängert, in einen langen Griffel zugespitzt mit zweispaltiger Narbe, gestielt; Bltt. elliptisch, wellig-gesägt, anfangs haarig, später glatt.

Unter einigen Pflanzen, welche Vogel aus *Paris* in den Umgebungen von *Gräfenberg* gesammelt hatte und mir mittheilte, befanden sich einige Exemplare dieser von mir längst in Schlesien vermutheten aber bisher noch nicht aufgefundenen Weide. Die vorliegenden Exemplare sind Blüthenzweige eines weiblichen Strauches mit unreifen Kapseln und noch ganz jungen Blättern, und zwar von der glattfrüchtigen Form. Die langen Griffel (daher *S. stylaris* Seringe) machen diese Art leicht kenntlich.

S. aurito-myrtilloides. *S. finmarchica* Willd.? *S. finmarchica* Fries Novit. Mant. I. 68. Frucht-Kätzchen gestielt mit beblättertem Stiel, erst eig. dann walzig; Kapseln (bei der Fruchtreife) lang-kegelförmig, langgestielt, der Stiel doppelt so lang als die behaarte Schuppe, 4-5 mal so lang als die Drüse; Griffel sehr kurz mit linealen Narben; Bltt. elliptisch und verkehrt-eiförmig, oberseits schwach fein-haarig oder kahl, unterseits feinhaarig, runzelig-aderig, graugrün.

In der Gesellschaft der beiden Stammarten bei *Königshuld bei Oppeln* von Fincke und Grabowski beobachtet. Mai. h.

Von dieser Bastardbildung giebt es einige äusserst belehrende Formen, von denen die einen mit stärker behaarten und verkehrt-eiförmigen Bltt. so wie mit kürzeren Kätzchen, kürzergestielten seidenhaarig-grauen Kapseln der *S. aurita* sehr nahe stehen, indem sich die anderen mit schwachhaarigen zuweilen fast kahlen elliptischen Blättern, langwalzenförmigen Kätzchen, langgestielten ganz kahlen Kapseln von der *S. myrtilloides* nur wenig entfernen. Dazwischen zeigen sich nun auch genaue Mittelbildungen, woran die Kapseln mit zerstreuten Haaren auch mit einer oder einigen Haarlilien bekleidet sind. Auch hier ist der Typus beider Stammarten in den Bastardbildungen bald in dem einem bald in dem anderen Merkmal deutlich ausgesprochen. Am besten erscheint sie als Mittelform zur Zeit der Fruchtreife. Bisweilen haben die Kätzchen tragenden Zweige eine auffallende Aehnlichkeit mit *S. depressa* (Starkeana Willd.). Die männlichen Kätzchen sehen denen der *S. myrtilloides* auffallend ähnlich, durch die feinen langen Staubfäden. Lange saftige Zweige im Herbste gleichen sehr manchen Formen der *S. aurito-repens*, aber der Blattschnitt, dessen gerundeter Grund oft ins Herzförmige übergeht, und die ganz eigenthümliche Farbe der *S. myrtilloides*, welche sich auf der Unterseite der Bltt. in einem fast röthlich-leuchtenden Blaugrau ausspricht (am auffallendsten an den reifenden Kapseln, welche oft wie mit einem Reif überzogen erscheinen) welche auch an diesen Bastardformen noch sichtbar ist, lässt sie wohl unterscheiden. Stützbltt. sind eilanzettlich aber sehr selten. — Bei Koch Syn. wird die *S. finmarchica* Willd. als Varietät zur *S. ambigua* gezogen. Allein die *S. finmarchica* gehört gewiss in die Verwandtschaft der *S. myrtilloides*, während darüber dass *S. ambigua* Ehrh. eine *S. aurito-repens* ist, kaum ein Zweifel sein kann. Uebrigens ist die *S. onusta* Besser, wie ich aus Besserschen Originalexemplaren weiss, nichts anderes als die *S. myrtilloides* selbst, und seine *S. elegans* ist davon auch nicht verschieden. Möglich indess, dass Besser auch vorliegende Bastardform mit der ächten *S. myrtilloides* verwechselt hat; zu letzterer scheint seine var. *γ lithuanica* zu gehören.

S. aurito-repens. Kätzchen sitzend, bei der Fruchtreife kurz gestielt, Kapseln kegelförmig-pfriemlich, seidenhaarig-filzig, gestielt, der Stiel 2-4 mal so lang, als die Drüse; Griffel kurz mit eiförmigen ausgerandeten, zusammenliegenden Narben; Bltt. elliptisch, eiförmig, oben ein wenig breiter, mit umgekrümmter Spitze, schwach und verloren gezähnt, unterseits runzelig-aderig, grau oder weissfilzig von geraden anliegenden Haaren, die oberen und jüngeren mit Silberglanz.

Bisher fast überall gefunden, wo *S. repens* und *S. aurita* durch einander wachsen. Zuerst von Schummel bei *Lissa* gefunden, dann nach Nees v. Esenbeck bei *Warmbrunn*. Von der männlichen Pflanze wurde von uns ein Strauch bei *Lilienthal*, einer bei *Carlowitz*, einer bei *Riemberg* und zwei bei *Janowitz*, von der weiblichen mehrere bei *Lilienthal*, einer bei *Carlowitz*, mehrere bei *Janowitz* und bei *Lissa* beobachtet. April, Mai. h.

Von allen Formen der *S. aurita*, deren kleinblättrige Varietät uns wohl bekannt ist, durch die langen und geraden Haare auf der unteren Blattseite, welche, wo sie sehr dicht stehen, einen seidenartigen silberglänzenden Ueberzug bilden und die länglich-elliptische Form der Bltt. zu unterscheiden: von *S. repens* durch die unterseits runzelig-aderigen nach oben ein wenig breiteren Bltt. zu unterscheiden. Die Kätz-

chen der Staubgefässblumen sind eiförmig-walzig $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Zoll lang, mit langen und feinen Staubfäden, nach dem Verstäuben gelbbrannen Staubbeuteln. Die Kätzchen der Stempelblumen anfangs länglich-eiförmig, später eiförmig-walzig bis $\frac{3}{4}$ und 1 Zoll lang, die Schuppen unten gelblich, oben schwärzlich, zottenhaarig; die Kapseln anfangs kurz, später länger-gestielt, kegelförmig in eine feine Spitze verschmälert, am Gr. mehr oder weniger bauchig, oft sehr verlängert: die Narben aufrecht-abstehend oder zusammenliegend. Stützbltt. eiförmig oder eiförmig-rundlich. Die Bltt. sind veränderlich in Grösse (8'' bis 2'' Länge und 4'' bis 9'' Breite), Gestalt (bald der länglich-elliptischen bald der breit-eiförmigen näher, bald fast gleich breit bald oben sichtlich breiter) und Bekleidung, auch die Aderrizeln der Unterseite sind bald stärker bald schwächer, der Grund gerundet oder schief-verlaufend. Der Rand ist stets zurückgeschlagen, mit bald mehr bald minder seichter Einzahnung, die kurze Spitze schief oder faltig-zurückgekrümmt; an älteren Bltt. am unteren Theile der Zweige, wo die Behaarung dünner ist, leuchtet das schwache Bleigrau der Unterseite, was von der *S. aurita* her stammt. Uebrigens schreiben sich die mannigfaltigen Formen dieses Bastardes, der sich jedoch als derselbe leicht wiedererkennen lässt, theils davon her, dass sie bald der einen bald der anderen Stammart näher stehen; theils von der Form her, welcher das Stammindividuum angehörte. In dem bekanntlich sowohl *S. aurita* als auch in noch höherem Grade *S. repens* in sehr vielen Abänderungen erscheinen, so muss es als ein höchst interessanter Moment gelten, dass sich an den Bastardformen der vorliegenden sogar die Varietät der Stammarten herauserkennen lässt, welchen das Bastard-individuum seine Entstehung verdankt. — Zu derjenigen Form, welche der *S. repens* näher steht, gehört *S. ambigua* Ehrh. bei Willd. Sp. pl. und *S. plicata* Fries l. l. 66, zu der welche der *S. aurita* näher ist, *S. spathulata* Willd. u. *S. aurita* c. *ambigua* Fries 55.; beide vereinigt Koch Syn. unter *S. ambigua*. Der Ausspruch Willdenows a. a. O. „Quasi medium inter *S. fuscam* (d. i. Form unserer *S. repens*) et *auritam*“ bestätigen Koch und die meisten Autoren. Warum will man nicht; dass sie ein Bastard sei, wenn man doch sagt, dass sie gleichsam ein Mittelding sei? Oder giebt es Mitteldinge anderer Art?

× *S. cinereo-repens*. Kätzchen sitzend, bei der Fruchtreife gestielt, Kapseln pfriemlich, seidenhaarig, gestielt, der Stiel 2-3 mal so lang als die Drüse; Griffel kurz, mit länglichen horizontal-abstehenden Narben; Bltt. eilanzettlich oder länglich-lanzettlich, beiderseits spitz, unterseits grau und feinhaarig oder silbergrauhaarig mit schwach vorstehenden silberweisschimmernden Adern, mit ungleichen schwach-schweifiggezähnten Rändern.

Bisher nur ein männlicher Strauch bei *Lilienthal* und mehrere weibliche bei *Carlowitz* von Krause entdeckt, an beiden Orten in Gesellschaft der *S. cinerea* und *S. repens*. April, Mai. h.

Dieser bisher noch nirgends beobachtete Bastard sieht dem vorigen einigermaassen ähnlich, ist aber durch die mehr lanzettförmigen oben und unten spitzten unterseits weniger runzlig-aderigen Blätter so wie durch die ausgesperrten Narben auf den ersten Blick zu erkennen. Auch an dieser Art ist die Bekleidung natürlich, wie an den Stammarten selbst, veränderlich, durchläuft aber zumal an den verschiedenen Blättern und Zweigen eine entsprechende Stufenfolge; eben so die Blattform. Man erkennt auch aus der Mischung das eigenthümliche Grüngrau der *S. cinerea* besonders auf der Unterseite heraus, zumal da wo nur dünnes Haar aufliegt, andererseits zeigt sich das anliegende Silberhaar der *S. repens*, besonders an oberen und jüngeren Bltt., hauptsächlich an den Adern. Der eine Blattrand pflegt einen stärkeren Bogen zu beschreiben als der andere, indem diese Blathälfte breiter und das ganze Blatt

schief ist. Der Rand ist schwach nach unten umgebogen und zeigt bisweilen deutlich die Spuren der unregelmässigen wellig-schweifigen Zahnung, die der *S. cinerea* eigenthümlich ist. An den kürzeren stark verzweigten Aesten sind die Bltt. klein von 1—1½" Länge bei 4—5" Breite, unterseits von den vorstehenden Hauptadern fast linirt, weissgrau mit dünnem fast geradem schwachliegenden Haar; hier stellen die Bltt. ein völliges Mittelgebilde dar, aus welchem die disparaten Stammformen schwer erkannt werden. Aber an den oberen Bltt. etwas saftreicherer Triebe erkennt man die *S. repens* deutlich wieder, hingegen an den Bltt. der langen und starken Triebe aus den abgeschnittenen Aesten oder Stämme oder aus späten Seitentrieben eines solchen oben gehemmtten Zweiges stellt sich der Zusammenhang mit der *S. cinerea* deutlich dar; die oberen sind dann unterseits dicht seidenhaarig-filzig mit grauweissem Schimmer eiförmig-länglich, wellig-schweifig-gezähnt und auch auf der Oberseite ähnlich aber dünner bekleidet. Aus einigen Stöcken, welche auf einer Wiese standen, und deren Zweige bei der Heuerndte alljährlich abgeschnitten wurden, sprosssten lange krautige Triebe, welche den unter ähnlichen Verhältnissen entstehenden der *S. cinerea* ganz ähnlich waren, nur mit schmäleren und spitzeren Bltt.; auch hier waren die untersten gewöhnlich ganz kahl, die obersten aber zeigten in Form und Bekleidung deutlich die *S. repens* an. Die Kätzchen der Staubfädenblumen sind fast von der Grösse derer der *S. aurita*, oval 6—7" lang, ziemlich dichtwollig, die Staubbeutel nach dem Verstäuben braunschwarz; an dieser Pflanze waren die Zweige braunroth, ziemlich lang ruthenförmig, die Bltt. eiförmig-länglich, beiderseits spitz, oberseits schmutzig-grün, unterseits die Adern nur wenig erhaben, graugrün mit anliegendem schlichtem Haar, die oberen weissgrau-schimmernd. Die Stützblt. eiförmig-länglich oder länglich. — Hierher gehört *S. cinerea* c. *virgultosa* Fries l. l. 55. Koch im Taschenb. d. D. Fl. erklärt die *S. cinereo-repens* für eine schmalblättrige Form der *S. ambigua*. Allein abgesehen von allem übrigen lässt diess die constante Verschiedenheit der Narben nicht zu. Die *S. cinereo-repens* und *S. aurito-repens* sind allerdings analoge Bildungen und sehen bisweilen einander sehr ähnlich, wie ja auch *S. cinerea* und *S. aurita* sehr ähnliche, bisweilen schwer zu unterscheidende, Arten sind.

× *S. purpureo-repens*. Jezwei bis gegen die Mitte verwachsene Staubfäden in jeder Blume; die Kätzchen sitzend bei der Frucht reife kurz gestielt mit einigen kleinen Deckblättern, walzenförmig oder eiförmig-walzig; Kapseln kurz gestielt, eikegelförmig, weissgrau-filzig, mit sehr kurzem Griffel und kurzer zweilappiger Narbe; Bltt. lineal-lanzettlich oder lanzettlich gegen die Spitze verbreitert, schwach sägezählig, graugrünlich, die oberen unterseits von anliegendem Seidenhaar weiss-schimmernd.

Von dieser Bastardform, welche hauptsächlich in zwei Gestalten vorkommt, wurden beide zuerst zwischen *Liebenau und Riemberg*, dann am Parke bei *Koberwitz* gefunden, an beiden Orten wenige weibliche Sträucher, zwei dergleichen in der Nähe von *Janowitz*, ein dergleichen bei *Lilienthal*, mehrere um die Kalkgruben bei *Sadewitz bei Oels*, ein männlicher bei *Rosenthal bei Breslau* von *Wichura*, und zwei dergleichen unfern *Sadewitz* von *Krause*. April, Mai. h.

Einer der ausgezeichnetsten Bastarde, dessen eine Form der *S. purpurea*, die andere der *S. repens* näher stehend, dadurch dass sich diese Annäherung sowohl in sämtlichen Merkmalen der Blätter (Gestalt, Bekleidung, Farbe, Schwarzwerden beim Trocknen) der Kätzchen (kürzer oder länger daher mehr eiförmig oder mehr walzig,)

der Kapseln (bald kürzer und mehr eiförmig, bald länger und nach oben schmaler, daher ei-kegelförmig) u. s. w. als auch im ganzen Aussehen darstellt, seinen Ursprung unzweideutig zu erkennen giebt. Man könnte von diesem Bastarde geradezu zwei Formen unterscheiden und die eine *S. purpureo-repens* die andere *S. repenti-purpurea* nennen, wenn es nicht bei dem Schwanken der Bastardformen räthlicher und kürzer wäre sie unter einem Namen zu vereinigen, der ihre Bastardnatur anzeigt und alle darunter begriffenen Formen zusammenfasst. Die letztere Form wird einem ungeübten Auge als eine *S. purpurea* erscheinen, deren obere Bltt. die Bekleidung der *S. repens*, nur dünner, zeigen. Zur Vermeidung von Missverständnissen bemerke ich, dass die *S. purpurea* & *sericea* Koch Syn.! *S. monandra sericea* Seringe! *S. d. S.* auch von mir hier beobachtet worden ist: diese ist eine wahre *S. purpurea*, die darauf vorkommende Bekleidung der Unterseite ist durchaus abnorm, gewöhnlich nur auf einzelnen Stellen der Blattfläche als ob die übrige abgerieben wäre, gleichsam ein Ueberbleibsel des den jungen Weidenblättern fast aller Arten im Frühlinge eigenhümlichen Seidenhaares. Bei unserm Bastard ist diese Bekleidung regelmässig und constant, wenn sie auch bisweilen sehr dünn wird und an den unteren Bltt. der Zweige fast verschwindet. Die männl. Kätzchen sehen denen der *S. purpurea* ziemlich ähnlich, sind aber kürzer, die Staubfäden bald nur unten, bald bis zur Mitte oder noch höher verwachsen, daher erscheinen sie länger und dünner; die Antheren sind nach dem Verstäuben braungelb, doch ein wenig schwärzlich leuchtend. An beiden Formen zeigen sich die der *S. purpurea* gewöhnlichen, längeren rufthelförmigen, röthlichen Zweige. Die Bltt. sind bald schmaler, bald breiter, wie auch die beiden Stammarten und zeigen im Herbst auch etwas von der härteren, trockneren Consistenz der Bltt. der *S. repens*, während man die Farbenmischung der *S. purpurea* nicht daran vermisst. — Hierher gehört nach der Beschreibung bei Koch Syn. die *S. Doniana* Smith.

Zur Seite 336.

S. Laponum. Die Staubgefässblumen dieser Art verbreiten einen äusserst angenehmen feinen Veilchengeruch.

S. herbacea. Von dieser Art giebt es zwei Formen, eine mit fast kreisrunder etwas dickeren und eine mit mehr ovalen Bltt. von dünnerer Consistenz. Die letztere findet sich an den angegebenen Orten im Gesenke, die erstere in der zweiten Schneegrube im Riesengebirge, 1842 von Waage entdeckt.

Anhangsweise führe ich hier noch drei nicht schlesische Formen auf, welche ich gleichfalls für Bastarde zu halten veranlasst bin. 1) **S. nigricanti-repens.** Diese wurde von Meyer und Patze in der Gegend von *Königsberg* in grossen Brüchen, wo *S. repens* mit mannigfaltigen Formen von *S. nigricans* vereinigt wächst, gefunden und theilt wenigstens nach den vorliegenden Blättern die Charaktere dieser beiden Arten. Die *S. cinereo-repens* wenigstens, wofür sie die Entdecker hielten, ist es nicht. — **S. repenti-viminalis**, von Exemplaren aus *Schonen* von Fries. **S. angustifolia** Wahlb. Fries Mant. II. 65., welcher selbst auf diesen hybriden Ursprung hinweist, den die vorliegenden Exemplare deutlich erkennen lassen. Vermuthlich wird dieser schöne Bastard auch noch bei uns gefunden werden. 2) **Myrtilloidi-Laponum**, nach Exemplaren, welche von Wahlenstroem, die **S. versifolia** Wahlb.

S. fusca L. nach Fries l. l. 69. Die der *S. myrtilloides* nähere Form hat Fries als Unterart *Myrtoides* bezeichnet. Vielleicht wird die Natur dieser problematischen Art durch diese meine Ansicht von derselben aufgeklärt.

Zur Seite 339.

P. obliqua Suter. Nach der von Schauer in der *Regensburger* Zeitung gegebenen Auseinandersetzung wäre diese Kiefer nichts anderes, als die vollständig entwickelte baumartige Form der *Pinus Pumilio* Haenke. Nachdem ich die Zapfen von *P. Pumilio* wiederholt beobachtet habe, finde ich allerdings keine wesentlichen und constanten Unterschiede von denen der *P. obliqua*, welche letztere nur gewöhnlich grösser sind und theilweise mehr dickwulstige Ränder der Schuppen zeigen. Blätter, Rinde und Holz sind bei beiden genau übereinstimmend. Bei dem Mangel aber an hinreichenden Unterscheidungs-Kennzeichen und in Betracht dass beide Formen ein und denselben Wohnsitz haben, da auch *P. Pumilio* eigentlich Moorsümpfe bewohnt, dass ferner *P. obliqua* bisher nur an Gebirgen beobachtet worden ist, muss ich dieser Ansicht beipflichten, wenn es mir gleich noch nicht geglückt ist, den wirklichen Uebergang der einen in die andere wahrzunehmen. Im Uebrigen verweise ich auf die angeführte Abhandlung.

Zur Seite 342.

Ceratophyllum demersum L. *Starrer Igellock*. Die Bltt. gabelig-getheilt in 3-4 Endzipfel ausgehend, am Rücken stachelig-gezähnt, starr, die oberen Wirtel genähert und bogenförmig-gegeneinandergeneigt; die Nüsse länglich-eiförmig schwach-zusammengedrückt, von dem stehenbleibenden verdickten dornförmigen Griffel gekrönt, am Grunde auf jeder Fläche mit einem ähnlichen niedergebogenen Dorne.

β . *platyacanthum*. Die Nuss mit flügelig-gezähntem, mitten beiderseits in einen niedergebogenen zusammengedrückten Dorn verlängertem Bande und zwei kurzen stumpfen Dornen auf den Flächen über der Mitte. *C. platyacanthum* Chamisso *Linnaea* 1829. *Reichenb. Fl. Exc. Germ. Koch Syn.*

In stehenden und langsam fliessenden Gewässern der Ebene und des Vorgebirges gemein, aber nicht häufig mit Blüthe und Frucht. β um Br. in Lachen vor Grüneiche. Juli—Sept. 2.

Die Gestalt der Früchte ist veränderlich, daher wird man die unter β angeführte Form, welche mit der Beschreibung von *C. platyacanthum* Cham. ziemlich übereinkommt, nicht als Art davon trennen können, da sie übrigens vollkommen mit der gewöhnlichen übereinstimmt. Blüthen und Früchte werden meistens nur an Exemplaren mit lockeren Blattwirteln und in reinem Wasser, wo weder Schlamm- noch Algenüberzug die Pflanze bekleidet, gefunden. Die Blüthenhülle ist bei den Staubgefässblumen und Stempelblumen ganz gleichförmig und besteht aus einer kurzen kreiselförmigen Röhre und einem in 9-10 linealische, an der Spitze gezähnte Zipfel getheilten Saume.

Ceratophyllum submersum L. *Weicher Igellock*. Die Bltt. gabelig-getheilt in 5-8 Endzipfel ausgehend, welche fein und entfernt stachelig-gezähnt sind, die oberen Wirtel genähert und

einseitwendig; die Nüsse rundlich-eifg., zusammengedrückt, von dem stehenbleibenden verdickten dornförmigen Griffel gekrönt.

In stehenden Wässern. Diese seltne Art entdeckte ich mit Blumen und Früchten in einigen Lachen vor *Kleinburg bei Br. Aug. 2*.

Die Blattspitzen dieser Art, welche häufig eine röthliche Färbung hat, sind viel feiner als an der vorigen und mit seichterem und entfernteren Dornzähnen besetzt. Die Blumenhülle wie bei jener, an der Spitze dreizählig, indem die Seitenspitzen in feine Haarspitzen ausgehen. Die Früchte sind breiter, etwas mehr zusammengedrückt, von braungrüner Farbe mit feinschuppiger Oberhaut und bisweilen feinkörniger Oberfläche; auch der Rand ist bisweilen etwas breiter und dann schwach-ausgeschweift. Der stehenbleibende Griffel ist gekrümmt und kürzer als bei jener, meist die Länge der Frucht nicht erreichend. Die Staubbeutel, 8—16, genau wie bei der vorigen Art, oben mit zwei Spitzen und einer Vertiefung, mit einer fettig-glänzenden weiss-röthlichen Oberhaut; der Blumenstaub tetraedrisch.

Zur Seite 344.

Lemna minor — Diese Art fand *Wichura* zahlreich blühend im Sommer 1841 in Lachen bei *Carlowitz*.

Zur Seite 345.

Potamogeton rufescens Schr. — Auch in stehendem Wasser, das jedoch Abfluss hat, in den Sitten bei *Oberrnigk* nahe am Bade.

Zur Seite 355.

Zeile 12 v. u. nach parasitisch setze hinzu: die unsrigen theils auf Wiesen, Waldwiesen oder Triften wie die Arten von *Orchis*, theils in Wäldern, letztere

Zur Seite 360.

Orchis angustifolia. — Nach der neuesten Ansicht von *Fries* wäre nun unsere schles. *O. angustifolia* die wahre *O. incarnata* *Linnaei*, und von dieser und der *O. latifolia* (*majalis* *Reichenb.*) die *O. angustifolia* *Reichenb.*, *O. Traunsteineri* *Saut.* und *Koch* Syn. zu unterscheiden, welche Art bei uns noch nicht aufgefunden worden ist. Siehe *Fries* *Mant. III. 127*.

Zur Seite 361.

Coeloglossum *Hartman*. Diese Sippe hatte ich *Chlororchis* genannt. Zeitig genug erfuhr ich, dass dieselbe von *Hartman* bereits jenen Namen erhalten habe, um denselben an die Stelle zu setzen. Auch *Lindley* hat einer Orchideen-Sippe den Namen *Coeloglossum* gegeben (nr. 1520 bei *Endlicher* *Genn.*), allein der *Hartmansche* Name hat die Priorität. Bei *Endlicher* gehören *Coeloglossum viride* und *albidum* *Hartman* unter die Sippe *Peristylus* *Blume*.

Zur Seite 367.

Cypripedium Calceolus. Zweiter Standort auf unserem Gebiet: An Hügeln bei *Bielitz*, von *Kotschy* mitgetheilt.

Zur Seite 368.

Zu den Diagnosen der *Gladiolus*-Arten ist hinzuzusetzen;

G. communis. Die Faserhaut der Wurzelknollen besteht aus netzartig zu Maschen verbundenen Fasern.

G. imbricatus. Die Faserhaut der Wurzelknollen besteht aus dichten, parallelen Längsfasern.

Zur Seite 369.

Iris bohémica. — Nach Schauer in Regensb. Bot. Zeitg. 1843. Nr. 31. ist diese Art die *I. biflora* L., und eine zweite von demselben am *Georgenberge bei Striegau* gefundene Art die wahre *I. nudicaulis* Lamarck. Die von demselben daselbst gegebenen Diagnosen lauten:

I. biflora L. Bltt. schwerdtförmig, langspitzig, seegrün, so lang als der Blüthenstängel, bei der Fruchtreife länger, die äusseren sichelförmig; der Stängel 2-3spaltig, der unterste Ast fast grundständig; die Blumenscheiden krautartig-häutig oben trocken werdend, grün-violett, bauchig, so lang als die Röhre der Blumenhülle; Blumen kurz-gestielt; die äusseren Zipfel der Blumenhülle zurückgefaltet, länglich-spathelfg.; die inneren einwärts-gekrümmt, an den Spitzen zusammengerollt, länglich, oben wellig-, unten faltig-runzelig, am Rande und an der Spitze fein-gezähnt; der Fruchtknoten länglich stielrund, fast sechseckig.

I. nudicaulis Lam. Bltt. schwerdtfg., kurzspitzig, fast grün so lang als der blühentragende Stängel, bei der Fruchtreife doppelt so lang, die äusseren sichelfg., Stängel 2-3spaltig, der unterste Ast unter der Mitte oder nahe dem Grunde entspringend; die Blumenscheiden krautig, grün, bauchig-aufgeblasen, länger als die Röhre der Blumenhülle; die Blumen deutlich gestielt; die äusseren Zipfel der Blumenhülle zurückgekrümmt-abstehend, keilförmig mit stumpfer fast dreieckiger Spitze; die inneren aufrecht, zusammengeneigt, oval, wellig mit wellenförmigem Rande, an der Spitze fein gezähnt; der Fruchtknoten dreikantig.

Zur Seite 380.

A. carinatum. — Die dort zweifelhaft vorgetragene Pflanze habe ich seitdem in Grabowskis Sammlung untersucht, woraus sich deren Unterschied von *A. oleraceum* deutlich herausstellte. Die Blätter sind unterseits seicht gerillt, mit scharfen Rändern; die Staubgefässe $\frac{1}{2}$ -mal so lang als die Blumenhülle; die Bltt. der Blumenhülle verkehrt-eiförmig, gestutzt mit einer Ausrandung, rosa- oder fleisch-farben. Diese Art nennt Fries Nov. 2. p. 86 und M. und Koch *Allium carinatum*, dagegen Koch Syn. p. 720. *A. flexum* Waldst. und Kit.; so auch Grab. Fl. v. Oberschl. p. 306. Das Zeichen $\times$ ist nunmehr zu entfernen. Diese Art wächst um *Cudowa*, und ist vielleicht der Vorgebirgsgegend eigenthümlich.

A. descendens bei Koch Syn. p. 719 von *Gnadenfeld in Schlesien* aufgeführt, sah ich bisher nicht lebend. Die getrockneten

Exemplare, welche ich in Grabowskis Sammlung sah, schienen mir eine Form des *A. arenarium* zu sein, mit zwiebellosen Dolden, als welche sie denn auch Grab. in der Fl. v. Oberschl. p. 97 aufführt.

Zur Seite 385.

Z. 7. v. u. setze hinzu nach Querwänden: aussen glatt;

Zur Seite 386.

Z. 8. v. o. setze hinzu nach Querwänden: der Länge nach fein gerillt. — Zu den Synonymen der *I. atratus* gehört noch: *I. sylvaticus* β *macrocephalus* Koch Syn., doch erkennt Koch im Taschenbuche d. D. Fl. den *I. atratus* jetzt als eigene Art an. Er wächst besonders häufig an Stellen, die zeitweilig durch Grundwasser unter Wasser stehen, auch um *Carlowitz, Margareth.*

Zur Seite 386.

I. alpinus. Auch um *Carlowitz*; in Oberschl. auf Hutungen bei *Prziwor* und in Sümpfen bei *Königshuld und Trzenzin.*

Zur Seite 387.

I. Tenageia Ehrh. Halm beblättert; Bltt. borstlich, am Grinnenförmig; Aeste der Spirre verlängert, zweispaltig, etwas abstehend; Blumen einzeln, entfernt; Blättchen der Blumenhülle eilanzettlich, spitz, mit einer Stachelspitze, etwas länger als die rundliche Kapsel.

Auf feuchten, sandigen Plätzen. Um *Cosel* am Fusssteige nach *Redschütz* von *Wersch* entdeckt. Juni, Juli. ☉.

Diese Art sieht dem *I. bufonius* ziemlich ähnlich, nur feiner und schlanker, und ist an den sehr stumpfen und braunglänzenden Kapseln sogleich zu unterscheiden. Siehe Grab. Fl. v. Oberschl. p. 102. Ich sah Exemplare in Grabowskis Sammlung.

Zur Seite 403.

C. stricta. — Fries in *Mant. 3. p. 150* bemerkt, dass diese Art ein ausgezeichnetes Kennzeichen habe: die Boden der Früchte schwellen an der Spindel auf und fließen in verdickte Ringe zusammen, welche spiralg die Spindel umgeben; daher erscheinen die Früchte gedrängt und in acht Reihen dachziegelförmig. Uebrigens sind die Früchte vielnervig. — Uebrigens hält Gay die *C. stricta* Good. für die wahre Linnaeische *C. caespitosa.*

C. vulgaris (nigra Linn. Lapp. n. 330.) Fries *Mant. 3. p. 153.* Ein bis drei staubgefässtragende Aehrchen an der Spitze, mehrere genäherte stempeltragende; die Deckbltt. blattartig mit sehr kleinen Oehrchen; zwei Narben; Früchte beinahe sitzend, ausdauernd, rundlich-elliptisch, vielnervig, beiderseits stumpf, mit kurzem, ganzrandigem Schnabel, aussen convex, innen flach, länger als die stumpfen Schuppen; Halm scharfleckig; Bltt. schwach gehöhlt, fast eben; Blattscheiden häutig ungetheilt.

Hierher gehört *C. caespitosa* fast aller neuen, besonders deutscher Autoren, W. et Grab. *Sil., Wimm. Fl. v. Schles. 1832 und 1840.*

nebst β , aber nicht γ ; welcher Irrthum bereits von Gay bemerkt worden war.

Die obige Diagnose ist nach Fries. Diese Art ist leicht die ~~ganze~~ unter allen Carexarten; sie wächst allerdings nicht vorzugsweise in Rasen, ja oft einzeln; die steifen Halme sind gewöhnlich schwach-gekrümmt. Die Gestalt der Frucht unterscheidet diese und die folgende Art hinreichend.

C. caespitosa Linn. nach Fries, (nicht Wimm. Floren Schlesiens.) Eine staubgefässtragende Aehre, 2-3 genäherte Aehren mit Stempelblumen; Deckbltt. geöhrt mit grannenförmiger Spitze oder abgestutzt; zwei Narben; Früchte sitzend, nicht sehr dicht, abfall-eiförmig, ohne Nerven, beiderseits convex, mit kurzem, ungetheiltem Schnabel, so lang als die lanzettlichen Schuppen; Halm scharf, fast blattlos, schwach; Bltt. zweikielig, am Rande umgebogen, flatterig, die Scheiden am Rande netzfaserig.

C. pacifica Drey. Hafn. *C. Dreyeri* Lang.

C. caespitosa β *gracilis* Wimm. et Grab. Sil. — γ *gracilis* W. Fl. v. Schl. 1840.

Auf sumpfigen Wiesen. Mit Gewissheit nur am Fusse des *Geiersberges*. Mai, Juni 2.

Diese Art hatte ich bisher, ohne sie näher zu untersuchen, als eine schlanke Form unserer *C. caespitosa* (=vulgaris Fries) aufbewahrt, die Vergleichung mit sächsischen Exemplaren der *C. pacifica* von G. Reichenbach und mit der exacten Beschreibung von Fries s. a. O. liess keinen Zweifel über diese Form. Sie wächst in dichtem, grossen Rasen, ganz wie *C. stricta*, hat aber viel schmalere Bltt. und dünnere schlaife übergeneigte Halme, fast wie *C. acuta*; die sterilen Büschel bilden ein dichtes Polster, dessen Bltt. umgebogen sind und niederliegen. Die Halme sind schlank, fast blattlos, am Gr. mit einigen gestutzten Blattscheiden, aus denen ein kurzes Blatt entsteht. Die Bltt. der sterilen Büschel sehr lang, schmal und weich. Die unteren Blattscheiden sind am Rande in ein schwaches Fasernetz aufgelöst wie an *C. stricta*. Von den Früchten kommen viele nicht zur Entwicklung. — Von der Fries'schen Beschreibung passt fast jedes Wort auf unsere Pflanze. Ueber die Nomenclatur und Synonymik ist die vollständige Auseinandersetzung bei Fries zu vergleichen.

C. longifolia Host. Eine Aehre mit Staubgefäsblumen, 1-3 genäherte, länglich-eiförmige mit Stempelblumen, die unterste kurzgestielt; die Deckbltt. am Rande häutig, umfassend, die unterste scheidig; 3 Narben; die Nüsschen verkehrt-eifg., dreikantig, kurz geschnäbelt, ausgerandet, feinhaarig; die Schuppen vom auslaufenden Nerven stachelspitzig; Halme aufrecht; Wurzel faserig rasenbildend.

In Wäldern. Vor vielen Jahren mit Schummel in den Wäldern am Rummelsberge gesammelt, aber mit *C. praecox* vereinigt, neuerdings von Wichura bei *Riemberg* beobachtet und unterschieden. Mai. 2.

Unterscheidet sich von *C. praecox* durch höheren schlanken Wuchs, sehr lange Bltt. und die faserige Wurzel.

Zur Seite 426.

C. vaginata. Das Synonym „*C. subspathacea* Wormsk.“ ist zu streichen, da dieser Name einer anderen nordischen Art zukommt; siehe Fries Mant. 3. p. 148.

Zur Seite 429.

Festuca duriuscula & *glauca*. — Diese Form hält Fries für eigene, und von den graugrünen Formen der *F. duriuscula* — wie dergleichen auch von den verwandten vorkommen — verschiedene Art, welche sich besonders durch die eigene Weise des Wachstums, kleine und völlig von einander gesonderte Rasen, welche von breiten, trockenhäutigen Schuppen umhüllt sind, charakterisirt. Allerdings kommt diese Form in ihrer entschiedensten Gestalt immer nur im lockeren Sande, besonders aufgeworfener Sandhügel vor und zeichnet sich auch durch eine eigene Tracht der Blüthen aus; sonst schrieb ich diese Eigenthümlichkeiten dem Einfluss des Bodens zu. Vielleicht ist sie indess doch wirklich verschieden.

Zur Seite 429.

F. heterophylla Lam. — Diese, wie ich nunmehr glaube, durchaus selbstständige Art, fand sich auch auf der Wiese unterhalb des kleinen Teiches im *Riesengebirge* auf einem trocknen und mageren Grasplatze. Auch die ehemals um *Leobschütz* gesammelten Exemplare, welche Schramm für die Schles. Centurien mittheilte, gehören wahrscheinlich hierher. Nach Fries Mant. III. würde diese Art mit dem Namen *F. dumetorum* L. zu bezeichnen sein.

Cryptogamae.

Cryptogamae.

Gewächse ohne sichtbare oder deutliche Befruchtungsorgane.
Die embryosen Sporen liegen in Sporenbehältern.

Protophyta.

Mehr oder minder deutliche Gefässbündel. Freie Sporen in ein- oder mehrfächerigen Sporenbehältern. — Linné's erste Ordnung der Cryptogamae, Filices bei ihm genannt. — Nach der Beschaffenheit der Vegetationsorgane und der Stellung und Gestalt der Früchte zerfällt diese Abtheilung in vier Ordnungen.

Equisetaceae. Blattlose gegliederte Stängel mit eingeschleierten Gliedern tragen an der Spitze eine Fruchtlähre.

Filices. Beltaubte Wedel, vor der Entwicklung schneckenförmig gerollt. Einfächerige Sporenbehälter sitzen auf den Adern des Laubes in unbedeckten oder mit einer schuppenförmigen Haut bedeckten Häufchen.

Lycopodinae. Beblätterter Stamm mit einfachen Blättern, in deren Winkeln Sporenbehälter, welche in Klappen aufspringen und Sporen von zweierlei Gestalt enthalten.

Hydropterides (Rhizocarpae). Blätter und Stängel gesondert. Die Sporenbehälter am Grunde der Blätter, welche Keimorgane von zweierlei Gestalt enthalten.

Equisetaceae D. C., Schachtelhalme.

Der Fruchtstand an der Spitze des Stängels, oder der Aeste, oder eines besonderen, von den krautigen Stängeln verschiedenen Schaftes. Zahlreiche, schuppenförmige, schildförmig-gestielte, vieleckige, in einer zapfenförmigen Aehre stehende Fruchthalter. Je 6-7 häutige einfächerige Sporenbehälter, der unteren Seite des Fruchthalters angewachsen, die nach innen der Länge nach aufspringen. Zahlreiche

freie Sporen, welche auf zwei fadenförmigen, an den Spitzen keulenförmig-verdickten und körnigen Schleudern aufsitzen.

Landpflanzen, in feuchtem oder sumpfigem Grunde wachsend, mit einem unterirdischen, kriechenden Wurzelstocke. Rinde, gefurchte, steife, gegliederte, einfache oder wirtelig-ästige Stängel: die Glieder geschlossen und an der Spitze mit einem Quirl von Blättern, welche zu einer trockenhäutigen, gestutzten oder gezähnten Scheide verbunden sind; innen hohl, aussen gefurcht. Die Aeste wirtelförmig, aussen am Grunde der Scheiden entspringend, innen hohl. — Sie enthalten unter der Oberhaut viel Kiesel-erde. Viele gigantische Arten dieser Familie haben in früheren Erdperioden existirt, wovon noch fossile Ueberreste vorhanden sind; zumal gehört hierher die fossile Sippe *Calamites Suckow*. Jetzt nur noch eine Sippe.

Equisetum L. Schachtelhalm.

Fruchtbehälter auf der Unterseite schildförmig gestielter in einer endständigen, zapfenartigen Achse stehender Fruchthalter. Walzenförmige, gegliederte, röhrige Stängel, mit anliegenden, gezähnten Scheiden an den Spitzen der Glieder.

E. hyemale L. Wahrer Schachtelhalm. Polir-Sch. Stängel aufrecht, meist einfach, am Grunde aestig, sehr rauh; die Scheiden angedrückt, am Grunde und Rande schwärzlich.

nfeuchten und dunkeln Laubwäldern, Brüchen, der Ebene bis in das Vorgebirge. Um *Br. im Goi bei Kapsdorf* in Wäldern um *Oels und Bernstadt*, z. B. bei der *Waldmühle, um Vielgut*. Bei *Schleibitz* nach *Scholtz*. Um *Oppeln auf Bolko* und in den *Paschecken, um Cosel bei Suckowiz und Goberschau* nach *Grab*. Fructificirt im Juli und Aug. 2.

Diese Art ist charakterisirt durch die einfachen Stängel mit sehr rauher Oberfläche, wodurch sie zum Poliren des Holzes und weicher Metalle tauglich sind, ferner durch gestutzte, am Rande kerbzähnige Scheiden, von denen die oberste die Fruchtlöhre am Grunde umgibt und pfriemförmig zugespitzte Zähne hat.

E. arvense L. Acker-Schachtelhalm, Kannenkraut. Stängel von zweierlei Gestalt, die einen fruchttragend, schaftförmig, einfach, strohfarben, mit walzenförmigen, aufgeblasenen, trockenhäutigen, lanzettlich-gezähnten Scheiden; die anderen später erscheinend, unfruchtbar, aestig, an der Spitze nebst den Aesten vierkantig und etwas rauh.

Auf Aeckern, an Ackerrändern, auf Brachen und Triften, meist auf lehmigem und sandigem Grunde, hie und da in grosser Menge, über das ganze Gebiet in der Ebene verbreitet. Die fruchtbaren Stängel erscheinen im ersten Frühlinge, März und April, die unfruchtbaren nach dem Verwelken jener im Sommer. 2.

Die fruchttragenden Stängel sind aufrecht und verwelken nach der Ausstreuung der Samen. Die unfruchtbaren erscheinen nach ihnen, sind schwach graugrün, aufsteigend oder niederliegend, aestig, bisweilen sehr ausbreitet.

E. palustre L. Sumpf-Sch. Stängel gefurcht, kahl, meist ästig, bisweilen einfach, an der Spitze nebst den Aesten 4-5kantig;

die Scheiden röhrig und etwas locker, auch röhrig-glockig; mit lanzettlichen spitzigen Zähnen.

Auf sumpfigen Wiesen und Triften, auf nassen Sandplätzen, an den Rändern von Gräben und Gewässern, zwischen hohem Grase und Schilfe, in sumpfigen Wäldern, gemein durch das ganze Gebiet bis in das Vorgebirge. Sommer-Herbst. 2.

Ist dem *E. hyemale* einigermassen ähnlich. Der Stängel ist tief gefurcht, die Zahl der Furchen veränderlich. Die Scheiden sind an Hauptstängeln walzenförmig, ziemlich locker, an den Aesten röhrig-glockig; bei jenen sind die Zähne schwärzlich, bei diesen grünlich mit wasserhellem trockenhäutigem Bande, an Zahl veränderlich. Erscheint in verschiedenen Formen, bald ganz einfach, bald vom Grunde an aestig, die Aeste wiederum ästig; bald ein Hauptstängel oben mit zahlreichen feinen Aesten. Die Aeste tragen bald alle, bald einige Aehren; bisweilen sind sie sämmtlich und auch wohl der Hauptstamm unfruchtbar. Auf Wiesen, wo sie mit der Heuernte alljährlich abgeschnitten werden, erscheinen die vielästigen und vieljährigen Formen gewöhnlich.

E. limosum L. Schlamm-S. Katzezahl. Stängel ohne oder mit einfachen kurzen Aesten, glatt, gestreift, röhrig; die Scheiden anliegend, raschelnd, mit vielen pfriemförmigen, spitzigen oben schwärzlichen Zähnen.

In stillstehenden Wässern der Ebene, tiefen Gräben, Wiesen- und Waldsümpfen, Weihern und Teichen, gemein. Mai, Juli. 2.

Ausgezeichnet durch die starken, steif-aufrechten, glatten und fettig anzufühlenden, ganz hohlen, oft ganz astlosen, oder nach oben mit kurzen, fünfkantigen Aesten meist zu 12 versehenen, Stängel. Die Fruchtlöhre oval. Wächst meist dicht geschaart, zwischen Schilf und *Glyceria spectabilis*.

E. Telmateja Ehrh. Grosser S. Stängel von zweierlei Gestalt, die einen fruchttugend, einfach, schafftförmig, röthlich, mit grossen, nach oben offenen, weisshäutigen Scheiden, mit braunen, langen, grannenförmigen Zähnen und mit langer, walzenförmiger, lockerer Fruchtlöhre; die anderen unfruchtbar, röhrig, weisslich, mit acht schwärzlichen Riefen, langen fädlichen und scharflichen Aesten, tutenförmigen Scheiden mit pfriemlich-grannenförmigen Zähnen.

In Waldsümpfen der Vorgebirgsgegend und der oberschlesischen Hochebene. Um *Reinerz* von Reumer, am *Jägerhause* bei *Oberweichsel* nächst *Ustron* von mir, zw. *Oppeln* und *Grudschütz* von *Grabowski*, auf Aeckern um *Goleschau* bei *Ustron* von *Kotschy*, um um *Teschen* bei *Koppiz* und *Zuckan* von *Reissek* gefunden. Im Frühling.

Diese Art ist durch die grossen, meist über Zoll langen, in der Mitte etwas dickeren, sonst walzigen Fruchtlöhren, deren Stängel unten dicht von den grossen Scheiden bekleidet sind, und durch die Elfenbeinfarbe der unfruchtbaren starken Stängel, so wie durch die feinspitzigen grannenartigen Zähne der Scheiden leicht zu erkennen, Ob *E. fluviatile* L. dieselbe Art sei, ist noch zweifelhaft.

E. sylvaticum L. Wald-S. Stängel doppelt-aestig, gelblich-weiss, vielfurchig, scharflich; mit vierkantigen, zuerst im Bogen niedersteigenden, dann abstehend-ausgebreiteten Aesten, etwas lockeren, oben braun-trockenhäutigen, in eilanzettliche Zipfel getheilten Scheiden; die Aeste dreikantig, mit feinspitzigen Scheiden.

An feuchten und tiefschattigen Waldplätzen, oft zwischen Sumpfmooß, an moosigen Waldbächen in der Ebene bis ins Hochgebirge häufig. April, Mai, im Gebirge später.

Diese Art mit fruchtbaren und unfruchtbaren Stängeln ist durch die anfangs nach unten bogenförmigen Aeste kenntlich, welche stets wieder feinere Aeste tragen. Die Zipfel der braunen Scheiden sind unregelmässig, ohne Grannenspitze. Die Fruchtlähre elliptisch. Oft bedeckt diese Art moosige dunkle Waldplätze in grosser Menge und giebt solchen Stellen ein eigenthümliches Ansehen. Die älteren unfruchtbaren Stängel sind durch die feinen und langen zierlich gestellten Aeste ausgezeichnet.

E. pratense Ehrh. Wiesen-Sch. Der unfruchtbare Stängel einfach aestig, der fruchttragende einfach, später ästig, fein-gerillt, schärflich; die Aeste dreikantig, niedergebogen und zurückgeschlagen, die oberen abstehend, die Scheiden tutenförmig, mit zwölf pfriemlichen Zähnen, die der Aeste mit lanzettlichen Zähnen.

Diese Art wächst auf trocknen Waldwiesen, und wurde von uns in Schlesien bisher mit Sicherheit *an der alten Oder bei Leerbeutel* und um *Freschen* beobachtet.

Der vorigen ähnlich, aber durch einfache kürzere Aeste und den durchaus abweichenden Bau der Scheiden verschieden. Diese sind weissgrünlich, in 12-13 lanzettliche, gleichmässige Zähne mit braunen oder schwärzlichen Nerven und weisslichem trockenem Hautrande gespalten.

Filices L., Farnkräuter.

Der Stamm liegt unter der Erde, und bildet einen horizontalen oder schiefabsteigenden mit den stehengebliebenen Basen der Blatt- oder Wedelstiele verwachsenen Stock. Die Blätter stehen zerstreut oder an der Spitze des Stockes rosettenförmig, sind bei der Entwicklung schneckenförmig eingerollt, einfach oder gefiedert, mit Adern, die aus verlängerten Zellen bestehen. Die Fruchthälter stehen auf dem Rücken oder am Rande der Blätter auf den Adern in Häufchen, welche entweder nackt, oder mit einer Haut (Schleier) oder von dem umgeschlagenen Rande des Blattes bedeckt sind, gestielt oder sitzend. Zahlreiche, freie kugelige oder eckige Keimkörner (Sporen). — Der Stamm der Farn, welcher bei den unserigen unterirdisch, bei den tropischen und vielen fossilen baumartig ist, enthält einen geschlossenen Ring von Gefässbündeln. Sie wachsen in feuchten schattigen Orten der Wälder, besonders der Gebirge und in Ritzen der Felsen und Mauern. Sie zerfallen in drei Unterordnungen: a. Polypodiaceae. Die Fruchtkapseln sitzen auf der Unterseite des Laubes, sind von einem Ringe umgeben, und springen quer auf. b. Osmundaceae. Die Fruchtkapseln sitzen auf der Unterseite des zusammengezogenen Laubes und bilden eine Aehre; sie haben einen unvollständigen Ring und springen an der Spitze auf. c. Ophioglosseae. Die Fruchtkapseln bilden eine Aehre, sind ohne Ring, und öffnen sich in zwei Halbklaappen.

a) Polypodiaceae.

Allosorus Bernhardi.

Die Fruchthälter sitzen auf den Nebenadern schief gegen die Mittelrippe, in linienförmigen oder rundlichen Häufchen. Der umgeschlagene Rand des Laubes bildet einen Schleier.

A. crispus Bernh. Pteris crispa L.

Im hohen Gebirge in den Ritzen und Fugen der Felsen und Felsblöcke. Bisher nur im *Riesengebirge, in den Schneegruben und im Riesengrunde* an den Abhängen des *Brunnenberges*. Sommer und Herbst.

Wächst rasenförmig mit langen faserigen Wurzeln, die nebst dem unteren Theile der Stiele in den Fugen der Steine und Felsen verborgen sind. Das Laub ist von zweierlei Gestalt, die äusseren Blätter des Rasens unfruchtbar, auf kürzeren Stielen mit breiten platten Zipfeln der Blattfläche, die inneren fruchttragenden sind höher auf längeren Stielen, mit zusammengesetzten schmälern Zipfeln: sämtlich doppelt-gesiedet; die der unfruchtbaren mit rhomboidal-rundlichen, am Grunde keilförmigen, fiederspaltigen und an den Spitzen gezähnten Zipfeln; die der fruchtbaren mit zungenförmigen Zipfeln. Sie sind freudig-grün, von zarter und brüchiger Consistenz. Höhe $\frac{1}{2}$ –1'. Das Laub gleicht dem von *Asplenium Ruta muraria*.

Polypodium L. Engelsüss.

Die Fruchthälter sitzen auf den Adern in rundlichen zerstreuten oder reihenweise stehenden Häufchen und sind unbedeckt.

P. vulgare Engelsüss. Das Laub buchtig-fiederspaltig mit länglichen oder länglich-lanzettlichen Zipfeln; zweireihige Häufchen; kriechender Wurzelstock.

In Laub- und Nadelwäldern, an dunkeln; nicht gar feuchten Stellen schattiger Hohlwege, in Ritzen von Felsen und alten Mauern. Um *Br. bei Lissa, im Glimcher Walde bei Skarsine*. Im Vorgebirge am *Zobten, an der Eule, um Charlottenbrunn u. s. w.* Um *Sprottau im Nonnenbusche* (Goeppert) *Auf den Vorbergen des Riesengebirges* hie und da, z. B. oberhalb *Giersdorf* (Scholtz). In Oberschlesien um *Oppeln, Ratibor, Cosel, am Annaberge und im Gesenke*. Herbst.

Der Wurzelstock horizontal oder etwas schief absteigend, fast walzig, mit braunrothen häutigen Schuppen besetzt. Die Wedel länglich auf glatten, aufrechten oder aufsteigenden strohgelben Stielen, buchtig-fiederspaltig, oder tief-fiederspaltig, mit länglich-lanzettlichen, gegen die Spitze unregelmässig gekerbten Zipfeln, von denen die obersten oft in eine lanzettliche Spitze zusammenfliessen. Auf deren Unterseite stehen beiderseits der Mittelrippe die grossen goldbraunen Häufchen. — Die Wurzel ist süsslich und war ehemals als *Radix Polypodii officinell*.

P. Phegopteris L. Das Laub doppelt-fiederspaltig, die beiden untersten Fiedern niedergebogen, die Zipfel lineal-lanzettlich, gewinpert; die Fruchthäufchen gesondert, nahe am Rande sitzend.

An feuchten Waldplätzen des ganzen Vorgebirges und in der

Waldregion des Hochgebirges, gesellschaftlich. Zunächst am *Zobtenberge und Rummelsberge*. In Oberschl. um *Proskau, am Anaberger, Wronin bei Cosel*. Sommer.

Stiele und Adern der Unterseite nebst dem Bande der Blätter mit weissen Spreuhaaren besetzt. Das Laub dreieckig, oben in eine lange feine Spitze vorgezogen; die Fiedern lanzettlich, fiederspaltig, mit länglichen stumpfen, ganzrandigen Zipfeln. Der Stiel ist da, wo das Laub ansitzt, unterseits mit braunen Spreuschuppen besetzt. Das Rhizom ist verzweigt und kriechend. Farbe dunkelgrün. Höhe $\frac{1}{2}$ —1'.

P. Dryopteris L. Das Laub gedreit-doppelt-fiederspaltig, im Umfange breit-dreieckig; die Zipfel länglich, die unteren gekerbt; die Fruchthäufchen am Rande sitzend.

In feuchten Waldungen, zumal von Fichten und Tannen in der höheren Ebene, dem Vorgebirge bis in das Hochgebirge, meist gesellschaftlich und oft mit dem vorigen. Um *Br. im Glaucher Walde bei Skarsine*. Sommer.

Die gedreiten Wedel zeichnen diese zierliche Art aus. Das Laub ist ganz kahl und freundig-grün. Die Stiele kahl, nur nach unten mit einzelnen Spreuschuppen. Das Rhizom schwärzlich, weit kriechend und aestig, von der Dicke einer Babenfeder.

P. alpestris Hoppe. Das Laub doppelt-gefiedert, länglich, die Fiedern breit lanzettlich, die Fiederchen länglich mit eiförmig-länglichen gesägten Zipfeln; die Fruchthäufchen in den Winkeln der Zipfel.

In den feuchten Waldungen und den schattigen Lehnen der Waldregion des Hochgebirges bis in die Region des Knieholzes. Auf dem Riesengebirge und am ganzen Kamme des Gesenkes. Sommer.

Diese Art, deren Laub sich durch dunkles Grün und zarte Consistenz auszeichnet, gleicht im äusseren Ansehen dem *Aspidium Filix femina*, von welcher sie sich durch den Mangel der Schleierchen leicht unterscheiden lässt; sie scheint im Gebirge überall da einzutreten, wo jene Art aufhört und erfüllt oft grosse Strecken in Wäldern und steinigen Lehnen. Die Stiele sind oberseits platt und rinnig, am Grunde mit braunen Spreuschuppen besetzt.

Pteris L. Flügelfarn.

Die Fruchthälter sitzen am Rande in einer zusammenhängenden Reihe auf einem nervenförmigen Fruchtboden und sind von einem aus dem Laubrande entspringenden nach innen geöffneten Schleierchen bedeckt.

P. aquilina L. Adlerfarn. Das Laub dreitheilig, die Aeste doppelt gefiedert, die Fiedern breit-lanzettlich, die Fiederchen länglich.

In Heiden, trocknen Birken- und Kieferwäldern, auf Haide-Hügeln und selbst an Ackerrändern in steinigen und etwas sandigen Gegenden der Hügelregion und des Vorgebirges, durch das ganze Gebiet bis in das Hochgebirge. Um *Breslau bei Lissa, Skarsine*. Herbst.

Höhe bis 4'. Hohe steife Stängel mit ausgebreitetem, mehr oder minder zusammengesetztem Laube, stets dreitheilig, mit fast gegenständigen Aesten. Das Laub ist dick, fast lederartig; die Fiederchen und Zipfel ganzrandig, ein wenig spitz. An grossen Exemplaren sind die Stängel unten fingersdick und im Querschnitt zeigen die

Gefässbündel die Zeichnung eines Doppeladlers. In trocknen Wäldern sieht man oft die ganze Unterseite des Laubes mit einem Pilze in Gestalt regelmässiger, länglicher, schwarzer Striche bedeckt: *Dothidea Pteridis*. Die Wurzel, welche tief in der Erde kriecht, war ehemals officinell.

Blechnum L. Ribbenfarn.

Die Fruchthälter bilden je zwei linienförmige Häufchen längs der Mittelrippe und sind von trockenhäutigen gewölbten gegen die Rippe hin offenen Schleierchen bedeckt.

B. Spicant Roth. *Osmunda Sp. L. Blechnum boreale Swartz.* Die Wedel länglich; die unfruchtbaren fiederspaltig, die fruchtbaren wechselständig-gefiedert.

In schattigen, moosigen und steinigen Wäldern des höheren Vorgebirges und der Waldregion des Hochgebirges, im ganzen Zuge der Sudeten und des Teschnischen Gebirges. Sommer und Herbst.

Ein dichter, mit braunhäutigen Schuppen umhüllter Wurzelstock treibt einen Rasen von Wedeln, von denen die äusseren unfruchtbar, kürzer $\frac{1}{2}$ —1' hoch, hellbraun und strohgelb, bis gegen den Grund belaubt, die inneren fruchtbar, bis 2' hoch, kastanienbraun und bis $\frac{2}{3}$ mit Laub bekleidet sind. Der Umriss der Bltt. ist länglich, nach oben und unten schmaler, kammförmig-fiederspaltig, die Zipfel lineal, schwach gebogen, ganzrandig, stumpf mit kurzer Spitze, die obersten zusammenfliessend, die untersten verkürzt, rundlich-trapezoidisch, kerbig. An den fruchtbaren Blättern sind die Zipfel zusammengezogen, schmal-lineal, von einander entfernt.

Struthiopteris Willd. Strausfarn.

Die Fruchthälter sitzen auf dem zusammengezogenen Rücken der inneren Wedel auf den schiefen Hauptadern der Mittelrippe in linealen Häufchen. Schleier zweifach; ein gemeinsamer aus dem umgeschlagenen Rande des Laubes; besondere in Form von Scheidewänden zwischen den Häufchen.

St. germanica W. *Osmunda Struthiopteris L.* Laub in korbformigen Rasen, zwifach; die äusseren Wedel unfruchtbar, doppelt fiederspaltig, mit länglichen Fiedern; die inneren fruchtbaren gefiedert, mit linealischen Fiedern.

An steinigen Flussufern im Vorgebirge. Bisher nur an dem Ufer der Weichsel bei *Ustron* und *Weichsel*, von *Kotschy* entdeckt, und in einigen Dörfern der *Oberlausitz*. Sommer und Herbst.

Die dichten Wurzelstöcke treiben lange kriechende Ausläufer. Die unfruchtbaren Wedel bilden einen trichterförmigen Korb, mit starkem, braungelbem, oberseits rinnenförmigem Stiel, im Umfange länglich, doppelt fiederspaltig: die Fiedern breit lineal, zugespitzt, die Zipfel eiförmig-länglich, vorn schief gestutzt und feinkerbig, die untersten dem Stiele anliegend und ihn theilweise bedeckend; bisweilen fliessen die Zipfel so zusammen, dass die Fieder grobkerbig oder buchtig-gekerbt erscheint. In der Mitte derselben erheben sich die steif aufrechten fruchtbaren Wedel zu 3—5, auf einen starken, unterseits abgerundeten, nach der Spitze hin kantigen, oberseits tief rinnigen hell braunen, 1—1 $\frac{1}{2}$ ' hohem Stiele. Die Fiedern sind stark zusammengezogen, nur noch anfänglich grünlich, später ganz braun und dicht von den Fruchthäufchen bedeckt. Das gemeinschaftliche Schleierchen reisst zuletzt in unregelmässige Fetzen.

Asplenium L. Streifenfarn.

Die Fruchthälter sitzen auf den Seitenadern in linealen Häufchen und werden von einem häutigen aus der Ader entspringenden gegen die Mittelrippe offenen Schleierchen bedeckt. — Niedrige, rasenförmig in Felsspalten wachsende Arten; deren Stiele unten braunschwarz gefärbt sind,

A. septentrionale. Acrostichum sept. L. Das Laub meist zweitheilig, die Zipfel schmal linealisch nach oben mit 2-3 spitzen Zähnen.

An Mauern und Felsen, im Vor- und Hochgebirge häufig. Sommer.

Wächst in dichten Basen, mit zahlreichen Wurzelfasern und von den stehenbleibenden braunschwarzen Resten der früheren Stängel umgeben. Die 4-8" langen Stiele gehen in das schmale Laub über, dessen Unterseite ausser den Spitzen von den Fruchthäufchen ganz bedeckt ist.

A. fissum Kit. Das Laub dreifach-gefiedert, die Fiedern keilförmig, dreispaltig; die Zipfel lineal-länglich gestutzt, zweispaltig oder ausgerandet.

An Felsen, bisher nur am Geiersberge am südwestlichen Abhange. Herbst.

Aus einem dicken Wurzelstocke mit zahlreichen Fasern entspringen viele $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ', hohe schwachgebogene Wedel mit unten kastanienbraunen oben grünen Stielen. Das Laub im Umfange dreieckig-länglich, dreifach-gefiedert, die Fiedern unten fiederspaltig, die mittleren dreispaltig, die oberen zusammenfließend; die Zipfel rhomboidal-länglich, ungleich-seicht-dreispaltig, mit zwei zweizähligen Seiten- und einem dreizähligen Endlappen. — Ob diese Art von der folgenden wirklich verschieden oder nur eine schmalblättrige höhere Abart derselben sei, ist uns noch ungewiss. Hierher gehört *A. multicaule* bei Scholtz Enum. Fil. Sil. und wahrscheinlich auch *A. germanicum* desselben. — *A. germanicum* Weis wird von Rabenhorst auf der Landkrone angegeben. Schlesische Exemplare desselben sah ich noch nicht.

A. Ruta muraria L. Mauerraute. Das Laub am Grunde doppelt, oben einfach gefiedert; die Abschnitte breit oder schmal rhombisch, 2-3spaltig, stumpf, nach vorn gezähnt, die Häufchen meist zusammenfließend.

An alten Mauern und Felsen. Um Br. an vielen alten Gemäuern, besd. der Kirchen. Sonst durch das ganze Gebiet. Sommer und Herbst.

Von 1-6" Höhe. Schmutzig-dunkelgrün; die Stiele grünlich. Die unteren Aeste meist mit drei Abschnitten, die mittleren dreitheilig oder dreispaltig, die oberen zusammenfließend; die Zipfel rhombisch, am Grunde keilförmig. Gewöhnlich ist die ganze Unterfläche von den Früchten bedeckt. Diese Art ändert in der Breite der Zipfel ein wenig ab, und war ehemals officinell.

A. Trichomanes L. Wiedertod, Frauenhaar. Das Laub gefiedert, die Fiedern abwechselnd rundlich-elliptisch, stumpf, vorn feinkerbig, am Grunde keilförmig; die Stiele hornig, kastanienbraun, glänzend.

In Hohlwegen, an schattigen, steilen Berglehnen, an Baumwurzeln, Felsen und alten Mauern in der Hügelerde der Ebene und im Vorgebirge. Um *Br. im Glaucher Walde bei Skarsine*. Uebrigens durch das ganze Gebiet. Sommer.

Bildet dichte Basen, aus denen bis 50 lineal-längliche Wedel und darüber entspringen. Die Stiele, deren Reste lange dauern, sind dunkel-kastanienbraun bis ins schwarze, oberseits rinnig, mit einer schmalen Haut an beiden Rändern. Die Fiederblättchen abwechselnd auf einem ganz kurzen Stielchen, von sattgrüner Farbe. War als *Herba Trichomanis officinell*.

A. viride L. Grünes Frauenhaar. Das Laub gefiedert, die Fiedern abwechselnd rundlich- und länglich-trapezoidisch, stumpf, kerbig-gezähnt, am Gr. ganzrandig; die Stiele grünlich, krautig, am Gr. purpurbraun.

An moosigen und waldigen Berglehnen und an Felswänden des Hochgebirges. Im *Riesengebirge*, im *Riesengrunde am Kiesberge u. im Rübzahlgarten*, in der *kleinen Schneegrube*. Im *Gesenke im gr. Kessel*. Sommer.

Diese Art ist kleiner als die vorige, mit der sie bisweilen zusammen wächst, durch das zartere, hellgrünere, stärker gezähnte Laub, und die grünen, nur am Grunde braunen Stiele sogleich von jener zu unterscheiden.

Scolopendrium Smith. Hirschzunge.

Die Fruchtbehälter sitzen auf den Schenkeln gabeliger Queradern in linienförmigen Haufen, deren je zwei aus zwei nebeneinanderliegenden Adern zusammenfließen und von zwei an einanderliegenden häutigen Schleiern bedeckt werden.

Sc. officinarum. Asplenium Scolop. L. Das Laub breit lineal-lanzettlich, am Gr. herzförmig, kahl, auf einem mit Spreu besetzten Stiele.

Zwischen Steinen im Hochgebirge. Von der *Babia Gora* von *Th. Kotschy* mitgetheilt. Sommer.

Der Stiel $\frac{1}{2}$ ' lang, das Laub lederartig, zungenförmig, ungetheilt, am Rande bisweilen schwach wellig. Die Seitenadern regelmässig, gabeltheilig; an den letzten Schenkeln sitzen die Fruchtbehälter in linealischen Querreihen, so dass je zwei Reihen der nächsten Adern sich vereinigen, über welche zwei Schleierchen, die in der Mitte zusammenfließen, gelegt sind.

Aspidium Swartz. Wurmfarn. Schildfarn.

Die Fruchtbehälter sitzen auf einem säulenförmigen Fruchtboden, welcher aus der angeschwollenen Spitze oder Mitte der Adern entspringt, in rundlichen oder länglichen Häufchen. Die Schleierchen rundlich, schildförmig, am Rande ringsherum frei. — Diese Sippe bildet nach Zahl der Arten und Häufigkeit der Individuen das Centrum der Farnkräuter. Wo sie in Menge wachsen, geben sie der Gegend ein eigenthümliches Ansehen. Die meisten wachsen rasenförmig und in ziemlicher Regelmässigkeit, indem die Wedel vom Boden aus schief und schwach gekrümmt nach oben einen trichterartigen Korb bilden. Das Rhizom besteht aus einem schiefen, ziemlich dicken Stöcke

der von den Resten der abgestorbenen Blattstiele bedeckt und mit deren Rasen verwachsen ist. Sie haben einen eigenthümlichen Geruch, und einige enthalten harzig-ölige, wurmtreibende Stoffe. In manchen Gegenden wird durch das Verbrennen derselben Pottasche gewonnen, wozu bei uns z. B. im Gesenke *Polypodium alpestre* dient.

a) das Schleierchen bleibt bei der Fruchtreife.

A. Lonchitis L. Das Laub länglich, einfach-gefiedert, die Fiedern länglich-lanzettlich, sichelförmig, am Gr. mit einem nach oben gerichteten Ohrzipfel, doppelt-dornig-gesägt; der Stiel mit Spreuschuppen; die Fruchthäufchen in zwei Reihen.

An waldigen Steinlehnen des Hochgebirges. Bisher nur am *Kiesberge im Riesengebirge*, und nach Grabowski im gr. Kessel des Gesenkes. Sommer.

Bildet kleine Basen; die Wedel von $\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ ' Höhe. Laub lederartig, oberseits dunkel, unterseits hellgrün mit zerstreuten, linealen braunen Spreublättchen, die später verschwinden.

A. aculeatum L. Das Laub lederartig, doppelt-gefiedert, die Fiedern lanzettlich lang-zugespitzt, die Fiederchen länglich-eiförmig, sichelförmig; mit granüger Spitze und begranneten Sägezähnen, am Gr. nach vorn mit einem ohrförmig verzogenem Zahne, das obere des unteren Paares grösser, der Stiel mit Spreuschuppen besetzt.

Auf waldigen und tiefschattigen Berglehnen, von der Hügelgegend der Ebene bis in das Hochgebirge. Um *Br. bei Skarsine*. Im Vorgebirge bei *Silberberg, Charlottenbrunn, an der Eule, Kiesberg im Riesengebirge, Gläzer Schneeberg*. Im Gesenke an der *Brünnelhaide*. Bei *Teschen* an der *kl. Czantory*. In Oberschlesien am *Annaberge* und im *Schillersdorfer Walde bei Ratibor*. Sommer.

Diese nebst der folgenden Art sind durch die Grannenapitzen an den Zähnen und besonders an der Spitze der Fiederchen ausgezeichnet. Die vorliegende hat ein mattgrünes, fast ins Graue ziehendes, fast lederartiges, auf der Oberseite kahles Laub; die Unterseite ist mit Spreuhaaren und die Spindel ziemlich dicht mit rostfarbenen Spreuschuppen besetzt. — Nach Rabenhorst und Scholtz kommt eine Form mit einfach gefiedertem Laube vor, woran nur die unteren Fiedern fiederspaltig sind: am Spitzberge bei Probsthayn, und an der Landkrone bei Görlitz.

A. angularis Kit. Das Laub doppelt gefiedert, die Fiedern länglich-lanzettlich, die Fiederchen länglich, tief sägezählig, mit begranneter Spitze und Zähnen, am Gr. nach vorn mit einem vorstehenden grösseren Zahne, der Stiel und die Spindel von Spreuhaaren wollig.

An waldigen und steinigen Berglehnen. Bisher nur an der *kleinen Czantory*, im Jahre 1825 von mir entdeckt, in Gesellschaft der vorhergehenden Art. Sommer.

Diese Art hat im Laube ganz denselben Zuschnitt, wie die vorhergehende, ist aber durch einige constante Merkmale von derselben verschieden. Das Laub ist in allen Verhältnissen breiter, die Fiedern weniger zugespitzt, von zwar satt-, aber doch freundgrüner Farbe, oberseits stets mit einigen Spreuhaaren besetzt, von weicherer Consistenz. Die Spreuschuppen am Stiel und der Spindel sind um vieles dichter. Die Fiederchen sind weniger sichelförmig, breiter, der Hinterrand bogig, der vordere gerade,

der untere grössere Zahn tritt weniger heraus. Da ich diese Art aus Ungarn und von Pirna bei Dresden genau mit unseren Exemplaren übereinstimmend sah, und sie auf der Czantory unter *A. aculeatum* wächst, auch alle Varietäten, die ich von letzterer Art sah nie einen Uebergang zu dieser Art zeigten, so halte ich das *A. angulare* für eine hinlänglich unterschiedene Art.

A. spinulosum Sw. Das Laub doppelt gefiedert, die Fiedern länglich-lanzettlich, die Fiederchen länglich, am Gr. herablaufend, fiederspaltig-ingeschnitten, die lineal-länglichen Zipfel vorn sägezähig, die Zähne sichelförmig, dornig begrannt, der Stiel stark, die Spindel schwach, mit Spreuschuppen besetzt.

In feuchten Waldungen und sumpfigen Wäldern, Erlensümpfen, der Ebene und des Vorgebirges bis an das Hochgebirge durch das ganze Gebiet verbreitet und häufig. Sommer.

Diese Art, welche fast von allen bis in die tieferen Gegenden auch des Oderthales herabsteigt, und in feinerer Zertheilung des Laubes den folgenden näher steht; von denen sie sich durch die dornigen Spitzen der Zähne d. i. die frei aus der Fläche her austretenden Enden der Adern unterscheidet, ist besonders kennlich durch die an den Nebenstielen seitlich herablaufenden Fiedern, wodurch bisweilen der Stiel wie geflügelt erscheint. Die Breite der Fiedern und ihre Zertheilung ist veränderlich, daher stehen sie bald entfernter, bald dichter; auch die Spitzen der Zähne variiren ein wenig in Länge. Die Fruchthäufchen stehen auf jedem Fiederblättchen zweireihig, bald der mittleren Rippe desselben näher, bald mehr gegen den Rand. Das Laub ist ziemlich weich, von dunkelgrüner Farbe; die Höhe von 1-3'. Manche unterscheiden hiervon *A. dilatatum* Sw. durch verbreiterte Stiele und mehr zusammengesetztes Laub, auch nackte Schleierehen, da *A. spinulosum* drüsige Schleierehen haben soll: wir konnten hier niemals zwei wirklich gesonderte Arten erkennen.

A. cristatum Sw. *Polypodium Callipteris* Ehrh. Das Laub länglich, gefiedert, die Fiedern entfernt aus eiförmigem Grunde dreieckig kürzer oder länger lanzettlich, tief fiederspaltig; die Zipfel länglich stumpf, die unteren eingeschnitten-, die oberen doppelt gesägt, die Zähne mit kurzen Dornspitzen.

In brüchigen und sumpfigen Wäldern um alte Erlenstöcke in der Ebene. Zuerst um *Garsuche bei Ohlau* von Beilschmied, dann an den *Winower Bergen u. b. Trenschin b. Oppeln* von Grabowski gefunden, nach diesem auch auf Wiesen bei *Reinschdorf bei Cosel*. Sommer.

Diese zierliche Art, welche von fern dem *A. Filix Mas* etwas ähnlich, aber durch die dreieckige Gestalt der mittleren Fiedern leicht kennlich ist, hat 1-2' Höhe dunkelgrünes lederartiges Laub, grosse Fruchthäufchen und feingeaderte Blättchen. Die Zipfel sind vorn abgerundet-stumpf, hin und wieder ist der mittlere Zahn zu einer etwas längeren Spitze vorgezogen. Der Stiel ist strohfarben hie und da mit grösseren braunen Spreuschuppen besetzt.

A. Filix Mas Sw. Wurmfarne. Das Laub doppelt gefiedert, die Fiedern abwechselnd, lang lineal-lanzettlich, die Fiederchen und Zipfel aus breitem Grunde länglich, stumpf, rundherum kerbig-gesägt, am Grunde zusammenfliessend, die Spindel mit feinen Spreuschuppen besetzt; die Häufchen zweireihig nächst der Mittelrippe.

In Laub- und Nadelwäldern der Ebene bis an das Hochgebirge durch das ganze Gebiet häufig, oft Strecken überziehend. Sommer bis Herbst.

Diese Art bildet zierliche Körbe und Büsche von 2—3' Höhe; die Wedel sind breit, von länglich-eiförmigem Umfange. Das Laub ist ziemlich weich und zart, die Fruchthäufchen gross und lange mit dem Schleierchen bedeckt, 2, 3—4 vom Grunde bis über die Mitte jedes Zipfels. Die unteren Fiedern bogig aufsteigend. Das unter dem Namen Jahannishand und Wanzenwurz bekannte noch jetzt officinelle Rhizom, welches ausser den gewöhnlichen Bestandtheilen ein eigenes ätherisches Oel mit Harz enthält, liefert den Officinen ein Extract, welches als eines der probatesten Wurmmittel gilt.

A. Oreopteris Sw. Das Laub gefiedert, die Fiedern langlineal-lanzettlich, fiederspaltig, die Zipfel länglich, vorn stumpf, ganzrandig, die unteren verloren gekerbt; die Häufchen randständig.

In Nadelwäldern der Hügellebene hie und da z. B. im *Glaucher Walde bei Skarsine*, im Vorgebirge um *Charlottenbrunn*, bis an das Hochgebirge, z. B. im *Elbgrunde des Riesengebirges*, im *Gesenke und im Teschnischen Gebirge*. Sommer und Herbst.

Der vorigen ähnlich, aber das Laub kleiner, derber und mehr hell und freudig-grün. Das Laub ist unterseits mit zerstreuten Drüsen besetzt. Der Stiel nur wenig mit Spreuschuppen. Das Schleierchen fällt früh ab.

A. Thelypteris Sw. Das Laub gefiedert, die Fiedern linienlanzettförmig, kammförmig, tief-fiederspaltig, die Zipfel am breitem Grunde länglich, fastdreieckig, etwas spitz, ganzrandig; die Häufchen randständig; Stiele und Spindel ohne Spreuschuppen.

In Sümpfen, Erlenbrüchen, sumpfigen Waldungen in der Ebene und dem Vorgebirge häufig. Um *Br.* bei der *Knopfmühle* (Scholtz), *Schleibitz*, *Lissa*, *Windmühle b. Kritschen*. Um *Oppeln bei Trenschin u. Chrzelitz*, um *Cosel* häufig. *Schibitz bei Teschen* (Reisek). Herbst.

Von 1—2' Höhe, länglich, freudig-grün, durchaus kahl und glatt, wodurch sie schon nächst ihrem Standort von weitem kenntlich wird. Die Zipfel der kammförmig-fiederspaltigen Fiedern sind zumal wenn der Rand bei der Fruchtreife sich einzieht, aus dreieckigem Grunde länglich-lanzettlich, zum Theile sichelförmig gebogen, oft an Länge ungleich. Die Häufchen sind randständig, verlieren das Schleierchen zeitig, und fliessen alsdann zusammen. Das Rhizom ist walzenförmig, kriechend, schwarz.

Cystopteris Bernhardi.

Die Fruchthälter sitzen auf einem aus der angeschwellenen Mitte der Ader entspringenden Fruchtboden in rundlichen Häufchen. Die Schleierchen sind am Grunde angeheftet, nach dem Rande des Laubes zu frei. (*Polypodium L.*)

C. Filix Femina. Aspidium F. f. Willd. Das Laub länglich, doppelt gefiedert, die Fiedern länglich-lineal oder lineal-lanzettlich; die Fiederchen länglich, eingeschnitten-gesägt, die Zipfel länglich 2-3zählig; die Schleierchen am Rande rissig-gewimpert.

In feuchten, schattigen Laub- und Nadelwäldern von der Ebene bis an das Hochgebirge die verbreitetste Art, sehr gesellschaftlich und oft über grosse Strecken. Sommer und Herbst.

Diese Art ändert in der Breite und Einzahnung der Fiederchen und Zipfel, wie die verwandten dieser und der vorigen Sippe, daher man sie sonst in mehrere unhaltbare Arten (*Asp. dentatum*, *incisum* u. *trifidum Hoffm.*) zerlegte. Sie wächst in

dichten Rasen, oft in trichterförmigen Kürben, wie *Aspidium Filix mas*, von 1—3' Höhe; das Laub ist fein und zart, von dunklem Grün, dem von *Polypodium alpestre*, welches diese Art im Gebirge vertritt, durchaus ähnlich. Der Stiel ist am Grunde dicht, die Spindel nur hin und wieder, mit einzelnen Spreuschuppen besetzt. Die Fruchthäufchen stehen an vollkommenen Exemplaren dicht und bedecken ausser der Spitze die ganze Unterseite der Zipfel, sind länglich-rundlich. — Eigentlich gehört diese Art, welche man zu den Sippen *Aspidium*, *Athyrium*, *Asplenium* gerechnet hat, mit den beiden folgenden nicht zu einer Sippe; doch habe ich sie hier vereinigt, indem ich das Kennzeichen der seitlich angehefteten Schleierchen zu Grunde legte.

C. fragilis Bernh. Das Laub länglich, doppelt gefiedert; die Fiederchen länglich, eingeschnitten und gekerbt, die Zipfel eiförmig gezähnt; die Fruchthäufchen zerstreut, die Spindel geflügelt, kahl.

In Hohlwegen, Ritzen von Felsen und alten Mauern an schattigen und feuchten Plätzen durch das ganze Gebiet bis in das Hochgebirge. Sommer.

Diese und die folgende Art sind durch das äusserst zarte, brüchige, hellgrüne Laub, die rundlichen und zerstreut stehenden Fruchthäufchen und die Gestalt des Schleierchens ausgezeichnet. Die Fiederchen sind nach der Aussenseite des Wedels stets tiefer ausgeschnitten, so dass sie schief erscheinen und stehen entfernt. Ihre Breite und Zerkümmung variiert, daher auch hier ehemals mehrere Arten unterschieden wurden. Die Stiele sind äusserst brüchig, weher der Name. Wächst in kleinen Rasen von $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' Höhe.

C. alpina Fries Nov. Mant. III. Das Laub auf langem Stiel fast dreieckig im Umfange, fast dreifach-gefiedert; die Fiederchen und Zipfel länglich-eiförmig, eingeschnitten, die Zipfel verkehrt-eiförmig, gestutzt, gezähnt, die Fruchthäufchen zerstreut, die Spindel und der Stiel fast kahl.

In Gebirgswäldern. Auf den *Hirschwiesen im Gesenke* von Grabowski entdeckt. Sommer.

Diese Art hat ein horizontal-kriechendes, saftiges Rhizom, die Wedel von 1' Höhe, auf aufrechten zarten Stielen. Das Laub frohdig grün und von äusserst zarter Beschaffenheit; seine dreieckige Form bei der feinen Zerkümmung macht diese Art leicht kenntlich.

Woodsia R. Brown.

Die Fruchthälter sitzen auf der Mitte der Adern in rundlichen zerstreuten Häufchen. Die Schleierchen sind tellerförmig unter die Häufchen gebreitet und am Rande vielspaltig in wimperige Franzen aufgelöst.

W. ilvensis R. Br. Polypodium ilvense Sw. Das Laub länglich, gefiedert, die Fiedern fast gegenständig aus breiterem Grunde länglich, unterseits an den Adern mit Spreuhaaren, die unteren tief fiederspaltig, die Zipfel länglich, kurz, vorn gerundet, schwachschweifig; Stiel und Spindel mit Spreuschuppen und Haaren besetzt.

An felsigen Abhängen des Vorgebirges. Bisher nur an Felsen des Weistrizthales von Beinert i. J. 1826 entdeckt. Sommer.

Rasenförmig, 3—5' hoch, die obere Hälfte belaubt. Laub ziemlich derb, schmutzig hellgrün. Die eigenthümliche Bildung der Schleierchen macht diese Sippe leicht kennt-

lich, auch im sterilen Zustande ist sie aus der Bekleidung der Adern auf der Rückseite, zu erkennen.

W. hyperborea R. Br. Polyp. hyperb. Sw. Das Laub lineal-lanzettlich, gefiedert, die Fiedern wechselständig, unterseits behaart, rundlich-eiförmig, fiederspaltig-gelappt, die Zipfel gerundet, am Gr. keilförmig, der Stiel fast kahl, die Spindel mit schmalen Spreuschuppen und Haaren dicht besetzt.

An Felswänden im Hochgebirge. An den Basaltfelsen *dér kl. Schneegrube im Riesengebirge*. Sommer.

Diese Art ist der vorigen ähnlich, viel kleiner, 1—2" hoch, das Laub schmaler, mit kurzen und breiten Fiedern und Zipfeln, von dunkelgrüner Farbe. Sie ist an dem bezeichneten Standorte sehr selten.

b) Osmundaceae.

Osmunda L. Traubenfarn.

Die Fruchthälter sind gestielt, fein netzaderig und sitzen auf dem zusammengezogenen Laube in Form einer Rispe. — Die Rispe stellt sich meist als ein vom Laube gesonderter endständiger Fruchtstand dar; nicht selten sitzen aber auch Früchte an den Rändern und Stielen der oberen Laubfiedern.

O. regalis L. Königsfarn. Das Laub doppelt-gefiedert, die Fiederchen länglich, stumpflich, unregelmässig-geschweift, am Gr. gehört, nach vorn verloren sägezählig, die Früchte in endständiger traubiger Rispe.

In Haidegegenden, an steinigen feuchten Waldplätzen, bisher nur in der Ebene um *Wohltau*. In Waldsümpfen bei *Königshuld b. Oppeln*. Sommer.

Von 2-3' Höhe. Das Laub ist hellgrün, ziemlich derb; die Fiederchen $\frac{1}{2}$ —1" lang, 5-6" breit, je 6-8 an jeder Fieder. Die Fruchthäufchen stehen eigentlich am Bande des Laubes, das aber so zusammengezogen wird, dass nur noch die Stiele übrig bleiben, an denen dann die Früchte rispenförmig geordnet sind.

c) Ophioglosseae.

Ophioglossum L. Natterzunge.

Die Fruchthälter stehen in einer zweireihigen gegliederten Aehre und sind verwachsen; sie sind einfächerig und springen in die Quere auf. — Der Stängel stellt einen kurzen länglichen aufrechten Wurzelstock dar; das Laub ist doppelt, ein äusseres, einfach-blattartiges, welches das innere verlängerte zur Fruchthöhre sich gestaltende scheidenförmig umgiebt. Knospung nicht gerollt.

O. vulgare L. Das Laub ein eiförmiges oder eiförmig-längliches Blatt, mit dichtem Adernetz.

Auf feuchten Wiesen, feuchten Waldwiesen, steinigen Heidewiesen. Um Br. bei *Hennigsdorf, Koberwitz, Kalkgruben b. Sadewitz*

bei Oels. Jeltsch und Grüntanne bei Ohlau. Guhrwitz bei Koberwitz (Scholtz) Wohlau, Hochwald bei Sprottau (Goeppert). Um Oppeln am Sakrauer Berge, bei Kardubiez, Oberwitz bei Krappitz. Im Gesenke bei Ludwigsthal u. kl. Mora.

Von $\frac{1}{2}$ -1' Höhe. Aus dem Wurzelstocke entspringen starke, söhllige Fasern. Das zungenförmige Blatt ist stumpflich, oder mit feiner Spitze, von papierartiger Consistenz, fast etwas fleischig, mit eigenem Fettglanz. Aus ihm tritt wie aus einer Scheide der Fruchtstiel, an welchem die Fruchthälter zweizeilig sitzen, darüber ragt eine kurze freie Blattspitze. Aestige Aehren kommen bisweilen vor; hier sah ich sie noch nicht.

Botrychium Sw. Mondraute.

Die Fruchthälter gesondert, in einer rispigen Traube, einfächerig, in zwei Halbkappen sich öffnend. — Der Stiel trägt unten oder in der Mite das unfruchtbare Laub, und an der Spitze eine einseitwendiger Fruchtaehren.

B. Lunaria Sw. Osmunda Lun. Linn. Das Laub entspringt aus der Mitte des Schaftes, gefiedert, die unteren Fiedern mondfig., die oberen keilfig., verloren-geschweift oder gelappt.

Auf grasigen Berglehnen, in der höheren Ebene bis auf das Hochgebirge. *Hochwald bei Sprottau (Goeppert). Um Oppeln bei Winow, und um Gnadenfeld. Reinerz (Remer). Im Riesengebirge in den Schnee gruben, am Riesengrunde. Im Gesenke am Hockschar, Peterssteine, im gr. Kessel, auf den Stechplänen, am Urlich bei kl. Morau. Im Teschnischen an der gr. Czantery. Sommer.*

Der abgebiessene schiefe Wurzelstock treibt starke, lange Wurzelfasern, nach oben einen etwas aufsteigenden Schaft, aus dessen Mitte ein seitlich-abstehender Laubwedel von 1—2" Länge; die Fiedern sind breit mondformig, die oberen keilformig, am Bande schwach und verloren geschweift, bisweilen mit einem und dem anderen Einschnitt, zumal die endständige; dick lederartig, fast fleischig, fett glänzend. Seltner sind die Fiedern tiefer getheilt und halbfiederspaltig, var. *rutacenum*, welche Form ich aus Schlesien noch nicht sah. Die Fortsetzung des Schafts trägt den endständigen Fruchtwedel, dessen Laub ganz zur Spindel zusammengezogen ist. Die Fruchttripe länglich, unten doppelt, oben einfach geliedert, die Stielchen tragen die Fruchthälter in zwei Reihen. Höhe 2—6".

B. matricarioides Willd. Der Fruchtschaft blattlos; 1—2 Laubwedel entspringen am Grunde, sind 3theilig, fast doppelt gefiedert, die Fiedern und Zipfel länglich-eiförmig, und eiförmig-rundlich, verloren kerbig-geschweift.

An steinigten Berglehnen. *Am Uhusteine bei Einsiedel im Gesenke. Im Aupengrunde auf dem Lunaboden nach Scholtz. Im Teschnischen an der Lissa Hora und am Mohelnitzer Jägerhause (Reissek). Sommer.*

Kleiner als die vorige Art, und durch das vieltheilige, am Grunde des Schafts aus dem Wurzelstocke entspringende Laub zu unterscheiden.

Lycopodinae Swartz.

Krautartige Gewächse mit ausdauernden, aestigen und kriechenden Stängeln mit centralen Gefässbündeln, an welchen einfache, einnervige, zerstreut oder reihenweise gestellte schmale Blätter meist dicht gestellt sind. Die Samenbehälter sitzen entweder einzeln in den Blattwinkeln oder an den Spitzen der Aeste, indem die Blätter in schuppenförmige Deckbltt. verwandelt sind, in Gestalt von Kätzchen, und sind 3—4körnig, herz- oder nierenförmig, oder kugelig, 1- selten 2-3fächerig, 2-3klappig, entweder alle gleichförmig, oder auf einem Individuum von zweierlei Gestalt: theils 2klappige mit mehlartigen, zu 4 zusammenhängenden Staubkörnern erfüllte, theils 3-4klappige, einige grössere Körner enthaltende. — Unter den Resten der vorweltlichen Flora, wie sie sich zumal in der Steinkohlenformation finden, befanden sich zahlreiche baumartige aus dieser Ordnung. Sie wachsen bei uns in moosigen und schattigen Wäldern, am Boden und Baumstämmen, selten an begrasteten Felslehnen und auf Steinen.

Lycopodium L. Bärlapp.

Die Fruchtkapseln einfächerig; von einerlei oder von zweierlei Gestalt; die einen fast herzförmig, zweiklappig, mehlartige Staubkörner führend; die anderen kugelig 3-4lappig und -klappig, grössere Körner führend.

a) Die Fruchtkapseln in gestielten Aehren.

L. clavatum L. Bärlapp, Löwenfuss. Stängel kriechend, mit aufsteigenden Aesten; Blätter dicht, linealisch, nervenlos, in ein feines Borstenhaar endigend; je zwei walzige Fruchtaehren auf einem mit Schuppen besetzten Stiele; die Deckblätter eiförmig, haarspitzig, ausgefressen-gezähnt.

In trocknen Wäldern, Haiden, an sonnig-steinigen Waldlehnen auf sandigem Boden, durch das ganze Gebiet bis an das Hochgebirge gemein. Sommer.

Kriecht weit umher und wurzelt am Boden, hell und meist gelbgrün. Die Blättchen stehen sehr dicht, sind am Rande unregelmässig schwach gezähnt und gehen in eine lange weisse Haarspitze aus. Die Fruchtsiele sind mit entfernten, lanzettlichen, nach oben etwas breiteren weisshäutigen, zerrissen-gefranzten, in eine weisse Haarspitze geendigten Blättchen besetzt, von 2" Länge, und tragen gewöhnlich 2, selten 1, noch selner 3, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ " lange, gelbliche Fruchtaehren. Die Fruchtkapseln alle gleichförmig, die Sporen mehlartig, als Samen Lycopodii zu Strenpulver officinell.

L. complanatum L. Aufrecht; die Aeste abwechselnd, gabelspaltig, plattgedrückt, von den verwachsenen Blättern bedeckt; die Blätter oberseits fast dreireihig, die mittleren schmaler, die seitlichen mit freien Spitzen; die Fruchtaehren paarweis auf schuppig-beblätterten Stielen; die Deckbltt. fast rundlich, am Gr. keilförmig zugespitzt mit friemlicher abtender Spitze.

In Laub- und Nadelwäldern der Ebene und des Vorgebirges. Um

Br. bei Lissa und Skarsine. Deutschhammer, Wilhelmsthal bei Wohlau, S'rottan. In Oberschl. um Malapane, Proskan, Jakobswalde, Ratibor, Leobschütz, Einsiedel im Gesenke. Ustron bei Teschen. Sommer.

Die eigenthümliche Gestalt des Laubes unterscheidet diese Art von den übrigen einheimischen. Die Aeste sind ganz von den verwachsenen Bltt. bedeckt, welche in 4 Reihen stehen, deren 3 auf der Oberseite stehen, die beiden seitlichen breiter, mit freien abstehenden Spitzen, die mittleren schmaler, eine auf der Unterseite in Gestalt kurzer Afterblättchen. Die Fruchtaehren stehen auf endständigen Stielen, paarweise, indem zwei benachbarte Stiele am Grunde oder bis zur Mitte verwachsen; gewöhnlich tragen zwei benachbarte Aeste Fruchtstiele, in welchem Falle dann 4 Aehren nebeneinander stehen. (Dahin ist der irrige Ausdruck in den Diagnosen „pedunculis quadrifidis tetrastachyis“ zu berichtigen). Die Aehren sind walzig, $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ “ lang, grünlich, später braungelb. Die Deckbltt. mit den Spitzen zuletzt abstehend und sparrig. Die Fruchtbehälter von einerlei Gestalt.

b) Die Fruchtbehälter in sitzenden Aehren.

L. alpinum L. Stängel aus gestrecktem Grunde aufrecht, die Aeste büschelförmig, gabelig-getheilt; die Blätter vierreihig, gedrückt, lineal-länglich, spitz, convex; die Aehren paarweis; die Deckbltt. eiförmig mit lanzettlicher abstehender Spitze.

Auf grasigen Plätzen der Kämme des Hochgebirges. Im *Riesengebirge, an der Schneekoppe, Lahnberge, den Sturmhauben u. dem hohen Rade. Im Gesenke am Hockschar, Altvater, Rande des grossen Kessels. Sommer.*

Wächst in dichten Polstern, mit hingestreckten Stängeln, deren dichtbüschelige Aeste aufrecht stehen. Von der gabeligen Theilung der Aeste rührt es her, dass die Fruchtaehren gewöhnlich zu 4 bei einander stehen, ganz wie bei der vorigen Art, mit welcher diese viel Aehnlichkeit hat. Die $\frac{1}{2}$ “ langen walzigen Fruchtaehren erscheinen sparrig. Die Farben hellgrün, auf trocknen Plätzen gelbgrün und daselbst sehr niedrig; sonst 3–4“ hoch.

L. annotinum L. Stängel weit-kriechend vielästig, die Aeste aufsteigend-aufrecht, am Grunde doppelt 2-3theilig, die Aestchen einfach; die Bltt. fünf-reihig, linealisch fein spitzig, nach vorn schwach-gesägt, einnervig, abstehend und niedergebogen; die Fruchtaehren einzeln, walzig; die Deckbltt. rundlich in eine lanzettliche Spitze vorgezogen, ausgefressen-gesähnt.

In feuchten Laub- und Nadelholzwaldungen von der Ebene bis an das Hochgebirge. Um *Br. bei Skarsine, Wohlau. Im Hochgebirge in der Waldregion, z. B. um den Kochl- und Zackenfall.*

Von sattgrüner Farbe. Kennlich durch die langen Aeste und die abstehenden, und zum Theile zurückgeschlagenen nadelförmigen Blätter, welche dachziegelförmig und ziemlich dicht stehen; an den Gelenken des Stängels, wo ein neuer Jahrestrieb beginnt, sind sie zusammengezogen. Die Aehren endständig, walzig $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ “ lang.

L. inundatum L. Stängel kriechend, etwas aestig; nur die aehrentragenden Aeste aufrecht; die Bltt. dicht fünf-reihig, sparrig, linealisch, die Fruchtaehren einzeln; die Deckbltt. blattähnlich, aus breiteiförmigem Grunde in eine lange linealische Spitze vorgezogen, sparrig.

Auf feuchten Sandplätzen und nassen Stellen in Haidegegenden. Um Br. bei Friedewalde. Garsuche bei Ohlau. In der Jacobswalder Haide. Herbst.

Diese seltener Art hat kurze kriechende und wurzelnde Stängel. Die Fruchtröhren von $\frac{1}{2}$ —1" Länge sind durch die weitabstehenden langen Spitzen der Deckbltt. ausgezeichnet.

L. selaginoides L. Stängel kriechend, die Aeste aufsteigend, einfach; die Blt. zerstreut, lanzettlich, abstehend, wimperig-gezähnt; die Fruchtröhren einzeln; die Deckbltt. den Stängelbltt. gleichförmig; die Fruchthälter von zweierlei Gestalt.

An grasigen Plätzen und felsigen Abhängen des Hochgebirges. *Im Riesengebirge im Aupengrunde, im Rübzahlsgarten. Im Gesenke am Petersteine und im grossen Kessel. Sommer.*

Ein bis zwei Zoll hoch. Die dünnen Stängel bilden kleine Rasen im Grase, mit gekrümmten, durcheinander geschlagenen Aesten, welche unten mit entfernten, an den Spitzen dicht mit Blättern besetzt sind. Die walzigen Fruchtröhren $\frac{1}{2}$ " lang, grün. — Die Deckbltt. etwas grösser als die Stängelblätter. Freudig-grün.

c) Die Fruchthälter in den Winkeln der Blätter.

L. Selago L. Stängel aufsteigend, Aeste bogenförmig-aufgerichtet, gabelig, fast gleich lang; die Bltt. 8fach-gereiht, dicht, etwas abstehend, lineal-lanzettlich.

In Wäldern der Ebene selten, häufiger des Vorgebirges, zumal auf modernen Baumstämmen, und auf Grasplätzen der Lehnen des Hochgebirges. *Um Br. bei Skarsine, und um Garsuche bei Ohlau. Sommer.*

Bis zu $\frac{1}{2}$ ' Höhe. Der Stängel theilt sich gabelförmig und die dicken Aeste streben aufwärts, an ihrem Eade bisweilen wieder eingekrümmt. Die Bltt. stehen dicht, sind lineal-lanzettlich, mit einem starken Fettglanz.

Hydropterides Willd.

Salviniaceae Bartl. Schwimmende Gewächse, fiedrig-aestig, nach unten mit Wurzeln besetzt, mit wechselständigen grosszelligen Blättern. Fruchthälter von zweierlei Gestalt am Grunde der Blätter: die einen schliessen eckige oder kugelige Körper ein; die anderen enthalten an einer Mittelsäule gestielte Kapseln, in denen einige freie Sporen liegen.

Salvinia Micheli.

Die Fruchtkörper sitzen in Büscheln von Würzelchen umgeben an den untergetauchten Aesten.

S. natans Mich. *Marsilea natans L.* Schwimmend; die Bltt. elliptisch, stumpf, schwach-ingedrückt, gepaart, oberseits mit büscheligen, auf Warzen stehenden Haaren, unterseits haarig; die Fruchtkörper in Büscheln zu 3-8, haarig.

Auf stehenden und langsam fließenden Wässern. Um Br. bei Ransern. Garsuche bei Ohlau. Um Vollwark und Gr. Döbern bei Oppeln, Militsch bei Cosel, Ratibor. Gleiwitz (nach Unverricht). Sommer. 2.

Die Keimung aus den Sporen ist beobachtet, daher diese als Keimkörner erwiesen. In den kugligen Körpern der anderen Art ist eine schleimige Masse enthalten. — Die hier nahe verwandten Sippen *Pillularia* und *Isaetes* werden vermuthlich noch in Schlesien aufgefunden werden.

Als diese Bogen bereits im Drucke waren, hatte ich Gelegenheit in diesem Frühjahr noch mehrere der oben-erwähnten Weidenformen näher zu beobachten und einige Lücken der Beobachtung zu ergänzen, wovon ich daher nachträglich hier das wichtigste mittheile.

S. cinereo-purpurea. — Unsere Bestimmung dieser Bastardform, dass diess nämlich *S. Pontederana* Willd. sei, welche zunächst nur nach den Bltt. gemacht war, ist durch die Auffindung von zwei Exemplaren mit Stempelblumen bestätigt, nicht minder die von uns gegebene Deutung dieser Art. Ein kleiner Strauch wurde zwischen *Masselwitz* und *Lissa* an einem Graben und ein hoher im Walde bei *Margareth* von Krause gefunden. Die Kätzchen der Stempelblumen sind im jüngeren Zustande $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ “ lang bei 3—4“ Breite, walzig, schwach-gekrümmt, ziemlich vom Aussehen derer der *S. cinerea*, aber dünner und schlanker, dicker und kürzer als bei *S. purpurea*, starkzottig, mit gedrängten Blumen, der Fruchtknoten kurz länglich, oben mit sehr kurzer Spitze, ganz kurzem Griffel und eiförmigen Narben. Im vorgerückten Zustande sind die Kätzchen bis 1“ lang, ziemlich dick, walzig, etwas schlaff, weissgrau-schimmernd, die Fruchtknoten kegelförmig, etwas zusammengedrückt, von anliegendem kurzem Silberhaare grau, oben stumpflich, in einen sehr kurzen Griffel endigend. — Auch ein bei *Sadowitz* bei *Oels* gefundener Strauch mit Staubfadenblumen, ganz vom Ansehen der *S. cinerea*, aber mit schlankeren Kätzchen, halbverwachsenen Staubgefässen und mehr rundlichen als länglichen Staubbeuteln scheint hierher zu gehören und eine der *S. cinerea* näherstehende Form darzustellen.

S. aurito-purpurea. — Beide Sträucher in der Gegend von *Margareth* wurden in diesem Jahre mit Blüthen, und zwar mit Stempelblumen gefunden. Die Kätzchen sind im Ganzen vom Aussehen der *S. purpurea* aber etwas dicker und minder schlank, 1“ lang bei 3“ Durchmesser. Die Schuppen am Grunde gelbgrün, sparsam mit krausen Haaren besetzt. Bei dem Strauche, der in den Bltt. der *S. aurita* näher, sind die Kapseln kürzer und nach vorn dicker, der Griffel fast verschwindend kurz, die Narben kürzer und breiter, bei dem anderen, in den Bltt. der *S. purpurea* mehr ähnlichen, sind die Kapseln etwas länger und spitzer, ein kurzer aber deutlicher Griffel mit länglichen Narben: diese Differenzen scheinen mehr individuell zu sein. Noch fehlen uns die Staubblüthen von dieser seltenen Bastardform.

S. purpureo-repens. — Unfern *Sadewitz bei Oels* beobachtete ich von dieser Form in diesem Frühlinge zwei Sträucher mit Staubblüthen; die sich durch die Farbe der Zweige und die helleren Blüthenkätzchen von den herumwachsenden Weidenformen auf ziemliche Entfernung auszeichneten. Die Staubfäden sind oft bis dicht unter die Staubbeutel verwachsen, und ich glaube, dass die von den Autoren aufgeführte Varietät der *S. purpurea* mit gespaltenen Staubfäden hierher gehört. Bei dieser Gelegenheit will ich erwähnen, dass gespaltene Staubfäden auch bei *S. repens* und *S. aurita* bisweilen beobachtet werden, in Folge jener Metamorphose der Blüthen, welche in sehr mannigfaltigen Uebergängen Mittelbildungen zwischen Staubgefässen und Stempeln hervorruft. Allein diese Art der Spaltung oder Verwachsung giebt sich auf den ersten Blick durch die Verdickung der Staubfädenäste und die Vergrünung der Antherenhäute, als Uebergang zum Carpellarblatt, zu erkennen. Bei *S. aurita* werden bisweilen Exemplare mit 3-4theiligen Staubfäden gefunden, die *S. cladostemma* Hayne. Bei den Bastarden aber, welche verwachsene Staubfäden haben, sind die Blüthen durchaus regelmässig.

Ausserdem wurde eine merkwürdige Weidenform am Teiche vor *Liebenau* beobachtet, welche den Blättern nach ein Mittelding von *S. purpurea* und *amygdalina* darzustellen schien, welcher Vermuthung jedoch die Blüthen widersprechen. Die Bltt. derselben zeigen im Frühling ein helles, fast fettglänzendes Graugrün, später ein dunkleres Graugrün, sind dann fast pergamentartig, länglich, nach vorn in eine kurze Spitze verengt, unten wenig verschmälert und am Grunde selbst gerundet. Die Kätzchen walzig, von der Gestalt derer der *S. purpurea*, doch etwas dicker; die Schuppen am Gr. gelbgrün, wenig behaart; die Kapseln kegelförmig, stumpf, weisslich-seidenhaarig, mit sehr kurzem Griffel und eiförmigen Narben. Diese Form wird noch der weiteren Beobachtung vorbehalten.

FLORA VON SCHLESIEN.

Zweiter Band.

FLORA

von

SCHLESISIEN

preussischen und österreichischen Antheils.

Von

Friedrich Wimmer,

Director und erstem Professor des Königl. Friedrichs - Gymnasiums zu Breslau
und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Nebst

einer Uebersicht

der

fossilen Flora Schlesiens

von

Dr. H. R. Goepfert,

ordentlichem Professor der Medicin an der Universität, praktischem
Arzte, Correspondenten der Berliner Akademie der Wissenschaften und mehrerer
anderer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Zweite, neu redigirte und bereicherte Ausgabe.

Zweiter Band.

BRESLAU,

Verlag von Ferdinand Hirt.

1844.

Digitized by Google

Richard Wagner

Richard Wagner's Opera - The Ring of the Nibelung - The Twilight of the Gods

Richard Wagner

Richard Wagner's Opera - The Ring of the Nibelung - The Twilight of the Gods

Richard Wagner

Richard Wagner's Opera - The Ring of the Nibelung - The Twilight of the Gods

Richard Wagner's Opera - The Ring of the Nibelung - The Twilight of the Gods

Richard Wagner

Richard Wagner

Richard Wagner

Inhalt

des zweiten Bandes.

- 1. Geographische Uebersicht der Vegetation von Schlesien.**
- 2. Verzeichniss der wichtigsten Höhenpunkte der Sudeten und des Teschnischen Gebirges.**
- 3. Anleitung zu botanischen Excursionen in Schlesien, nebst Anweisung zum Sammeln, Trocknen und Aufbewahren der Pflanzen.**
- 4. Geschichte der die Schlesische Flora betreffenden Forschungen.**
- 5. Die fossile Flora Schlesiens von H. R. Goepfert.**
- 6. Alphabetisches Register der Standorte Schlesischer Pflanzen.**
- 7. Index der lateinischen Familien- und Sippen-Namen.**
- 8. Blattweiser der deutschen Pflanzen-Namen.**
- 9. Karte des Profils der Sudeten und des Teschnischen Gebirges, nebst erläuterndem Text.**

Geographische Uebersicht
der
Vegetation Schlesiens.

Association of Biologists

Geographische Uebersicht

der

Vegetation Schlesiens.

Indem die Pflanzengeographie die Gesetze aufsucht und bestimmt, nach welchen die in den sogenannten natürlichen Ordnungen oder Familien systematisch gereihten Vegetations-Formen auf der Erdoberfläche vertheilt sind, ist sie darauf angewiesen, aus den Floren kleinerer Bezirke oder grösserer Ländergebiete die Data und das Material zu entnehmen, und je getreuer diese den Vegetationscharakter ihres Gebiets wiedergeben, mit desto mehr Zuverlässigkeit dürfen sie zur Benutzung kommen. Diese Treue besteht zunächst darin, dass die wahrhaft einheimischen und ursprünglichen Arten von den erweislich eingeführten und nur durch Menschenhand verbreiteten oder zufällig an einzelnen Punkten verstreuten gesondert werden*); zweitens dass die Arten in ihrer wahrhaft natürlichen Begränzung erkannt und aufgeführt, alle Abänderungen also als solche, und nicht minder die hybriden oder Bastard-, d. h. durch Vermischung zweier Arten entstandenen, Formen an den ihnen gebührenden Ort verwiesen werden. Drittens aber, und diess ist das zunächst für den Pflanzengeographen brauchbare Requisite, müssen die örtlichen Verhältnisse der Arten beschrieben werden: die allgemein-physische

*) In Ländern, wo die Cultur lange herrschend gewesen, ist die Darstellung der „ursprünglichen“ Vegetation unmöglich. Dennoch ist durch Absonderung derjenigen Pflanzenarten, welche sich als eingewanderte und Ankömmlinge nachweisen lassen, wenigstens annäherungsweise jene Darstellung möglich. Auch sind einerseits manche Arten so verbreitungsfähig und gleichsam von der Natur dazu bestimmt, sich allerwärts anzusiedeln, dass man sie vom Vegetationsgemälde nicht ausschliessen darf. Andererseits hat die Geschichte und die Gewalt der Cultur ihr Recht, demzufolge ihre Wirkungen von dem Gemälde der Vegetation, das durch sie modificirt worden, nicht ausgeschlossen werden dürfen.

und geognostisch-mineralische Natur ihres Wohnplatzes, die Verbreitung und Häufigkeit derselben in dem Gebiete und die Erhebung ihres Wohnsitzes über das Meer. Es wird für die Zukunft wünschenswerth, ja vielleicht nothwendig werden, dass die Floristen ausser derjenigen Diagnose, welche zur Erkennung der Pflanze aus der Gestalt ihrer Theile dient, einer jeden Art auch noch eine gleichsam phytogeographische Diagnose beisetzen, worin die Verhältnisse ihres Vorkommens in bestimmten und allgemein verständlichen Zeichen und Ausdrücken angegeben sind, da eine solche Characteristik nicht minder als jene zur vollständigen Kenntniss der Art gehört. Wenigstens wird die phytogeographische Rücksicht diese Angaben in Zukunft vollständiger und genauer erheischen, als sie in den meisten oder allen bisherigen Floren gegeben worden sind.

Wir haben uns bemüht in der vorangehenden Flora diesen Anforderungen soweit nachzukommen, als unsere Beobachtungen es verstatteten. Mit dem festen Vorsatz, nur dasjenige auszusprechen, von dessen Wahrheit wir uns selbst überzeugt halten, verbindet sich freilich das Geständniss, dass von den so eben gestellten Forderungen der grössere Theil unerfüllt geblieben ist und dass bei vorwaltender Rücksicht auf andere Zwecke es in dieser Richtung an sicherer und umfassender Beobachtung mangelt. Doch schien es, als würde dem ausgesprochenen Mangel in einiger Weise abgeholfen werden, wenn eine Uebersicht der Vegetation nach den hervorstechendsten Lokalitäten gegeben würde, indem in unserem Gebiete die nicht geringe Erhebung der Gebirge über das Meer, ihre ansehnliche Ausdehnung von West gen Ost, die augenfällige Differenz ihrer Formation sowohl in ihnen selbst sehr bemerkenswerthe Unterschiede der Vegetation hervortreten lassen, als auch in der zu ihrem Fusse gelagerten unteren und ebenen Region dergleichen bedingen. Indem wir diese Darstellung versuchen, bitten wir zu berücksichtigen, dass sie nur mit dem Anspruche eines Versuches auftritt. Was noch ausserdem für die phytogeographische Statistik wünschenswerth schien, enthalten die angeschlossenen Tabellen.

Lage und Gränzen des Gebiets. Schlesien — hier im weitesten Sinne, d. h. das preussische, das österreichische, Glaz und die preussische Oberlausiz, erstreckt sich nach dem Laufe des Hauptstromes, der Oder, in einer Längenausdehnung von ungefähr 70 und einer durchschnittlichen Breite von 20 Meilen, in der Richtung von Südost nach West-Nord-West, mit einem Flächeninhalt von ungefähr 830 Q. M. Eine natürliche Hauptgränze desselben bildet der in gleicher Richtung mit geringen Unterbrechungen verlaufende Gebirgszug der Sudeten, welcher es von den südlich-gelegenen Ländern Böhmen und Mähren

trennt. Die obere Oder trennt dieses Gebirge von dem nahe daran gränzenden Teschnischen Gebirge, dem westlichsten Flügel des Karpatischen Gebirgssystems. Diese Gränze reicht von der Tafelfichte bis zur Babia Gora. Die übrigen Gränzen sind die politischen; die nördliche kann übrigens in sofern als eine theilweise natürliche angesehen werden, in sofern sie dem rechten Oderufer parallel-laufend, dessen nördliche Böschung abschliesst. Die Begränzungslinie von Grünberg über Sagan und Hoyerswerda nach Görlitz ist jedoch willkürlich.

Das Teschnische Gebirge — wir wählen diesen Namen als den unzweideutigsten für das von der Lissa Hora, über die Jablunkaer Schanze bis zum B. Baranio verlaufende karpatische Vorgebirge — musste, obwohl im geognostischen und vegetativen Charakter abweichend, mit aufgenommen werden, weil es sich eng an die Sudeten anschliesst und weil seine westliche Hälfte zum Flussgebiete der Oder gehört. Daher wollten wir es uns nicht versagen sogar die Schlesische Gränze überschreitend unsere Gränze bis an die Babia Gora auszudehnen, welche man als den Endpunkt des Teschnisch-Galizischen Gebirges ansehen kann, jenseits dessen die eigentlichen Ungarisch-Galizischen Karpatenzüge beginnen. Die Mitaufnahme dieser Gebirge gewährt interessante Vergleichen und wir wollten zur allgemeinen Kenntniss der Vegetation dieser Gegenden, so weit wir es vermögen, beitragen. — Die südliche Abdachung dieser Gebirge ist zwar nicht ausgeschlossen, aber auf die obere Region beschränkt worden; diese musste als integrierender Theil des Gebirges und dessen Flora gelten, am jenseitigen Fusse aber beginnen schon augenfällige Differenzen.

Erhebung über die Meeresfläche und Eintheilung der Gebirge. Die Oder hat bei Oderberg eine Höhe über M. von 588', bei ihrem Austritte nach der Mark von 175'; der Abfall des Oderthals beträgt also 413'. Die höchsten Berggipfel unseres Gebiets erheben sich, die Schneekoppe 4930' ü. d. M.*), die Babia Gora 5080' ü. d. M.**)

Der ganze Gebirgszug, welcher von den gegen Römerstadt und Goldenstein in Mähren abfallenden Höhen des Gesenkes an, von Südost gegen Nordwest mit mehr oder weniger Unterbrechung und in grösserer oder geringerer Höhe bis zur Tafelfichte verläuft, bildet die grosse Wasserscheide zwischen der Oder, der Elbe und der in die Donau münden-

*) Vgl. v. Vinke in Uebersicht der Arb. etc. d. Schles. Gesellschaft im J. 1836. p. 76.

**) Nach einer im J. 1825 angestellten Barometrischen Messung des Herrn Postmeisters Habelt zu Skotschau.

den March, indem im allgemeinen alle auf der Nordseite dieses Zuges herabströmenden Gewässer der Oder, alle auf der Südseite dagegen der Elbe oder der March zufließen. Insbesondere scheidet das Isergebirge die Iser von dem Queis, das Riesengebirge die Elbe selbst von den Zuflüssen des Bober, das Erlizgebirge die Erliz von der Gläzer Weistriz, der Gläzer-Schneeberg die March von der Neisse, das hohe Gesenke die Zuflüsse der March von denen der Oder (Oppa u. Mora). Das Teschnische Gebirge scheidet sich bei einer mannigfaltigen Gruppierung deutlich in eine westliche Hälfte, von welcher die Oder Zuflüsse erhält und eine östliche mit den Quellen der Weichsel und deren Nebenflüssen Biala und Sola. Die fernere Wasserscheide zwischen der Weichsel und Oder erstreckt sich nördlich von Jablunka in einer nicht durch grosse Höhen bezeichneten nordwestlich verlaufenden Linie und ist im Preussischen Schlesien nur noch als ein wenig erhabenes Hügelland, welches in nordöstlicher Richtung bei Sorau, Nikolai und Beuthen verläuft, bemerkbar, in welchem zuletzt die Malapane von der Brinniza geschieden wird.

Beginnt man mit dem Pass von Jablunka, so lassen sich drei Hauptzüge des Teschnischen Gebirges unterscheiden. Den Mittelpunkt des östlichen bildet die Lissa Hora, in einem südöstlich gekrümmten Bogen mit den Beskiden zusammenhängend. Von diesem durch das Flussthal der Oelsa getrennt, verläuft der mittlere Zug in geringerer Höhe, dessen Hauptpunkte die beiden Czantory-Berge bilden, in nordwestlicher Richtung. Das Thal der Weichsel trennt diesen von dem dritten fast von Norden nach Süden verlaufenden östlichen Flügel vom Klimczok bei Bieliz bis zur Wielka Gora, dessen Hauptpunkt der Berg Baranio, von dem die Weichsel in mehr als sieben parallelen Quellflüssen herabkommt. Dieser Zug setzt sich südöstlich bis zur Babia Gora in Gallizien fort.

Das Sudetengebirge zerfällt in drei Hauptabschnitte: 1) die östlichen Sudeten von der Oder bis zur Gläzer Neisse, oder bis zu den Pässen von Mittelwalde und Wartha. 2) Die mittleren Sudeten, von der Gläzer Neisse bis zum oberen Bober und dem Striegauer Wasser oder bis zu den Pässen von Königshain, Liebau, Landshut u. Giesmannsdorf. 3) Die westlichen Sudeten vom oberen Bober bis zur Lausitzer Neisse.

Die östlichen Sudeten bestehen aus drei Haupttheilen: a) dem Gesenke von der Oder bis zum Ramsauer Pass, dessen höchste Gruppe das Altvatergebirge, bis gegen 4500', bildet, während seine östliche Abdachung gegen Janowiz, Engelsberg, Würbenthal u. Johannisthal, das niedere Gesenke, bis 2000' ansteigt; b) dem Neisser Gränz-

gebirge, vom Ramsauer Pass bis zum Pass bei Wartha, durchschnittlich 3000' hoch. Die Theile desselben sind der Hundsrücken, Karpenstein, Heidelberg, Jauersberg und das Reichensteiner Gebirge mit dem Spitzberge, woran sich nordöstlich das Freiwaldauer Gebirge anschliesst. c) Dem Glazer Schneegebirge, einem gegen 4300' hohen Gebirgsstock von massiger Ausbreitung. — Als Vorberge sind nur die Hultschiner Berge mit der Landecke und die Bischofskoppe bei Zuckmantel bemerkenswerth.

Die mittleren Sudeten bestehen aus: a) dem Erlitz-Gebirge vom Mittelvalder Pass bis zum Reinerzer Pass; es besteht aus zwei Parallelzügen, dem nordöstlichen, oder Habelschwerdter Gebiete, und dem südöstlichen oder den böhmischen Kämmen mit der hohen Mense. Höhe bis gegen 3500'. b) Dem Heuscheuer-Geb., von der Reinerzer Weistritz bis gegen Schömberg und Grüssau, nach Böhmen in das Adersbacher Gebirge sich fortsetzend, bis ungefähr 3000' H., c) dem Eulengeb. von 3000' H., von der Neisse bei Wartha bis zur Schweidnitzer Weistritz. d) Dem Schlesischen Mittelgebirge, von der Schweidnitzer Weistritz und der Waldiz an der Steina hinauf bis Friedland und von Grüssau und Schömberg bis zum oberen Bober und Striegauer Wasser, einem Flötzgebirge aus unregelmässigen, meist kegel- und kugelförmigen Berggruppen und Bergen. Man unterscheidet darin das Friedländer Geb., das Waldenburger Geb., den Hoch- und Sattelwald und das Ueberschaargebirge. Seine höchsten Gipfel sind nur 2400' bis 2900' ü. d. M. — Auf der Schlesischen Seite sind als Vorberge der mittleren Sudeten zu bemerken: die Groche-Berge bei Frankenstein, die Kleutsch-B. bei Reichenbach, die Nimptscher-B., die Rummels-B. und das Zobtengebirge, welches aus dem Zobten-B., Geiers-B. und Költchenberge besteht.

Die westlichen Sudeten bestehen aus dem Riesen- und Isergebirge. Das Riesengebirge oder die östliche Hälfte, enthält die höchsten Gipfel der Sudeten bis 4930'. Das Isergebirge, bis zur Görlitzer Neisse, erhebt sich bis zu 3200'. Am nördlichen Fusse dieses Gebirgszuges liegt eine gebirgige und bergige Landschaft, welche sich von dem Striegauer Wasser beim Giessmannsdorfer Pass bis zum Queis und nördlich bis gegen die Städte Jauer, Goldberg und Löwenberg erstreckt, und nach den Hauptflüssen als das Bober- und Katzbach-Geb. zu bezeichnen ist, wovon die Bleiberge, Altenberge, Kammerberge, Hohe-Gulge, der Mönchswald die hauptsächlichsten Theile, als dessen letzte Erhebungen die Striegauer Berge und der Gröditzberg zu bemerken sind, bis zu einer Höhe von 3200'.

Die Erhebung auf dem rechten Ufer der Oder ist zwar unbedeutend, aber dennoch deutlich in einer Hügelreihe wahrnehmbar, welche zwischen der Bartsch und Oder beginnend und mit der letzteren ziemlich parallel-laufend, sich an der polnischen Gränze bis an den Ursprung der Malapane erstreckt, wo sie sich an den aus dem südöstlichen Schlesien aufsteigenden Höhenzug anlehnt. Letzterer setzt sich in einem westlichen Seitenzuge zwischen der Clodnitz und Malapane bis nahe an die Oder fort und steigt daselbst im Annaberge bei Kosel zu der bedeutendsten Erhebung der Oberschlesischen Ebene empor.

Eintheilung des Gebiets in Höhenregionen. Es ist allgemein bekannt, dass in verschiedenen Höhen über der Meeresfläche, hauptsächlich auf Grund der verschiedenen Temperatur, nächst dem mehrerer anderen wichtigen Differenzen der Luft und des Bodens, verschiedene Vegetation erscheint, und es ist eines der wichtigsten Probleme der Pflanzengeographie, die Gränzen und Gesetze dieser Erscheinung zu bestimmen. Bei einem Höhenunterschiede von 4755' und resp. 4905' zwischen dem niedrigsten Punkte unseres Gebiets und den beiden höchsten Erhebungen ist es daher von Wichtigkeit, zu ermitteln, auf welche Art sich in demselben die Vegetations-Unterschiede nach der Erhebung des Bodens gestalten und diese Unterschiede in einer anschaulichen Uebersicht nächst dem auch in Zahlenwerthen zusammengefasst vor Augen zu stellen.

J. Meyen hat in seinem Grundrisse der Pflanzengeographie*), von der Ansicht ausgehend, dass die Regionen, nach denen die Gebirgsflora einzutheilen sind, den Zonen in der horizontalen Verbreitung der Pflanzen entsprechen, den Satz aufgestellt, dass mit einer Erhebung des Bodens von je 1900' eine andere Flora erscheine. Darnach würden in unserem Gebiete drei Regionen unterschieden werden müssen. Wir hatten früher, nach der Verschiedenheit der Vegetation, wie sie sich uns aus mehrjähriger Beobachtung und Vergleichung herausgestellt hatte, unabhängig von und unbekannt mit jenem Theorem, eine ähnliche Eintheilung festgestellt. Diess ist Grund genug, warum wir die von uns durchgeführte Unterscheidung von drei Vegetations-Bezirken in unserem Gebiet, der Ebene, des Vorgebirges und des Hochgebirges für richtig und ausreichend halten. Es entgeht uns zwar nicht, dass man noch mehrere Abtheilungen machen und namentlich noch eine Flora des niederen und des höheren Vorgebirges oder die der regio collina und regio montana unterscheiden könne. Ja man könnte noch weiter gehend eine Flora der Ebene, der Hügelregion, des Vorge-

*) Berlin 1836, p. 262.

birges, des Mittelgebirges und Hochgebirges unterscheiden, eine Ansicht welcher Schummel zugethan ist, und welche sich allerdings für Schlesiens durchführen liesse und zur Uebersicht der Vegetationsgruppen nicht ungeeignet erscheint: auch Göppert fordert eine Abtheilung mehr. Allein wir geben zu bedenken, dass je zahlreicher die Abtheilungen, desto unsicherer die Gränzen werden, und dass, je weiter man theilt, um desto weiter und weiter die Theilung fortzusetzen man sich genöthigt sieht, und dass die Schärfe der Absonderung und Begränzung nur für den Schematismus existirt, dessen Starrheit die Natur in der Mannigfaltigkeit der Erscheinung aufhebt. Daher haben wir die grösseren Abtheilungen, welche man auch für andere Länder füglich in Anwendung bringen kann, auch für unser Gebiet zu Grunde zu legen nicht beanstandet*).

Für die unterste Region, R. d. Ebene, nehmen wir als Gränze eine Höhe von 1700 Fuss an. Sie begreift zunächst das Oderthal oder den Gürtel theils flachen, theils hügligen Landes zu beiden Seiten der Oder, welcher auf dem linken Ufer ungefähr in einer Linie, welche die Städte Görlitz, Löwenberg, Liegnitz, Kanth, Strehlen, Neisse, Leobschütz, Ratibor, Oderberg, Pless, Kenty berührt, begränzt wird nebst dem Tropaüer Lande zwischen der Oder und Mora, und ausserdem das Plateau, auf welchem das sämmtliche oben bezeichnete Vorgebirge und ein Theil des höheren Gebirges ruht. Die charakteristischen Bäume derselben sind die Eiche und Kiefer, *Pinus sylvestris*.

Die zweite Region, R. des Vorgebirges, liegt zwischen 1700' und 3600' Höhe, und begreift alle diejenigen Bergzüge und Gruppen, welche auf dem linken Oderufer die Abdachung des Sudetengebirges nach der Ebene bilden, nebst dem grössten Theile des Teschnischen Geb., dessen

*) Es ist nicht zu läugnen, dass sich bei der Betrachtung der Ebene z. B. ein nicht unbeträchtlicher Unterschied in der Vegetation der tieferen Gegenden z. B. der Wälder und Wiesen längs den Ufern der Oder und den höheren herausstellt. Doch gränzen diese beiden Localitäten oft so nahe an einander, dass eine Sonderung unzulässig ist, indem eine kleine Erhebung des Bodens (man denke an den Fuchsberg bei Schwoitsch mit *Digitalis ambigua*, *Linosyris*, *Anthericum ramosum*, *Polygonatum anceps*) hinreicht, eine schon ziemlich abweichende Vegetation erscheinen zu lassen. Dasselbe gilt auch von der Trennung der Gebiete des Vorgebirges und des Mittelgebirges. Werden einmal Regionen unterschieden, so müssen es solche sein, die eine einigermaassen bestimmte und auch anderwärts wiederzufindende Gränze darbieten. Wir haben uns deshalb in Beziehung auf jene geringeren Regionen-Unterschiede begnügt, die abweichenden Vegetationsverhältnisse in den weiter unten folgenden Ausführungen der drei Vegetationsbezirke nach Gebühr zu berücksichtigen.

zwei höchste Punkte die Lissa Hora, etwa 4260' nach von Oeynhauscn, und Baranio zwar diese Höhe überschreiten aber wenig ausgezeichnete Vegetation aufzuweisen haben. Für die Baumflora dieser Region sind die Fichte, *Abies Picea*, und die Tanne, *Abies pectinata*, charakteristisch.

Die dritte Region, R. d. Hochgebirges, reicht von 3600' bis 4930' und resp. 5080' absoluter Höhe und umfasst die höheren Gebirgsrücken und Gipfel sammt deren Abhängen und Schluchten. Sie ist in drei oder vier Gruppen vertheilt, das Riesengebirge, das Gläzer Schneengebirge, das Altvatergebirge, die Babia Gora. Der Gestalt und Lage nach kann man diese Region in Gipfel oder Koppen, Rücken oder Kämme, Abhänge oder Lehnen und Schluchten oder Gründe sondern. Als Charakter dieser Region können die Zwergformen der Fichte und einiger Laubbölzer (*Sorbus*, *Fagus*), sowie das Knieholz, *Pinus Pumilio* Hänke, gelten, nächst dem aber sind derselben die baumlosen Kämme, Gipfel und Lehnen eigenthümlich.

Was die Gränzen dieser drei Höhenregionen anbetriift, so scheint es kaum der Erinnerung zu bedürfen, dass dieselben durch die Vegetation nirgends sehr scharf und bestimmt ausgedrückt sind. Am meisten möchte diess noch an der Gränze des Vor- und Hochgebirges der Fall sein, weil hier die Erhebung des Bodens meist steiler und plötzlicher geschieht, daher auch alle diejenigen Momente, welche eine Verschiedenheit der Vegetation bedingen, hier in einem raschern und leichter bemerkbaren Wechsel auf einander folgen, so dass eben sowohl der Erfolg, nämlich die Veränderung der Vegetation, als deren Ursachen augenfälliger werden. Weit weniger gilt diess aber von der Gränze der Ebene und des Vorgebirges, da jene nach und nach und gleichsam in wellenförmigen allmäligen Erhebungen zu diesem aufsteigt und da die zum Bereiche des Vorgebirges gehörigen Berge zum Theil mit ihrem Fusse dem Reiche der Ebene angehören. Daher finden sich manche Pflanzenarten, welche dem Vorgebirge angehören, auch in der Ebene, so wie umgekehrt, obwohl seltener, Pflanzen der Ebene an einzelnen Punkten des Vorgebirges erscheinen; diese Ausnahmen dienen als Beweis dafür, dass die Ordnung der Natur auf einer allseitigen Mannigfaltigkeit beruht, ohne dass das Gesetz, die Einheit, gestört wird. Wenn wir also oben die Fichte und Tanne als die charakteristischen Bäume des Vorgebirges aufgeführt haben: so soll damit nur gesagt sein, dass die Verbreitung und Häufigkeit dieser Gewächse in dieser Region ihr Maximum erreicht, so dass man diese als den eigenthümlichen Sitz derselben anzusehen hat, obgleich sie sich auch an vielen Punkten der Ebene ziemlich zahlreich vorfinden. Eben so wird

andererseits die Kiefer (*Pinus sylvestris*) auch an verschiedenen Punkten der zweiten Region gefunden, hat aber ihren Hauptsitz in der ersten.

Auf diese Betrachtung gestützt werden wir uns daher bisweilen veranlasst sehen, unsere oben angenommene Gränze, hauptsächlich nach unten hin, zu überschreiten und z. B. manche Arten dem Vorgebirge zutheilen, deren Standort noch unter 1700' liegt, wenn uns andere wichtige Gründe dafür bestimmen. Es ist nämlich leicht einzusehen, dass namentlich in bergigen Gegenden einzelne Plätze und Stellen durch ihre Lage gegen die Sonne, die herrschenden Winde, die Wärmeleitungsfähigkeit des Bodens u. dergl. eine geringere Luft- und Bodentemperatur haben können als höher gelegene Punkte der freien Ebene. Namentlich wird man sich bisweilen veranlasst sehen, solche Pflanzen, welche am Fusse oder in der unteren Gegend eines Berges wachsen, dessen oberer Theil der zweiten, dessen unterer aber der ersten Region angehört, lieber jener d. i. der zweiten Region zuzuweisen. Dass manche Pflanzen von ihrem höheren Standort durch zufällige oder auch gewisse regelmässig wiederkehrende Ursachen, z. B. durch die Gebirgswässer in tiefere Gegenden herabgeführt werden und sich daselbst, wenn es ihre Natur zulässt, und sie einen geeigneten Boden finden, festsetzen und vermehren, ist eine bekannte Erfahrung. Man hat daher bei der Betrachtung der Verbreitung der Pflanzen nach der Höhe darauf zu achten, in wiefern dergleichen Umstände mitwirkend gewesen sein können. — Man hat früher die Behauptung aufgestellt, dass die Pflanzen von den Gebirgen als ihrem ersten Wohnsitze herabgestiegen und sich allmählig über die Ebene verbreitet haben. Die Begründer der Pflanzengeographie haben das Verdienst, diese Meinung widerlegt, und dagegen die ordnungsmässige Vertheilung der Gewächsformen nach den Höhenregionen, worin die Pflanzen in ihrer Beziehung auf ihre Lebensmomente erscheinen, entdeckt und aufgezeigt zu haben.

Wir werden nun eine jede dieser drei Regionen einzeln betrachten und den Charakter ihrer Vegetation in seinen Hauptbeziehungen darzustellen versuchen. Wir bemerken hierüber ausdrücklich, dass wir uns einer speciellen Schilderung der topischen und physischen Verhältnisse enthalten und dieselben nur in soweit berühren, als es der vorliegende Zweck erfordert. Für eine ausführlichere Darstellung derselben und eine Zusammenstellung derselben mit der Vegetation dürften die Materialien noch nicht hinreichen, und es scheint uns vortheilhafter uns auf sichere Erfahrungen und zuverlässige Resultate zu beschränken, als schwankende Combinationen und Hypothesen zu versuchen.

I. Dritte Region, Region des Hochgebirges.

Character. Kämme und Gipfel (Kuppen), theils mit einer dünnen Lage von Erde (die nur eben aus aufgelösten mineralischen Partikeln der Gesteine und dem Verwesungsprodukt der dortigen Vegetation gebildet und gemischt worden), theils mit zahlreichen Geschieben und Felstrümmern bedeckt, oder offene oft weit verbreitete Moore und Sümpfe bildend. Knieholz, Gräser und *Hieracium alpinum*, in den Mooren *Carices* und überhaupt *Cyeroideen* bilden die ziemlich dünne und magere Vegetation. Diese wird reicher und mannigfaltiger an mehr geneigten Flächen und Lehnen, welche Wiesen bilden oder um die Bauden, wo Anbau stattfindet und in Folge der Viehzucht die Wiesen in einer fortwährenden Düngung erhalten werden. Die tieferen Einschnitte und bald mehr bald weniger steilen Lehnen von überall herabsickernden und rieselnden oder fliessenden Wässern befeuchtet und oft zwischen hervorstehenden Felsen geschützt, wodurch eine höhere und im Sommer durch das Abprallen der Sonnenstrahlen oft eine sehr hohe Temperatur möglich wird, besitzen gemeinlich eine sehr reiche und üppige Vegetation, die sich bisweilen im Beginn des Sommers unmittelbar nach dem Schmelzen des Schnees mit grosser Schnelligkeit binnen wenigen Tagen entwickelt; an und zwischen den Felswänden selbst wachsen die seltensten Gebirgspflanzen. Der unterste Saum dieser Region umfasst die obere Gränze des Baumwuchses, wo die Fichte und Eberesche zwergig zu werden beginnen. Auch dieser grösstentheils feuchte und quellreiche Waldsaum birgt an vielen Stellen eine reiche, sogar bisweilen üppige Vegetation, die zwar nicht aus vielen Arten besteht, aber durch die Dichtigkeit und die Höhe der Pflanzen sich auszeichnet. *Senecio nemorensis*, *Adenostylium albifrons*, *Sonchus alpinus*, *Poa sudetica* und besonders *Polypodium alpestre* sind die namhaftesten. Dieselbe Vegetation ist den tieferen Gebirgsschluchten (Gründen) eigenthümlich.

I. Das Riesengebirge. — Höhe der Kämme durchschnittlich 4000', der höchsten Punkte 4700' und 4950'. Gebirgsart: Granit und Gneus, Glimmerschiefer und Basaltador, welche theils auf den Kuppen und in den Gründen in Form von mehr oder minder mächtigen Trümmersgeschieben und Blöcken, theils auf den Kämmen zerstreut als übereinander gelagerte und geschichtete Blöcke (Mittagstein, Dreisteine, Mädelsteine, Mannstein, Schweinsteine u. s. w.), hie und da bis in das Thal hinunter, theils an den Abstürzen als senkrechte oder schwach geneigte Felswände,

wie an den Sebacegruben, Teichen, Patschfall, Kesselgrube u. s. w., zu Tage liegen.

Aus dem fast von Süd-Ost nach West-Nord-West fortlaufenden Rücken oder Kamme erheben sich mehrere kegelförmige Gipfel oder Kuppen, welche sich seitwärts in daran liegende Schluchten und Gründe absenken. Sie selbst sind fast ganz mit zahllosen Geschieben und Felsblöcken bedeckt, welche mit einer ziemlich bunten und für das Auge ergötzlichen Flechten-Flora — hauptsächlich Lecidea-Lecanora- und Parmelia-Arten, die hier in den mannigfaltigsten Formen und Abänderungen erscheinen, dann Verrucariae, Variolariae, Urceolariae, Gyrophorae u. s. w.*) — bekleidet sind. Die interessantesten dieser Gipfel sind die Schneekuppe und das hohe Rad. Zwischen den Steinen, wo sich eine dünne Erdecke angesetzt hat, erscheinen neben eisigen Gramineen, Cyperaceen und Junceen, Hieracium alpinum und Anemone alp. An der Schneekuppe allein wachsen Luzula spicata, Veronica bellidioides. Nächst dem Phleum alpinum, Aira caespitosa, Agrostis rupestris, Festuca alpina, Anthoxanthum, Carex atrata, Juncus trifidus, Luzula campestris sudetica, Alchemilla vulgaris, Primula minima, Gnaphalium supinum, Potentilla aurea, Sedum saxatile, Solidago Virgaurea.

Die Rämme bestehen je nach ihrer Lage aus Wiesenflächen, Moorwiesen und Sümpfen, und sind oft in grossen Strecken mit Knieholz bewachsen, das sich theilweise zwischen den Steinen an den Kuppen hinaufzieht, besonders aber auch an den Schluchten und Lehnen hinabstreckt und bisweilen an die Region der zwergigen Fichte unmittelbar anschliesst. Auch in den Sümpfen vegetirt dasselbe sehr lebhaft, indem es die kleinen Inselchen von Land oder festerem Boden zwischen den zahllosen Lachen und Wässern einnimmt. Der Boden besteht aus einer sehr dünnen und mageren Schicht, die in einer geringen Menge von Dammerde unzählige kleine Körnchen von Quarz und Glimmer enthält, wodurch derselbe ein sandiges Ansehen erhält. Die häufigen hier herrschenden Winde und Stürme und die geringe Verwitterungsfähigkeit des Gesteins mögen Ursachen sein, dass auf diesen Flächen die Dammerde nicht zunimmt und dass die Vegetationsdecke sich nicht selbst durch ihre Verwesung nach und nach eine nahrhaftere und fruchtbare Unterlage schafft. Die Vegetation dieser Stellen ist und bleibt daher mager und dürftig, ausser dem Knieholz etwa auf Aira caespitosa und flexuosa, Festuca alpina, Agrostis rupestris, Juncus trifidus, Homogyne alpina, Hie-

*) Eine kritische Aufzählung sämtlicher hier beobachteten Arten und Formen von dem berühmten Lichenologen von F l o t o w, siehe in W e n d t's Schrift über Warmbrunn.

racium und *Anemone alpina*, *Gnaphalium supinum*, *Potentilla aurea*, *Vaccinium* *Vitis idaea*, *Luzula albida*, *Silene Beben*, *Rumex Acetosella* beschränkt, welche letztere aber schon etwas besseren Boden verlangt. Diese Beschaffenheit zeigen besonders der sogenannte Koppenthan, der Querberg mit den Silberrändern oder die Höhe am Mittagstein bis zur Sturmhaube und der Kamm zwischen dem hohen Rade und dem Reifträger. Tiefere Stellen der Käme mit reichem Graswuchs zeichnen sich durch grössere Anzahl der Individuen und mannigfaltige Formen, namentlich des *Hieracium alpinum* aus, wovon weiter unten die Rede sein wird; ausserdem kommen daselbst *Polygonum bistorta*, *Geum montanum* und *Hypochoeris uniflora* zahlreicher vor. Der reichere Graswuchs dieser Plätze wird nächst anderen noch durch *Calamagrostis Halleriana* bewirkt, die oft kleine Strecken ganz bedeckt, ohne überall Blüthenhalme zu treiben. Auf diesen Plänen, zumal an den sanft abhängigen Rändern derselben wird auch *Lycopodium alpinum* gefunden und ausserdem sieht man hier und zum Theil an der Gränze einerseits der ansteigenden Felsen oder Kuppen, andererseits der Moorflächen eine Anzahl von interessanten Flechten, zumal strauchartigen, unter denen die rothfrüchtige *Capitularia bellidiflora*, die weissleuchtende *Cap. vermicularis taurica*, einige Gebirgsformen aus der Gruppe der *Cap. rangiferina*, *Cornicularia aculeata* und *pubescens*, *Cetraria islandica* hier oft mit Früchten die geläufigsten sind.

Quellenreiche und moorige Stellen sind sehr zahlreich und fast an allen sanften abhängigen Rändern der Käme, zum Theil als Abzug der höher liegenden Sümpfe, wie derer auf der Weissen- und Elb-Wiese. Diese Stellen sind es, wo besonders *Eriophorum alpinum* und *E. vaginatum*, nächst dem *Scirpus caespitosus* und verschiedene *Carices*, namentlich *limosa*, *rigida*, *stellulata*, *flava*, *canescens*, *Leucoglochin*, neben der überall gemeinen *C. vulgaris* (siehe die Nachträge) vegetiren, nächst dem aber *Sweertia perennis*, *Pedicularis sudetica*, *Bartschia alpina*, *Epilobium alpinum* und *E. origanifolium* vorkommen.

Einen Theil des sogenannten Koppenthanes und die am Abhänge des grossen Rades liegende Elbwiese nehmen ziemlich ausgedehnte Sümpfe ein, aus einer Menge einzelner seichter Wasser-Lachen und Löcher bestehend, zwischen denen durch den *Scirpus caespitosus* und einige *Carices* Inselchen gebildet sind, welche es möglich machen, sie zu passiren. *Eriophorum vaginatum* und *angustifolium* die obengenannten *Carices*, zumal *C. limosa* mit ihren Varietäten, die irrig für verschiedene Arten angesehen worden sind, besonders auch die hohe Form von *C. rigida* (siehe Fries Novit. Mant. 3.) nebst *C. ampullacea*, *Molinia coerulea*,

Andromeda polifolia, *Vaccinium Oxycoccus* bilden hier hauptsächlich die Vegetation. Unter dem Knieholze versteckt wuchern *Homogyne alpina*, *Trientalis europaea* auf der Weissen- und *Rubus Chamaemorus* auf der Elbwiese, welcher merkwürdigerweise nur auf einzelnen Stellen dieser ausgedehnten Sumpfparchie angetroffen wird.

Wo diese Sumpf-Pläne nach Lehnen oder Gründen zu sanft abhän-
gig werden, wie diess besonders von der Elbwiese nach dem Elb-
falle zu stattfindet, sieht man wirkliche Wiesen, auf denen sich das
Wasser in einzelne Bäche zusammengezogen hat und die mit einer ziem-
lich dichten und reichen Vegetation geschmückt sind. Ausser einigen
der schon oben genannten sind diess etwa die höchsten Stellen, auf wel-
chen *Veratrum Lobelianum*, *Sonchus alpinus*, *Aconitum Napellus* und *Se-
necio nemorensis* gefunden werden; hier wuchern neben *Alchemilla vul-
garis*, *Epilobium origanifolium* und *E. alpinum*, *Gymnadaeia conopsea*,
Coeloglossum albidum, *Bartschia alpina*, einige Formen des *Hieracium
alpinum*, *Halleri* und *prenanthoides*, *Hypochoeris uniflora*, *Crepis
grandiflora*, *Geum montanum*, *Luzula albida*, nebst deren *Var. cuprea*
oder *rubella*, *Streptopus*, *Lychnis diurna*.

Ehe wir die Rämme verlassen, um in die Schluchten und Gründe hin-
abzusteigen, müssen wir noch der grösseren Felsgruppen und Blöcke
erwähnen, welche sich theils auf höheren theils auf niedrigeren Punkten
des Riesengebirgskammes zerstreut finden und sowohl durch ihre Gestalt
überhaupt als auch durch die eigenthümliche Art der Lagerung und
Schichtung der Platten und Blöcke, aus welchen sie bestehen, die Augen
der Reisenden schon von fern auf sich ziehen. Ausserdem, dass diese
Felsgruppen, unter welchen in botanischer Hinsicht der Mittagsstein
und Mädelstein am meisten erwähnenswerth sind, den Lichenologen
ein besonderes Interesse gewähren, werden *Cardamine resedifolia*, *Poa
laxa* und einige Formen der *Poa nemoralis*, besonders die *var. glauca* und
Festuca duriusc. alpina fast allein an diesen Stellen gefunden.

Meist an den tieferen und mehr geschützten Stellen der Lehnen und
sanfteren Abhänge sind die unter dem Namen Bauden bekannten Woh-
nungen der Gebirgsbewohner angelegt, in deren unmittelbarer Umge-
bung die eigentlichen fetteren Wiesenplätze gefunden werden. Einer-
seits mag die Anlage dieser Bauden schon an solchen Stellen geschehen
sein, welche von Natur einen reicheren und höheren Pflanzenwuchs be-
sassen, andererseits ist derselbe gewiss durch Düngung und hin und wie-
der wohl auch durch Ansaat (namentlich von *Polygonum Bistorta*) beför-
dert worden. Die höchste dieser Wiesen ist die um die Wiesenbaude,
welche sich gegen den Brunnenberg hinaufzieht; unter den anderen höher

gelegenen führen wir als die bedeutendsten die um die Hampel-, Richter-, Peters-, Pudel-, Alte und Neue Schlesische-Baude gelegenen auf. Ausser den oben angeführten Gräsern kommen hier noch vorzüglich *Phleum alpinum*, *Alopecurus pratensis*, *Poa pratensis* und die stets die menschlichen Wohnungen begleitende *Poa annua*, zumal deren buntfarbige grossblumige Abart (var. *supina*) vor; nächst dem *Rumex alpinus*, der entweder nicht ursprünglich einheimisch, sondern von früherem Anbau her verwildert ist, oder vielleicht weil man ihm zu sehr nachgestellt hat, an anderen Stellen verschwunden ist und sich nur noch um die Wohnungen hier und da erhalten hat, und *R. Acetosa arifolius*, *Ranunculus acris*, *Polygonum Bistorta*, an den Bächen *Petasites alba*, *Adenostylium*, *Sonchus alpinus*, *Aconitum Napellus*, *Senecio nemorensis*; die letzteren, welche um die bei weitem höher als die übrigen gelegene Wiesenbaude fehlen, zeigen die Nähe der oberen Waldregion an, in deren Bereich wir uns hier zum Theil schon befinden. An den Rändern des Weisswassers abwärts der Wiesenbaude wird der Sammler Gelegenheit haben, nebst manchen Formen des *Epilobium alpinum* mehrere seltene Moose und Lebermoose zu sammeln; unter anderen sind *Dicranum Starkii* neben *D. falcatum*, *Polytrichum hercynicum*, *Bryum Ludwigii* hier zahlreich zu finden.

Die Vegetation derjenigen tieferen Einschnitte in den Gebirgskamm, welche man mit dem Namen Schluchten, auch wohl Gruben und in sofern sie eine längere Ausdehnung haben, Gründe zu benennen pflegt, ist sehr verschiedenartig nach der Verschiedenheit der einzelnen Theile, aus denen sie bestehen, und des Bodens, aus dem die Vegetation entspringt. Man kann darin füglich Lehnen, Wände und den Grund unterscheiden. Die Lehnen oder der sanftere Abfall dieser Schluchten führen das auf den höheren Gebirgsmooren gesammelte oder von den Wänden herabsickernde Wasser in eine Menge kleiner Bäche versammelt den Gründen zu, in welchen sich Wasserbehälter, als Teiche oder Flüsse, befinden und die Menge der Feuchtigkeit so wie andererseits die höhere Wärme, welche hier durch Zurückstrahlung erzeugt und durch die seitlichen Wände zusammengehalten wird, rufen hier eine reiche und üppige Vegetation hervor. Besonders bemerkenswerth ist in dieser Beziehung die Lehne, welche sich gegen den kleinen Teich hinabzieht, welche fast von oben bis unten mit den mannigfaltigsten Formen der unseren Gebirgen eigenthümlichen *Salix limosa* bedeckt ist, zwischen welchen *Salix silesiaca*, *Ribes petraeum*, *Betula pubescens* var. *carpatica*, sowie sehr viele der obengenannten Pflanzen als *Aconitum*, *Adenostylium*, *Sonchus*, *Veratrum*, *Hieracium nigrescens*, *prenanthoides*, *Cineraria*

crispa, *Epilobium trigonum*, *Crepis grandiflora* und *paludosa*, *Phyteuma spicatum* var., *Thesium alpinum*, *Carduus Personata*, *Lilium Martagon*, *Rosa alpina*, *Ranunculus aconitifolius*, *Aleotorolophus pulcher*, *Achillea Millefol.* *alpestris* u. s. w. wuchern, welche nebst *Polypodium alpestre*, *Petasites alba* und *Chaerophyllum hirsutum*, die nur durch ihr Rieseln und Rauschen wahrnehmbaren Bäche verdecken, an welchen die Steine noch überdiess mit einem Teppich von Moosen und Lebermoosen, (besonders *Jungermanniae*, von denen sich hier viele, auch einige seltene Arten und in verschiedenen Formen zumal den grösseren, einige auch mit schön entwickelten Früchten finden lassen) dicht überkleidet sind. Auf der westlichen Seite fassen grosse zum Theil senkrecht abgeschnittene Felsmassen diese Schlucht ein und trennen sie von der daran liegenden des sogenannten grossen Teiches, welche von diesem Gewässer ganz ausgefüllt wird und daher fast unzugänglich ist. An diesen Felsen bemerken wir *Poa laxa* und Formen von *Poa nemoralis*, *Cardamine resedifolia* und einige andere. Die grasreichen Stellen unterhalb dieser Felsen, zum Theil zwischen den Wänden schief und ziemlich steil hinaussteigend, prangen in einem reichen Flor von *Primula minima*, *Anemone alpina*, *A. narcissiflora*, *Alchemilla vulgaris* und *fissa*, *Allium sibiricum*, *Eriophorum alpinum*, *Pedicularis sudetica*, *Sweetia*, *Hieracia*, *Epilobium trigonum*, *Bartschia*, *Aleotorolophus pulcher*, *Viola biflora* und *V. palustris*, *Geranium sylvaticum*, *Pleurospermum austriacum* und einigen der oben genannten Pflanzen; hier wird auch auf einzelnen Stellen *Veronica alpina* gefunden. Hier ist es auch, wo man auf überraschende Weise in einer Entfernung von kaum fünfzig Schritten ein und dieselbe Pflanze im Emporspriessen aus dem eben vom Schnee verlassenen Boden, im Knospen-, im blühenden und auch wohl im fruchttragenden Zustande beobachten kann. Der Grund dieser Schlucht ist, wie gesagt, zum grossen Theile von einem Teiche erfüllt, an dessen Rande man ausser den genannten Pflanzen noch Gebirgsformen der *Betula pubescens*, *Salix silesiaca* nebst einigen Formen der *S. limosa*, z. B. mit sehr wenig behaarten, breitovalen Blättern, *Rosa alpina* und *Ribes petraeum* findet: auf der andern Seite gegen die Schlingelbaude hin, an den Rändern der Lomnitz, welche hier den Abfluss des Teiches bildet, nächst anderen auch *Arnica montana*, *Festuca heterophylla*, *Drosera rotundifolia* und bisweilen zerstreute Exemplare der *Veronica alpina*.

Wichtiger noch sind die beiden grossen unter dem hohen Rade steil nach Norden abfallenden Schluchten, welche unter dem Namen der beiden Schneegruben bekannt sind, besonders die westliche, welche auch die zweite oder kleine heisst. Den ganzen vorderen Rand der-

selben bilden mannigfaltig zerklüftete fast senkrecht abfallende Granitfelsen. Von da an senkt sich der oben mit Gerölle angefüllte und dasselbst ziemlich steile Grund allmähig über fruchtbare Wiesenflächen, doch immer ziemlich stark abfallend bis an den hinteren offenen Rand der Grube, wo sich dichte Massen von Knieholz befinden. Diese Wiesenflächen, welche zum Theil an die Seitenwände, namentlich die westliche, hinaussteigen, gehören zu den fruchtbarsten Stellen des Gebirges, indem sie mit einer reichen, bunten, üppigen und ausnehmend kräftigen und frischen Vegetation bedeckt sind. Ausser den schon früher genannten häufigeren und seltneren unserer Gebirge, als *Anemone alpina* und *narcissiflora*, *Ranunculus aconitifolius* und *nemosus* (acris?), *Alchemilla fissa* neben *vulgaris glabra*, *Adenostylium*, *Veratrum*, *Pleurospermum austriacum*, *Valeriana sambucifolia*, *Streptopus*, *Aconitum*, *Geum montanum*, *Potentilla aurea*, *Epilobium trigonum*, *Geranium sylvaticum*, *Anthriscus sylvestris alpestris*, *Crepis grandiflora*, *Sonchus alpinus*, *Achillea Millefolium* var., *Cineraria crispa*, *Hieracium nigrescens*, *Bartschia*, *Sweetia*, *Poa sudetica* und *nemoralis* u. s. w. kommen hier noch *Archangelica officinalis* und *Heracleum sibiricum*, nebst einer Var. des *H. Sphondylium*, mitten im Grunde *Salix herbacea*, auf den Moospolstern der anstossenden Knieholzregion *Linnaea borealis* u. an den Basaltfelsen der westlichen Wand, (einer auch in mineralogischer Hinsicht sehr merkwürdigen Stelle), *Saxifraga muscoides*, *bryoides* und *nivalis*, *Androsace Chamaejasme* und *Arabis alpina* nebst *Sedum Rhodiola*, *Carex atrata*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Asplenium viride* und *Allosorus crispus*, *Galium sylvestre pusillum*, *Myosotis sylvatica* var. *Thymus Serpyllum* var. vor. Vielleicht bewohnt auch noch ein und die andere seltene Gebirgspflanze die grünen Plätze, welche zwischen den unersteiglichen Felsspalten der grossen Schneegrube das Auge des Botanikers auf sich ziehen.

Eine dritte unter dem Namen der Agnetendorfer Schneegrube bekannte Schlucht, zeigt im Allgemeinen dieselbe Vegetation, doch fehlen ihr die seltneren der vorhin angeführten Arten. Da sie etwas tiefer als jene liegt, so bemerkt man hier noch einige andere Arten, welche der tieferen Region eigen sind, z. B. *Circaea alpina*, *Paris quadrifolia*, *Gnaphalium sylvaticum*, *Melampyrum sylvaticum*, ein sehr auffallendes Beispiel, wie eine nicht sehr bedeutende Höhenverschiedenheit sich doch schon in der Vegetation deutlich herausstellt.

Ein nicht minder merkwürdiger Grund ist der die Schneekoppe von dem Steinboden und Brunnenberge scheidende Riesen- und Aupengrund, der in seinen verschiedenen Theilen gleichfalls eine interessante und mannigfaltige Vegetation zeigt. Der mittlere Rand desselben wird von

den vielen Zuflüssen, welche das im Grunde sich sammelnde Aupen-Wasser bilden, erfüllt und zeigt dieselbe Vegetation wie sie an den quellenreichen Lehnen überall erscheint; an dieser Stelle bemerken wir neben *Salix limosa* noch die dem höheren Gebirge eigene Form von *Salix silesiaca* mit glatten und fast lederartigen Blättern. An den erhabeneren und trockneren Lehnen nach der Schneekoppe hin werden vorzüglich die *Campanula rotundifolia pusilla*, *Digitalis grandiflora*, *Bupleurum longifolium*, *Pimpinella magna* var., *Scabiosa lucida*, *Thymus Serpyllum grandiflor.* *Thesium alpinum*, und an dem Felsen um den alten Schacht, wo jetzt zum Theil neue Einschläge gemacht sind, *Saxifraga oppositifolia*, *Carex capillaris* neben *C. flava* und *pallescens*, *Arenaria verna*, *Sagina saxatilis*, um die Halden *Ranunculus nemorosus*, *Pyrola minor*, *Parnassia*, *Euphrasia officinalis* und einige seltene Cryptogamen, als: *Aspidium Lonchitis* und *A. aculeatum*, *Asplenium viride*, *Trichomanes* u. *A. Rebouillia hemisphaerica*, *Mnium spinosum*, *Hypnum molluscum*, *Barbula tortuosa*, einige Collemata, *Solorina saccata* u. s. w. bemerkt. Den am Einschnitt des Brunnenberges befindlichen Rand, eine wohl bewässerte Wiesenlehne, zeichnen die üppigsten Exemplare von *Carex atrata*, nächst dem aber *Allium sibiricum* und die seltene *Carex vaginata* aus, die ausserdem nur noch in der ganz ähnlichen Kesselgrube, der der Kesselkoppe südöstlich anliegenden Schlucht, gefunden wird. Hier wächst auch unter *Sal. silesiaca* und *limosa* die seltene *Salix phylicifolia* (oder *S. Weigeliana*), welche sonst nur noch um die alte Schlesische Baude vorkommt, ferner an Felswänden *Carex capillaris*, *Eriophorum alpinum*, *Allium sibiricum*, *Lycopodium selaginoides*. In dem Grunde selbst ist die ursprüngliche Vegetation durch Anbau und Wiesenkultur verdrängt; an steinigten Plätzen sind nur *Sagina saxatilis* neben *S. procumbens*, *Cardamine resedifolia*, *Juncus uliginosus* und *Arabis Halleri* zu bemerken. Die den langausgedehnten Aupengrund einschliessenden Wände gehören zu den bedeutendsten Punkten des Riesengebirges, insbesondere die von dem Steinboden sehr steil abfallende Wand, an welcher zwischen vorspringenden Felsen eingeengt, das schwer zu ersteigende aber durch mehrere ihm eigenthümliche Pflanzen ausgezeichnete Teufelsgärtchen (Rübezahls Lustgarten) liegt. Ausser vielen gewöhnlichen Gebirgspflanzen werden hier vorzugsweise *Hedysarum obscurum*, *Arenaria verna*, *Festuca varia* und *Carex capillaris*, nächst dem auch *Hieracium rupestre* All. (wovon *H. Schmidtii* Tausch eine Form ist) in mehreren Gestalten, *Saxifraga oppositifolia*, *Cnicus heterophyllus*, *Sorbus Aria*, *Sagina saxatilis*, *Cardamine resedifolia*, auf einem sehr kleinen Raume zusammengedrängt gefunden. Eine andere Lehne ist mit der im Riesengebirge nur hin und

wieder vorkommenden *Viola lutea* besetzt. Auf der anderen Seite der Schneekoppe zwischen ihr und dem Gehänge, dessen vorspringende Spitze die kleine Koppe heisst, zieht sich die Melzerggrube gegen den Wolfshau hinab. Diese hat ziemlich dieselbe Vegetation, wie der Aupengrund, nur minder reich; schöne Formen von *Salix limosa* am steilen Abfall derselben, tiefer unten *Betula pubescens* var. *carpatica*, *Acer Pseudoplatanus*, *Lonicera nigra*, *Salix silesiaca* und *S. caeprea*, *Heracleum sibiricum*, *Pleurospermum austriacum*, *Lazula maxima*, *Poa sudetica* und das seltene *Epipogium Gmelini* zeichnen dieselbe aus.

Von der Kesselkoppe öffnet sich gegen Nordost nach einem ziemlich weiten Thale die Kesselgrube, welche durch eine Felsengräte in zwei Theile geschieden wird. Wir bemerken als die auszeichnendsten Gewächse derselben *Heracleum sibiricum*, *Carex vaginata*, *vulgaris*, *flava* und *stellulata*, *Delphinium elatum*, *Aconitum Napellus*, *Senecio nemorensis*, *Dianthus superbus*, *Valeriana sambucifolia*, *Pedicularis sudetica*, *Alchemilla vulgaris* und *fissa*, *Sweetia*, *Allium sibiricum*, *Arabis sudetica*, zahlreiche Formen von *Epilobium origanifolium* und *alpiaum* neben *E. palustre*, *Betula pubescens* var. *carpatica*, *Sorbus Aucuparia*, *Salix silesiaca*, *Fagus*. Nächst der Kesselkoppe an der Lehne des Kirkonos *Sorbus Aria*, *Arnica montana*.

Den tieferen Schluchten des Gebirges, welche unter dem Namen der Gründe bekannt und unter welchen die bedeutendsten die sogenannten Sieben Gründe, so wie der Elbgrund, sind, kommt dieselbe Vegetation zu, die wir am unteren Saume dieser dritten Region oder in der oberen Waldgränze finden, und welche theilweise schon im Vorhergehenden mit berührt worden ist. Die genannten Gründe sind zugleich die bedeutendsten Flussthäler des Gebirges, von den beiden Hauptquellen der Elbe, dem Elbseifen- und dem Weisswasser durchströmt. In diesem Bezirk erreicht die Fichte ihre obere Gränze, wo sie nur noch etwa von strauchartiger *Sorbus Aucuparia*, *Acer Pseudoplatanus* und von *Salix silesiaca* begleitet wird; etwas tiefer so wie in den bezeichneten Gründen zeigt sich auch *Fagus* noch baumartig, die jedoch höher herauf strauchartig verkrüppelt und bald ganz verschwindet. Indem wir uns hier an der Gränze der nächst unteren Region befinden, die wir an einigen Punkten auch schon überschritten haben, ist diess auch in der Vegetation deutlich ausgesprochen und in diesem Bezirke wird man besonders bei dem allmählichen Hinaufsteigen gewahr werden, wie nach und nach die Pflanzen des höheren Gebirges eine nach der andern erscheinen. Im Elbgrund und Weisswassergrunde z. B. werden neben folgenden Pflanzen, welche nur der dritten Region angehören: *Bartschia*,

Gentiana asclepiadea, *Ribes petraeum*, *Epilobium alpinum* und *trigonum*, *Hieracium prenanthoides*, *Crepis grandiflora*, *Sonchus alpinus*, *Adenostylium*, auch folgende in der zweiten und zum Theil auch in der ersten vorkommende Arten gefunden: *Geranium sylvaticum*, *Thesium alpinum*, *Salix silesiaca*, *Homogyne alpina*, *Cineraria crispa*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio nemorensis*, *Lonicera nigra*, *Rosa alpina*, *Crepis paludosa*, beide *Aconita*, besonders *variegatum* in grosser Menge, *Valeriana sambucifolia*, *Digitalis grandiflora*, *Anthriscus alpestris*, *Viola biflora* und *palustris*, *Streptopus*, *Agrostis vulgaris*, beide *Chrysosplenias*, *Lysimachia nemorum*, *Orchis maculata*, *Montia fontana*, *Juncus uliginosus* und *articulatus*, *Circaea alpina*, *Valeriana dioeca*, *Pyrola uniflora*, *Carex muricata*, *Stellaria nemorum*, *Equisetum sylvaticum*, *Blechnum Spicant*, *Aspidium Filix mas*, *Dryopteris* und *Thelypteris*.

Noch mehrere in der tieferen und sogar in der Ebenen-Region vorkommende Pflanzen finden sich mit denen der höheren Region gemischt auf den theils an der Thalsole dieser Gründe theils an ihren Ausweitungen liegenden Wiesen. Hier kommen *Crepis grandiflora*, *Chrysanthemum Leucanthemum*, *Cirsium rivulare*, *oleraceum*, *Leontodon hastilis* var. und *Oporina autumnalis*, *Scorzonera humilis*, *Trifolium alpestre*, *pratense*, *Lathyrus pratensis*, *sylvestris*, *Alectorolophus hirsutus*, *Pedicularis palustris*, *Euphrasia officinalis*, *Orchis maculata* und *latifolia*, *Gymnadenia conopsea*, *Carum Carvi*, *Phleum alpinum* und *pratense*, *Arabis Halleri* und viele andere vor.

II. Diejenigen Bergzüge, welche zwischen dem Riesengebirge und Gesenke liegen, erreichen nicht die für die dritte Region angenommene Höhe, mit Ausnahme des Gläzer Schneeberges, welcher sich zwar dem letzteren Gebirgszuge anschliesst, aber, da er von dem Hauptstocke desselben deutlich geschieden ist, für sich betrachtet werden kann.

Der Gläzer Schneeberg reicht mit seinem 4300' hohen Gipfel schon mit 400' in die dritte Region hinein, was sich auch beim Aufsteigen in der Vegetation deutlich kund giebt. Gegen den Gipfel hin werden die Laub- und Nadelhölzer zwergig und *Ribes petraeum* verkündet die Nähe der dritten Region. Der obere Waldrand zeigt uns die Vegetation der fruchtbaren Schluchten des Riesengebirges, die *Aconita*, *Senecio nemorensis*, *Adenostylium*, *Sonchus alpinus*, *Rosa alpina*, *Lonicera nigra*, *Poa sudetica*, *Veronica montana*, *Circaea alpina*, *Lychnis diurna*, *Ranunculus aconitifolius*, *Digitalis grandiflora*, *Luaria rediviva*, *Veratrum Lobelianum* erfüllen denselben. Dazwischen auch das dem Riesengebirge fehlende *Doronicum austriacum* neben *Delphinium elatum*. Der obere Gipfel ist bis auf dürftige Sträucher von allem Holz entblösst,

aber an den feuchten Rändern mit einigen seltenen Gebirgspflanzen, wie *Avena planiculmis*, *Viola lutea*, *Campanula barbata*, *Cardamine amara subalpina* geziert; ausserdem trägt der Gipfel *Hieracium alpinum*, *Potentilla aurea*, *Meum Mutellina*, *Phleum alpinum*, *Coeloglossum albidum*, *Carex rigida*, *Thesium alpinum*, *Dianthus superbus*, *Crepis grandiflora*, *Hypochoeris uniflora*. Man sieht hieraus wie sehr sich die Vegetation des Gipfels derjenigen des Gesenkes annähert, mit welchem derselbe einige Arten gemein hat, welche dem Riesengebirge fehlen.

III. Das Gesenke, auch Vater- oder Altvatergebirge, Mährisch-Schlesisches Gebirge genannt. Höhe der Kämme durchschnittlich 4000', der höchsten Punkte 4440' u. 4570'. Der Hauptzug desselben beginnt in Nordwesten am Ramsauer Passe bei dem Dorfe Lindewiese mit dem Hockschar, und zieht sich in einem bald höheren bald niederen Rücken mit schwachen Einsattelungen über den Köpernickstein zur Brünnelhaide bis zum rothen Berge fort, wo er sich zu dem Pass des rothen Berges absenkt, steigt darauf wieder empor zum Hungerberge und Altvater, welcher in den Petersstein und die Janowizer Haide verläuft und sich gegen Janowiz absenkt. Die Rücken dieser Berge bilden gerundete Flächen, von geringerer oder grösserer Ausdehnung und Breite. Vom Peterssteine aus verlaufen sich diese Kämme in mehreren Richtungen, gleichsam sternförmig; der längste unter dem Namen Janowizer Haide gegen Südost, ein zweiter nach Nordost gegen Carlsbrunn, der dritte und vierte bilden die den Petersstein und Altvater trennende Schlucht und der fünfte unter dem Namen Saurücken gegen Winkelsdorf. — Das Gebirge besteht aus Urfelsen von verschiedenartigem Granit, zum Theil aus Gneis und Chloritschiefer, hauptsächlich aber aus schieferigem Quarz und Glimmerschiefer, welcher letzterer am Altvater und Peterssteine, am Köpernik und Fuhrmannssteine in ansehnlichen nackten Felsmassen hervortritt, und am westlichen Flügel zahlreichen Staurolith und rothen Andalusit einschliesst. — Es giebt zahlreichen und ansehnlichen Quellen den Ursprung; am Altvater entspringen die Kleine und Mittel-Oppa, auf den Hirschwiesen die weisse, oberhalb Reiwiesen die schwarze Oppa, welche sich zwischen Einsiedel und Würbenthal sämmtlich zur Oppa vereinigt haben; an der Janowizer Haide die Mora; am Bielekamm nördlich am Altvater die Biela.

Der vegetative Charakter des hohen Gesenkes stimmt im Allgemeinen mit demjenigen des Riesengebirges überein; was dort von der Vegetation der Lehnen, Gründe und Schluchten so wie zum Theil von den Mooren und höheren Gebirgswiesen gesagt wurde, gilt im Allgemeinen

auch für dieses Gebirge. Namentlich kommt es mit dem Riesengebirge in der grossen Fruchtbarkeit der bewässerten Thalschluchten und Gebirgseinschnitte überein; die Ueppigkeit der Vegetation ist hier fast noch grösser als an den ähnlichen Stellen des Riesengebirges; eben so sind die Lehnen meist durch ihre grosse Fruchtbarkeit und eine Fülle mannigfaltiger und seltener Pflanzenarten ausgezeichnet. Vergleicht man indess die äussere Gestaltung dieses Gebirges, die Beschaffenheit, Bildung und Oberfläche seiner Kämme und Gipfel, wie auch der Abfälle und Lehnen mit denen des Riesengebirges: so ergeben sich bedeutende Verschiedenheiten, von denen uns einige auch für die Vegetation wichtig erscheinen können. Ausserdem muss man für die nicht unbedeutenden Abweichungen der Vegetation die etwas südlichere Lage und den Abstand nach Osten zu, vielleicht auch noch einige andere in der Lokalität gegründete Umstände, die sich leichter muthmassen als nachweisen lassen, als bedingende Ursachen in Anschlag bringen. Indem wir noch einmal auf die Uebereinstimmung der Vegetation des Gesenkes mit der des Riesengebirges im Allgemeinen hinweisen, haben wir besonders die Verschiedenheiten hervorzuheben.

Die Höhen des Gesenkes bestehen aus gedehnten, ziemlich breiten und meistens an den Rändern abgerundeten Kämmen, und auch diejenigen Punkte, welche sich von gewissen Seiten als erhöhte Gipfel darstellen, steigen von den meisten Seiten allmählig an und erheben sich nur wenig über die Fläche des Rückens, der ihren Grund bildet. Die bedeutendsten Höhen sind der Altvater (4576^{*)}) nebst dem kleinen Vater, der Petersstein (4439') nebst der Janowizer Haide (4471'), der Hocksehar und Köpernikstein (4319') nebst der Brünnelhaide (3969'), sämmtlich baumlose Kämmе, welche nur wenig über die Baumgrenze (östlich vom Petersstein 4082') erhaben sind und theils weitausgedehnte wiesenartige Flächen und bogige Rücken, theils offene Moore bilden und nur an einzelnen Punkten (Köpernikstein, Altvater, Petersstein und an einigen davon südlich und südöstlich gelegenen Schluchten) mehr oder minder grosse Felsgruppen (Glimmerschiefer) tragen.

An den beiden auf dem Peterssteine und Altvater befindlichen vereinzelteten Felsen ist besonders das Vorkommen der *Anemone narcissiflora* und *Saxifraga aizoon* bemerkenswerth; in den Felsritzen *Salix herbacea*, und wie auch am Köpernikstein, *Cardamine resedifolia*, nebst den kleinen und stark zottigen Formen des *Hieracium alpinum*, welche als die

*) Diese Höhenangaben nach den Messungen des Königl. Preuss. Major Herrn Baron v. Vincke.

Normalform dieser Art bei den Botanikern gelten. Eben so wie im Riesengebirge ist diesen Felsgruppen diejenige Form der *Poa nemoralis* eigenthümlich, welche bei den Floristen als *Poa aspera* (nach Gaudin) oder *Poa caesia* (Smith, auch bei Koch Synops. p. 803.) gilt, und so abweichend von den Formen der Ebene ist, dass man nur da, wo man mit zunehmender Höhe ihre stufenweise Umbildung verfolgen kann, über ihre Abstammung Gewissheit erhält; desgleichen *Festuca duriuscula alpina*. Ausser diesen wenigen einzelnen Felsgruppen, und den bald zu erwähnenden am grossen Kessel, fehlen der Höhe des Gesenkes bedeutende Felsmassen so wie felsige Wände und Abstürze gänzlich, ein Umstand, aus welchem manche Verschiedenheiten der Vegetation seiner Höhen und der des Riesengebirges abgeleitet werden dürfen. Der grösste Theil der Oberfläche dieser Käme ist hier schon mit einer obwohl dünnen Decke fruchtbarer Erde überzogen, daher dieselben grösstentheils eine stärkere und reichlichere Vegetation zeigen, als die Käme des Riesengebirges, wo grosse Strecken theils von Steintrümmern, theils vom Knieholze bedeckt werden. Diese wiesenartigen Käme sind im Juni und Juli mit unzähligen verschiedenartigen Formen des *Hieracium alpinum* und *H. nigrescens* bedeckt, in einer Mannigfaltigkeit, wie sie kaum im Riesengebirge gefunden werden; meist höhere, oft ästige, sehr grossblüthige Exemplare, sehr oft mit breiteren Blättern und der verschiedenartigsten Behaarung. Von den Gräsern überziehen auch hier *Calamagrostis Halleriana*, *Avena flexuosa*, *Phleum alpinum* nebst *Carex atrata* und *rigida* grössere Strecken; *Potentilla aurea*, *Crepis grandiflora*, *Meum Mutellina*, *Hypochoeris helvetica*, letztere häufiger als im Riesengebirge; als Seltenheit begegnet man der *Gentiana punctata*; die etwas tieferen Stellen nahe der Baumgrenze zeigen oft eine unbeschreiblich üppige Vegetation, zu deren Schmuck *Campanula barbata*, *Viola lutea* in grosser Menge, die grossblumige Gebirgsform der *Apargia hispida*, *Polygonum Bistorta*, *Veratrum Lobelianum*, *Allium Victorialis*, *Coeloglossum vride* und *albidum*, *Alectorolophus pulcher*, *Hieracium aurantiacum* und *prenanthoides* beitragen. Ziemlich zahlreich sind auch quellige Stellen und wassergrundige Wiesen, auf denen an einigen Plätzen, wie am Altvater und Petersstein *Salix limosa*, doch diese sparsam und kaum mit einiger Variation der Blätter, und *S. hastata*, diese als eigenthümlich und ziemlich zahlreich, vorkommen. Dabei *Gentiana verna* und *Epilobium alpinum*, *organifolium* und *palustre*, *Cineraria crispa* nebst der var. *crocea*. An den meisten Stellen dieser Art wächst auch *Allium sibiricum* in grosser Anzahl, dessen Vorkommen im Riesengebirge auf wenige Plätze beschränkt ist, an einigen Stellen die seltene *Avena planiculmis*. An ver-

schiedenen Stellen des Gebirgsrückens, wie auf dem Hokschar und Köpernik, an der Brünnelhaide und am Altvater sind auch Hochmoore vorhanden, von denen jedoch keiner an Ausdehnung und Wassermenge der weissen Wiese und der Elbwiese im Riesengebirge gleichkommt und schon in der Region der Baumgrenze oder dicht daran, welche ausser *Carex limosa*, *Leucoglochin*, *rigida*, *ampullacea*, *vaginata* (dieser nur am Köpernik und im Kessel) und *Juncus trifidus* nebst den gemeineren Arten, kaum besondere Pflanzenarten aufzuweisen haben. An einigen tieferen Stellen gesellt sich sehr zahlreich *Vaccinium uliginosum* dazu. Am Nessel-Urlich, einem Vorberge des Altvaters nicht tief unter der Baumgrenze kommt *Conioselinum Fischeri*, welches die Bewohner des Gesenkes in ihre Gärten verpflanzt haben, doch sehr sparsam vor.

Zu den merkwürdigsten Stellen des Gesenkes gehört der nach der Janowitzter Seite d. i. gegen S. Südwest gelegene Abfall des Petersteins, welcher der grosse Kessel oder der hohe Fall*) genannt wird, eine kesselförmige zum Theil ziemlich steile Abflachung des Rückens nach dem Morathale zu, dessen östlicher Rand in wiesenartigen Flächen absetzt, während der westliche in einigen steilen Felsengräten, die zwischen sich kleine Schluchten bilden, jäh abfällt. Dieser Platz ist wegen seiner reichen und mannigfaltigen Vegetation und besonders dadurch, dass die charakteristische Flora des Gesenkes hier auf einem Punkte vereinigt ist, und dass sich hier mehrere Pflanzenarten finden, welche im übrigen Gebirgszuge bisher noch nicht gefunden worden sind, auch einige der seltensten Arten des Riesengebirges, beinahe die merkwürdigste Stelle im ganzen Gebirgszuge. Wir geben zum Beweise dessen ein Verzeichniss der im Monat Juli auf einem beschränkten Raume hier beobachteten Flora. In diesem Verzeichnisse sind diejenigen Arten, welche innerhalb des Gebiets bisher nur an dieser Stelle gefunden wurden, durch gesperrte, die welche nur im Gesenke vorkommen, durch gesperrte Kursivschrift und diejenigen seltneren Arten, welche dieser Platz mit dem Riesengebirge gemein hat, durch Kursivschrift ausgezeichnet.

Aconitum Napellus, *variegatum*, *Lycocotnum*. *Ranunculus acris* var., *aconitifolius*, *nemorosus*. *Anemone narcissiflora*, *vernalis*. *Delphinium elatum*. *Trollius europaeus*. *Thalictrum aquilegifolium*. *Caltha palustris*. *Actaea spicata*. — *Helianthemum vulgare*.

*) und zwar der Mora, welche aus den an diesem Kessel herabsickernden Quellen entspringt. Ausserdem wird auch der Fall der weissen Oppa am Wege von Karlsbrunn auf den Altvater, und der Fall der Biela zwischen dem Leiterberge und dem kleinen Keilich hoher Fall genannt.

Lunaria rediviva. Arabis Halleri, arenosa, hirsuta. Cardamine resedifolia, amara subalpina. Dentaria bulbifera.

Viola biflora, lutea, palustris. — Acer Pseudoplatanus — Geranium sylvaticum — Dianthus superbus, Carthusianorum. Lychnis diurna. Silene inflata. — Parnassia palustris — Linum catharticum.

Sedum saxatile. Rhodiola rosea. — *Saxifraga Aizoon*. Chrysosplenium alternifolium. — Hypericum quadrangulare.

Bupleurum longifolium. Pleurospermum austriacum. *Laserpitium Archangelica*. Anthriscus sylvestris alp. Heracleum Sphondylium. Chaerophyllum hirsutum. Pimpinella magna. *Conioselinum Fischeri*. Meum Mutellina.

Epilobium trigonum, alpinum, origanifolium, angustifolium.

Mespilus Cotoneaster. Sorbus aucuparia. Rosa alpina. Geum montanum, rivale. Alchemilla vulgaris. Spiraea Aruncus, Ulmaria. Rubus saxatilis. Potentilla aurea.

Hedysarum obscurum. Vicia Cracca, sylvatica.

Ribes petraeum.

Lonicera nigra. — Galium boreale, sylvestre pumilum. — Valeriana officinalis, Tripteris, sambucifolia.

Hieracium villosum, alpinum cum var. nigresc., aurantiacum, prenanthoides, cymosum (Nestleri), stoloniflorum, collinum. Crepis succisifolia, paludosa, grandiflora, sibirica. Hypochoeris helvetica. Apargia hispida var. Homogyne alpina. Tussilago Farfara. Petasites albus. Doronicum austriacum. Cineraria crispa. Senecio nemorensis. Aster alpinus. Adenostylium albifrons. Gnaphalium norvegicum: Sonchus alpinus. Cirsium heterophyllum. Carduus Personata. Prenanthes purpurea. Achillaea Millefolium.

Campanula barbata, latifolia, persicifolia, Trachelium, rotundifolia v. pusilla. Phyteuma orbiculare. — Pyrola minor, media.

Gentiana verna, punctata. *Sweetia perennis*.

Digitalis grandiflora. *Bartschia alpina*. Euphrasia officinalis cum var. Alectorolophus pulcher. Veronica bellidioides, officinalis. Scrophularia Scopolii. — Thymus Serpyllum var. Prunella grandiflora. Lamium maculatum. Stachys alpina. — Myosotis sylvatica var.

Pinguicula vulgaris. — Primula elatior. — Plantago montana. — Thesium alpinum. Betula pubescens carpat. — Salix hastata, silesiaca. — *Juniperus nana*.

Rumex Acetosa arifolius. Polygonum Bistorta. — Asarum europaeum. — Orchis globosa, conopsea, maculata. Coeloglossum viride, albidum.

Veratrum Lobelianum. *Convallaria maialis*. *Polygonatum verticillatum*. *Streptopus amplexifolius*. — *Allium sibiricum*. *Lilium Martagon*. — *Juncus filiformis*, *trifidus*. *Luzula sudetica*, *maxima*, *albida*.

Carex vaginata, *rigida*, *atrata*, *caespitosa*; *Buxbaumii*, *flava*, *stellulata*, *montana*, *capillaris*. *Eriophorum alpinum*, *vaginatum*, *angustifolium*.

Phleum alpium. *Agrostis alpina*. *Calamagrostis Halleriana*. *Molinia coerulea*. *Aira caespitosa*. *Milium effusum*. *Phragmites vulgaris*. *Avena planiculmis*, *flexuosa*. *Poa alpina*, *sudetica**).

Die Vegetation des Kessels ist auch noch in sofern bemerkenswerth, als neben Pflanzen, welche unserer obersten Gebirgsregion angehören, — und auch das Auftreten von *Sorbus* und *Acer Pseudo-platanus* in Strauchform deutet auf die höhere Region hin — mehrere gefunden werden, welche sonst nur der nächsten Region oder auch der Ebene angehören und anderweitig nicht zu den allgemein verbreiteten und allen drei Regionen angehörigen zu rechnen sind, eine Bemerkung, die man an dergleichen Lehnen, namentlich wenn sie einige Ausdehnung haben, öfter zu machen Gelegenheit hat. Ausserdem, obwohl der Kessel selbst durchaus über der Baumgrenze liegt, denn erst in seinem Grunde beginnen strauchartige Fagi und niedrige Fichten zu erscheinen, bemerkt man unter den genannten Pflanzen mehrere, welche dem uns theils aus dem Riesengebirge bekannten, theils bald auch hier zu betrachtenden, Bezirke der obersten Waldregion angehören.

Ehe wir die Kämme des Gesenkes verlassen, erwähnen wir noch als eines sehr bedeutsamen Unterschiedes von denen des Riesengebirges den Mangel des Knieholzes, *Pinus Pumilio* Haenke, wovon sich kaum bestimmte Ursachen anführen lassen. Im Riesengebirge wenigstens erstreckt sich das Knieholz an sehr vielen Stellen um vieles tiefer als durchschnittlich die Kämme des Gesenkes, an einigen Stellen sogar bis mitten in die obere Waldregion hinein; auch ist das Knieholz nicht ein Begleiter des Granit oder Gneus, wie man muthmassen könnte; denn auf der *Bahia Gora*, wo Grauwacke zum Grunde liegt, erscheint dasselbe fast in derselben Höhe wie auf dem Riesengebirge. Gleichsam als Stellvertreter,

*) Das hier gegebene Verzeichniss, in welchem der Vollständigkeit halber, damit an diesem besonders geeigneten und merkwürdigen Beispiele die reiche und mannigfaltige Vegetation einer ausgezeichneten Gebirgslocalität anschaulich werde, alle beobachteten Arten aufgeführt sind, gründet sich sowohl auf unsere eigenen zum Theil früher bekannt gemachten Beobachtungen, als auch auf die von Schauer in der Regensb. Bot. Zeitung gegebenen sehr vollständigen Mittheilungen. Doch ist hiermit die Flora dieser reichen Gebirgsschlucht noch nicht erschöpft.

obwohl bei weitem nicht so verbreitet und häufig, findet man auf dem Kamm des Gesenkes *Juniperus nana*, welcher auch auf der Babia Gora in Gesellschaft des Knieholzes gefunden wird, dem Riesengebirge aber fehlt. Wir zweifeln nicht, dass diess eine von *J. communis* wohl unterschiedene Art sei.

Die Baumgrenze ist ebenso wie im Riesengebirge an verschiedenen Stellen nach der Lage und Temperatur derselben in verschiedener Höhe: östlich vom Petersstein 4082'. Die Vegetation der obersten Waldregion unter der Baumgrenze kommt fast in allen Stücken mit der des Riesengebirges überein und ist an sehr vielen Stellen durch eine ausserordentliche Ueppigkeit namentlich an den engeren Wasserschluchten, z. B. an der weissen Oppa, ausgezeichnet. Es ist hinreichend, wenn wir dieselben durch die Anführung von *Sonchus alpinus*, *Prenanthes purpurea*, *Galtonia crisa*, *Adenostylium albifrons*, *Petasites albus*, *Senecio nemorensis*, *Lonicera nigra*, *Ranunculus aconitifolius*, *Chaerophyllum hirsutum* andeuten. *Aconitum Lycoctonum* und eine Fülle von *Doronicum austriacum* nebst *Delphinium elatum* und *Valeriana Tripteris* sind hier dem Gesenke eigenthümlich; ausserdem ist *Poa sudetica* hier häufiger, *Aconitum Napellus* seltner als im Riesengebirge.

Anhangsweise betrachten wir noch als den letzten in die dritte Region reichenden Punkt den Gipfel der Babia Gora in Galizien. Das Oderthal trennt die herzynischen Gebirge der Sudeten, als deren Mittelpunkt das Riesengebirge gelten kann, von den karpatischen. Zu den letzteren gehört das bald jenseit der Oder aufsteigende Klokacz- oder Teschnische Gebirge, das wir jedoch wegen der Nähe der Oder und als südliches Grenzgebirge für einen Theil von Oberschlesien noch in Betracht ziehen. Die Babia Gora in Galizien bildet einen merkwürdigen Ausläufer dieses Gebirges, welcher von dem Hauptzuge der ungarischen Karpaten durch eine fast acht Meilen breite Thalebene völlig geschieden ist. Nach einer Messung des Postmeister Habelt in Skotschau im J. 1825 ist die Höhe der Babia Gora 5088*). Der Gipfel ist eben so wie der der Koppe mit unzähligen Felstrümmern der Grauwacke bedeckt, welche hin und wieder mit einer bunten Flechtenvegetation beschlagen sind. Bald über der Baumgrenze beginnt das Knieholz in einer Höhe von 4236' und reicht bis nahe an den Gipfel; *Juniperus nana* beginnt schon tiefer zu erscheinen. Etwas höher hinauf giebt es zahlreiche kleine Seitenschluchten, die gleichfalls mit Felstrümmern angefüllt sind und hin und wieder felsige Wände haben. Hier erscheinen *Doronicum austriacum*, *Poa su-*

*) Barometerstand 23' 8" 4"', Thermometer 10° R., Mittags 2 Uhr im Monat Juli.

detica var. hybrida, Ranunculus nemorosus, Aconitum Napellus, Sedum purpureum, Festuca varia, Saxifraga Aizoon, Juncus spadicus, Viola biflora, Sempervivum montanum, Potentilla aurea, Meum Mutellina, Homogyne alpina und Soldanella alpina, aber ebenso wie Allium Victoria-
 lis dürrig und ohne Blüthe; Geum montanum, Salix silesiaca, Festuca nigrescens Lam., Sedum Rhodiola, Bartschia alpina und Arabis arenosa.;
 der Gipfel selbst trägt noch Veronica aphylla, Soldanella alpina, Hieracium alpinum, Anemone narcissiflora, Potentilla salisburgensis u. aurea, Cerastium alpinum neben C. triviale Link, nebst Sempervivum montanum und Saxifraga Aizoon. In der tieferen Region findet man Senecio alpinus. Im Allgemeinen ist die Vegetation dieses Berges, wie auf den meisten des Klokaczgebirges, arm und mager im Vergleich zu der mannigfaltigen und üppigen des Riesengebirges und Gesenkes.

Folgende Pflanzenarten sind die unserer dritten Region ausschliesslich angehörig:

- Ranunculaceae.** Anemone narcissiflora, alpina. Delphinium elatum (Aconitum Napellus). Aconitum Lycoctonum.
- Cruciferae.** Arabis alpina. Cardamine resedifolia.
- Violaceae.** Viola lutea.
- Alsineae.** Arenaria verna. Cerastium alpinum.
- Papilionaceae.** Hedysarum obscurum.
- Dryadeae.** Geum montanum. Rubus Chamaemorus. Potentilla aurea, salisburgensis.
- Sanguisorbaceae.** Alchemilla fissa.
- Pomaceae.** Sorbus Aria.
- Onagrariae.** Epilobium trigonum, organifolium.
- Crassulaceae.** Rhodiola rosea. Sedum purpureum, repens. Sempervivum montanum.
- Grossulariaceae.** Ribes petraeum.
- Saxifragaceae.** Saxifraga Aizoon, oppositifolia, bryoides, muscoides, nivalis.
- Umbelliferae.** Bupleurum longifolium. Meum Mutellina. Conioselinum Fischeri. Archangelica officinalis. Heracleum sibiricum. Laserpitium Archangelica. Pleurospermum austriacum.
- Dipsacaceae.** Scabiosa lucida.
- Compositae.** Gnaphalium supinum. Doronicum austriacum. Aster alpius. Crepis grandiflora, sibirica. Hieracium prenanthoides, alpi-

- num, Halleri, rupestre, villosum. *Hypochoeris helvetica*. *Adenostylium albifrons*.
- Campanuleae.** *Campanula barbata*.
- Labiatae.** (*Stachys alpina*).
- Scrofularinae.** *Bartschia alpina*. *Alectorolophus pulcher*. *Pedicularis sudetica*. *Veronica alpina, bellidioides, aphylla*.
- Plantagineae.** *Plantago montana*.
- Primuleae.** *Androsace obtusifolia*. *Primula minima*. *Soldanella alpina*.
- Gentianeae.** *Gentiana punctata, asclepiadea, verna*. *Sweetia pennensis*.
- Polygoneae.** *Rumex alpinus*.
- Salicineae.** *Salix herbacea, Lapponum, hastata, phylicifolia*.
- Coniferae.** *Juniperus nana*. *Pinus Pumilio*.
- Liliaceae.** *Allium sibiricum, Victoralis*.
- Juncaceae.** *Luzula spicata, spadicea*. *Juncus trifidus*.
- Cyperaceae.** *Carex rupestris, atrata, rigida, vaginata, capillaris*. *Eriophorum alpinum*. *Limnochloe caespitosa*.
- Gramineae.** *Agrostis rupestris, alpina*. *Festuca varia*. *Poa laxa, alpina*. *Avena planiculmis*.

II. Zweite Region, Region des Vorgebirges.

Die Mannigfaltigkeit des Schlesischen Vorgebirges, welche auf seiner weiten Ausdehnung, der verschiedenartigen Gruppierung der Bergzüge und deren vielfältigen geognostischem Charakter beruht, lässt keine summarische und übersichtliche Darstellung seiner Vegetation zu, und wir werden uns in dieser Hinsicht darauf zu beschränken haben, diejenigen Pflanzen, welche als demselben ausschliesslich angehörend, für charakteristische dieser Region gelten müssen, zusammenzustellen, wenn dieselben auch zerstreut wachsen und nur an einzelnen und entlegenen Punkten derselben gefunden werden.

a. Das Klokacz-Gebirge, auch Beskiden, Schlesische Karpaten und Teschnisches Gebirge genannt. Wegen seiner abgesonderten Lage und seines abweichenden Charakters erheischt dieses Gebirge eine besondere Betrachtung. Sowohl nach der Erhebung seiner Höhen als auch nach seiner Vegetation steht es gleichsam in der Mitte zwischen dem Vor- und Hoshgebirge; die Grenze des letzteren erreichen nur zwei seiner Höhen, die Lissa Hora und der Berg Baranio (nach ungefährer

Schätzung 3800 — 4000' hoch). Der Gipfel der ersteren, 4082' hoch, ist baumlos aber äusserst kahl und pflanzenarm. Der Rücken des Berges Baranio reicht bis zur Baumgrenze, da *Abies Picea* und *Fagus* zwergig werden, und trägt einige Pflanzen, welche der dritten Region angehören. Ausserdem reichen mehrere Höhenpunkte bis nahe an diese Region, jedoch müssen sie sämmtlich zur zweiten Region gerechnet werden, und auch die baumlosen Höhen der Czantory-Berge bei Ustron sind nur Hochwiesen, da an ihrem Rande sogleich ein kräftiger Baumwuchs beginnt.

Die Vegetation erscheint in diesem Gebirge im Vergleich mit ähnlichen Gegenden des Riesengebirges und Gesenkes mager und dürftig, und es scheint, dass man den Grund davon in dem unterliegenden Gestein suchen müsse. Die dieses Gebirge konstituierende Grauwacke scheint durchaus nicht für eine reiche und üppige Vegetation geschickt zu sein. Denn wenn auch an vielen Stellen desselben ein grosser Mangel an Feuchtigkeit bemerkt wird, der als Grund für die dürftige Vegetation gelten kann: so sind doch andere Theile äusserst wasserreich, wie die zahlreichen Schluchten des Berges Baranio, in denen die Quellenarme der Weichsel (gewöhnlich werden deren 7 gezählt) dem Thale zuströmen. Von der üppigen Vegetation, welche an ähnlichen Stellen des Riesengebirges und Gesenkes dergleichen Quellbäche begleitet und dieselben gewöhnlich dem Auge verbirgt, ist hier kaum eine schwache Spur, und die grösseren Pflanzen dieser Plätze, wie *Aconitum*-*Valeriana*-*Senecio*-Arten stehen meist nur einzeln und sparsam; selbst Moose, Lebermoose und Flechten müssen sorgsam zusammengesucht werden, während sie in jenen beiden Gebirgen in dichten Polstern die Steine und Ränder bekleiden. Auch die höheren Wiesen und Sümpfe entbehren der Mannigfaltigkeit und Ueppigkeit jener Gebirge, und es sind fast nur die beiden Czantory-Berge, besonders der kleine, mit ihren nächsten Umgebungen und einige niedrigere Hügelgruppen, welche eine reichere Vegetation besitzen.

In der Baumvegetation tritt kaum ein namhafter Unterschied dieses Gebirges hervor. Denn *Taxus baccata*, die auf den niedrigeren Hügeln desselben als ein mitunter ansehnlicher Baum erscheint, ist auch anderen Stellen des Schlesischen Vorgebirges eigen. Auf der Höhe des Berges Baranio beginnen Fichten und *Fagus* zu verkrüppeln, welche auch an den Bergwänden, — denn nur auf dem Berge Baranio, den Beskiden und der Babia Gora sind Kämme, oder eigentlich nur kurze wellenförmige Rückengipfel — die Hauptbaumvegetation bilden.

Die Höhe des Berges Baranio erfüllen zum grössten Theile wenig fruchtbare Waldsümpfe, an deren Rändern als charakteristische Pflanze dieser Gegend *Senecio alpinus*, in zwei scheinbar als Arten verschiedenen

Formen mit ungetheilten und mit leierförmigen Blättern erscheint. Ausserdem bemerkten wir: *Cineraria crista*, *Neottia cordata*, *Aconitum Napellus*, *Ranunculus aconitifolius*, *Valeriana Tripteris*, *Senecio nemorensis*, *Homogyne alpina*, *Luzula maxima*, *Poa sudetica hybrida*, *Circaea alpina*, *Aspidium Fil. F.*, und nach Mittheilungen von Kotschy kommen daselbst auch vor: *Viola lutea*, *Gentiana asclepiadea*, *Rumex alpinus*, *Trientalis*, *Vaccinium Vitis idaea* am Gipfel, *Ranunculus nemorosus*, *Tozzia alpina*, *Bartschia alpina*, *Centaurea montana* am südöstlichen Abhange, *Doronicum austriacum*, *Hieracium prenanthoides* und *austriacum*, *Sonchus alpinus*, *Prenanthes purpurea*, *Veratrum Lobelianum*.

Nächst diesem sind die beiden, eigentlich einen einzigen Berg bildenden, Czantoryberge bei Ustron auszuzeichnen. Ihre Ränder sind theils mit Rothbuchen-, theils Fichtenwald bedeckt, nicht sehr wasserreich und nur am untern Theile fruchtbar; ihr Rücken ziemlich fruchtbare, mässig feuchte Hochwiesen. Hier werden gefunden: *Veronica montana*, *Salvia glutinosa*, *Phleum alpinum*, *Calamagrostis sylvatica*, *Lysimachia nemorum*, *Gentiana asclepiadea*, *Hacquetia Epipactis*, *Streptopus amplexifolius*, *Polygonatum verticillatum*, *Luzula albida*, *Veratrum Lobelianum*, *Acer Pseudoplatanus*, *Daphne Mezereum*, *Paris quadrifolia*, *Pyrola umbellata*, *Rosa alpina*, *Rubus hirtus*, *Ranunculus aconitifolius*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Digitalis grandiflora*, *Lathraea squamaria*, *Dentaria glandulosa* u. *bulbifera*, *Geranium sylvaticum*, *Corydalis bulbosa*, *Petasites albus*, *Senecio nemorensis*, *Hieracium sylvaticum*, *Sonchus alpinus*, *Prenanthes purpurea*, *Coeloglossum viride*, *Malaxis monophyllos*, *Nigritella angustifolia* nach Kotschy, *Epipactis latifolia*, *Cephalanthera ensifolia*, *Spiranthes autumnalis* nach Kotschy, *Salix silesiaca*, *Mercurialis perennis*, *Dictamnus Fraxinella* bei Konska nach Kotschy. In den Bergwäldern durch das ganze Gebirge findet man stellenweise und zerstreut als dieser Gegend besonders eigen: *Euphorbia amygdaloides* und *Hacquetia Epipactis*, ferner *Aspidium angulare* neben *A. aculeatum*, *Filix m.*, *Filix f.*, *Oreopteris*, *spinulosum*, *Dryopteris*, *Phegopteris* und *fragile*. Im Niedecker Schlege unter der gr. Czantory ist besonders die seltene *Carex maxima* auszuzeichnen. An den sich anlehnenden fruchtbaren Wiesen bei O. Lischna bemerken wir *Muscari comosum*, *Orchis militaris*, *variegata*, *globosa*, *Anacamptis pyramidalis*, *Lilium Martagon*, *Trollius europaeus*, *Gentiana cruciata*. — Als Repräsentanten der kleineren Hügel führen wir den eine Stunde von Ustron entfernten durch einigen Reichthum der Vegetation sich auszeichnenden Hügel, den Tul auf. Hier sind *Iris graminea* nach Kotschy, *Hacquetia Epipactis*, *Dianthus superbus*, *Stachys alpina*, *Dentaria enneaphyllos*, *Trifolium rubeus*, *Inula hirta* nach Kotschy,

Orchis mascula, *pallens*, *militaris*, *ustulata*, *sambucina*, *Anacamptis pyramidalis*, *Coeloglossum albidum*, *Cephalanthera ensifolia*, *Anthemis tinctoria*, *Orobanche major*. — Das Thal, in welchem sich die Weichsel aus ihren zahlreichen Quellen sammelt, von der Försterei durch Ober-Weichsel bis gegen Ustron bietet als Eigenthümlichkeiten dieser Gegend auf höheren Wiesen *Rumex alpinus*, in Waldsümpfen *Equisetum eburneum*, im niedrigen Thale zum Theil auf den kiesigen Ufern des breiten Flussbettes *Salix incana*, *Myricaria germanica*, *Struthiopteris germanica* und eine Fülle von *Spiraea Aruncus* und *Epilobium Dodonaei* dar.

Zuletzt führen wir noch die an verschiedenen Punkten zerstreuten Arten auf, welche theils dieser Gegend eigenthümlich sind (obwohl einige schon zur ersten Region gehörig), theils den Charakter der Vorgebirgs-Flora ausdrücken. *Salvia verticillata*. *Gladiolus imbricatus*. *Stipa pennata* nach Kotschy bei Konska und Trziniec, *Melica ciliata* bei Dzingelau, *Galium Cruciatum* und *vernum*. *Nonnia pulla* bei Ochab. *Pulmonaria angustifolia*. *Phyteuma orbiculare* bei Deutsch-Weichsel. *Atropa Belladonna*. *Gentiana cruciata* bei Lischna und Teschen, *ciliata*, *campestris* bei Ustron. *Passerina annua* bei Guldau, Mönchhof u. s. w. *Sambucus Ebulus*, *racemosa*. *Allium Ursinum*, *Victorialis* im Bielizer Geb. *Colchicum autumnale*. *Adoxa moschatellina*. *Dictamnus Fraxinella* bei Konska nach Kotschy. *Monotropa Hypopitys*. *Pyrola uniflora* an der Lissa Hora. *Lychnis diurna*. *Melampyrum sylvaticum*. *Lunaria rediviva*. *Trifolium spadicum*. *Centaurea montana* bei Konskau. *Cirsium eriophorum* an der Jablunkaer Schanze. *Carlina acaulis*. *Pyrethrum corymbosum* bei Friedek. *Gymnadenia conopsea*. *Cephalanthera rubra*. *Cypripedium Calceolus* um Bieliz. *Arum maculatum*. *Euphorbia dulcis*. *Empetrum nigrum*.

Das sämmtliche übrige zwischen 1700' und 3600' liegende Hügel- und Bergland von Schlesien lässt sich in Absicht auf die Vegetation sehr wohl zusammenfassen, indem diesem wesentlich ein und derselbe Charakter zukommt. Indem aber dieses Land nicht ein zusammenhängendes Ganze bildet, sondern aus mehreren theils zusammenhängenden, theils vereinzelt kleineren und grösseren Berggruppen besteht, welche von einander durch tiefere, bald schmälere, bald breitere Thäler getrennt sind, welche die Höhe von 1700' nicht erreichen und daher der ersten Region oder der Ebene anheimfallen, stellt sich auch die Vegetation desselben und deren Verschiedenheit von der Ebene weniger deutlich und entschieden heraus, und der Uebergang geschieht bisweilen sehr unmerklich, zumal da manche Pflanzen, wie wir es auch bei der dritten Region gesehen haben, die Fähigkeit besitzen bis in bedeutende Tiefen herabzustei-

gen. Bei einiger Aufmerksamkeit wird man indess bald gewahr, welche Pflanzen in dem Vorgebirge ihren eigentlichen Wohnsitz haben, indem dieselben nur zufällig und unter begünstigenden Umständen und an einzelnen Stellen bis in die erste Region hinabkommen, und diese dürfen als charakteristische aufgeführt werden. Um eine Uebersicht der Vegetation der zweiten Region zu erlangen, werden wir zunächst alle charakteristischen Pflanzenarten derselben auführen, und diejenigen, welche die Grenzen dieses Gebiets entweder gar nicht, oder höchst selten überschreiten, mit durchschossener Schrift anzeigen.

Thalictrum aquilegifolium. *Hepatica triloba*. *Anemone ranunculoides*. *Ranunculus aconitifolius*, *lanuginosus*, *nemorosus*. *Trollius europaeus*. *Helleborus niger*, *viridis*. *Aquilegia vulgaris*. *Aconitum variegatum*. *Actaea spicata*.

Corydalis cava, *fabacea*, *solida*.

Arabis arenosa, *hirsuta*. *Cardamine Impatiens*, *sylvatica*, *hirsuta*, *trifolia*. *Dentaria enneaphyllos*, *glandulosa*, *bulbifera*. *Lunaria rediviva*.

Helianthemum vulgare.

Viola palustris, *mirabilis*, *biflora*.

Drosera intermedia.

Silene gallica, *nutans*. *Lychnis diurna*.

Sagina saxatilis.

***Stellaria holostea*.**

***Hypericum montanum*.**

***Acer platanoides*, *Pseudoplatanus*.**

***Geranium sylvaticum*.**

Oxalis Acetosella.

Dictamnus Fraxinella.

Staphylea pinnata.

Anthyllis Vulneraria. *Trifolium rubens*, ***spadiceum***. ***Onobrychis sativa***. *Vicia pisiformis*, *sylvatica*. *Lathyrus latifolius*, ***macrorrhizus***. *Genista germanica*.

Spiraea Aruncus. *Rubus Idaeus*, ***Bellardi***, ***hirtus***, ***Schleicheri***, *saxatilis*. *Potentilla verna*. *Rosa alpina*.

Poterium Sanguisorba.

Cctoneaster vulgaris. *Sorbus aucuparia*, ***torminalis***.

Epilobium montanum, *virgatum*.

Montia fontana.

Sedum villosum. *Sempervivum soboliferum*.

Ribes alpinum.

- Saxifraga caespitosa*. *Chrysosplenium oppositifolium*.
Sanicula vulgaris. *Hacquetia Epipactis*. *Libanotis montana*.
Meum athamanticum. *Imperatoria Ostruthium*. *Laserpitium latifolium*.
Chaerophyllum hirsutum. *Myrrhis odorata*.
Hedera Helix.
Sambucus Ebulus, racemosa. *Lonicera nigra*.
Asperula odorata. *Galium Cruciata*, saxatile, sylvestre.
Valeriana dioeca.
Centaurea phrygia, montana, nigra. *Gnaphalium sylvaticum*. *Anthemis tinctoria*.
Pyrethrum corymbosum. *Arnica montana*. *Conyza squarrosa*.
Inula hirta. *Cineraria crispa*. *Senecio subalpinus*. *Hieracium echioides*,
 rupestre, rigidum. *Prenanthes purpurea*. *Petasites albus*, vulgaris.
Carduus Personata. *Cirsium heterophyllum*, rivulare, eriophorum,
Carlina acaulis.
Phyteuma orbiculare, spicatum. *Campanula Cervicaria*, latifolia.
Adenophora suaveolens.
Origanum vulgare. *Stachys recta*. *Melittis Melissophyllum*. *Salvia glutinosa*,
 verticillata.
Myosotis sylvatica. *Omphalodes scorpioides*. *Echinosperrnum deflexum*.
Lathraea squamaria. *Tozzia alpina*. *Melampyrum sylvaticum*.
Alectorolophus hirsutus. *Veronica montana*, *Teucrium*. *Digitalis ochroleuca*.
Verbascum Thapsus. *Pinguicula vulgaris*.
Atropa Belladonna.
Primula elatior. *Trientalis europaea*. *Lysimachia nemorum*.
Pyrola uniflora, media. *Arctostaphylos officinalis*. *Vaccinium Myrtillus*,
 uliginosum, *Vitis idaea*.
Gentiana ciliata, campestris, germanica, cruciata. — *Vinca minor*.
Rumex aquaticus.
Euphorbia amygdaloides. *Mercurialis perennis*.
Asarum europaeum.
Quercus Robur. *Fagus sylvatica*. *Betula pubescens*. *Salix myrtilloides*,
 silesiaca, incana, nigricans.
Juniperus communis. *Pinus obliqua*. *Abies excelsa*, pectinata, *Larix*.
Taxus baccata.
Thesium alpinum.
Coeloglossum viride. *Gymnadenia conopsea*. *Anacamptis pyramidalis*.
Orchis pallens, mascula, militaris, globosa, variegata. *Spiranthes auctumnalis*.
Corallorrhiza innata. *Goodyera repens*. *Cepha-*

Ianthera ensifolia. *Listera cordata*. *Malaxis monophyllos*. *Epipogium aphyllum*.

Lilium Martagon. *Allium fallax*. *Anthericum ramosum*.

Polygonatum verticillatum. *Streptopus amplexifolius*.

Luzula albida, *maxima*. *Juncus filiformis*. *Scheuchzeria palustris*.
Colchicum autumnale.

Leucoium vernum. *Narcissus Pseudonarcissus*.

Iris graminea. *Gladiolus communis*. *Crocus vernus*.

Carex pulicaris, *chordorrhiza*, *remota*, *montana*, *digitata*, *limosa*,
maxima, *filiformis*. *Eriophorum angustifolium*.

Calamagrostis sylvatica. *Festuca sylvatica*. *Bromus asper*. *Melica ciliata*, *uniflora*. *Poa sudetica hybrida*, *compressa*. *Avena pratensis*.

Arum maculatum.

Es sind demnach die Familien der Orchideen, Irideen, Gentianeen, Rosaceen, Umbellaten, Cruciferen, Personaten und Ranunculaceen, welche nach Verhältniss der Artenzahl überhaupt die meisten eigenthümlichen Arten im Vorgebirge aufzuweisen haben, und unter diesen möchten die Gentianeen und Orchideen die hauptsächlichste Stelle einnehmen. Der Unterschied der Vegetation von der der Ebene scheint demnach nicht eben sehr in die Augen fallend zu sein. Bedenkt man jedoch, dass erstens in der für das Auge am meisten auffälligen Baumvegetation der wesentliche Unterschied liegt, dass die Kiefer (*Pinus sylvestris*) entweder ganz fehlt oder nur noch an einzelnen Stellen erscheint, dass die in der Ebene nur zerstreut u. theilweise erscheinenden *Abies excelsa* und *A. pectinata* hier als die wichtigsten Bäume auftreten, dass unter den Laubbölzern *Fagus* die Oberhand hat, dagegen die Eichen nur am Saume und vereinzelt Stellen wachsen, so wie, dass unter den das Unterholz bildenden oder die Hügellehnen bekleidenden Strüchern *Evonymus*, *Rhamnus*, *Corylus*, *Salix cinerea* allmählich nach oben verschwinden, dagegen *Sambucus racemosa*, *Lonicera nigra*, *Salix silesiaca* eintreten; zweitens dass aus den in dem obigen Verzeichnisse aufgeführten Elementen immer einzelne oder mehrere zahlreich vorhanden sind und die Vegetationsdecke bilden helfen: so wird man es leicht begreiflich finden, wenn diese auf den Wiesen und in den Wäldern des Vorgebirges ein ganz anderes Bild gewährt als in der Ebene. Die einzelnen Bilder, welche sich nach den Jahreszeiten ändern und nach den unendlich mannigfaltigen Bedingungen des Bodens und der Lokalität überhaupt unzählige Modifikationen haben, prägen sich dem beobachtenden Auge leichter ein, lassen sich aber in diagnostischen Characteren oder registri-

renden Uebersichten niemals genügend darstellen. — Zur richtigen Würdigung des oben gegebenen Verzeichnisses ist noch zu bemerken, dass ein Theil der dort angeführten Gewächse der sogenannten regio collina (Hügelregion) angehört, daher sich dieselben an manchen höher gelegenen oder doch durch seine Lage und Bodenverhältnisse der Vorgebirgsgegend ähnlichen Punkten der Ebene finden. Die Bodenmischung nämlich ist ein so eigenthümliches, lange noch nicht genug erkanntes und sich auch der Beobachtung so sehr entziehendes Moment für die Hervorbringung der Pflanzenarten, dass man ihr stets neben der Erhebung des Bodens und der Lufttemperatur eine gleich bedeutende Stelle einräumen muss. Wenn man z. B. die Waldgegenden von Lissa, Arnoldsmühl und Koberwitz bei Breslau, die Trebnitzer Hügel von Skarsine bis Riemberg, die ersten Vorberge am Zobten und um Jordansmühl, Thomnitz, Striegau und Strehlen vergleicht, so wird man die hier gegebenen Bemerkungen bestätigt finden.

Nach dieser allgemeinen Uebersicht betrachten wir nun einige der bedeutenderen Berg-Gruppen und Plätze der zweiten Region, welche sich entweder durch Reichthum ihrer Flora oder dadurch, dass sie seltene und eigenthümliche Arten besitzen, auszeichnen.

In der oberschlesischen Ebene, auf dem rechten Ufer der Oder gehört nur der Annaberg nebst der Vyssoka Hora zw. Oppeln und Kosel in diese Region. *Salvia verticillata*, *Gentiana cruciata*, *Melittis Melisophyllum*, *Vicia sylvatica*, *Hypericum montanum*, *Epipogium Gmelini* nach Kölbings, *Cephalanthera pallens*, *rubra*, *ensifolia*, *Poterium Sanguisorba* und *Euonymus verrucosus* sind die seltneren Arten, welche bisher hier bemerkt worden sind.

Auf dem linken oberen Oderufer zeichnen sich die Hultschiner Berge durch einige Arten aus, welche auf die Flora des Klokaczgebirges hinweisen. Auf der Landecke findet man *Hacquetia Epipactis* und *Salvia glutinosa*, welche hier ihre letzte Station gegen Nordosten zu haben scheinen. Auch *Dentaria glandulosa* erstreckt sich nur bis hierher und bis in die Gegend von Ratibor.

Die Vorberge des Gesenkes weichen von dem übrigen Vorgebirge der Sudeten nicht wesentlich ab. *Carex rupestris* vom rothen Berge muss wohl der dritten Region zugewiesen werden. Ausserdem sind nur *Maxis monophyllos*, *Echinosperrum deflexum*, *Cirsium praemorsum*, *Stellaria Friesiana*, *Aspidium montanum*, *Botrychium matricarioides*, *Scrophularia Scopoli*, *Valeriana Tripteris*, diese jedoch nur von höherem Standort herabsteigend, als Eigenthümlichkeiten dieser Gegend hervorzuheben; vereinzelt findet sich *Epilobium Dodonaei*. — Der schnelle Abfall

des Altvatergebirges nach den Thälern begünstigt das tiefe Herabsteigen mancher Gebirgspflanzen, wodurch namentlich auch das enge Thal von Karlsbrunn (2331 nach v. Vincke) sich auszeichnen, in welchem z. B. noch *Valeriana Tripteris*, *Gnaphalium sylvaticum*, *Crepis grandiflora* gefunden werden.

Aus dem Neisser Gränzgebirge heben wir den grossen Jauersberg, welcher durch die Fülle von *Acer Pseudoplatanus* und *platanoides*, woher der Berg vor Alters seinen Namen erhielt, ausgezeichnet ist, hervor. *Sambucus racemosa*, *Lonicera nigra*, *Daphne Mezereum*, *Lychnis diurna*, *Dentaria enneaphylla* und *bulbifera*, *Neottia Nidus avis*, *Palanthera bifolia*, *Lilium Martagon*, *Myosotis sylvatica*, *Valeriana sambucifolia*, *Asperula odorata*, die Bergform von *Galeobdolon luteum*, *Lathraea squamaria*, *Chaerophyllum hirsutum* bilden hier unter hochstämmigen *Fagus* und *Abies excelsa*, an freien Wiesenplätzen auch *Orchis mascula* und *latifolia*, eine reiche Pflanzendecke. — Die letzte unmittelbar zur Gl. Neisse abfallende Höhe dieses Zuges, der Kapellenberg bei Wartha, bietet als seltene Arten *Seseli Libanotis*, *Epilobium Dodonaei*, *Arabis arenosa* und *Melica ciliata* dar.

Am Gläzer Schneeberge ziehen besonders der Wölfelsgrund und Klessengrund durch ihren Reichthum und das Herabsteigen einiger Arten, als *Veratrum Lobelianum*, *Doronicum austriacum*, *Cardus Personata*, eine Fülle von *Acer Pseudoplat.* und *platanoides* unsere Aufmerksamkeit auf sich. Seliger entdeckte auch hier das seltene und vereinzelt Epipogium Gmelini. Die Beobachtung der allmähigen Umbildung des *Epilobium palustre* bei zunehmender Höhe ist auch hier belehrend.

In dem Erlitz-Gebirge ist besonders die hohe Mense, ausgezeichnet durch eine Fülle von *Aconitum variegatum* und *Napellus* in vielen mannigfaltigen Formen, wegen der an einem Plateau derselben befindlichen grossen Moorsümpfe, welche unter dem Namen der Seefelder bekannt sind, merkwürdig. Ausser den die Ränder derselben umgebenden *Abies excelsa* und *Fagus* bewohnt diese Plätze die merkwürdige *Pinus obliqua* Suter (besser *Pinus uliginosa* von Neumann genannt).*) Diese

*) Dieselbe Form findet sich auch auf den Hochsümpfen der Heuscheuer, wo wir sie selbst zu sehen Gelegenheit hatten, auf dem Moosbruche bei Reiwiesen im Gesenke, und nach Weeber im böhmischen und sächsischen Erzgebirge. Schauer hat erklärt und nachzuweisen versucht, dass diese Kiefer, welche auch auf Mooren bei Lomnitz im Hirschberger Thale vorkommen soll, nichts anderes als die vollständiger entwickelte Form von *P. Pumilio* sei, oder richtiger gesprochen, dass *P. Pumilio* eine durch den höheren Standort modificirte gleichsam Zwergform dieser Kiefer sei. Grabowski glaubte dieser Ansicht beistimmen zu müssen. Nach wiederholten Untersuchungen des Holzes, der Blätter und Früchte habe ich nichts gegründetes dagegen einzuwenden.

Sümpfe sind fast der einzige Fundort von *Betula nana* im Gebiet; ausserdem sind *Drosera anglica* und *intermedia?*, *Scheuchzeria palustris*, *Carex limosa* zu bemerken. — Die Umgebungen von Reinerz und Cudowa sind durch einige seltene Pflanzen bemerkenswerth, unter denen *Cardamine trifolia*, einziger Standort im Gebiet, *Orchis globosa* und *ustulata*, *Gentiana ciliata* und *germanica*, *Salix silesiaca*, *Campanula latifolia*, *Poa sudetica hybrida* und *Equisetum eburneum* hervorzuheben sind.

Das Heuscheuer-, ein Quadersandstein-Gebirge, obwohl von weiter Ausdehnung und ansehnlicher Gruppierung, besitzt keine eigenthümliche Arten; vielmehr gehört eine magere und dürftige Pflanzendecke zu seinem Charakter, der an dem höchsten Punkte, der Heuscheuer selbst, und den übrigen mauerförmigen Felsrücken dieses Zuges deutlich ausgesprochen ist. Nur an abhängigen feuchten Waldstellen erscheint hier und da eine reichere Vegetation aus *Sonchus alpinus*, *Rosa alpina*, *Valeriana sambucifolia*, *Senecio nemorensis*, *Lonicera nigra*, *Spiraea Ulmaria* u. s. w. gemischt. Dagegen nehmen die auf den Plateau's dieses Gebirgszuges und zwar besonders auf dem Hauptplateau der Heuscheuer selbst bisweilen ziemlich umfangreichen Hochsümpfe unsere Aufmerksamkeit in Anspruch*), welche mit den Seefeidern der hohen Mense die grösste Aehnlichkeit haben. Auch hier bildet *Pinus obliqua* den hauptsächlichsten Baum, nach Lage und Höhe von verschiedener Grösse, dazwischen Birke und Erle theils als niederer Wald theils als Gesträuch. Auf den moorigen Stellen zwischen Sumpfmöos erscheinen *Listera cordata*, *Carex filiformis*, *chordorrhiza*, *dioeca*, *limosa*, *Salix myrtilloides*, *Comarum palustre*; an den freieren Stellen im Sumpfe selbst *Drosera anglica*, *Scheuchzeria* und *Utricularia intermedia*. Fortgesetzte Durchforschung lässt noch einen Zuwachs an Seltenheiten hoffen. Am Abfall dieses Gebirges bei Dörnrikau wächst *Saxifraga caespitosa* var. *sponhemica*.

Eine ziemlich gedrängte Gebirgsgruppe mit einzelnen Gipfeln, Rücken und kleinen Hochebenen bildet das zwischen Friedland, Braunau, Charlottenbrunn und Waldenburg liegende plutonische Gebirge, aus **Porphy**r und **Basaltit** mit grossen Lagern von Steinkohle, dessen Haupterhebungen der **Heidelberg**, **schwarze Berg** und **Storchberg** sind.***) Die Vegetation ist reich und mannigfaltig. An den

*) deren nähere Kenntniss wir den sorgfältigen Beobachtungen des Apotheker Neumann in Wünschelburg verdanken. Vgl. Uebers. d. Arb. etc. d. Schles. Ges. im J. 1837.

**) Die genaue Kenntniss desselben, sowohl der phanerogamen Flora der Jetztwelt als auch besonders der Ueberreste der vorweltlichen Flora, haben wir bekanntlich dem unermüdeten Beinert in Charlottenbrunn zu verdanken.

Berglehnen wechseln *Fagus* und die beiden *Acer*-Arten mit *Abies excelsa*. Durch Pflanzenreichthum ausgezeichnet sind der lange Berg bei Donnerau und die Umgebungen des schwarzen Berges und Sandgebirges. Wir erwähnen als die vorzüglicheren Arten *Narcissus Pseudo-Narcissus*, *Dentaria enneaphyllos*, *bulbifera*, *Cardamine sylvatica*, *Asperula odorata*, *Lathraea Squamaria*, *Monotropa Hypopitys*, *Primula elatior*, *officinalis*, *Orchis mascula*, *Petasites albus*, *officinalis*, *Leucoium vernum*, *Gentiana campestris*, *germanica*, *ciliata*, *Geranium sylvaticum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Archangelica officinalis* (Lomniz), *Centaurea phrygia*, Mehrere Formen der *Hieracia cymosa*, *Hier. molle*, *Cirsium heterophyllum*, und *C. oleraceo-palustre*, *Lilium Martagon* und an einzelnen Stellen *Cineraria crispa*, *Campanula latifolia*, *Aconitum variegatum gracile*, *Allium ursinum*, *Sempervivum soboliferum*, *Ribes alpinum*, *Omphalodes scorpioides*, *Juncus filiformis*, *Homogyne alpina*, *Sonchus alpinus*, *Conyza squarrosa*, *Elymus europaeus*, *Festuca sylvatica*, *Bromus asper*.

Das Eulen-Geb., dessen Hauptzug ein ansehnlicher Gneusrücken, sich in der hohen Eule zu 3036' und in der Sonnenkoppe zu 2840' erhebt, und woran sich im Süden ein Bergzug aus rothem Sandstein, nach Ost und Nord ein Serpentin-Gebirge anschliesst, ist von mässiger Fruchtbarkeit und ohne hervorstechende Vegetation. Wir bemerken *Salix silesiaca*, *Potentilla aurea* (?), *Orchis mascula*, *Phleum alpinum*, *Sonchus alpinus*, *Arabis Halleri*, *Veratrum Lobelianum*, *Conyza squarrosa*, *Dentaria bulbifera*, *enneaphylla*, *Arnica montana*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Paris*, *Sanicula* als die in der höheren Region desselben häufiger vorkommenden Arten.

An den südlichen Vorbergen gegen Neurode und Wünschelburg erscheint nach den Lokalitäten eine grosse Abwechslung in der Vegetation; wir heben als häufig erscheinende Pflanzen *Orchis conopsea*, *Platanthera bifolia*, *Pedicularis palustris*, *Epilobium montanum* β . *minus*, *Hedera*, *Arnica*, *Rubus hirtus* hervor und bemerken von einzelnen Punkten: *Goodyera*, *Cirsium rivulare*, *Pyrola media*, *Arundo Halleriana*, *Rosa alpina*, *Rubus saxatilis* u. *Schleicheri*, *Hieracium Nestleri*, *bifurcum*, *Fragaria elatior*, sämmtlich am Zentner bei Hausdorf, *Pyrola uniflora*, *Galium sylvestre*, *Lathyrus sylvestris*.

Nach Norden senkt sich die Eule gegen Schweidnitz in die Berge um Kynau, welche durch den Reiz ihrer Lage bekannt und auch um ihrer Vegetation willen bemerkenswerth sind. In den Seiffen zwischen Charlottenbrunn und Kynau werden nächst anderen *Cephalanthera ensifolia*, und *Lathyrus macrorrhizus*, im Schlesierthale *Rosa alpina*, *Ribes alpi-*

num, *Spiraea Aruncus*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Primula elatier* neben *officinalis*, *Orcis mascula* neben *Moric* und *Gymnadenia conopsea*, *Valeriana dioeca*, *Aquilegia*, *Luzula albida*, *hirsuta*, *Anthemis tinctoria*, *Digitalis grandiflora*, *Silene nutans*, *Lychnis viscaria* neben mehreren anderen Arten, welche die niedrige Lage dieses Thales (1400') andeuten, gefunden. Im Weistritzthale ist als Seltenheit *Polypodium ilvense* zu bemerken.

Ein anderer Vorgebirgszug der Eule, ein Serpentinegebirge, besonders zwischen Frankenstein und Nimptsch, endiget mit dem Zobtengebirge, welches plötzlich in die Ebene herabfällt. Auf den Grochenbergen (auch Briesnitzer Berge) zwischen Silberberg und Frankenstein werden *Taxus*, *Sorbus torminalis*, *Lonicera nigra*, *Xylosteum*, *Daphne Mezereum*, *Digitalis grandiflora*, *Melica uniflora*, *Hypericum montanum*, *Atropa*, *Arctostaphylos officinalis*, *Prenanthes purpurea*, *Conyza squarrosa*, *Chaerophyllum hirsutum*, *aromaticum*, *Trifolium rubens*, *Anthericum Liliago*, *Genista germanica*, *Melittis*, *Pyrethrum corymbosum*, *Ranunculus nemorosus*, *Avena pratensis*, *Rubus hirtus* gefunden. — Die meisten dieser Arten kommen auch auf den östlichsten Ausläufern dieses Zuges um Strehlen, auf den Rummelsbergen vor, namentlich auch *Sorbus torminalis*, wo ausserdem noch *Vinca minor*, *Tilia grandifolia*, *Cephalanthera ensifolia* und nach Schummel auch *Adenophora suaveolens* gefunden werden. — Der Zobtenberg, 2318', wo über Granit und Gneus Serpentin und Gabbro gelagert ist, für das gesammte Niederschlesien ein äusserst ausgezeichneteter Gesichtspunkt, bietet als erste bedeutende Erhebung unmittelbar aus der Ebene auch in der Vegetation einige Merkwürdigkeiten dar. Die Formen der Sippe *Rubus* haben wir nicht leicht anderwärts in so belehrenden und die Polymorphie und Variation erläuternden Formen gefunden als hier, wo man beim allmäligen Aufsteigen *R. villicaulis* in den *R. Radula* sich verwandeln sieht und *R. hirtus*, *Bellardi*, *Schleicheri*, *thyrsoides* in mannigfaltigen Gestalten beobachtet. Gegen den Gipfel erscheinen *Prenanthes purpurea*, *Polygonat. verticillatum*, *Acer platanoides*, *Petasites officinalis*, *Lilium Martagon*, *Pyrola chlorantha*, *Atropa*, *Daphne*, *Festuca sylvatica*, *Poa sudetica*, *Lysimachia nemorum*, *Gentiana Amarella* var. ausser anderen auch in tieferen Gegenden vorkommenden Arten; an den Abhängen entdeckten wir hier zuerst das seltene *Epilobium virgatum*; am Fusse wachsen: *Festuca heterophylla*. *Vicia tenuifolia*. *Spiraea Aruncus* und viele Formen des *Hieracium sylvaticum*. An selteneren Arten noch reicher ist der nur durch ein schmales hohes Thal davon getrennte Geiersberg. Um den Gipfel desselben werden *Q. Robur*, *Asperula tinctoria*, *Galium sylvestre*, The-

sium alpinum neben *Linophyllum* var., seltene Formen des *H. cymosum*, *Allium fallax*, *Festuca duriuscula* glauca, *Avena flexuosa*, *Anthericum Liliago*, *Polygonatum anceps*, *Euphorbia pilosa*, *Melittis*, an den Lehnen *Trifolium rubens*, *Lathyrus latifolius*, *Campanula glomerata*, *Laserpitium latifolium*, *Dianthus superbus*, *Potentilla alba*, *Adenophora suaveolens*, *Geranium sanguineum*, *Anthyllis Vulneraria*, *Hypericum montanum*, *Pyrethrum corymbosum*, *Pyrola minor* und *media*, *Carex disticha*, an und auf den Wiesen am Fusse *Ranunculus nemorosus*, *Carex montana*, *caespitosa* (*pacifica* Doej.) und *stricta*, *Scorzonera humilis*, *Prunella grandiflora*, *Cuscuta Epithimum*, *Peucedanum Cervaria*, *Gladiolus communis* neben *imbricatus*, *Limnochloe pauciflora*, *Carex Davaliana* gefunden.

Im Bober- und Katzbach-Geb. zeichnen sich die Basalt-Berge bei Striegau, der breite B., Georgen-B. und Kreuzberg durch einige seltene Arten aus. Neben Pflanzen tieferer Gegenden als *Quercus Robur*, *Prunus spinosa*, *Origanum vulgare*, *Geranium columbinum* und *divaricatum*, *Cerastium brachypetalum*, *Gnaphalium uliginosum*, *Elatine Alsinastrum*, *Thymus Acinos*, *Galium boreale*, *Trifolium agrarium* und *montanum* werden *Epilobium montanum* $\beta.$ minus, *Potentilla recta* und *rupestris*, *Echinosperrum Lappula*, *Gentiana cruciata*, *Digitalis grandiflora*, *Poterium Sanguisorba*, *Cotoneaster vulgaris*, *Dianthus prolifer*, *Verbascum Schraderi*, *Sempervivum soboliferum*, *Vicia tenuifolia*, *dumetorum*, *sylvatica*, *pisiformis*, *Seseli Libanotis*, *Inula hirta*, *Laserpitium latifolium*, *Trifolium rubens*, *Pyrethrum corymbosum*, *Veronica Teucrium* gefunden. — Aus der Gegend von Schönau ist als Seltenheit *Staphylea pinnata* (ob wirklich wild?) zu bemerken. — Endlich sind noch die basaltischen Erhebungen, der Spitzberg bei Probsthayn mit *Festuca aspera*, *Asperula odorata*, *Allium fallax*, *Lilium Martagon*, *Pyrola uniflora*, *Cotoneaster vulgaris*, *Origanum*, *Vicia pisiformis*, *Cephalanthera rubra* und *Taxus baccata*, so wie der Grödizberg zu bemerken, auf welchem *Calamagrostis sylvatica*, *Poa bulbosa*, *Festuca aspera*, *Asperula odorata*, *Galium sylvestre*, *Primula elatior*, *Lysimachia nemorum*, *Phyteuma spicatum*, *Viola mirabilis*, *Sambucus racemosa*, *Lilium Martagon*, *Luzula albida*, *Pyrola minor*, *media* und *chlorantha*, *Actaea*, *Lathraea*, *Vicia cassubica* und *dumetorum*, *Cephalanthera ensifolia* und *Poterium Sanguisorba* bemerkt werden.

Wir beschliessen diese Uebersicht der Vegetation des Vorgebirges mit den Umgebungen des durch seinen romantischen Thalgrund ausgezeichneten Fürstensteines. *Veronica Teucrium*. *Circaea intermedia*. *Calamagrostis Halleriana* und *sylvatica*. *Arrhenatherum elatius*. Fe-

stuea aspera. Galium sylvestre. Ribes alpinum. Vinca minor. Hedera. Seseli Libanotis. Leucoium vernum. Polygonatum anceps. Rubus saxatilis. Rosa alpina und rubiginosa. Origanum vulgare. Galeopsis cannabina. Lathraea. Corydalis cava u. fabacea. Lathyrus sylvestris. Vicia dumetorum. Conyza. Arnica. Anthemis tinctoria. Hieracium echioides. Hypochoeris maculata und Taxus baccata sind die bemerkenswerthesten hier vorkommenden Arten, welche theils auf die höhere zweite Region, zum Theil aber nebst vielen anderen hier nicht genannten auf die tiefe Lage und die Nähe der Ebene hindeuten.

III. Erste Region, R. der Ebene.

Wenn die Flora unserer dritten, der Hochgebirgs-Region, bei der Zusammendrängung derselben auf verhältnissmässig kleine Räume eine leichtere Uebersicht verstattet und sich für die Betrachtung in einen überschaulichen Rahmen zusammenfassen liess, wenn dagegen die Vegetation des Vorgebirges, dessen Theile mehr auseinanderfallen, schon schwerer zusammenzufassen und zu veranschaulichen war: so ist eine übersichtliche Charakteristik der Flora der Schlesischen Ebene bei der grossen Mannigfaltigkeit derselben noch unweit schwieriger. Indem wir hier die Mängel unserer Kenntniss nicht verhehlen, bitten wir daher unsere Leser sich einstweilen damit begnügen zu lassen, wenn wir zu diesem Ende zuerst die Flora der Umgebungen von Breslau, als welche am meisten durchsucht und bekannt sind, etwas ausführlicher gleichsam als Repräsentanten dieser Region, vortragen, dann einige der wichtigsten Punkte der Ebene durch die Eigenthümlichkeiten ihrer Vegetation charakterisiren und zuletzt diejenigen Arten, welche ausschliesslich in der Region der Ebene vorkommen, zusammenstellen.

Ausser den Thalgegenden des Vorgebirges, welche grösstentheils unter 1700' liegen, gehört zu dieser Region das sämmtliche übrige Nieder- und mit Ausnahme etwa des Annaberges und der Vorberge des Gesenkes das gesammte Oberschlesien oder sämmtliches Land, welches von einer durch die Ortschaften Bielitz, Teschen, Friedek, Troppau, Jägerndorf, Neustadt, Neisse, Strehlen, Zobten, Schweidnitz, Striegau, Jauer, Goldberg, Löwenberg, Greifenberg, Lauban, Görlitz, gezogenen Linie nördlich liegt. Der grössere Theil dieses Landstriches, wohl über zwei Drittheile von ganz Schlesien ist wirkliche Ebene, theils eine Art Hochebene wie Oberschlesien, theils Tiefland wie die Thalsohlen der Oder, der unteren Neisse, der Weide, der

unteren Weistritz, der Bartsch und des unteren Bober, theils wellenförmiges Land, das sich an der Gränze von Südost gen Nordwest in einer mehr oder weniger fortlaufenden Hügelreihe erhebt, welche bei Pless beginnt, am ausgezeichnetsten in den Trebnizer Hügeln heraustritt und bei Grünberg endigt.

Die gesammte niederschlesische Ebene ist auf eine ausgezeichnete Weise bewässert. Eigentliche Landseen besitzt dieselbe nicht, sondern nur Fischteiche, welche abwechselnd besät und bewässert werden, unter denen von einiger Grösse und Bedeutung der Schlauer See bei Beuthen, der Damnteich bei Priebus und die unten zu erwähnenden Teiche bei Militsch und Trachenberg sind. — Nach der Vegetationsdecke kann man in dieser Ebene Ackerland, Wiese, Wald und Haide unterscheiden. Haideland in grösserer Ausdehnung findet sich besonders im nordöstlichen Theile von grossen Kieferwäldungen eingeschlossen, hie und da an Moor- und Bruchland angränzend. Der Laubwald, besonders Eichenwald oder gemischtes Holz herrscht vor in den Flussthälern; die Oderwälder, ehemals fast ununterbrochene Reihen von Eichenwäldern, jetzt von Jahr zu Jahr mehr gelichtet, zeigen eine fast durchgehends gleichförmige Vegetation. Kieferwald ist besonders den genannten Höhenzügen eigen, denen sich an der nördlichen Absenkung hie und da Hochlaubwald d. i. von *Fagus sylvatica* nebst Fichten und Tannen als Mengung anschliesst. Wiesen der mannigfaltigsten Art, aber nirgends in grosser Ausdehnung; für den Botaniker bieten die Moor- und Torfwiesen, welche zahlreich und sehr zerstreut, doch nirgends von grosser Ausdehnung sind, die seltnere und reichere Vegetation dar. Den bei weiten grössten Theil der Oberfläche nimmt das Ackerland ein, dessen bester Theil mit Waizen und Roggen, nächstdem mit Gerste und Hafer bebaut ist, denen als Stoppelfrucht die Wasserrübe nachfolgt. Allgemein ist der Anbau der Kartoffel. Der Anbau des Leins ist über das ganze Gebiet verbreitet, hier und da, zumal in der Hügelgegend in grösserem Masse. Der Anbau des Raps und der Runkelrübe ist in neuerer Zeit viel allgemeiner geworden. Als Zwischenfrucht werden Erbsen, Linsen und Wicken gebaut; die Esparsette und Luzerne nur vereinzelt. Hirse nur sporadisch und in kleinen Parteen. Schlechte Sandäcker werden hie und da auf grössere Strecken mit Haidegrütze (Buchwaizen) bebaut. Um die grösseren Städte, namentlich um Breslau und Liegnitz wird starker Gemüsebau betrieben. Tabak nur um Ohlau, Wanssen und Neumarkt. Auf den sandigen Hügeln um Grünberg findet bekanntlich ein schwunghafter Weinbau statt, der wohlschmeckende Trauben aber nur ein sehr mittelmässiges Getränk gewinnen lässt.

Die Flora der Umgegend von Breslau.

Breslau liegt fast in der Mitte des ganzen Schlesischen Oderthales; der Spiegel der Oder 360' über der Ostsee. Der mittlere Barometerstand auf der Sternwarte (112 F. über dem Oderspiegel) aus 27jährigen Beobachtungen ist 27 Zoll 7,615 Lin., die mittlere Jahrestemperatur + 6,37 Reaum., die der Wintermonate + 1,47, die der Sommermonate + 11,07. Die herrschenden Winde sind West- und Südwestwinde, welche nur selten heiteres Wetter bringen, gewöhnlich fortdauernde Regengüsse oder halbheitere Tage mit einzelnen Regengüssen oder Strichregen. Südwinde mit ziemlich heiterer Luft wehen bisweilen durch mehrere Tage im Frühling, in manchen Jahren auch im Herbst. Heiteres Wetter durch längere Zeit tritt gewöhnlich nur bei Ostwind ein, in welchen sich der Westwind durch Nordwest und Nord umzusetzen pflegt. Längere Dauer desselben pflegt im Mai oder Juni und besonders auch im August und September einzutreten. Gewöhnlich ist der Eintritt des Frühlings spät und wird, nachdem im Februar und März ein kurzer Vorfrühling da gewesen, durch neue Kälte mit Regen und Wind verzögert, so dass die Vegetation nur sehr allmählig im März und April fortschreitet. Daher zeigen sich grosse Differenzen in der Blüthezeit der Frühlingsgewächse in verschiedenen Jahren, wie z. B. die ersten Blüthen von *Prunus spinosa* schon am 11. April, ein andermal wieder am 12. Mai, *Galanthus nivalis* schon am 26. Januar und auch bis in den April hinein beobachtet wurde. Diese Differenzen gleichen sich für die wildwachsenden Pflanzen in der Regel bis gegen Johannis vollständig aus; doch variirt die Roggenärnte nach der Beschaffenheit des Frühjahrs um einige Wochen. Am meisten offenbart sich der Einfluss der Frühlingswitterung in dem früheren oder späteren Eintritt der Baumblüthe, namentlich der Pomaceen. Die Witterung des Sommers entscheidet für die Vegetation der Wiesen, Triften u. s. w. überhaupt die einjährigen und niedrigen krautigen Gewächse. Trockne und heisse Sommer berauben diese Plätze, welche des Schattens und Schutzes vor den Sonnenstrahlen entbehren, sehr bald ihres Schmuckes, am meisten die torfigen und sonst nassen oder sumpfigen Wiesen; solche Stellen erscheinen dann ausgebrannt und wie versengt; grüne Vegetation ist dann nur im Schatten der Wälder und an den Ufern der Gewässer und Teiche anzutreffen, wo sich dann auf den sonst vom Wasser bedeckten Plätzen eine reiche und bisweilen sehr üppige Vegetation entwickelt, auch mit manchen sonst wohl seltneren Arten. — Nach feuchten und durch veränderliches Wetter ausgezeichneten Sommern folgt oft ein langer und schöner Herbst, mit milder Temperatur auch bis in den December; Frost und Schnee treten meist nicht vor Ende October, bisweilen

erst in oder nach dem December ein. Späte Fröste im April und Mai schaden oft der schon entwickelten und vorgerückten Vegetation, wie denn ausser manchen Garten- und Anbau-Gewächsen die eben entfalteten Blätter der Eichen sehr oft erfrieren und die Blüten der Obstbäume nicht selten durch die Frühlingsnachtfröste beschädigt und die Obstärnte durch sie benachtheiligt wird. — Auch in den Umgebungen von Breslau lässt sich nach der Lage und Bodenbeschaffenheit eine nicht unbedeutende Verschiedenheit in dem Erscheinen der Vegetation beobachten; am frühesten tritt sie in der nächsten Umgebung der Stadt heraus; in der etwas höher liegenden holzreicheren Gegend von Lissa und Arnolds Mühl blühen dieselben Gewächse, z. B. *Anemone nemorosa*, *Viola hirta* schon fast um acht Tage und in der Gegend von Skarsine und Trebnitz um fast vierzehn Tage später.

Die Umgegend von Breslau, für welche wir einen Radius von 3-4 Meilen annehmen, wird von der Oder, die ihren Lauf von S. O. nach N. W. nimmt, in 2 gleiche Theile getheilt. Die N. u. NW. Gränze bildet die Trebnitzer Hügelreihe, die sich N. W. bei Auras bis nahe an die Oder erstreckt. Das linke Ufer der Oder erhebt sich gegen S. W. allmählig aber unbedeutend und wenig bemerkbar. Ausserdem giebt es auf beiden Seiten nur wenige Hügel, von denen man eine Umsicht über die nächste Umgebung hat, rechts bei Carlowitz, Oswitz, Ransern, Schwoitsch und Paschkerwitz, links bei Oderwilken und Rottwitz, welche sämmtlich sandigen Grund haben, aber ungeachtet der geringen Höhe von Wichtigkeit sind, da sie eine eigene Vegetation zeigen, einige auch seltene oder sonst nicht weiter vorkommende Arten hegen.

Die Oder ist bei Breslau selbst in mehrere Arme getheilt, unter denen der grösste, vom Dorfe Scheitnich bis gegen Pöpelwitz in einem grossen Bogen die Nordseite der Stadt umströmende, unter dem Namen der alten Oder bekannt ist. Diesem Arme entlang ziehen sich theils bestrauchte, theils kahle Dämme hin, wie dieses auch an dem Hauptstrome der Fall ist. Von beiden Seiten sind die Ufer mit Weidengesträuch bewachsen und das Flussbett in trocknen Sommern an vielen Stellen fast ganz versandet und trocken gelegt. Durch die in den Strom gebauten Buhnen wird zwischen denselben angeschwemmtes Land gebildet, das in trocknen Sommern nicht ohne Vegetation ist, welche der der sandigen Teichränder gleicht. Das zwischen den Dämmen der alten Oder und den Ufern befindliche Land ist meist sehr versandet, mit Weidengesträuch und an einigen Stellen auch mit niedrigem Eichengebüsch bewachsen. Die Ufer sind meist flach und wenig erhöht, nur im S. W. bei Rattwitz und Tschirne erhebt sich das rechte Ufer zu einer ansehnlichen Höhe.

Im Westen des bei Scheibitz mündenden tiefen Arm der Weide, das Schwanenwasser, welches rechts in Ohlau mündet die eigentliche Weide-
 u. a. m. die bei Ohlau ziemlich lang und da stagnirender und
 oberhalb Ohlau tiefer Ebene
 an der Ufer vereinigen sich in Breslau selbst die Ohlau, bei
 der Oder.

Die Ohlau ist von derselben Beschaffenheit wie die Weide, die Loh-
 floss schneller und hat mehr kiesigen und sandigen Grund, die Weistritz
 bekommt ihren Ursprung aus dem Gebirge noch mehr durch ihr öfteres
 plötzliches Anschwellen und die alsdann reissende Strömung.

Von einiger Bedeutung finden sich im ganzen Gebiete nur um
 bei Ohlau und um Belkau; in der Nähe der Oder, Ohlau und
 befinden sich aber zahlreiche kleine stehende Gewässer, wahr-
 scheinlich Ueberbleibsel vormaliger grosser Ueberschwemmungen.

Sümpfe sind vorherrschend in den Umgebungen der Weide und Ohlau,
 dann um Garsuche, zwischen Lissa und Oderwilken, Riemberg, Kober-
 witz u. s. w. Bewässerte Gräben, meist bestimmt den feuchten oder sum-
 pfigen Wiesen und den Brüchen das Wasser abzuleiten, finden sich be-
 sonders um die Schleibitzer, Weigelsdorfer, Lissaer und Oderwilkner,
 Koberwitzer, Riemberger und Garsucher Wiesen und Sümpfe. Moor-
 und Torfwiesen sind namentlich um Nimkau, bei Bruch und Kadlau, zwi-
 schen Hauffen und Riemberg, und bei Lissa.

Den grösseren Theil des Bodens hat der Feld- und Ackerbau in Besitz
 und der ursprüngliche Alluvialboden ist daher mit einer nach
 dem Alter der Kultur höheren oder seichteren durch Dü-
 ngen Lage von Humus bedeckt. Noch verschwinden Jahr-
 und Wiesenstücke und werden in Getraide- oder Kartof-
 fefelder verwandelt. Grössere Wiesen hat daher die Gegend gar nicht,
 und die höhere oder trockene Wiesenboden fehlt zwar nirgends, ist aber
 keine Plätze oder Strecken beschränkt, welche sich besonders
 als Waldgründen hinziehen. Häufiger sind feuchte und nasse Wiesen,
 auf an den Ufern der Nebenflüsse, welche meist eine sehr reiche Heu-
 ernte gewähren. Von der Masse des ehemaligen Waldes, der zum Theil
 noch im Anfange dieses Jahrhunderts grössere Strecken zusammenhängend
 bedeckte, ist nur noch wenig vorhanden; Bestände von einigem Umfange
 sind nur noch an einigen Punkten im Odergebiet und in der Trebnitzer
 Hügelkette zu finden, ausserdem gibt es nur kleinere zerstreute Wäld-
 chen und Gehölze.

Laubwäld und Laubgehölz zumal Eichenwäld und gemischtes Holz finden sich vorzüglich auf dem linken Gebiete der Oder und längs den Oderufem selbst, auf dem rechten dagegen ist der Nadelwäld, hie und da auch mit der Rothbuche, vorherrschend.

Eichenwäldungen von *Quercus pedunculata* sind dem Gebiete der Oder, dagegen von *Quercus Robur* und *Fagus sylvatica* ausschliesslich der Hügellkette eigenthümlich. An einigen Stellen unterbrechen die Nadelwälder die Eichenwälder der Oder; die grössten dieser Art um Jeltsch und Garsuche. Auch in der Hügellkette unterbrechen sie die Laubwäldungen, besonders in dem N. W. Theile und sind um Heidewilken und Riemberg, wo auch Tannen (*Abies pectinata*) zum Vorschein kommen, vorherrschend.

Auf dem bebauten Lande des rechten Oderufers findet man mehr sandigen theilweise sandig-lehmigen Boden, auf dem des linken dagegen mehr fetten und schwarzen, stellenweise aber auch lehmigen Boden.

Der Oder und dem Schweidnizer Wasser fehlen die eigentlichen Wassergewächse, ohne Zweifel wegen der zu starken Strömung, welche dagegen in der Weide, Ohlau und Lobe, die nur geringen Fall und schwache Strömung haben, in Menge vorkommen.

Die Weidengesträuche des Odergebietes bestehen zum grösseren Theil aus *Salix viminalis*, *amygdalina* und *purpurea*, darunter zerstreut *S. rubra* u. *S. acuminata* (Bischofswalde, Sandberg und Masselwiz) *S. hippophaifolia* (Scheitnich, Grüneiche, Pöpelwiz, Marienau) bisher nur mit Stempelblumen.

Diesen Gebüschern eigenthümliche Pflanzen sind: *Cuscuta monogyna*, *Senecio saracenicus*, *Veronica longifolia*, *Saponaria officinalis*, *Eryngium planum*, *Tanacetum vulgare*, *Euphorbia lucida*, *Asperula rivalis* (Grüneiche u. Strachate), *Thalictrum angustifolium*, *Barbarea stricta*, beide *Erysima*, *Vicia sepium* u. *Cracca*, *Aster salignus* (Sandberg unweit der Mündung der Weistritz), *Oenothera biennis*, *Calamagrostis lanceolata*, *Convolvulus sepium*. In dem an der Oder vorkommenden Eichen- und Lindengesträuch, wie z. B. um Cosel und an der alten Oder, zeigen sich: *Valeriana officinalis*, *Angelica sylvestris*, *Cnidium venosum*, *Seseli annuum*, *Selium Carvifolia*, *Veronica longifolia*, *spicata*.

Auf freien Sandplätzen, die zwischen diesen Gebüschern liegen: *Jasione montana*, *Erigeron canadense*, *Echium vulgare*, (*Iberis umbellata* verwilkt) *Armeria vulgaris*, *Hieracium pilosella*, *Auricula*.

Auf den kahlen Triften oder Weideplätzen der Oder eigenthümliche Pflanzen sind: *Carex hirta*, *Euphorbia lucida* und ihre Verwandte mit *E. Cyparissias* und *Esula*, *Ranunculus bulbosus*, *Stel-*

laria viscida, *Armeria vulgaris* und einmal bei Pöpelwitz *Senecio vernalis*, hie und da auch *Dipsacus sylvestris* und (um Ransern und Ohlau) *D. luciniatus*.

An den buschigen Oderdämmen, deren Gebüsch aus *Prunus spinosa*, *Crataegus Oxycantha* und niedriger *Quercus pedunculata* besteht: z. B. Krazbusch, Dämme bei Grüneiche, Ransern etc. *Cynanchum Vincetoxicum*, *Scutellaria hastifolia*, *Rosa gallica*, *tomentosa*, *canina*, *dumetorum*, *Galium Mollugo* und *verum*, *Bauhini* (um Pirscham), *Malva Alcea*, *Cucubalus bacciferus*, *Chaerophyllum bulbosum*, *temulum*, *Allium oleraceum*, *Rubus caesius*, *Clinopodium vulgare*, hie und da *Cynoglossum officinale*, *Thalictrum collinum* und *Poterium Sanguisorba* bei Carlowitz, *Polygonum dumetorum*, *Turritis glabra*, *Senecio Jacobaea*, *Cerinthe minor* und *Lavatera thuringiaca* (Masselwitz), um Treschen als Ueberreste ehemaliger Waldvegetation: *Lathyrus niger*, *Lithospermum officinale*, *Asperula odorata*, *Polygonatum multiflorum*, *Primula officinalis*. — *Viola pratensis* und *elatior* (Ransern, Schwoitsch); bei Grüneiche *Ranunculus auricomus* var. *fallax*.

An sonnigen Dämmen *Trifolium striatum* (Lehmdamm) *Salvia pratensis* (Carlowitz), *Fragaria collina*, *Veronica spicata*, *Euphorbia Esula*, *Veronica arvensis*, *Valerianella olitoria*, *Sedum acre*, *sexangulare*, *Dianthus deltoides*, *Armeria*, *prolifera* (Pöpelwitz und an dem hohen Oderufer bei Rattwitz), *Luzula campestris*, *Carum Carvi*, *Daucus Carota*, *Potentilla argentea*, *Güntheri*, *inclinata* (Lanisch und Tschirne), *Alyssum calycinum*, *Vicia lathyroides*.

Die dem Odergebiete eigenthümlichen Laubwälder von *Quercus pedunculata* bestehen entweder nur aus dieser, in welchem Falle sie meist ihres lehmigen festen Bodens wegen eine sehr magere Vegetation zeigen, oder sie haben einen lockeren guten Waldboden, sind sehr fruchtbar und enthalten ausser *Q. pedunculata*, *Ulmus*, *Carpinus*, einzelne *Abies excelsa*, *Tilia*, *Populus nigra*, *tremula*, *Pyrus Malus*, *communis*.

Im ersten Falle stehen die Bäume dieser Wälder meist sehr entfernt, ihre Vegetation besteht darin, dass bisweilen die *Euphorbia Cyparissias* ganze Strecken wie auf Brachfeldern überzieht, an etwas feuchten Stellen oder Lachen zeigt sich *Mentha Pulegium*, *Polygonum Hydropiper*, *laxiflorum* und *minus*, etc. Im anderen Falle stehen sie meist dichter und sind mit Unterholz von *Corylus*, *Ulmus* oft sehr dicht durchwachsen. Wälder von dieser Beschaffenheit sind um Kottwitz, Tschechnitz, Schleibitz, Treschen, die Strachate, Masselwitz u. s. w.

Diesen Wäldern eigenthümliche Pflanzen, welche in dem Hügelgebiete nicht vorkommen, sind: *Valeriana sambucifolia* (Tschechnitz und Pir-

scham), *Iris nudicaulis* (im Kottwizer Walde); *Tulipa sylvestris* (Pilsniz), *Convallaria majalis*, *Rumex sanguineus*, *Paris quadrifolia*, *Barbarea stricta*, *Hypericum hirsutum*, *Carex brizoides* (Kottwiz) *sylvatica*, *Scrophularia Scopoli* (Strachate). Dagegen finden sich in der tieferen Ebene und in der Hügellage zugleich: *Circaea lutetiana*, *Milium effusum*, *Melica nutans*, *Poa trivialis* und *nemoralis*, *Festuca gigantea*, *Brachypodium sylvaticum*, *pinnatum*, *Agropyrum caninum*, *Cornus sanguinea*, *Galium sylvaticum*, *Smilacina bifolia*, *Myosotis sylvatica*, *Campanula Trachelium*, *Impatiens noli tangere*, *Viola canina*, *sylvestris* und *Riviniana*, *Galanthus nivalis*, *Polygonatum multiflorum*, *Gagea lutea*, *Fragaria vesca*, *Geum urbanum*, *Ranunculus auricomus*, *Stachys sylvatica*, *Scrophularia nodosa*, *Alliaria officinalis*, *Geranium Robertianum*, *Lathyrus vernus* (Strachate) und *niger*, *Hieracium murorum*, *vulgatum*, *boreale*, *umbellatum*, *Epipactis latifolia*, *Neottia Nidus avis*, *Carex elongata*, *muricata remota*, *pallescens*.

Die Laubgehölze werden aus *Quercus pedunculata*, *Tilia parvifolia*, *Rhamnus cathartica* und *Frangula*, *Euonymus europaeus*, *Acer campestre*, hin und wieder *Viburnum Opulus* und *Cornus sanguinea* gebildet. Die darin vorkommenden Pflanzen sind: *Gladiolus imbricatus*, *Peucedanum Cervaria*, *Selinum Carvifolia*, *Cnidium venosum*, *Seseli annum*, *Melampyrum cristatum*, *Arabis Gerardi*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Pimpinella magna*, *Torilis Anthriscus*, *Malva Alcea*, *Valeriana officinalis*.

In den Laubgehölzen beider Gebiete finden sich: *Veronica Teucrium*, *Pulmonaria officinalis* besonders um Haselnuss-Gesträuch, *Dianthus Armeria*, *Erythraea Centaurium*, *Campanula Trachelium*, *Verbascum nigrum* und *Lychneitis*, *Heracleum Sphondylium*, *Pimpinella Saxifraga*, *Myosotis hispida*, *sparsiflora*, *Viola hirta*, *Stellaria Holostea*, *Arenaria trinervia*, *Thymus Serpyllum*, *Clinopodium vulgare*, *Betonica stricta*, *Melampyrum nemorosum* besonders in jungen Schlägen, *Turritis glabra*, *Trifolium alpestre*, *medium*, *Hieracium umbellatum*, *vulgatum*, *Cuscuta europaea*, *Lathyrus niger*, *Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *ranunculoides*, *Vicia sepium*, *Hypericum quadrangulum*, *perforatum*, *Gnaphalium sylvaticum*.

Die Nadelwäldungen des Odergebietes bestehen nur aus *Pinus sylvestris*; der Boden ist entweder lockerer Sand, daher sehr unfruchtbar und sehr häufig ganze Strecken mit *Cladonia*-Arten und *Corynephorus canescens* überzogen, wie dies besonders in der höheren Ebene der Fall ist, oder ein etwas humushaltiger Sandboden von festerer Beschaffenheit mit Laubmoosen bewachsen und von lebhafterer Vegetation.

Von denen der höheren Ebene unterscheiden sie sich durch den Mangel der *Salix Caprea*, *Pyrola*-Arten, *Hypochoeris maculata*, *Juniperus commu-*

nis, Luzula sylvatica. In den Kieferwäldern um Garsuche sind besonders *Avena flexuosa*, *Chamaecrista sylvatica*, *Goodyera repens*, *Potentilla reptans*, *Vaccinium Myrtillus* u. *Vitis idaea*, *Cytisus supinus* zu erwähnen. Auf dem östlich von Oderufer unweit Kottwitz befindlichen Kieferhügel kommen noch Manne von *Biscutella laevigata*, *Scorzonera purpurea* und *Genista germanica* ausgezeichnet.

Bei Schweitsch und Ransern finden sich ebenfalls unbedeutende Hügel mit Kiefern bewachsen; an diesen beiden Orten ist *Anemone pratensis*, auf denen bei Ransern *Alyssum montanum*, welches auch auf den Sandhügeln bei Kottwitz, am Weinberge bei Ohlau und bei Karlowitz erscheint; auch die letzteren sind früher wahrscheinlich mit Nadelwald bewachsen gewesen, wofür das Vorkommen von *Vaccinium Myrtillus*, *Calluna* und *Lycopodium clavatum* spricht.

Die Vegetation der Kieferwälder machen im Allgemeinen ausser den schon angeführten noch folgende Pflanzen aus: *Veronica officinalis*, *Brachypodium sylvaticum*, *Viola canina* var. *ericetorum* und var. *aculis*, *Pimpinella Saxifraga*, *Poa nemoralis*, *Spergula pentandra*, *Rubus plicatus* und *nemorosus*; *Potentilla Tormentilla* und *cinerea*. In Kieferhauen und den daria befindlichen freien Stellen: *Peucedanum Oreoselinum*, *Sedum Telephium*, *reflexum*, *Potentilla cinerea*, *Elichrysum arenarium*, *Antennaria dioica*, *Gnaphalium rectum*, *Teesdalia nudicaulis*, *Veronica verna*, *Erigeron canadense*, *Senecio sylvaticus*, *Solidago Virgaurea* (Fuchsberg bei Schweitsch) *Scabiosa columbaria*, *Verbascum Lychnitis*, *Chondrilla juncea*, *Nardus stricta*, *Festuca duriuscula* var. *glauca*, *Carex ericetorum* und *pratensis*.

Häufiger ausserhalb sondern auch zwischen den früher erwähnten Kieferwäldern befinden sich mehr oder weniger feuchte Wiesen von *Chamaecrista* Vegetation. Auf den trocknen oder halbfeuchten Waldhügeln kommen: *Gentiana pneumonanthe* (Scheitnich), *Polygala vulgaris*, *Genista tinctoria*, *Serratula tinctoria*, *Inula salicina*, *Hieracium Nestleii*, *collinum*, *Carex pilulifera*, *pallescens*, *Viola pratensis*, *canina*. Auf den mehr feuchten Stellen der vorbenannten Orte: *Iris sibirica* (auch bei Cosel und Oswiz), *Scorzonera humilis* auch um Pirscham, *Salix repens*, *Scabiosa succisa* (um Scheitnich), *Viola persicifolia*.

Die Vegetation der trocknen Wiesen im Allgemeinen bilden: *Veronica Chamaedrys*, *Alopecurus pratensis*, *Phleum pratense*, *Arrhenatherum elatius*, *Holcus lanatus*, *Aira caespitosa*, *Avena flavescens*, *pubescens*, *Koeleria cristata*, *Poa trivialis*, *Briza media*, *Festuca pratensis*, *rubra*, *Cynosurus cristatus*, *Dactylis glomerata*, *Festuca ovina* an meist etwas

sandigen Stellen, *F. duriuscula*, *Bromus mollis*, *Galium boreale*, *Sanguisorba officinalis*, *Campanula patula*, *glomerata*, *Heracleum Sphondylium*, *Peucedanum Cervaria*, *Selinum Carvifolia*, *Cnidium venosum*, *Seseli annuum*, *Ranunculus auricomus*, *acris*, *polyanthemus*, *Trifolium montanum*, *Chrysanthemum Leucanthemum*, *Hieracium umbellatum* niedrig und armlüthig.

Die feuchtern Wiesen um Althof, Tschecnitz u. Scheitnich sind besonders reich an Carices: *C. disticha*, *canescens*, *stellulata*, *tomentosa*, *distans*, *panicea*, *caespitosa*, *glauca*, *ampullacea*, *acuta* u. a. m.; ferner *Veronica scutellata*, *Gratiola officinalis*, *Molinia coerulea*, *Galium palustre*, *uliginosum*, *Alchemilla vulgaris*, *Myosotis palustris*, *Symphytum officinale*, *Viola persicifolia*, *stricta* und *pratensis*, *Allium acutangulum*, *Peucedanum pratense*, *Stellaria palustris*, *Ranunculus flammula*, *Caltha palustris*, *Teucrium Scordium*, *Mentha aquatica*, *Cardamine pratensis*.

Die sogenannte alte Oder besitzt ganz den Charakter der eigentlichen Oder, an den Dämmen ist zahlreiches Gebüsch durch mannigfaltige Formen von *Rosa canina* und *tomentosa*, auch einige Formen der *Hieracia cymosa*, zumal *H. stoloniflorum* und *floribundum* nächst der Brücke an der Strasse nach Hundsfeld und den vielleicht verwilderten *Aster brumalis*, ausgezeichnet. Statt der Wiesen sind Sandplätze, die nach der Beschaffenheit des Bodens mehr oder weniger bewachsen sind; um Scheitnich *Hierochloa odorata*. Auf den Sandbänken wurde früher einmal, so wie in dem Stadtgraben *Cineraria palustris* gefunden; einzeln auch *Chepodium ficifolium*, wie am Lehmduhm.

Die in den nächsten Umgebungen der eigentlichen und alten Oder befindlichen kleinen stehenden Wässer um Grüneiche, Carlowitz, Pöpelwitz, Ransern u. a. führen theils im Wasser, theils an den Rändern: *Hippuris* (Marienau, Margarethenmühle; an letzterem Standorte mit der *Leersia oryzoides*), *Utricularia vulgaris*, *Scirpus lacustris*, *Tahernaemontani*, *radicans*, *Trapa natans*, *Potamogeton natans*, *obtusifolius*, *compressus*, *crispus*, *Hottonia palustris*, *Acorus Calamus*, *Rumex Hydrolapathum*, *Peplis*, *Portula*, *Oenanthe Phellandrium*, *Lemnae*, *Isolepis setacea*, *acicularis*, *Cyperus flavescens*, *fuscus*, *Alisma Plantago*, *Polygonum amphibium*, *Butomus umbellatus*, *Potentilla spina* auf sandigem Boden an den Rändern, *Nymphaea alba*, *Nuphar luteum*, *Batrachium aquatile*, *rigidum*, *Ranunculus Lingua*, *Scutellaria galericulata*, *Mentha aquatica*, *Limosella aquatica*, *Lindernia pyxidaria*, *Pedicularis palustris*, (Carlowitz) *Armoracia amphibia*, *Nasturtium palustre*, *Cardamine parviflora*, *Bidens tripartita*, *cernua*, *Carex ampullacea*, *vesicaria*, *paludosa*, *riparia acuta* und *stricta*, *Sparganium ramosum* und *simplex*, *Ceratophyllum demersum*, *Myriophyllum spicatum*, ver-

ticillatum, *Sagittaria sagittifolia*, *Typha latifolia* und *angustifolia*, *Hydrocharis Morsus Ranae*, *Stratiotes aloides*.

Hierzu gehören noch einige Pflanzen, die an und in bewässerten Gräben wachsen, als *Oenanthe fistulosa*, (Krittern, Lilienthal) *Berula angustifolia*, (Nendorf) *Callitriche verna*, *Scirpus maritimus*, (Hube, Gräbschen) *Phalaris arundinacea*, *Glyceria spectabilis*, *fluitans*, *Sium latifolium*, *Iuncus conglomeratus*, *effusus*, *glaucus*, *articulatus*, *Rumex maritimus*, *Epilobium hirsutum*, *parviflorum*, *roseum*, *tetragonum*, *Polygonum lapathifolium*, *laxiflorum*, *Hydropiper* und *minus*, *Malachium aquaticum*, *Lythrum Salicaria*, *Carex vulpina*, *Pseudocyperus* (Höfchen), *stricta*.

Die Umgebungen der Weide und Ohlau haben hinsichtlich ihrer Lokalitäten und ihrer Vegetation fast gleichen Charakter. Die flachen, mit Erlengebüsch bewachsenen Ufer, werden von feuchten fruchtbaren Wiesen begränzt. An einigen Stellen namentlich, wo das Flussbett breiter als gewöhnlich ist, wächst Schilf (*Phragmites communis*) in dichten Gruppen. Besonders häufig sind in diesen Flüssen die *Potamogetones*; zu den seltenern gehören *P. rufescens*, *compressus*, *pusillus*, *pectinatus*, *obtusifolius*, die gemeineren sind *natans*, *lucens*, *perfoliatus*, *crispus*. Ausserdem kommen hier *Nymphaea* und *Nuphar luteum*, *Ceratophyllum*, beide *Myriophylla*, an den Rändern *Acorus Calamus* u. *Butomus* und stellenweise *Menyanthes trifoliata* vor. Zwischen dem niederen Gebüsch von *Alnus glutinosa* sieht man hin und wieder *Salix cinerea*, und an den mit Schilf bewachsenen Stellen wächst zwischen diesem nicht selten *Ranunculus Lingua*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Solanum Dulcamara*, *Scrophularia nodosa*, *Symphytum officinale flore albo*, *Viola elatior*, *Convolvulus sepium*.

Den Weidenfern zugehörige Pflanzen, die gar nicht oder nur selten an der Ohlau vorkommen, sind *Alnus incana* bei Kryzanowiz, *Oenanthe fistulosa*, *Thysselinum palustre*, *Cicuta virosa*, *Symphytum offic. flore albo*, *Scrophularia aquatica*.

Die nächstliegenden Sümpfe und feuchten Wiesen sind denen des Odergebietes ganz ähnlich. In den benachbarten Eichengebüschen um Bischwiz ist an einigen Stellen *Chrysosplenium alternifolium* und *Viola mirabilis*, besonders häufig erscheint hier *Thalictrum nigricans*, *Senecio barbaraeifolius*, *Festuca gigantea*.

Diesen Flüssen ähnlich, doch mit etwas stärkerem Falle, ist die Lohe; es fehlen ihr mehrere Wasserpflanzen, ausser *Potamogeton natans*, *lucens*, *Ceratophyllum demersum*, die besonders an Stellen, wo die Lohe kleinere Buchten bildet und gegen die Mündung derselben, erscheinen. Die Ufer sind häufiger mit Weiden als mit Erlen bewachsen, das Flussbett sandig. Besonders zu erwähnen sind die Ufer nahe an ihrer Mündung bei Massel-

wiz, wo in trockenen Sommern auf den ausgetrockneten Stellen des Flussbettes *Dichostylis Micheliaana* und *Lindernia pyxidaria*, letztere oft in grosser Menge, erscheinen. Dann die an die Lohe gränzenden Wiesen zwischen Krittern und Hartlieb, wo *Thalictrum flavum*, und im Gebüsch längs den Ufern *Valeriana officinalis* häufig bemerkt werden. Von den benachbarten Wiesen verdienen noch besonders die um Krittern besucht zu werden, wo *Orchis coriophora*, *Viola elatior*, *Carex tomentosa*, *disticha*, *panicea*, *fulva* und mehrere andere Arten, *Lathyrus palustris*, *Saxifraga tridactylites*, *Hieracium Nestleri hirtum* und in den diese Wiesen begrenzenden Gräben *Oenanthe fistulosa* und *Tetragonolobus siliquosus* vorkommen.

Das Gebiet der Weistriz zeichnet sich besonders durch fruchtbare Laubwälder aus, sie bestehen hauptsächlich aus *Quercus pedunculata* u. *Carpinus Betulus*, andere aus *Betula alba*, an etwas feuchten Stellen zeigt sich *Betula pubescens* und hin und wieder Gebüsche von *Corylus Avelana*. Diesem Gebiete gehört ein Theil der pflanzenreichsten und durch seltene Arten ausgezeichneten Orte in den Umgebungen von Breslau an, und manche der hier vorkommenden Arten mögen vielleicht durch die Fluthen der bisweilen hoch angeschwollenen Weistriz aus dem Vorgebirge herabgeführt worden sein und sich hier angesiedelt haben. Diese Orte sind namentlich Schosniz bei Canth, Arnoldsmühl, Lissa u. Sandberg.

In dem zwischen Schosniz und Canth gelegenen Eichenwalde sind *Allium ursinum*, *Euphorbia dulcis*, *Lychnis diurna*, *Neottia Nidus avis*, *Carduus crispus*, *Stellaria nemorum* und an einer sonnigen Stelle des dort ziemlich hohen Ufers *Stachys recta*, so wie schmalblättrige Formen von *Ulmus campestris* anzuführen.

Von besonderem Interesse sind die feuchten Laubgehölze um Arnoldsmühle. Hier wachsen *Geum intermedium* mit dem gesellschaftlich vorkommenden *Geum rivale* und *urbanum*, und zwar in den mannigfaltigsten Uebergängen, die sich bald zu der einen bald zu der andern Art mehr oder weniger hinneigen, *Carex sylvatica*, *elongata*, *remota*, *stricta* und einige andere Arten, *Valeriana sambucifolia*. Auf etwas mehr trockneren Stellen *Ranunculus cassubicus*, *Mercurialis perennis*, *Isopyrum thalictroides*, *Hepatica triloba*, *Anemone ranunculoides*, *Daphne Mezereum*, *Viola mirabilis*, *Stellaria Holostea*, *Pulmonaria angustifolia* und *Myosotis sylvatica*; an den Rändern der Gebüsche *Potentilla opaca*, *Verbascum Thapsus*. In den Haselnussgehölzen *Corydalis cava*, *Lathraea Squamaria*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Lamium maculatum*, *Ranunculus lanuginosus* und an einem buschigen Damme *Lilium Martagon*. Auf Sumpfwiesen *Menyanthes trifoliata*, *Valeriana dioeca*.

An dem jenseitigen Ufer der Weistriz liegt eine sehr merkwürdige Gegend zwischen den Dörfern Lissa, Muckerau, Oderwilxen, und Marschwiz, welche durch die grosse Abwechselung des Bodens und der Lage für eine grosse Mannigfaltigkeit der Vegetation geeignet ist.

Nach der Weistriz hin gegen Lissa und Muckerau ist die Gegend tief und sumpfig, gegen Oderwilxen und Bresa wird sie von kleinen flachen Hügeln begränzt. Diese Hügel sind theils mit *Betula alba*, *Quercus pedunculata* und *Robur* bewachsen, theils bilden sie kahle Haiden oder sind mit kleinen Kieferbüschen besetzt. Am kahlen Berge sind ausser *Calluna vulgaris*, *Laserpitium prutenicum*, *Peucedanum Oreoselinum* und *Cervaria*, *Gentiana pneumonanthe*, *Anemone pratensis*, *Carex ericetorum*, *Veronica spicata*, *Anthericum ramosum* und auf einem daran gränzenden Hügel *Potentilla rupestris*. Zwischen diesem und dem Kirschberge fliesst ein kleiner Bach, an welchem auf feuchtem moosigem Boden *Viola palustris*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Rhynchospora alba* und *Hydrocotyle vulgaris* zu finden sind. Der Kirschberg selbst ist gegen S. mit *Pinus sylvestris* und *Betula alba*, übrigens kahl und mit *Calluna* bewachsen, und auf den freien trockenen Stellen unter anderen Flechten mit der merkwürdigen *Capitularia Papillaria* und *Stereocaulon pileatum* bedeckt, nur hin und wieder befinden sich darunter, besonders im bewaldeten Theile *Anemone pratensis*, *Prunella grandiflora*, *Platanthera bifolia*, ausserdem *Iasion montana*, *Chondrilla juncea*, *Sedum reflexum*, *Campanula rotundifolia*, *Rapunculus*. An einem niedrigen bewaldeten Hügel, dem Quarkberge, findet man *Trifolium rubens*, *Anthyllis Vulneraria*, *Thalictrum sylvaticum*, *Carex pilulifera*, *Orchis sambucina* mit weissen und rothen Blumen, *maculata*, *Vicia cassubica*, *Pyrola rotundifolia*, *Solidago Virgaurea*, *Gladiolus imbricatus*, *Cytisus capitatus* und *Geranium sanguineum*. In trockenen Laubgehölzen gegen Muckerau: *Campanula Cervicaria*, *glomerata*, auf feuchteren Stellen, *Thysselinum palustre*, *Astrantia maior*, *Iuncus sylvaticus*, *supinus*. Aehnliche feuchte Gehölze finden sich gegen Marschwiz, auf welchen besonders anzuführen sind: *Viola persicifolia*, *stricta*, *palustris*, *Salix aurita*, *repens* in verschiedenen Formen, *Betula pubescens*, *Salix pentandra*. Besonders kommen auf den sauren Wiesen dieser Gegend mannigfaltige Formen von *Taraxacum officinale* u. ausserdem eine fast vollständige Varietätenreihe von *Salix repens*, von der sogenannten *rosmarinifolia* bis zur *argentea* und *fusca* der Autoren vor, wie denn auch hier zuerst *Salix aurito-repens* in beiden Geschlechtern beobachtet wurde.

Von hier aus gegen die Weistriz und gegen Lissa sind unzugängliche Sümpfe, die theilweise von Gräben durchzogen und von Dämmen begränzt sind. An einem dieser wächst *Senecio nemorensis*.

Auf einer der feuchten Wiesen gegen Muckerau, die ebenfalls von Abzugsgräben durchschnitten werden, an welchen *Salix fragilis* mas baumartig wächst, findet man *Taraxacum officinale* var. *salina*, *Carex Buxbaumii*, *Crepis succisifolia*, *paludosa* und kleine Gebüsch von *Salix cinerea* und *aurita*. In einem der daran gränzenden Gebüsch, *Aconitum variale*, *Galeopsis cannabina*, *Asarum europaeum*, *Anemone ranunculoides*, *Pulmonaria officinalis* etc. — Nicht fern von hier findet man auf torfartigem Grunde, worin seltene *Sphagna*, *Eriophorum vaginatum*, *Juncus squarrosus*, *Calla palustris*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Drosera rotundifolia*, *Calamagrostis lanceolata*; am Rande bemerkt man in manchen Jahren häufig das gefüllte und monströse *Geum rivale*. Auch werden hier *Mnium palustre* und *Gymnocephalus androgynus* gewöhnlich mit Fruchtkapseln gefunden.

Kleine Kieferwäldungen befinden sich in der Gegend von Muckerau; die Vegetation dieser Wäldungen ist durch einige besondere Arten als: *Oxalis Acetosella*, *Epilobium angustifolium*, *Pyrola secunda*, *Ornithopus perpusillus*, *Juncus capitatus*, *Radiola Millegrana* bemerkenswerth. In den dem Flecken Lissa selbst näher und gegen Goldschmiede zu gelegenen Laubgehölzen und am Saume derselben wachsen: *Trifolium ochroleucum*, *Cytisus capitatus*, *Melampyrum nemorosum*, *Euphorbia dulcis*, *Potentilla opaca* und *rupestris*, *Lathyrus niger* und *vernus*, *Vicia dumetorum*, *Polygonatum anceps*, *Stellaria Holostea*, *Hieracium boreale*, *vulgatum*, an feuchten Stellen *Stellaria uliginosa*, *nemorum*, *Lamium maculatum*, *Euphorbia palustris*.

Hier erwähnen wir auch der an der Strasse zwischen Breslau und Lissa, zwischen der Lohe und Weistriz befindlichen feuchten, zum Theil moorigen Wiesen. Auf den trockneren Stellen wachsen *Iris sibirica*, *Trollius europaeus*, *Potentilla alba*, *Pulmonaria angustifolia*, *Tragopogon orientalis*, *Intybus praemorsus*, *Primula officinalis*, *Gentiana amarella*, *Anthyllis Vulneraria*, *Viola hirta*, *Orchis Morio*, *Hypochoeris maculata*, *Salix repens*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Prunella grandiflora*. Die feuchten Stellen zeichnen sich aus durch *Orchis laxiflora*, *latifolia* et *angustifolia*, *Carex disticha*, *Buxbaumii*, *Triglochin maritimum*, *palustre*; *Glaux maritima*, *Pedicularis sylvatica*, *Blysmus compressus*, *Heleocharis uniglumis*, *Limnochloe pauciflora*, *Scirpus Tabernaemontani*, *Cirsium canum* und *C. cano-palustre*, *Festuca arundinacea*, *Polygonum Bistorta*.

Unweit der Vereinigung der Weistriz mit der Oder in der Gegend von Sandberg wächst zwischen Weidengebüsch auf sandigem Boden *Aster salignus* in grossen Gruppen. Ausserdem Formenreihen der *Euphorbia lucida* und *E. Cyparissias*, welche unmerklich in einander verlaufen. Im

übrigen sind die sandigen Ufer und der Eichwald nicht von denen der Oderufer verschieden.

Wir betrachten nun noch einige andere, durch ihre Vegetation und durch seltene Arten ausgezeichnete Punkte auf dem linken Oderufer. Die Umgebungen von Koberwitz besitzen eine mannigfaltige Vegetation. Der in Koberwitz zu einem Park benutzte Laubwald besteht aus *Quercus pedunculata*, *Ulmus effusa* und *campestris* in ausgezeichneten Formen, *Carpinus Betulus*, *Populus nigra* und *Betula alba*, sämmtlich von ausgezeichneter Höhe. Sowohl im Park selbst als auch um denselben befinden sich mehr oder weniger feuchte Wiesen, die hin und wieder von Gebüsch umgeben und von bewässerten Gräben begränzt und durchzogen sind. Die in dem Laubwalde selbst vorkommenden Pflanzen sind vorzugsweise *Dipsacus pilosus*, *Polygonatum multiflorum* sehr zahlreich und wuchernd, *Senecio nemorensis*, *Viola hirta* und *odorata*. Auf freien Stellen *Aquilegia vulgaris*, *Thalictrum minus*. In dem die Gräben begränzenden Gebüsche: *Senecio erucifolius*, *Cerithe minor*, *Origanum vulgare*, *Valeriana officinalis*, *Melilotus officinalis*, *Salix repens* var. *fusca*. In Graspärten und an Wegerändern: *Verbascum phoeniceum*, welches von hier aus bis Zobten an verschiedenen Orten vorkommt. Die sowohl in als auch ausserhalb des Parkes gelegenen Wiesen besitzen einen mehr oder minder schwarzen fetten Boden. Auf den trockneren Stellen zeigt sich *Onobrychis sativa*, *Orchis militaris*, *Gymnadenia conopsea*, *Orchis coriophora*, *Colchicum autumnale*, *Gentiana Pneumonanthe*, *Valeriana dioica*. Auf feuchten Stellen: *Carex Davalliana*, *distans*, *Polygala amara*, *Limnochloa pauciflora*, *Gentiana uliginosa*, *Taraxacum officinale* mit allen Uebergängen bis zum *T. salinum*, *Teucrium Scordium*, *Trollius europaeus*, *Linum catharticum*, *Parnassia palustris*, *Cirsium canum*, *oleraceum*, *tataricum*. In Gräben: *Sparganium natans*, *Ranunculus Lingua*, *Carex stricta*, *Mentha aquatica*, *Berula angustifolia*, und in stehenden Gewässern: *Potamogeton pectinatus*, *Polygonum amphibium*, *Scirpus Tabernaemontani* nebst einigen seltenen *Chara*-Arten, namentlich *Ch. hispida* und *Ch. tenuissima* Desv.

Nächst Koberwitz werden in einem bei dem Dorfe Wirrwitz befindlichen Gebüsch *Lithospermum officinale*, *Aquilegia vulgaris*, *Melilotus officinalis*, an dessen Rändern *Tragopogon maior*, *Fumaria Vaillantii* und gegen Guhrwitz zu eine noch unbestimmte Art von *Orobanche* gefunden.

Das auf dem linken Oderufer liegende Ackerland wird zumal zwischen den Strassen nach Schweidnitz und der oberen Oder grösstentheils mit Roggen, weniger mit Waizen, Gerste, Kartoffeln und in der nächsten Umgebung Breslau's auf den sogenannten Kräutereien vorzüglich mit

aller Art Gemüse und mit Röhre bebauet. Man kann in diesem bebauten Lande im Allgemeinen Saatfelder, Gemüseäcker und Gartenland, Stoppel- und Brachäcker unterscheiden, indem diese Aecker auch hinsichtlich der darauf wildwachsenden Pflanzen wesentlich verschieden sind.

Den Saatfeldern eigenthümliche Pflanzen, theils auf denselben, theils an deren Rändern, im Allgemeinen sind: *Veronica hederifolia*, *triphylia*, *Valerianella Morisonii*, *Apera Spica Venti*, *Bromus secalinus*, *Agropyrum repens*, *Lolium perenne*, *temulentum*, *Holosteum umbellatum*, *Scabiosa arvensis*, *Sherardia arvensis*, *Galium Aparine*, *Aphanes arvensis*, *Myosotis arvensis*, *versicolor*, *stricta*, *Lithospermum arvense*, *Anchusa arvensis*, *Convolvulus arvensis*, *Chenopod. album*, *hybridum*, *Rumex crispus*, *Acetosella*, *Polygonum aviculare*, *P. Convolvulus*, *Scleranthus annuus*, seltener *perennis*, aber meist nur auf sandigen Aeckern, *Arenaria serpyllifolia*, *Cerastium vulgatum*, *Agrostemma Githago*, *Spergula sativa*, *Papaver Argemone*, *Delphinium Consolida*, *Alectorolophus maior*, *Melampyrum arvense*, *Sisymbrium Thalianum*, *Sinapis arvensis*, *Fumaria officinalis*, *Raphanus Raphanistrum*, *Melilotus vulgaris*, *Trifolium filiforme*, *Vicia angustifolia*, (*sativa* angebaut), *villosa*, *tetrasperma*, *hirsuta*, *Medicago lupulina*, *Cirsium arvense*, *Centaurea Cyanus*, *Matricaria Chamomilla*, *Anthemis Cotula*, *arvensis*, *Sonchus oleraceus*, *arvensis*, *Neslia paniculata*. Auf feucht gelegenen Aeckern *Iuncus bufonius*, *Polygonum lapathifolium*, *Stachys palustris*, *Odontites verna*. Diese angeführten Pflanzen sind den Saatfeldern meist ohne Unterschied der Saat und dem Gebiete eigenthümlich. Nur einige weichen hierin ab; so sind den Weizenfeldern besonders *Papaver Rhoëas*, *Avena fatua*, den Haferfeldern *Avena strigosa* und den Leinfeldern *Camelina dentata*, *Lolium arvense* u. *Cuscuta Epilinum* eigenthümlich. Eben so kommen einige nur an bestimmten Orten vor, z. B. um Lissa *Lithospermum arvense flore coeruleo*, *Silene gallica*, und auf Sandboden *Arnosaris pusilla* und *Hypochoeris glabra*.

Unter der Benennung Gemüseäcker sind solche zu verstehen, auf denen nicht allein Gemüsepflanzen, sondern auch andere Nutzpflanzen, wie z. B. Röhre, Runkelrüben u. dgl. gepflanzt werden. Die ihnen angehörende Vegetation wird durch folgende Pflanzen im Allgemeinen bestimmt: *Veronica Buxbaumii*, *polita*, *agrestis*, *hederifolia*, *Digitaria sanguinalis*, *humifusa*, letztere auf feuchtem Sandboden, *Echinochloa Crus Galli*, *Setaria verticillata*, *glauca*, *viridis*, *Sherardia arvensis*, *Anagallis arvensis*, *Solanum nigrum*, *Chenopodium hybridum*, *polyspermum*, *Atriplex patulum*, *Aethusa Cynapium*, *Polygonum Persicaria*, *Convolvulus*, *apathifolium*, *Oxalis stricta*, *Lamium purpureum*, *amplexicaule*, *Linaria*

minor, (besonders auf den Kräutereien vor dem Nikolaithore), Anthrimum Orontium, Neslia paniculata, Sinapis alba, Erodium Cicutarium, Fumaria officinalis, Senecio vulgaris, Sonchus oleraceus, asper, Cichorium Intybus, Euphorbia Helioscopia, Peplus, Urtica urens.

An vereinzelt Plätzen vorkommende sind: Montia minor auf feuchten Sandäckern am Kirschberge bei Lissa, Polycarpum tetraphyllum um Gräbschen und auf Stoppeläckern in den Kräutereien vor dem Nikolaithore, zumal um den Freiburger Bahnhof; ebendasselbst Portulaca oleracea.

Auf den Stoppeläckern erscheinen als allgemein verbreitete: Setaria glauca, Aethusa Cynapium var. segetalis, Gypsophila muralis, Silene noctiflora, Galeopsis Ladanum, Tetrahit; hie und da Linaria minor, Hypericum humifusum, Euphorbia exigua, Erythraea pulchella, Polycarpum tetraphyllum in Gesellschaft mit Linaria arvensis, ferner Linaria Elatine um Lissa und L. spuria mit voriger um Krittern und Koberwiz, Chenopodium ficifolium um Krittern.

Auf Brachäckern allgemein verbreitet sind, auf trockenem Humusboden: Veronica Buxbaumii, hederifolia, triphylla, Holosteum umbellatum, Sheardia arvensis, Aphanes arvensis, Myosotis arvensis, stricta, Lithospermum arvense, Anchusa officinalis, Lycopsis arvensis, Echium vulgare, Anagallis arvensis, Convolvulus arvensis, Viola tricolor, Chenopodium album, Gagea stenopetala, arvensis vereinzelt, Rumex Acetosella, Seleranthus annuus, Arenaria serpyllifolia, Papaver Argemone, Ranunculus sardous auf Lehm Boden, Lamium purpureum, amplexicaule, Linaria vulgaris, Sisymbrium Thalianum, Neslia paniculata, Barbaraea vulgaris, Erodium Cicutarium, Geranium rotundifolium, Melilotus vulgaris, Trifolium arvense, repens, campestre, filiforme, Vicia villosa, Medicago lupulina, Erigeron canadensis, Matricaria Chamomilla, Pyrethrum inodorum, Anthemis Cotula, arvensis, Crepis tectorum, Sonchus oleraceus, Cirsium lanceolatum, Carduus nutans, Euphorbia Helioscopia. Feuchte Stellen charakterisiren sich durch Juncus bufonius, Sagina procumbens, Myosurus minimus, Mentha arvensis, Odontites verna, Saxifraga tridactylites. Auf sandigen Brachäckern: Veronica arvensis, verna, Seleranthus perennis, Lepidogonum rubrum, Spargula pentandra, Calamintha Acinos, Teesdalia Iberis, Draba verna, Filago montana, arvensis, Euphorbia Esula, Cyparissias, letztere oft grosse Strecken überziehend.

Nur an einigen Orten vorkommende sind: Polycnemum arvense um Pöpelwitz und Sackerau, Verbascum Thapsus, phlomoides, thapsiforme beide um Gräbschen; Stachys arvensis vor Lissa, der einzige bis jetzt bekannte Standort, Gnaphalium luteoalbum bei Cosel und Leuthen, Filago germanica um Herrnpotsch, Senecio vernalis um Pöpelwitz und Althof einmal.

Das zwischen der Strasse nach Schweidnitz und der alten Oder liegende Ackerland weicht dadurch ab, dass es mehr Waizenboden und einige auf jenem nicht vorkommende Pflanzen besitzt. Besonders zeichnet sich die Umgegend von Roberwiz aus durch: *Stachys annua*, *Orobanche pallidiflora*, *Sagina apetala*, *Critamus agrestis*, *Cerithe minor* und *Adonis aestivalis*, letztere erstreckt sich östlich bis in die Umgegend von Ohlau; *Anthemis tinctoria* um Kleinburg und Bettlern, *Vicia tenuifolia* gegen Strehlen hin sehr häufig und dann bis ins Vorgebirge, *Thalietrum minus* auf Brachen um Wirrwiz, Roberwiz und Lambsfeld, *Tussilago Farfara* in dieser Gegend überall auf Lehmboden, *Poa Eragrostis* um Neudorf bei Breslau auf Gemüseäckern häufig, *Erysimum repandum* und *Muscari comosum* um Oltaschin.

Hieran schliessen sich auch die Ränder der Strassen und Wassergräben an, welche an einzelnen Stellen einige seltene und sogar eigenthümliche Arten besitzen. So zeichnet sich nächst Breslau der Weg nach Gräbchen durch folgende Arten aus: *Melilotus Kochiana*, *Petitpierreana*, *Astragalus Cicer*, *Medicago falcata*, *media* und *sativa*, *Chaerophyllum bulbosum*, *Anthriscus sylvestris*, *Trifolium fragiferum*, *Crepis biennis*, *Picris hieracioides*, *Geranium pratense*, *Ononis arvensis*, *Myosotis sparsiflora*, *Epilobium tetragonum*, *Scirpus maritimus*. An anderen wie um Kritttern *Verbascum Blattaria*, hinter Kleinburg *Gratiola officinalis*, *Hieracium praealtum*, *cymosum*, und *stolonifloro-cymosum*, hie und da auch *Lotus arvensis tenuifolius*. Am Wege nach Höfchen werden *Carex Pseudo-Cyperus*, und *Crepis biennis* bemerkt.

An der Strasse nach Lissa *Tragopogon orientalis*, *Hieracium praealtum*, *collinum*, *Auricula*, *Pilosella*, und *stolonifloro-cymosum*, *Potentilla Güntheri*. An sandigen Grabenrändern nächst der Lohe *Astragalus Hypoglottis*.

An der Schweidnitzer Strasse: *Cynoglossum officinale*, *Salvia pratensis*, *Bromus erectus*, *arvensis*, *Verbascum Blattaria*, *Lepidium Draba* seitwärts am Wege nach Oltaschin.

An der Strehleener Strasse ausser den oben genannten Arten, *Cerithe minor*, *Stachys germanica*, *Tetragonolobus siliquosus*.

Im Allgemeinen bilden an diesen Stellen folgende Pflanzen die Vegetation: *Veronica Chamaedrys*, *Arrhenatherum elatius*, *Holcus mollis*, *Avena flavescens* (Klettendorf, Tinz, Scheitnich), *Koeleria cristata*, *Poa trivialis*, *pratensis*, *Bromus inermis*, *mollis*, *sterilis*, *tectorum*, *Lolium perenne*, *Scabiosa Columbaria*, *Rnautia arvensis*, *Galium Mollugo*, *verum*, *Plantago major*, *media*, *lanceolata*, *Anchusa officinalis*, *Convolvulus arvensis*, *Campanula rapunculoides*, *Seseli annuum*, *Pimpinella Saxifraga*, *Carum*

Carvi, Chaerophyllum bulbosum, Anthriscus sylvestris, Saxifraga granulata, Cerastium arvense, vulgatum, Lychnis dioica, Sedum acre, sexangulare, Fragaria collina, vesca, Potentilla Anserina, reptans, argentea, Rosa canina, tomentosa, rubiginosa, gallica, Thymus Serpyllum, Ajuga genevensis, Farsetia incana, Geranium pratense, pyrenaicum (bei Koberwitz), G. pusillum, Ononis arvensis, Melilotus vulgaris, Trifolium montanum, Lotus corniculatus, Medicago sativa, Coronilla varia, Hypericum perforatum, Cirsium lanceolatum, Carduus acanthoides, Centaurea Jacea, C. Scabiosa, Artemisia campestris, Erigeron acris, Inula britannica, Achillea Millefolium, Crepis biennis, Hieracium umbellatum, Tragopogon pratensis, Cichorium Intybus, Euphorbia Esula, Cyparissias, Carex Schreberi, Leporina.

Die im NW. und N. sich erstreckende Hügelkette, unter dem Namen der Trebnizer Berge, oder dem scherzhaften des Katzengebirges bekannt, besteht aus einer ziemlich zusammenhängenden Reihe von theils bewaldeten, theils bebauten Hügeln, zwischen denen sich kleine Thäler und Schluchten hinziehen. Sie sind im Ganzen nur wenig bewässert und haben einen sandigen lehmigen Untergrund, der nur an wohlkultivirten Stellen von einer dünnen Humuslage und im Laubwalde durch Verwelken des Laubes von einer ähnlichen Lage besseren Waldbodens bedeckt ist.

Diese Hügelkette, obwohl von geringer Erhebung, zeigt doch eine in manchen Stücken abweichende Vegetation und viele Arten, welche hier bald einzeln bald häufiger gefunden werden, auch das Zusammenvorkommen einiger zeigen bereits auf die Flora der nächst höheren Region hin. Dennoch lässt sie sich, da diese Hinweisungen nur vereinzelt sind, da keine grösseren Unterschiede, namentlich in der Baumvegetation hervortreten, da sie endlich nur der Alluvial-Formation angehören, von der Ebenenregion füglich nicht trennen.

Die Nadelwälder bestehen fast nur aus Pinus sylvestris, seltener sind Pinus picea, Abies und Larix europaea, die zerstreut in den Laubwäldern vorkommen, die letztere nur angebaut. Vorherrschend sind die Kieferwälder im westlichen Theile um Riemberg, Oberrnigk und Heydewilken, dagegen die Laubwälder im östlichen um Trebnitz und Skarsine, welche theils ausschliesslich aus Fagus sylvatica bestehen, oder mit Quercus Robur, Tilia parvifolia und Carpinus Betulus untermischt. Häufig werden die Nadelholzwälder von Birkengehölzen unterbrochen, und am Fusse der Hügel, wo feuchte Wiesen sich anschliessen, ziehen sich Gebüsche von Corylus hin.

Die in den Laubwäldern dieser Hügelregion verbreiteten Pflanzen mit Ausschluss der in Birkengehölzen vorkommenden sind: Veronica officina-

lis, *Smilacina bifolia*, *Asperula odorata*, *Galium rotundifolium*, *sylvaticum*, *Hedera Helix*, *Sanicula europaea*, *Luzula pilosa*, *multiflora*, *Vaccinium Myrtillus*, *Epilobium montanum*, *Adoxa Moschatellina*, *Pyrola secunda*, *rotundifolia*, *Oxalis Acetosella*, *Galeobdolon luteum*, *Corydalis fabacea*, *Lathyrus vernus*, *macrorrhizus*, *niger*, *Hieracium murorum*, *vulgatum*, *rigidum*, *Prenanthes muralis*, *Carex pallescens*.

In Birkengehölzen *Laserpitium prutenicum*, *Veronica spicata*, *Melampyrum pratense* und *nemorosum*, *Turritis glabra*, *Trifolium agrarium*, *alpestre*, *Viscaria purpurea*, *Silene nutans*, *Vicia cassubica*, *Stachys recta*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula persicifolia*, *Carlina vulgaris*, *Platanthera bifolia*, *Carex ericetorum*, *praecox*, *Solidago Virgaurea*, *Salix Caprea*, *Juniperus communis*.

In den Nadelwäldern: *Veronica officinalis*, *Galium rotundifolium*, *Viola canina*, *Pimpinella Saxifraga*, *Luzula pilosa*, *multiflora*, *Rumex Acetosella*, *Vaccinium Vitis idaea*, *Pyrola chlorantha*, *minor*, *Monotropa*, *Rubus idaeus*, *plicatus*, *villicaulis*, *thyrsoides*, *saxatilis*, *Fragaria vesca*, *Potentilla nemoralis*, *Tormentilla*, *Carlina vulgaris*, *Senecio sylvaticus*, *Phoenicopus muralis*, *Hieracium murorum*, *Hypochoeris maculata*, *Juniperus communis*, *Antennaria dioeca*, *Elichrysum arenarium*.

Die wichtigeren und für Excursionen geeignetsten Punkte sind: Die Umgebung von Riemberg, wo ein fast isolirter Hügel, der sogenannte Warteberg, und die an dessen Fusse gegen W. u. S. sich ausdehnenden Sumpf- und Moorwiesen und Bruchplätze eine reiche Ausbeute gewähren. Auf diesem Hügel selbst *Salix praecox* (und zwar *acutifolia*, wahrscheinlich angebaut), *pentandra*, *Potentilla recta*, *Anthyllis Vulneraria*, *Blysmus compressus*. Auf Aeckern *Arenaria tenuifolia*, *Sagina apetala*, *Trifolium spadiceum*, *Montia minor*. Auf den von hier gegen Hauffen gelegenen Moor- und Torfwiesen: *Comarum palustre*, *Tofieldia calyculata*, *Orchis angustifolia* und *latifolia*, *Galium uliginosum*, *Oxycoccus*, und in den darauf befindlichen trockener gelegenen Erlenbüschen: *Melittis Melissophyllum*. Ueberhaupt findet man hier *Heleocharis uniglumis*, *Limnolobos pauciflora*, *Eriophorum latifolium* und *angustifolium*, *Viola palustris*, *Galium uliginosum*, *Drosera rotundifolia*, *Pedicularis sylvatica*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Scorzonera humilis*, *Orchis maculata*, *latifolia*, *Gladiolus imbricatus*, *Carex dioica*, *pulicaris*, *ampullacea*, *teretiuscula*, *paniculata*, *flava*, *curta* etc. *Salix cinerea*, *repens*, *aurita*, *aurito-repens*, *pentandra*, ferner *Intybus praemorsus*, *Hieracium vulgatum* und *rigidum*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Mercurialis perennis*, *Cardamine amara*, *Polygonatum anceps*, *Lilium Martagon*, *Rubus saxatilis*, *Pyrola uniflora* nebst *minor* und *chlo-*

rantha und *Ledum palustre*. Auf Sandplätzen und an Wegen: *Festuca Myurus*, *duriuscula* var. *glauca*, in einem gegen Hauffen gelegenen Kieferwalde *Avena praecox*, *Chimophila umbellata*, *Pyrola chlorantha*, auf einem zwischen hier und dem Dorfe Tannwald gelegenen steinigen Hügel *Sambucus racemosa* sehr häufig. Zwischen hier und Auras in einem Birkenhau, *Arabis hirsuta*, *Thesium montanum*, *Hypericum dubium*. — In der mit einigen seltneren *Sphagnum*-Arten, auf deren Polstern *Oxycoccus palustris* und *Drosera rotundifolia* nisten, erfüllten Brüchen ist *Betula pubescens* vorherrschend. Zwischen Riemberg und Obernigk Kieferwald mit einzelnen Fichten und Lerchenbäumen, auf sandigen und sonnigen Stellen besonders *Rubus thyrsoides* und *villicaulis*, *Sarothamnus vulgaris*, an Hügellehnen *Anthericum ramosum*, *Stachys germanica*, *Calamintha Acinos*, *Centaurea Scabiosa*. Die Gegend um Obernigk, zumal die sogenannten Sitten, wo eine Badanlage, bietet manche Formen des *Hieracium vulgatum* und *rigidum* und der *Rubi*, als Seltenheit auch *Potamogeton rufescens*. In den Umgebungen von Heydewilxen: *Astrantia major*, *Melittis Melissophyllum*, *Astragalus arenarius*, *Viola arenaria*, *Viscum album*, *Rubus Koehleri*, *Lathyrus sylvestris*, *Carex Davalliana*. Lebhafter wird die Vegetation von hier gegen Trebniz. In dem bekannten Buchenwalde und dessen Umgebungen: *Euonymus verrucosus*, *Cephalanthera pallens* und *rubra*, *Bromus asper*, sämtliche *Pyrolae* ausser *media*, *Circaea lutetiana* und *intermedia*, *Hieracium vulgatum*, *Platanthera bifolia*, *Neottia N. A.*, *Hedera*, *Carex remota*, *Galeopsis cannabina*. Von *Abies Larix* ist hier ein kleiner Bestand angepflanzt, ohne sonderlich zu gedeihen. Auf einer gegen Burgwiz gelegenen Wiese *Orchis coriophora*. In Birkenhauen: *Viscaria purpurea*, *Campanula glomerata*, *Epilobium angustifolium*, *Solidago Virgaurea* u. a. m. *Carlina acaulis*, *Laserpitium prutenicum* und *Seseli annuum* auf ähnlichen Hügeln am Wege nach Tarnast. Ebenda an einem Bache: *Thalictrum aquilegifolium*, *Gagea minima*, *Mentha nepetoides*, auf einem Hügel *Moenchia erecta*.

An sonnigen Hügeln um Hochkirch zwischen Trebniz und Breslau: ***Potentilla recta*, *Centaurea Scabiosa*, *Helianthemum vulgare*, *Trifolium alpestre*, *Orchis Morio*.** Im Buchenwalde bei Magniz kommen vereinzelt ***Abies excelsa* und *pectinata*** vor, und ausser den schon früher erwähnten ***Viola Riviniana*, *Stellaria nemorum*, *Mentha sylvestris*, *Chrysosplenium alternifolium* u. a.**

Die in dieser und der Skarsiner Gegend befindlichen Wiesen charakterisiren sich besonders durch ***Cirsium oleraceum*, *Cardamine amara*, *Orchis latifolia* und *angustifolia***; die kleinen Bäche und Gräben durch **Chry-**

Sosplenium alternifolium, *Hypericum tetrapterum*, *Mentha sylvestris*, *Scrophularia aquatica*, *Lamium maculatum*.

Von Trebnitz bis Skarsine sind diese Hügel mit Kieferwald, der hin und wieder von Birkengebüsch unterbrochen wird, bewachsen.

Einer der interessantesten Punkte dieser Gegend sind die Berglehnen zwischen Totschen und Blössel, theils mit Kiefern bewachsen und theils kahl. An den belaubten Lehnen sind *Hepatica triloba*, *Isopyrum thalictroides*, *Primula officinalis*, *Stellaria Holostea*, *Galanthus nivalis*, *Corydalis fabacea*, *Asarum europaeum* sehr häufig, seltener *Actaea spicata*. Am Grunde dieser Lehnen wachsen zwischen *Corylus*-Gestrüch *Corydalis bulbosa* und *fabacea*, *Stellaria Holostea*, *Ranunculus lanuginosus*, *Gagea minima*, *Pulmonaria officinalis*, *Lamium maculatum*, *Galeobdolon luteum*. An sonnigen Lehnen: *Potentilla rupestris*, *Stachys recta*, *Cerastium brachypetalum*, *Myosotis hispida*, *versicolor*, *Veronica verna*, *Sedum Telephium*. Auf den von hier bis Skarsine gelegenen mit Kiefern und Birken bewachsenen Hügeln ist die Vegetation sehr einförmig. Am fruchtbarsten die Bergschluchten zwischen Gr. Glauche und Pollentschine (der Glaucher Wald), in denen verschiedene Rubi, *Sanicula europaea*, *Lonicera Periclymenum* und *Xylosteum*, *Lathyrus macrorrhizus* und *sylvestris* und einige seltene Farn, namentlich *Aspidium aculeatum*, *spinulosum*, *Oreopteris*, *Filix mas.* und *fem.*, *Polypodium Dryopteris*, *valgare* und *Lycopodium Selago* anzuführen sind. Die am Saume der Hügel gelegenen Brach- und Kleeäcker sind oft mit *Viola tricolor* in den mannigfachsten Farbenänderungen bedeckt, nicht selten von *Equisetum sylvaticum* begleitet.

In dem zwischen Skarsine und Pollentschine gelegenen Laubwalde, aus *Fagus sylvatica*, *Carpinus Betulus*, *Quercus Robur* und *Betula alba* bestehend, sind ausser den schon früher diesen Wäldern als eigenthümlich angeführten Pflanzen, auch zu nennen: *Carex digitata*, *Viola mirabilis*, *Vinca minor*, *Festuca heterophylla*, *Hypericum montanum*, *Platanthera bifolia*, *Melampyrum cristatum*, *nemorosum*, *Silene inflata*, *nutans*, *Vicia sylvatica*, *Lathyrus macrorrhizus*, *Omphalodes scorpioides*, *Polygonatum multiflorum*, *Salix Caprea*, *Hieracium vulgatum* in den mannigfaltigsten Abänderungen, *Trientalis*, *Pyrola rotundifolia* und *uniflora*, *Gagea minima*, *Astrantia major*, *Campanula persicifolia*, *Hedera*, *Luzula pilosa*, *Tussilago Farfara*, wie auch eine Menge seltener Laub- und Leber-Moose, von denen hier beispielweise *Dicranum heteromallum*, *Fissidens bryoides*, *Diphyseium foliosum*, *Bartramia pomiformis* und *ithyphylla*, *Mnium crudum*, *palustre* und *affine*, *Hypnum curvatum*, *Pellia epiphylla*, *Fegatella conica*, nebst *Peltidea venosa* angeführt werden. Auf den den Grund

dieses schönen Buchenwaldes umgebenden Wiesen werden ausser andern häufigeren mannigfaltige Formen von *Knautia arvensis*, *Veronica Teucrium* und an einigen grasigen Lehnen *Cerastium brachypetalum* beobachtet. Die Bäche und bewässerten Gräben sind hie und da mit *Lonicera Xylosteum* besetzt, ausserdem mit *Hypericum tetrapterum*, *Lamium maculatum*, *Cardamine amara*, auch mit behaartem Stängel, als Uebergang zu der merkwürdigen alpinen Abart, *Scrophularia aquatica*.

Zwischen der Trebnizer Hügelkette und der Weide verdienen folgende kleine Hügel und hochgelegene Kieferwaldungen angeführt zu werden:

Der zwischen Mahlen und Blössel gelegene Kieferwald zeichnet sich besonders aus durch das Vorkommen fast sämtlicher *Pyrola*-Arten ausser *media*, ferner *Chimophila umbellata*, *Monotropa Hypopitys*, *Rubus saxatilis*, *thyrsoides*, *Oxalis Acetosella*, *Epilobium angustifolium*, *Viola arenaria*, *canina* var. *ericetorum* und kleinblättrige Formen der *V. Riviniana*, die nicht mit jenen zu verwechseln sind. In lichten Hauen *Koeleria cristata* var. *pyramidata*, *Scorzonera humilis*, *Solidago Virgaurea*. Gegen Wiesa ist dieser Wald niedriger; feucht und grenzt an Erlenbruch in welchem *Daphne Mezereum*, *Ribes rubrum*, *nigrum* wachsen. Auf den um Mahlen gelegenen feuchten Wiesen *Colchicum autumnale*, *Cirsium oleraceum*, *canum*, *tataricum*.

In einem Walde gegen Gr. Rake *Phyteuma spicatum*, *Dianthus superbus*, *Hieracium boreale*.

Südöstlich bei Pascherwiz auf einem sandigen Kieferhügel *Gypsophila fastigiata*, *Veronica verna* und auf einer benachbarten feuchten Wiese ehemals wenigstens *Cirsium acaule*. Von hier südlich gegen Oels und Hundsfeld sind noch einige mit Kiefern und Birken hewachsene Anhöhen um Weigelsdorf und Mirkau bemerkenswerth. Um den letzteren Ort namentlich werden *Silene chlorantha* und *Otites*, *Astragalus arenarius*, *Verbascum phlomoides*, *Avena pratensis*, *Gypsophila fastigiata* und *Muscari comosum* gefunden.

In dem Thiergarten von Domatschine und der Umgegend findet sich *Arabis arenosa*, *Alchemilla vulgaris glabra* und in einem stehenden Gewässer des Thiergartens *Hippuris vulgaris*. Auf Hügeln bei Bunkey *Salix pentandra* var., *Anemone pratensis*, *Arabis arenosa*, *Polygonatum anceps*, unter der Saat *Nigella arvensis* und *Allium arenarium*, welches letztere überhaupt den sandigen Getreideäckern dieser Gegend eigen ist.

Auf den Sandhügeln um Karlowiz kommen vor: *Alyssum montanum*, *Koeleria cristata* var. *glauca* und *Sedum reflexum*. Auf einer feuchten Stelle in der Nähe der Strasse nach Hundsfeld sind: *Lycopodium inundatum*, *Viola palustris*, *Drosera rotundifolia*, *Epilobium palustre*, *Cyperus*

flavescens, *Juncus capitatus*, *squarrosus*, *Radiola Millegrana*, an trockenen Stellen *Plantago arenaria*, *Teesdalia nudicaulis*, *Antennaria dioica* und *Thymus angustifolius* zu bemerken. Auf den hier befindlichen feuchten Wiesenplätzen sind *Eriophorum latifolium*, *Pedicularis sylvatica*, *Blysmus compressus*, *Orchis maculata*, *Carex ampullacea*, *Centunculus minimus* anzuführen. Auf den unter jenen Sandhügeln liegenden mit Gebüsch durchzogenen Wiesenflecken werden mannigfaltige Formen der *Salix repens*, nächst dem auch unter *S. cinerea* und *aurita* mehrere Formen der *S. cinereo-repens* u. *S. aurito-repens*, so wie *Juncus atratus*, *J. fuscoater*, *J. capitatus*, *Dianthus superbus*, *Solidago Virgaurea*, *Gentiana Pneumonanthe* gefunden; auch wurde hier *Lemna minor* in Blüthe beobachtet.

Besonders ausgezeichnet durch einige seltene Arten ist ein zwischen Hünern und Mahlen bei dem Dorfe Kapsdorf gelegener kleiner Laubwald der Goi; der etwas trocken gelegene Theil dieses Waldes besteht aus *Quercus pedunculata*, *Ulmus effusa* und *campestris* und einigen hohen *Fraxinus excelsior*. Hier wachsen *Campanula latifolia*, *Melica uniflora* und *nutans*, *Ranunculus cassubicus* in Gesellschaft des *R. auricomus*, *R. lanuginosus*, *Viola mirabilis*, *Isopyrum thalictroides*, *Anemone ranunculoides*, *Hepatica triloba* selten, *Chaerophyllum aromaticum*, *Pimpinella magna*, *Milium effusum*, *Melilotus officinalis*, *Campanula Trachelium*. Der feuchte und theilweise sumpfige Theil besteht aus *Corylus*, *Alnus glutinosa*, *Prunus Padus* und enthält: *Dipsacus pilosus*, *Corydalis bulbosa*, *Impatiens noli tangere*, *Galeopsis cannabina*, *Orchis angustifolia*, *Geum rivale*, *Carex paniculata*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Adoxa Motaschellina*. Auf den angrenzenden moorigen Wiesen, *Taraxacum officinale* var. *salinum*, *Orchis latifolia*, *coriophora*, *Epipactis palustris*, *Carex tomentosa*, *panicea*, *glauca* u. m. a., *Bromus racemosus* neben *mollis*, *Avena pubescens*.

Auf den zwischen Kapsdorf und Schön-Ellgut von Gebüsch durchschnittenen Wiesen: *Orchis ustulata*, *Colchicum autumnale*, *Crepis paludosa*, *Melilotus officinalis*, nächst dem auch andere Formen der *Hieracia cymosa*, unter welchen *H. cymosum poliotrichum* auszuzeichnen ist.

Von besonderer Wichtigkeit ist der durch einige seltene Arten ausgezeichnete Fuchsberg bei Schwoitsch, ein sandiger Kieferhügel, dessen West- und Südwestlehne mit Laubwald bewachsen, etwas jäh nach feuchten Waldwiesen gegen das Schwarzwasser abfällt. Hier werden ***Glaucolus imbricatus***, ***Thesium Linophyllum***, ***Veronica Teucrium***, ***Geranium sanguineum***, ***Campanula persicifolia***, ***Verbascum Lychnitis***, ***nigrum*** und ***Thapsus***, ***Viscaria purpurea***, ***Silene inflata***, ***Scabiosa Columbaria flor. lilacinis***, ***Polygonatum anceps***, ***Sedum Telephium***, ***Anthericum ramosum***,

Digitalis grandiflora und *Chrysocoma Linosyris* auf einem kleinen Raume vereinigt gefunden. Ausserdem verdient dieser durch seinen Insektenreichthum ausgezeichnete Hügel wegen mannigfaltiger und interessanter Formen der *Capitulariae* besucht zu werden. In den nächsten Umgebungen werden noch *Vicia cassubica* und *Potentilla inclinata*, einmal auch *Cineraria crista*, gegen Scheitnich hin aber *Myosotis caespitosa*, *Cardamine parviflora*, *Senecio barbaraefolius*, *Cucubalus bacciferus*, *Galanthus nivalis*, und in der Nähe von Scheitnich noch *Viola persicifolia*, *stricta* und *elatior* bemerkt.

Auf dem bebauten Lande auf dem rechten Oderufer fehlen *Adonis* und *Cerithe*, häufiger erscheint hier *Stachys annua*, vereinzelt *Arabis arenosa* und *Nigella arvensis*. Angebaut werden hier vorzugsweise mehr als auf jenem *Linum usitatissimum*, *Polygonum Fagopyrum*, *Trifolium incarnatum* nur in der Trebnizer Gegend.

Die Ränder der Landstrassen auf dem rechten Oderufer sind wegen des trockneren Bodens weniger pflanzenreich als auf dem linken, und es sind nur *Bromus pratensis* an der Mahleiner Strasse, *Verbascum Blattaria* hie und da auch an Ackerrainen ziemlich verbreitet, und an der Hundsfelder Strasse *Reseda luteola* als vereinzelt Erscheinungen zu erwähnen.

Die in Städten und Dörfern, auf Mauern, Dächern, Schutt- und Dünghaufen, freien unbebauten Plätzen und an Abzugsgräben wachsenden Pflanzen bilden die sogenannte Ruderal-Flora, woran sich die in Obst- und Graspärten, und an Hecken u. Zäunen vorkommenden Pflanzenarten anschliessen.

Auf Mauern und Dächern wachsen: *Valeriana officinalis* var. *angustifolia* auf den Ueberresten der Breslauer Stadtmauer, *Poa compressa*, *Verbascum Lychnitis*, *Sedum acre*, *Sempervivum tectorum* (Klettendorf und Rosel auf Strohdächern), *Linaria minor*, *Erysimum hieracifolium*, *Farsesia incana*, *Senecio viscosus*. Auf Schutthaufen oder um die Häuser: *Veronica polita*, *Poa annua*, *Glyceria distans*, *Hordeum murinum*, *Parietaria erecta*, *Asperugo procumbens* in den Vorstädten und umliegenden Dörfern, *Hyoscyamus niger*, *Solanum nigrum* und die var. *miniata* an der Strasse hinter dem polnischen Bischoff, *Chenopodium bonus Henricus*, *hybridum*, *urbicum*, *murale*, *opulifolium*, (Breslau) *Vulvaria* in den Vorstädten Breslaus, *Atriplex nitens*, *latifolium*, *patulum*, *Aethusa Cynapium*, *Anthriscus Cerefolium* durch Anbau verwildert, *Conium maculatum* (Schwoitseh) *Rumex crispus*, *Polygonum aviculare*, *Lythrum* } *Hyssopifolia*, *Potentilla Anserina*, *reptans*, *Chelidonium majus*, *Mentha sylvestris*, *La-*

mium album, Leonurus Cardiaca, Chaeturus Marrubiastrum, Ballota nigra, Marrubium vulgare, Verbena officinalis, Coronopus Ruellii (Odervorstadt), Lepidium ruderales, Erysimum cheiranthoides, Erodium Cicutarium, Sisymbrium officinale, Sophia, Geranium molle, Malva rotundifolia, borealis, sylvestris, Lavatera thuringiaca (Klein-Weigelsdorf, Masselwitz, Bischwitz a. d. Weide), Onopordon Acanthium, Lappa tomentosa, minor, major, Artemisia vulgaris, Absinthium, Pyrethrum Parthenium verwildert, Lapsana communis, Euphorbia Peplus, platyphyllos in den der Oder zunächst gelegenen Dörfern, Urtica urens, dioica, Xanthium Strumarium u. verwildernd X. spinosum, Amarantus Blitum, retroflexus fast nur um Breslau.

Auf Dunghaufen und an Abzuggräben: Echinochloa Crus Galli, Glyceria distans, Chenopodium rubrum, album, glaucum, Rumex obtusifolius, maritimus, Polygonum laxiflorum, lapathifolium, Hydropiper, Reseda luteola Schweidnizer Vorstadt wahrscheinlich verwildert, Potentilla supina, Ranunculus sceleratus, repens, Trifolium fragiferum, Sonchus oleraceus und asper.

In Grasgärten wachsende Pflanzen sind vorzüglich hervorzuheben: Tulipa sylvestris (Breslau und Pilsniz), Ornithogalum nutans, umbellatum (Breslau), Helleborus viridis (Mirkau)?, Scrophularia vernalis (am Lehdamme in Breslau).

An Zäunen und Hecken, Verbascum nigrum, Viola odorata, Chenopodium Botrys (Skarsine), Torilis Anthriscus, Aegopodium Podagraria, Chaerophyllum bulbosum, temulum, Anthriscus sylvestris, vulgaris, Sambucus nigra, Acer campestre, Berberis vulgaris, Galeopsis pubescens, Tetrahit, Nepeta Cataria, nuda vormalis in der Ohlauer Vorstadt, Geranium divaricatum (Bischwitz a. d. Weide, Sandberg, Beuthen), Urtica dioica, Bryonia alba, welche mit Ausschluss derjenigen, deren Standort besonders angegeben ist, in der nächsten und unmittelbaren Umgehung der Stadt vorkommen.

Wohlau, am Abfalle der oft erwähnten nördlichen Hügelreihe gelegen, hat in seinen Umgebungen grösstentheils von Wald umkränzte Sumpfwiesen von ansehnlicher Ausdehnung, mit denen theils Brüche und Waldsümpfe, theils ein wenig ansteigende sandige Kieferwälder in Verbindung stehen. Die Gegend besitzt mehrere theils seltene theils eigenthümliche bisher noch an keinem anderen Punkte des Gebiets bemerkte Arten. Auf den sumpfigen Wiesen längs der Schindel- und Giesemühle wurde ehemals Carex microstachya neben den häufigeren C. Linnaeana, ampullacea, flava etc., neuerdings aber Eriophorum gracile, einmal auch Sturmia Loeselii gefunden, ausserdem Epipactis palustris, Gladiolus imbricatus, Rhynchos-

pora alba, Scorzonera humilis und viele häufigere Arten. An waldigen Plätzen wächst *Holoschoenus vulgaris*, *Ledum palustre*, *Corallorrhiza*, *Osmunda regalis*, *Ophioglossum*, *Lycopodium complanatum*, *Leucoium vernum*, *Circaea alpina*; um Petranowiz *Herminium Monorchis*, *Triglochin maritimum* u. *Thalictrum collinum*; bei Arnsdorf *Silene chlorantha* und *Scorzonera purpurea*, um Polgsen *Linnaea borealis*, in kleineren Teichen nächst der Stadt *Utricularia minor*, *Potamogeton pectinatus* und *obtusifolius*. Ausserdem sind als seltene Arten aus dieser Gegend noch anzuführen: *Berberis vulgaris* hin und wieder im Riefergebüsch auch an entlegeneren Stellen verwildert, *Thalictrum flavum*, *Geranium divaricatum*, *Silene gallica*, *Arenaria tenuifolia*, *Portulaca oleracea*, *Chenopodium opulifolium* und *ficifolium*, *Atriplex album*, *Falcaria Rivini*, *Potentilla norvegica* und *recta*, *Aster salignus*? am Oderufer bei Grosen, *Stachys recta*, *Utricularia vulgaris*, *Muscari comosum*, *Festuca Myurus*. Dagegen wird hier wie in der Gegend von Sprottau *Lamium album* vermisst.

Das Flussgebiet der Bartsch, oder die Gegend von Trachenberg und Militsch an der nordöstlichen Grenze des Gebiets, ist niedrig und tief; die Bartsch, ein stagnirender Ebenenfluss bildet viele Aussümpfungen, die mit *Acorus Calamus* und hier und da *Oenanthe fistulosa* besetzt sind. Die Hauptmerkwürdigkeit dieser Gegend aber sind die ansehnlichen Fischteiche, worunter die Kollize und Grabownize bei Militsch die bedeutendsten und durch einige Formen von *Potamogeton*, namentlich des seltenen *P. gramineus*, dann *compressus*, *pusillus*, *lucens* und *obtusifolius* bemerkenswerth sind. In der Nähe kommt auch *P. rufescens* vor. Um Swibedove der seltene *P. gramineus latifolius*, *Utricularia vulgaris* und im Buchenwalde *Evonymus verrucosus*. Die Umgegend von Sulau ist durch eine Menge von *Fraxinus* ausgezeichnet. Um Birnbäumel wurden zuerst *Dianthus caesiis* und *Anemone Pulsatilla* gefunden; ausserdem sind *A. vernalis* und *patens* diesem Striche eigenthümlich und werden zahlreich auch um Deutsch-Hammer und bis nach Medzibor gefunden.

Die Gegend um Guhrau, insbesondere um Gr. Tschirnau wurde zuerst durch den trefflichen Starke durchforscht; nach ihm wurden *Sagina apetala*, *Arenaria tenuifolia* und *Polygala amara*, welche er zuerst in Schlesien entdeckte, hier wieder gefunden; die in den weitläufigen Brüchen an der Posenschen Gränze von ihm entdeckte *S. depressa*, welche Wildenow ihm zu Ehren *S. Starkeana* nannte, ist bisher noch nicht wieder gefunden, aber auch wenig darnach gesucht worden. Aber Schmidt entdeckte in der Guhrauer Gegend *Plantago maritima*.

Aus der Gegend von Gr. Glogau sind als seltenere Arten *Androsace septentrionalis*, *Astragalus arenarius*, *Triglochin maritimum*, *Corrigiola*

litoralis, Ononis spinosa, Gnaphalium luteo-album, Silene chlorantha, Gypsophila fastigiata und Cineraria palustris zu bemerken.

Aus der Gegend von Niederbeuthen, oder Beuthen a. O., deren genauere Kenntniss wir Beilschmied verdanken, zeichnen wir nach den einzelnen Orten folgende Arten aus: um Dalkau *Lathyrus vernus* und *niger*, *Carex digitata*, *Luzula pilosa*, *Astragalus glycyphyllos*; Lindau *Gagea minima*, *Corydalis fabacea*; in der Pasche *Leersia*, *Carex remota*, *Cardamine Impatiens*, *Oenanthe fistulosa*, *Euphorbia lucida latifol. et angustifol.*; am Nätischütz *Ornithopus*, *Anthyllis*, *Astragalus arenarius*; um Költseh und Karolath *Scirpus radicans*; um Rosenthal *Myriophyllum verticillatum*, *Utricularia vulgaris* und *Chara pulchella*; in der Karolather Haide *Polygonatum anceps*, *Pyrola secunda*, *Scorzonera humilis*, *Rosa rubiginosa*; um Polnisch-Tarnau *Utricularia minor*, *Circaea alpina*, *Cyperus flavescens*, *Hydrocotyle*, *Carex teretiuscula*, *Dianthus superbus*, *Cineraria palustris*; um Schlawa *Calla palustris*, *Cineraria palustris*; um Ottendorf *Calla palustris*, *Comarum*, *Salix repens argentea*; um Primkenau *Utricularia intermedia*.

Zwischen Liegniz und Haynau erstreckt sich rechts der Saum einer langen Waldung, welche sich westlich über den Bober und Queis hinaus mit denen der Lausiz verbindet nördlich bis Sprottau und im Osten bis gegen die Oder reicht. Nordöstlich von Sprottau verlieren diese Wälder ihren Zusammenhang und die Gegend erhebt sich in einzelnen vom linken Oderufer herstreifenden Höhenzügen, die im Freistädtischen und Grünbergischen ein niedriges aufgeschwemmtes Gebirge bilden, welches mit dem Trebnizer Höhenzuge zu vergleichen ist. Jene Waldungen sind theils trocken, theils sumpfig, und schliessen grosse Wiesen ein, welche früher häufig zu Teichen benutzt wurden. Vorherrschend ist darin die Kiefer, seltener die Fichte und Weisstanne. Dazwischen kommen auch Laubwaldungen aus *Betula*, *Carpinus*, *Acer platanoides* und anderen vor. Eine der interessantesten Parteen ist der Hochwald, südöstlich von Sprottau, aus *Fagus*, *Tilia* und einigen anderen zerstreuten Laubbölzern im Verein mit *Abies excelsa* und *pectinata* bestehend, ausserdem durch den häufig an den Stämmen emporrankenden Epheu charakterisirt. — Mit dem Beginn jener Waldungen verschwinden an der Strasse alle jene Weg- und Schuttpflanzen, die in der Ebene zwischen Breslau und Liegniz uns begleiten, völlig. *Xanthium*, *Onopordon*, die *Chenopodium* und *Atriplex-A.*, *Scabiosa Columbaria*, *Lepidium ruderales*, *Salvia pratensis*, *Anchusa* sucht man vergeblich sowohl hier, als auch um Sprottau am Ausgange jener Waldungen; selbst *Galium Mollugo* und *G. vernum* werden seltener. Dagegen hegt diese Gegend eine Menge von Wald- und Sumpfpflanzen, die sonst selten oder gar nicht vorkommen. — Um Dörfer

und auf Schutthaufen findet man überall *Artemisia Absinthium*, *Conium maculatum*, *Datura*; in Hauen *Verbascum phlomoides* und *V. Thapsus*; im trocknen Kieferwalde *Gypsophila fastigiata*, *Arctostaphylus officinalis*, *Genista germanica*, *Cytisus nigricans*, *Polypodium vulgare*. An der äussersten Grenze dieses Gebietes erscheint hier zuerst in Schlesien *Erica Tetralix*. In schattigen Laubwäldern: die gewöhnlichen Farn mit *Aspidium Oreopteris*, *Osmunda regalis* und *Botrychium Lunaria*; *Trientalis*, *Cephalanthera rubra* und *pallens*, *Primula elatior*, *Thalictrum minus*, *Rubus saxatilis*, *Lathyrus macrorrhizus*, *Arnica*, an hügelichen Stellen *Digitalis grand.*, *Hypericum montanum*. In dem obengenannten Hochwalde sind es vorzüglich *Aspidium cristatum*, *Ophioglossum*, *Cephalanthera rubra*, *Festuca aspera*, *Gagea minima*, *Circaea intermedia* und *C. alpina*, *Cardamine Impatiens*, *Dentaria enneaphylla* und *D. bulbifera*, *Actaea* und *Aquilegia*, welche unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. In den Sümpfen, meist Erlenbrüchen, ist *Calla* und *Aspidium Thelypteris* herrschend, dann *Leersia*, *Rumex aquaticus*, *Menyanthes*, *Andromeda polifolia*, *Ledum*, *Schollera*; dabei seltner *Hippuris*, *Elatine Alsinastrum*, *Valeriana dioica*, *Illecebrum verticillatum*. An Teichrändern: *Cineraria palustris*, *Sedum villosum*, *Triglochin maritimum*. In den Gewässern um Sprottau: *Potamogeton pectinatus* und *P. rufescens*, *Zannichelia*, *Batrachium fluviatile*, die drei *Utriculariae* und *Sparganium natans*. Nirgends findet sich *Stratiotes aloides*. Auf Aeckern: *Ornithogalum umbellatum*; an Wegen: *Festuca Myurus*; an grasigen Stellen ausnehmend häufig: *Veronica Teucrium*. Die Vegetation der Hügel im Norden von Sprottau gleicht fast durchaus der der Trebnizer Höhen. In der bezeichneten Gegend werden ausserdem folgende, sonst gemeine Pflanzen vermisst: *Melampyrum cristatum*, *Galanthus*, *Cynanchum*, *Orchis Morio*, *Daucus*, *Allium acutangulum*, die gelbblumigen *Meliloti*, *Euphorbia palustris*, *Eryngium planum*. Dagegen finden sich am Bober und um Freistadt *Corrigiola* *).

Die Umgegend von Bunzlau **) lässt sich nach der Beschaffenheit des Bodens und der dieser entsprechenden Vegetation in eine nördliche ebene und südliche hügeliche Hälfte eintheilen, welche letztere in einzelnen Punkten, wie im Probsthainer Spitzberg (2788' h.), zum Theil auch im Grödzberge — welcher zwar nur 1260' h. aber durch die Vegetation schon auf die zweite Region hindeutet — zu der Region des Vorgebirges sich erhebt. Die Pflanzen des fruchtbaren Humusboden, so wie die des ge-

*) Nach Goeppert in Uebers. d. Arbeit. der Schles. Gesellschaft im Jahre 1833.

**) Nach „Schneider Beiträge zur Schlesischen Pflanzenkunde. Breslau 1829.“

mischten Laubholzes kommen nur sparsam und zum Theil in der südlichen Hälfte, in den Bobergebüschchen und auf den Wiesen der Flussthäler vor: Sand-, Haide- und Moorpflanzen bilden den überwiegenden Charakter dieser Flora. Das hiesige Boberbette zunächst ober- und unterhalb Bunzlau führt die solchen Stellen eigenthümlichen Pflanzen als: *Oenothera biennis*, *Echium vulgare*, *Saponaria officinalis*, *Tanacetum vulgare* nebst *Lathyrus sylvestris*, und in den vom Wasser ausgewählten Lachen (Bober-tümpel) die gewöhnlichen Arten von *Potamogeton*, *Lemna*, *Myriophyllum*, *Ceratophyllum*, *Callitriche*, *Utricularia*, *Hottonia*, *Batrachium*, *Acorus*, nebst *Scirpus radicans*. Auf Sumpfwiesen erscheinen: *Gladiolus imbricatus*, *Epipactis palustris*, *Valeriana dioeca*, *Pedicularis palustris*, *Menyanthes trifoliata*, *Calla palustris*: in der Haide *Sorothamnus*, *Cytisus nigricans*, *Genista germanica*, *pilosa* und *tinctoria*, weite Strecken sind mit *Calluna vulgaris* andere mit *Vaccinium Myrtillus* und *Vitis idaea*, feuchte und torfige mit *Ledum* nebst *Andromeda polifolia* und *Vaccinium uliginosum* bedeckt, wozu in den sumpfigen Torfmooren noch *Vaccinium Oxycoccus* und *Erica Tetralix* kommen. Letztere, so wie *Carex arenaria* u. *Rhynchospora fusca* sind dieser Flora ausschliesslich eigen. Die seltenen Arten dieser Flora sind ausserdem: *Heleocharis ovata*, *Linnochloa pauciflora*, *Eriophorum gracile*, *Carex dioeca*, *Leucoglochis pulicaris*, *cyperoides*, *Buxbaumii*, *filiformis*, *Calamagrostis lanceolata*, *Avena praecox*, *Koeleria cristata glauca*, *Poa bulbosa*, *Festuca Myurus*, *Leersia*, *Juncus alpinus*, *Leucoium*, *Gagea minima*, *Ornithogalum umbellatum*, *Muscari comosum*, *Anthericum ramosum*, *Scheuchzeria*, *Orchis ustulata*, *Spiranthes*, *Cephalanthera rubra*, *Potamogeton obtusifolius*, *Salix acuminata*, *Taxus*, *Gentiana campestris*, *Utricularia vulg.*, *intermedia* und *minor*, *Lathraea*, *Petasites officinalis*, *Gnaphalium luteo-album*, *Arnica*, *Prenanthes purpurea*, *Onobrychis sativa*, *Vicia sylvatica*, *Astragalus arenarius*, *Ornithopus*, *Potentilla norvegica*, *Sedum villosum*, *Sempervivum soboliferum*, *Oenanthe fistulosa*, *Hydrocotyle*, *Drosera anglica*, *intermedia*, *Circaea alpina*, *Montia minor*, *Galium sylvestre*, *Lysimachia thyrsiflora*, *nemorum*, *Phyteuma spicatum*, *Ribes alpinum*, *Illecebrum*, *Cuscuta monogyna*, *Elatine Hydropiper* und *Alsinastrum*, *Pyrola media*, *chlorantha*, *uniflora*, *Chrysosplenium oppositifolium*, *Thalictrum flavum*, *Cardamine parviflora*, *Corydalis fabacea*, *Polygala amara*, *Mercurialis annua*.

Aus den Umgebungen von Görlitz und dem jetzt zu Schlesien gehörenden Antheile der Lausitz sind*) folgende seltene Arten aufzuführen:

*) nach „Rabenhorst Flora Lusatica. Leipzig 1839.“ Bei einigen Angaben mag die Schlesische Gränze vielleicht überschritten sein, da es hier auf eine scharfe Abgränzung nicht ankam.

Veronica montana bei Meffersdorf, *Pinguicula* bei Diehsa, *Utricularia minor* bei Kreba, *Circaea alpina* bei Niesky, *Polycnemum* bei Niesky, *Heleocharis ovata* ebenda, *Leersia* ebd., *Avena flavescens* bei Görliz, *Galium hercynicum* a. d. Tafelfichte, *Trapa* bei Kreba und Görliz, *Potamogeton praelongus* in der Neisse bei Görliz, *P. pectinatus* bei Gr. Hennersdorf, *Illecebrum* bei Niesky und Rothenburg, *Herniaria hirsuta* bei Priebus, *Gentiana asclepiadea* a. d. Tafelfichte, *Juncus Tenageia* bei Niesky, *Elatine triandra* bei Niesky, *E. hexandra* bei Kreba, *E. Hydropiper* bei Görliz und Kreba, *Ledum* bei Muskau, Rothenburg und Niesky, *Andromeda polifolia* um Muskau, Niesky und Wehrau, *Arctostaphylos officinalis* um Niesky, *Dianthus prolifer* bei Görliz, *Silene gallica* um Niesky, *Pyrus Aria* in d. Görlizer Haide (?), *P. torminalis* in d. Görlizer Haide, *Cotoneaster vulgaris* a. d. Landskrone, *Potentilla recta* bei Görliz, *Anemone vernalis* b. Niesky, *Mentha viridis* bei Gr. Hennersdorf, *Scrophularia vernalis* ebdas., *Linaria Cymbalaria* auf alten Mauern bei Görliz, *Dentaria enneaphylla* bei Meffersdorf, *Corydalis fabacea* a. d. Landskrone, *Cytisus nigricans* bei Muskau, Niesky und Görliz, *Astragalus arenarius* bei Kreba und Muskau, *Vicia pisiformis* a. d. Landskrone, *V. cassubica* b. Niesky, *Petasites albus* bei Meffersdorf, *Conyza* sq. a. d. Landskrone, *Cirsium acaule* bei Gr. Hennersdorf, *Lactuca Scariola* bei Görliz, *Orchis ustulata* bei Gr. Hennersdorf, *Coeloglossum viride* bei Meffersdorf und Niesky, *Epipactis palustris* bei Diehsa, *Listera cordata* bei Meffersdorf, *Goodyera repens* ebd., *Epipogium Gmelini* ehemed a. d. Königshainer Bergen, *Spiranthes autumnalis* bei Görliz, *Corallorrhiza* bei Meffersdorf, *Carex pulicaris* bei Niesky, *C. paradoxa* bei Muskau und Niesky, *C. cyperoides* um Gr. Hennersdorf und Niesky, *C. fulva* bei Görliz, *C. limosa* a. d. Tafelfichte, *Sparganium natans* b. Kreba, *Mercurialis annua* bei Görliz.

In den Umgebungen von Lauban *) wurden beobachtet im Hochwalde: *Veronica montana*, *Asperula odorata*, *Lonicera nigra*, *Vinca minor*, *Sanicula europaea*, *Chrysosplenium oppositifolium*, *Lathraea squamaria*, *Dentaria enneaphylla*, *Prenanthes purpurea*, *Neottia Nidus avis*, *Carex remota* u. *digitata*, *Polypodium Dryopteris*, *Blechnum boreale*; Försterwiese *Circaea alpina* u. *intermedia*, *Polygonum verticillatum*, *Dentaria bulbifera*; Berthelsdorf: *Valeriana sambucifolia*, *Laserpitium pratense*, *Drosera rotundifolia*, *Gymnadenia conopsea*; Klosterberg: *Valeriana dioeca*, *Melica uniflora*, *Elymus europaeus*, *Cirsium heterophyllum*, *Conyza squarrosa*, *Carex maxima*; Paritz: *Scirpus radi-*

*) Nach handschriftl. Mittheilungen von Hertzsch.

cans, *Radiola linoides*, *Ornithopus perpusillus*, *Eriva Tetralix* am weissen Berge; Nieda: *Avena praecox* am Kirchberge, *Bupleurum falcatum*; Marklissa: *Primula elatior*, *Gentiana campestris*, *Pyrola media*, *Spiraea Aruncus*; Schloss Tzschocha: *Primula elatior*, *Vinca minor*, *Cuscuta Epilinum*, *Lunaria rediviva*; Lichtenau: *Ribes nigrum*, *Cicuta virosa*, *Chrysosplenium oppositifolium*, *Conyza squarrosa*, *Spiranthes autumnalis*; Logau: *Leucoium vernum*, *Ornithogalum umbellatum*, *Corydalis fabacea*; Heidersdorf: *Alisma natans*; Schwerta: *Helleborus viridis* an der Schlossruine, *Lathraea squamaria*, *Corydalis fabacea*; Siegersdorf: *Cytisus nigricans*; Langenöls: *Aster salignus*; Holzkirch: *Chrysosplenium oppositifolium*, *Coeloglossum viride*; Steinberg: *Sedum villosum*, *Asplenium germanicum*; Landskrone: *Galium sylvestre*, *Ranunculus nemorensis*, *Cirsium acaule*; Tafelfichte und Iser: *Galium hercynicum*, *Lonicera nigra*, *Meum athamanticum* (Hermsdorf), *Myrrhis odorata*, *Streptopus amplexifolius*, *Luzula maxima*, *Veratrum*, *Trientalis*, *Aquilegia*, *Alectorolophus villosus*.

Die Gegend um Ohlau*), welches an der Ohlau und Oder liegt, hat einige durch mehrere selteneren Pflanzenarten ausgezeichnete Punkte. In den Umgebungen von Seifersdorf werden in einem fruchtbaren Laubwalde mehrere der Hügel-Ebene eigene Pflanzen angetroffen, als *Aconitum variegatum gracile*, *Isopyrum*, *Trollius*, *Corydalis fabacea*, *Polygala amara*, *Euphorbia pilosa*, *Tetragonolobus*, *Cirsium canum*, *tataricum* und *rivulare*, *Senecio erucifolius*, *Spiranthes autumnalis*, *Carex tomentosa*, *fulva* und ausserdem *Lolium arvense* und *Cuscuta Epilinum*. Um Merzdorf: *Gladiolus imbricatus*, *Calamagrostis lanceolata*, *Hierochloa odorata*, *Petasites officinalis*. Am Weinberge: *Sedum reflexum*, *Helianthemum*, *Cytisus biflorus*, *Alyssum montanum*, *Geranium sanguineum*, *Stachys recta*, *Anthericum ramosum*, *Primula veris* nebst einigen merkwürdigen Formen von *Hieracium*, namentlich *H. floribundum*, *H. stolonifloro-collinum* und *H. praealto-stoloniflorum*. Näher gegen Baumgarten hin *Dipsacus sylvestris* und *laciniatus* nebst *Cynoglossum officinale*. Bei Neuvorwerk: *Eriophorum vaginatum*, *Heleocharis ovata*, *Ribes nigrum*, *Pyrola uniflora*, *Potentilla norvegica*, *Cardamine parviflora*, *Carex cyperoides*. Bei Jakobine Limnochloa pauciflora, *Melica uniflora*, *Potamogeton rufescens*, *Colchicum*, *Salix repens*. Um Grüntanne, jenseit der Oder, in gemischter Laub- und Nadelwaldung: *Circaea alpina*, *Aira flexuosa*, *Calamagrostis sylvatica*, *Polygonatum anceps*, *Pyrola umbellata*, *Rubus saxatilis*, *Cytisus biflorus*, *Goodyera*. Ausgezeichnet besonders durch einige

*) Nach Mittheilungen von Beilschmied.

Sumpf- und Moor-Pflanzen ist die Gegend von Garsuche, wo *Utricularia minor*, *Eriophorum angustifolium*, *gracile*, *Hedera*, *Viola palustris*, *Hydrocotyle*, *Drosera rotundifolia*, *Oxycoccus*, *Ledum*, *Goodyera*, *Carex tetretuscula*, *ampullacea*, *digitata* und *Lycopodium annotinum*, *inundatum*, Selago, *Salvinia natans*, *Botrychium matricarioides*, *Aspidium cristatum* nebst anderen häufigeren Arten gefunden werden. Ausserdem finden sich in der Umgegend von Ohlau an verschiedenen Punkten unter anderen: *Veronica latifolia*, *Polycnemum*, *Cyperus flavescens*, *Scirpus radicans*, *Festuca Pseudo-myurus*, *Leersia*, *Polycarpum*, *Radiola*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Menyanthes*, *Phyteuma spicatum*, *Cicuta*, *Oenanthe fistulosa*, *Allium ursinum*, *Lilium Martagon*, *Trientalis*, *Dianthus superbus*, *Silene gallica*, *Lychnis diurna*, *Euphorbia lucida*, *Sempervivum soboliferum*, *tectorum*, *Aquilegia*, *Anémone pratensis*, *Chaeturus Marrubiastrum*, *Teucrium Scordium*, *Linaria arvensis*, *Elatine*, *Alyssum montanum*, *Cytisus capitatus*, *Lathyrus sylvestris*, *Hypericum montanum*, *Gnaphalium luteoalbum*, *Senecio nemorensis*, *Carex pulicaris*, *Salix daphnoides*.

Oberschlesien, und zwar zunächst der Preussische Regierungsbezirk Oppeln, in einem Flächenraume von 240 □ Meilen, bildet ein wellenförmiges Hochland, dessen Hauptthal das Oderbett bildet, und dessen vorzüglichste Nebenthäler von der Neisse, Malapane und Klodnitz gebildet werden. Die Erhebung auf beiden Seiten der Oder ist nicht bedeutend und erreicht auf der rechten Seite im Klemensberge nächst Lendzin bei Berun 1004', im Lubschauer Berge 1187' und in der Wasserscheide der Klodnitz und Malapane bei Tarnowiz gegen 1200', dann im Anna-Berge bei Kosel, als der bedeutendsten Erhebung 1296', und endlich gegen Oppeln hin im Sacrauer Berge bei Grosstein 850'; auf der linken Seite Bratsch bei Leobschütz 1249, und im Bratschberge 1400'. Von Seen sind nur der Kalichteich und der Czepanowitz Teich bei Oppeln und der Sarcziner Teich bei Pless zu bemerken. — Der grösste Theil dieses Gebiets ist vom aufgeschwemmten Lande bedeckt, das nur hie und da von hervorragenden Partien der älteren Gebirgsarten durchbrochen ist. Aude höheren Punkten herrscht grober Kies, auch mit den erraticen Blöcken, auch loser Flugsand in den Niederungen der rechten, dagegen mehr Letten auf der linken Seite. Unter den Gebirgsformationsgliedern, welche Oberschlesien charakterisiren, ist ohne Zweifel auf die Vegetation vom wesentlichsten Einflusse der Kreide-Kalkstein, welcher von grosser Ausdehnung ist und die nächste Unterlage bildet, nächstdem der Gyps, der Muschelkalkstein und in negativer Hinsicht die metallischen Lager im Dolomit. Der Kreidekalkstein füllt ein Becken aus von Oppeln wo er am mächtigsten ist, aufwärts in der Richtung der Oder, senkt sich

nördlich bei Gr. Döbern unter aufgeschwemmtem Lande ein und erhebt sich südlich bei Gr. Schminiz nur 20 Fuss mächtig, auf Thoneisensteingebirgen ruhend. Er ist kaum dicht, mehr feinerdig, wird oft nach unten mergelartig und deutlich geschichtet, von den die Kreideformation charakterisirenden Versteinerungen dicht erfüllt. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir einen Theil der eigenthümlichen Vegetation, zumal der Umgebungen von Oppeln, diesem Kalkboden zuschreiben, wenn auch nicht in dem Sinne, dass die daselbst vorkommenden Arten an denselben gebunden seien, doch so, dass derselbe durch seine Eigenschaften jene Vegetation begünstigt. — Die Formation des Gyps- und Mergelgebirges ist am ausgezeichnetsten am Rande des Grauwacken-Gebirges bei Dirschel, Katscher und Deutsch-Neukirch; in einem aschgrauen theils plastischen theils mergelartigem Thone liegen Nester und stockförmige Massen von Krystallgyps, hin und wieder zu Flötzlagen gestaltet, ausserdem ein mergelartiger Kalkstein in rundlichen brotförmigen Knollen, die sich zu einer Flötzlage an einander reihen. Auch diese Formation scheint für die Vegetation nicht ohne Bedeutung zu sein. Das Thoneisensteingebirge ist in Oberschlesien sehr verbreitet, vom Malapanethal nordwärts über Lubliniz, Rosenberg und Creuzburg, ferner westlich bei Falkenberg, südlich des Klodnitzthales um Kieferstädtel und über Rybnik bis nach Ratibor, obwohl nicht überall Eisen führend: von einem Einflusse auf die Vegetation sind indess kaum bestimmte Spuren wahrgenommen worden.

Die Bildung des Muschelkalksteins erstreckt sich in einem langen Zuge von 1 — 2 Meilen Breite, aus Polen hereintretend, über Beuthen, Tarnowiz, Tost, Gr. Strehliz bis nach der Oder und jenseit derselben bis Krappiz, und tritt ausserdem an vielen einzelnen Punkten insularisch hervor. Zu dieser Bildung gehört insbesondere derjenige Kalkstein, welcher in geschichteten Felsen an der Nordseite des Annaberges und am Sakrauer Berge zwischen Sakrau und Kleinstein ansteht. Obwohl dieses Gestein im Allgemeinen einen nachtheiligen Einfluss auf die Vegetation ausübt, indem die vielen dasselbe durchsetzenden offenen Klüfte das Regenwasser leicht fallen lassen und das Aufreissen des Bodens begünstigen, so erscheint doch an den genannten Stellen eine eigenthümliche, durch einige seltene Arten charakterisirte Vegetation. Der zu derselben Formation gehörende Dolomit, von Scharley nach Beuthen und Miechowiz und von da nördlich über den Silberberg und Trockenberg nach Tarnowiz und Repten bis Plakowiz und Wilkowiz, hildet bei einer noch mehreren Zerklüftung als wie der Kalkstein, ausgezeichnet trockne und sterile Anhöhen, pflegt aber eine braune, wenn auch sehr leichte und lockere, doch weit fruchtbarere

Dammerde zu tragen, welche in nassen Jahren reiche Ernte giebt, namentlich als Kartoffelland; auch sieht man darauf äusserst üppige Waldungen von Nadel- und Laubholz. Merkwürdig dagegen ist die gänzliche Unfruchtbarkeit des Lettens aus dem weissen Gallmeilager, wovon Halden ein halbes Jahrhundert hindurch auch keinen Grashalm aufkommen lassen, während selbst der erdige Brauneisenstein und der rothe Gallmeiletten in einigen Jahren überrast.

Die nur in Oberschlesien vorkommenden Arten sind: *Ranunculus illyricus*, *Clematis recta*, *Dentaria glandulosa*, *Viola uliginosa* (und *uliginosopalustris*), *Saponaria Vaccaria*, *Stollaria Friesiana*, *Herniaria hirsuta*, *Spergula subulata*, *Saxifraga Hirculus*, *Haecquetia Epipactis*, *Bupleurum falcatum*, *Barkhausia setosa*, *Aster Amellus*, *Cirsium pannonicum*, *Campanula bononiensis* und *sibirica*; *Villarsia nymphoides*, *Nonnia pulla*, *Orobanche major*, *ramosa* und *coerulea*, *Verbascum spurium*, *Salvia glutinosa*, *Chamaepitys vulgaris*, *Thesium ebracteatum*, *Nuphar pumilum*, *Alisma natans*, *Scilla bifolia*, *Carex paradoxa*, *Alopecurus agrestis*.

In der Gegend von Kreuzburg *) sind als die hervorstechendsten Arten zu bemerken, in den Umgebungen von Bankau: *Utricularia vulgaris*, *Heleocharis ovata*, *Cyperus flavescens*, *Lycopodium inundatum*, *Aspidium cristatum*; von Ludwigsdorf *Eriophorum latifolium*, *Alchemilla vulgaris glabra*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Tofieldia calyculata*; von Dombrowka *Vaccinium uliginosum*, *Ledum palustre*, *Andromeda polifolia*; ferner an verschiedenen Punkten: *Eriophorum angustifolium*, *Rhynchospora alba*, *Plantago arenaria*, *Potamogeton rufescens*, *Myosotis caespitosa*, *Sanicula*, *Hydrocotyle*, *Thyselinum palustre*, *Radiola Millegrana*, *Triglochin palustre*, *Juncus squarrosus*, *Epilobium palustre*, *hirsutum*, *molle*, *angustifolium*, *Calla palustris*, *Comarum*, *Mentha viridis* am Stober, *Pedicularis sylvatica*, *Scrophularia aquatica*, *Cytisus nigricans* am Wege nach Karlsruhe, *Sparganium simplex*, *ramosum*, *Typha latifolia*, *Carex ampullacea*, *Salix repens*, *Lycopodium annotinum* um Jeroltzuschütz.

Um Rosenberg **) wurden als seltene Pflanzen, und zwar für unser Gebiet daselbst zuerst beobachtet *Senecio vernalis* und *Scabiosa suaveolens*. Als ein besonders merkwürdiger Punkt ist der Wiesenschlund bei Wachowitz zu bezeichnen, wo *Thalictrum aquilegifolium* und *Streptopus* wachsen. Ausserdem sind auch hier die Mehrzahl der Ericineae zu finden.

Die Umgebungen von Oppeln selbst bieten auf einem ziemlich mannigfaltigen Boden eine reiche und höchst interessante Vegetation dar.

*) nach Mittheilungen von Beilschmied.

**) nach Mittheilungen von Fuchs.

Die merkwürdigsten Punkte in den nächsten Umgebungen der Stadt sind: der Moritzberg, ein Kalkhügel mit *Campanula sibirica*, *Pyrethrum corymbosum*, *Anagallis arvensis coerulea*, *Adonis aestivalis*, *Vaccaria pyramidata*, *Bupleurum rotundifolium*, *Chamaepitys vulgaris*, *Alopecurus agrestis*; die Pascheken und Bolko, wo *Armoracia austriaca*, *Salix daphnoides* als ansehnlicher Baum, *Galeobdolon*, *Asarum*, *Adoxa*, *Corydalis cava*, *Cardamine Impatiens*, *Barbarea stricta*, *Hypericum hirsutum*, *Anemone ranunculoides* und die übrigen in deren Gesellschaft vorkommenden gemeineren Wald- und Gehölz-Pflanzen. An und in dem umfangreichen Kallichteiche finden sich *Potamogeton gramineus*, *pectinatus*, *pusillus* und die gemeineren Arten, *Alisma Plantago graminifol.*, *Carex cyperoides*, *Juncus alpinus*, *Lindernia*, *Cardamine parviflora*. Auf den Hügeln bei Winow *Viola uliginosa*, *Melittis*, *Cephalanthera ensifolia*, *Trifolium ochroleucum*, *rubens* und *alpestre*, *Polygonatum anceps*, *Limnochloe pauciflora*, *Carex Buxbaumii* und *montana*, *Hypochoeris maculata*, *Hypericum montanum*, so wie *Cytisus capitatus* mit dessen verschiedenen Variationen. Ausserdem finden sich in den näheren Umgebungen zerstreut *Dipsacus laciniatus*, *Orobanche Galii?* *Alopecurus agrestis*, *Vaccaria pyramidata*, *Fumaria Vallantii*, *Polygala amara*, *Conringia perfoliata*, *Thlaspi perfoliatum*, *Cytisus biflorus*, *Ononis spinosa*, *Poterium Sanguisorba*, *Illecebrum verticillatum*, *Caucalis daucoides*, *Arnica montana*, *Senecio vernalis*, *Cirsium tataricum*, *Hypochoeris glabra*, *Cynoglossum off.*, *Pulmonaria angustifol.*, *Datura*, *Scrophularia Scopoli*, *Linaria arvensis*, *Veronica Teucrium*, *Lathraea*, *Pedicularis palustris*, *Stachys germanica*, *Lysimachia thyrsoflora*, *Chenopodium opulifolium*, *Daphne*, *Thesium ebracteatum*, *Spiranthes autumnalis*, *Carex paradoxa*. In den Kieferwäldern nach Malapane, Proskau u. s. w. an verschiedenen Stellen *Anemone vernalis* mit *Viola arenaria* von grosser Verbreitung, seltner *Anemone patens*, *pratensis* und *Dianthus caesius*. Ausgezeichnet durch ihre Vegetation sind die Sümpfe bei Königshuld und Trezenczin, wo ausser den gewöhnlichen Haidemoorgewächsen als *Andromeda*, *Vaccinium uliginosum*, *Arctostaphylus* u. a. auch *Salix myrtilloides* und *myrtilloidi-aurita*, *Scheuchzeria*, *Drosera anglica*, *Carex limosa*, *Dianthus caesius*, *Stellaria Friesiana*, *Illecebrum verticillatum*, *Scabiosa suaveolens*, *Arica montana*, *Utricularia intermedia*, *Sparganium natans*, *Juncus fusco-ater*, *Avena prae-cox*, *Festuca Pseudo-myurus*, *filiformis*, *paradoxa*, *paniculata* und *stricta*, *Eriophorum gracile* gefunden werden; eine Uebereinstimmung mit der Vegetation des grossen Sees auf der Heuscheuer, auf welche wir hinzudeuten nicht unterlassen wollen. Bei weitem die wichtigste Gegend aber sind die Umgebungen von Grosstein, wo auf einem kleinen Raume eine

Menge merkwürdiger und seltner Arten vereinigt sind. Hier wachsen: *Asperula cynanchica*, *tinctoria*, *Orobanche rubens*, *Adonis aestivalis cetrina*, *Sagina subulata*, *Chamaepitys vulgaris*, *Teucrium Botrys*, *Campanula sibirica*, *Laserpitium latifolium*, *Allium fallax*, *Aster Amellus*, *Alsine tenuifolia*, *Potentilla inclinata*, *Barkhausia setosa*, *Anemone sylvestris*, *Thalictrum minus* und *sylvaticum*, *Aquilegia vulgaris*, *Reseda lutea*, *Dentaria bulbifera*, *Sorbus torminalis*, *Potentilla alba*, *Anthyllis vulneraria*, *Avena pratensis*.

Um Krappiz wurden *Reseda Luteola*, *Asperugo procumbens* und das in diesen Gegenden seltene *Melampyrum cristatum*, bei Gr. Dübern *Lithospermum Pyxidaria* und *Cardamine parviflora* und um Kl. Schimniz *Teucrium Botrys* und *Mascari comosum* beobachtet.

Der Annaberg besitzt *Cardamine Impatiens*, *Dentaria bulbifera* und *concephylla*, *Potentilla recta*, *Euonymus verrucosus*, *Lonicera Xylosteum*, *Atropa Belladonna*, *Gentiana ciliata*, *Cephalanthera ensifolia*, *Viola* *albans* und *rubra*, *Veronica montana*, *Vinca minor*, *Sambucus Ebulus*.

Außerdem sind aus den Umgebungen von Leschnitz bei Cosel anzugeben*): *Circaea lutetiana* und *alpina*, *Utricularia vulgaris*, *Veronica filifolia*, *Iris sibirica*, *Gladiolus imbricatus*, *Polycnemum arvense*, *Cyperus alpinus* (Rokitsch), *Scirpus radicans* (Wilmirschowitz), *Blysmus compressus*, *Festuca aspera* (Wyssoka Hora), *Asperula cynanchica* (Zyrowa), *Galium vernum*, *Primula elatior*, *Lysimachia thyrsoiflora* (Wilmirschowitz), *Erythraea ramosissima*, *Ribes nigrum*, *Herniaria hirsuta*, (Zyrowa und Raschowa), *Gentiana cruciata* (Zyrowa), *ciliata* (Bischin), *Cuscuta Epilinum*, *Caucalis daucoides* (Zyrowa und Czarnosin), *Galanthus nivalis* (Wilmirschowitz), *Lilium Martagon* (Wyssoka Hora), *Anthericum ramosum*, *Allium ursinum* (Grabine), *Juncus capitatus* (Crassowa), *fusco-ater ebenda*, *Colchicum autumnale*, *Veratrum Lobelianum* (Januschowitz), *Ledum palustre*, *Silene gallica*, *Spergula subulata* (Rokitsch, Olshowa), *Sempervivum soboliferum*, *Spiraea Aruncus*, *Potentilla norvegica*, *Nigella*, *Trollius*, *Stachys germanica* und *recta*, *Chaeturus Marrub.*, *Digitalis grandiflora*, *Arabis Gerardi*, *Geranium phaeum* (in Obstgärten), *pratense* und *columbinum*, *Malva borealis*, *Cytisus biflorus*, *Vicia sylvatica* und *tenuifolia*, *Hypericum montanum* (Biesohin), *Carlina acaulis*, *Petasites officinalis*, *Gnaphalium luteo-album*, *Senecio barbaraeifolius* (Lenkau), *Cineraria crispa* und *palustris*, *Goodyera repens* (Wyssoka Hora), *Euphorbia dulcis*, *Carex dioeca*, *Davalliana*, *disticha*, *Pseudo-Cyperus u. ampullacea*, *Stratiotes aloides*. Aus der Gegend von Tost, Peiskret-

* Nach handschriftl. Mittheilungen von Hertzsch.

schem, Ujest, Gleiwiz, Tarnowiz und Gr. Strehliz führen wir als weniger gemeine und seltene Arten an*): um Tost, zumal an dem Schlossberge *Salvia verticillata*, *Valeriana sambucifolia* und *dioeca*, *Potamogeton rufescens* und *obtusifolius*, *Herniaria hirsuta*, *Conium*, *Veratrum*, *Sagina subulata*, *Potentilla recta*, *Comarum*, *Stachys germanica*, *Corydalis Halleri*, *Vicia tenuifolia*, *Petasites officinalis*, *Cineraria crispa*, *Echinops sphaerocephalus* (wahrscheinlich nur verwildert); um Dombrowka: *Circaea alpina*, *Polygonatum anceps*, *Lilium Martagon*, *Anthericum ramosum*, *Ledum*, *Chimophila*, *Andromeda*, *Rubus saxatilis*, *Aquilegia*, *Salix pentandra*, *Taxus baccata*, *Polypodium Dryopteris*; um Genta *Polygonum arvense*, *Arenaria tenuifolia*, *Cyperus flavescens*, *Lysimachia thyrsoflora*, *Sagina subulata*, *Cineraria palustris*; um Potempa *Rhynchospora alba*, *Cuscuta Epilinum*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Juncus capitatus*, *Lycopodium inundatum*; um Czarkow *Heleocharis ovata*, *Juncus fuscoater* und *supinus*, *Oxycoccus*, *Ledum*, *Andromeda*, *Arctostaphylus* off., *Genista pilosa*; um Oratsche *Limnochloe pauciflora*, *Carex dioeca Davalliana disticha* und *teretiuscula*, *Ceratophyllum submersum*; um Boguschütz *Eriophorum gracile*, *Trapa natans*, *Sambucus Ebulus*, *Thalictrum angustifolium*, *Salvinia natans*; um Kottlischowiz: *Bromus arvensis*, *Sagina apetala*, *Caucalis daucoides*, *Adonis aestivalis*, *Fumaria Vaillantii*, *Ononis spinosa*, *Tragopogon orientale*, *Sonchus arvensis* var. *calyc. glabris*; um Peiskretscham *Hippuris*, *Sambucus Ebulus*, *Juncus capitatus*, *Aquilegia*, *Senecio vernalis*, *Equisetum Telmateja* (bei Kemezowiz), *Sagina subulata*, *Digitalis grandiflora*, *Cephalanthera rubra* (sämtlich am und im Labander Walde); um Ujest: *Avena prae-cox*, *Asperula Aparine*, *Galium vernum*, *Anagallis coerulea*, *Chaeturus Marrubiastrum*, *Barbarea stricta*, *Senecio vernalis* (am Wege nach Slavencziz auf Kleeäckern), *Botrychium Lunaria*; um Tarnowiz *Veronica latifolia*, *Ornithogalum umbellatum*, *Stachys recta*, *Melittis* und *Cephalanthera rubra* im Saubusche, *Arabis hirsuta*, *Senecio vernalis*; um Gr. Strehliz: *Scabiosa suaveolens*, *Sempervivum soboliferum*, *Nigella*, *Anemone vernalis*, *Genista pilosa*, *Arabis hirsuta*, *Cytisus biflorus*.

Folgende Pflanzenarten lassen sich als die der ersten oder Ebenen-Region ausschliesslich angehörigen und für dieselbe charakteristischen betrachten:

Ranunculeae. *Anemone patens*. *Adonis aestivalis*. *Nigella arvensis*.

Cruciferae. *Barbarea stricta*. *Nasturtium palustre*. *Cardamine*

*) Nach handschriftl. Mittheilungen v. Hertsch.

- parviflora. *Sisymbrium Sophia*. *Armoracia austriaca*. **Lepidium**
 ruderae. *Coronopus Ruellii*.
- Violeae.** *Viola arenaria*, *Ruppil*, *elatior*.
- Elatineae.** *Elatine Alsinastrum*, *Hydropiper*.
- Malvaceae.** *Malva borealis*. *Lavatera thuringiaca*.
- Lineae.** *Radiola Millegrana*.
- Geraniaceae.** *Geranium divaricatum*.
- Sileneae.** *Silene chlorantha*. *Cucubalus baccifer*.
- Alsineae.** *Arenaria tenuifolia*. *Stellaria viscida*.
- Paronychieae.** *Corrigiola litoralis*. *Illecebrum verticillatum*. **Po-**
 lycarpum tetraphyllum.
- Amarantaceae.** *Amarantus Blitum*, *retroflexus*.
- Chenopodeae.** *Polycnemum arvense*. *Chenopodium urbicum*, **opa-**
 lifolium, *Vulvaria*. *Artiplex album*.
- Umbelliferae.** *Eryngium planum*. *Cicuta virosa*. *Berula angusti-*
 folia. *Oenanthe fistulosa*.
- Halorrhageae.** *Trapa natans*. *Myriophyllum spicatum*, **verticil-**
 latum.
- Dryadeae.** *Potentilla supina*, *norvegica*, *Anserina*, *inclinata*, **Gün-**
 theri, *cinerea*.
- Papilionaceae.** *Ononis hircina*, *Melilotus dentata*. *Trifolium stria-*
 tum, *fragiferum*. *Tetragonolobus siliquosus*. *Astragalus Cicer*,
Hypoglottis arenarius. *Ornithopus perpusillus*. *Vicia lathyroides*.
Lathyrus tuberosus, *palustris*.
- Euphorbiaceae.** *Euphorbia palustris*, *lucida*, *exigua*. *Mercurialis*
annua.
- Rubiaceae.** *Asperula Aparine*.
- Dipsaceae.** *Dipsacus sylvestris*, *laciniatus*, *pilosus*. *Scabiosa ca-*
nescens.
- Compositae.** *Arnoseris pusilla*. *Hypochoeris glabra*. *Aster salig-*
nus. *Bidens cernua*. *Pulicaria vulgaris*. *Gnaphalium luteo-album*.
Artemisia campestris. *Senecio vernalis*, *erucifolius*, *barbaraeifo-*
lius, *saracenicus*. *Cirsium acaule*. *Onopordon Acanthium*.
- Ambrosiaceae.** *Xanthium strumarium*.
- Ericaceae.** *Erica Tetralix*.
- Campanulaceae.** *Cuscuta monogyna*.
- Boragineae.** *Cerinthe minor*. *Cynoglossum officinale*. *Asperugo*
procumbens.
- Scrofularinae.** *Veronica longifolia*, *agrestis*. *Antirrhium Oron-*

- tum. *Linaria Elatine, spuria*. *Lindernia Pyxidaria*. *Gratiola officinalis*. *Verbascum Blattaria*.
Labiatae. *Stachys germanica, annua*. *Marrubium vulgare*. *Chaeturus Marrubiastrum*. *Scutellaria hastifolia*. *Chamaepitys vulgaris*. *Teucrium Scördium*.
Primulaceae. *Centunculus minimus*. *Lysimachia thyrsoiflora*. *Androsace septentrionalis*. *Glaux maritima*.
Plantagineae. *Plantago maritima, arenaria*.
Polygonaceae. *Rumex maritimus, Hydrolapathum*.
Salicinæae. *Salix hippophailfolia, daphnoides, viminalis, acuminata*.
Nymphaeaceae. *Nymphaea alba*. *Nuphar luteum*.
Najadeae. *Caulinia fragilis*.
Potameae. *Potamogeton gramineus, lucens, crispus, obtusifolius, pusillus*.
Hydrocharideae. *Stratiotes aloides*. *Sagittaria*.
Butomeae. *Butomus umbellatus*.
Juncagineae. *Triglochin maritimum*.
Typheae. *Typha latifolia, angustifolia*.
Orchideae. *Orchis laxiflora*.
Irideae. *Iris Pseud-Acorus*.
Liliaceae. *Gagea arvensis*.
Juncea. *Juncus capitatus*.
Cyperaceae. *Cyperus fuscus*. *Dichostylis Micheliana*. *Scirpus radicans*. *Carex arenaria, fulva, distans, Pseudo-Cyperus*.
Gramineae. *Phleum Boehmeri*. *Leersia*. *Corynephorus*. *Avena praecox*. *Glyceria distans, Bromus arvensis, inermis*. *Agropyrum caninum*. *Digitaria sanguinalis, filiformis*. *Echinochloa Crus Galli*.
Setaria verticillata.

Es giebt in der Schlesischen Flora eine kleine Anzahl von Pflanzenarten, welche dieses Gebiet mit den östlich und südöstlich gelegenen, namentlich mit den Karpathenländern gemein hat, und welche weiter nach Westen nicht vorkommen, die also hier ihre westliche und nordwestliche Gränze erreichen. Diese sind: *Ranunculus cassubicus* — denn alles, was wir aus dem westlichen Deutschland unter diesem Namen gesehen, war eine Form von *R. auricomus*; — *Anemone patens*, welche zwar südlicher auch noch weiter gegen Westen, z. B. in Böhmen und um München vorkommt, aber nördlich kaum weiter im Westen gefunden wird, und auch bei uns kaum die Oder zu überschreiten scheint;

Dentaria glandulosa nur bis in den äussersten südöstlichen Saum unseres Gebiets; *Conioselinum Fischeri*, welches im Gesenke seine südwestliche Gränze zu haben scheint; *Hacquetia Epipactis* nur im südöstlichen Theile; *Laserpitium Archangelica*; *Galega officinalis*; *Euphorbia lucida* und *Euphorbia pilosa*; *Asperula rivalis*; *Senecio vernalis*, welcher sich durch eingewanderten Samen angesiedelt und verbreitet hat, der entweder durch anhaltende Ostwinde im Herbst herübergeführt oder mit Klee- saamen aus den östlichen Ländern eingeführt worden sein mag; *Pedicularis sudetica*, welche wahrscheinlich auch in den Karpathen vorkommt. — Ausser diesen giebt es eine Anzahl von Arten, welche zwar im westlichen Deutschland nicht fehlen, aber doch um vieles seltner werden und darin nur noch sporadisch erscheinen, über deren Verbreitungsverhältniss erst nach genauerer Beobachtung wird berichtet werden können.

Unter den sämmtlichen in Schlesien einheimischen Arten, mit Ausschluss der verwilderten und zweifelhaften, sind 35 baumartige, nämlich 3 *Acera*, 2 *Tiliae*, 2 *Pyri*, 3 *Sorbi*, 1 *Fraxinus*, 2 *Ulmi*, 1 *Carpinus*, 2 *Quercus*, 1 *Fagus*, 2 *Betulae*, 2 *Alni*, 4 *Salices*, 3 *Populi*, 2 *Pini*, 3 *Abietes*, 1 *Taxus*; 71 strauchartige, und zwar 51 höhere nämlich 18 *Salices*, 10 *Rubi*, 5 *Rosae*, 4 *Ribes*, 3 *Sambuci*, 3 *Lonicerae*, 2 *Rhamni*, 2 *Evoynymi*, 2 *Juniperi* und je 1 *Hedera*, *Cornus*, *Myricaria*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Staphylaea*, *Viburnum*, *Daphne*, *Corylus*, *Betula*, und 20 niedere, nämlich 4 *Vaccinia*, 3 *Cytisi*, 3 *Genistae*, je ein *Helianthemum*, *Empetrum*, *Viscum*, *Arctostaphylus*, *Andromeda*, *Calluna*, *Erica*, *Ledum*, *Vinca*, *Sarothamnus*; 79 zweijährige und davon 21 *Compositae*, 5 *Boragineae* und 8 *Scrofularinae*; 262 einjährige, darunter 11 *Ranunculaceae*, 25 *Cruciferae*, 25 *Compositae*, 14 *Boragineae*, 24 *Scrofularinae*, 10 *Labiatae*, 5 *Cyperaceae* und 22 *Gramineae*; endlich 27 Zwiebelgewächse. Demnach beträgt die Zahl der übrigen ausdauernden Gewächse ungefähr 814.

Vergleicht man die Schlesische Flora mit denen der angränzenden Länder, namentlich Mährens, Böhmens, der Lausitz und der Mark, von denen wir genaue Darstellungen besitzen, so zeigt sich im Allgemeinen, dass die beiden erstgenannten Länder eine Anzahl von Pflanzenarten, die Schlesien fehlen, aus denjenigen Familien besitzen, welche überhaupt gegen den Süden Europa's hin an Artenzahl zunehmen und zum Theil dort ihre eigentliche Heimath haben, nämlich der *Umbelliferae*, *Caryophyllaceae*, *Compositae*, *Cruciferae*, *Papilionaceae*, *Orchideae*, *Labiatae*; die beiden letzteren hingegen fast nur aus der Familie der *Cyperaceae* und

im allgemeinen aus der Zahl der den feuchten Moor- und Haidegegenden angehörigen Pflanzen einige Arten besitzen, welche bisher im Gebiete der Schlesischen Flora noch nicht gefunden worden sind. Obwohl es uns nicht entgeht, dass eine erspriessliche Vergleichung die Ausschliessung derjenigen Arten, welche nur vereinzelt vorkommen, und die Berücksichtigung der Häufigkeit und Menge der Individuen erfordert, so halten wir es doch nicht für unangemessen, einstweilen eine vergleichende Uebersicht derjenigen Arten der genannten Länder, welche in Schlesien nicht vorkommen, vorzulegen. Doch darf nicht unbemerkt bleiben, dass höchst wahrscheinlich mehrere derselben künftig noch im Gebiete der Schlesischen Flora werden aufgefunden werden.

In Schlesien fehlende Pflanzen-Arten, welche gefunden werden in

	Mähren ¹⁾ :	Böhmen ²⁾ :	der Lausitz ³⁾ :	der Mark ⁴⁾ :
Ranunculaceae.	Clematis Vitalba, recta. Adonis vernalis.	Clematis Vitalba, recta. Adonis vernalis. Thalictrum foetidum, galioides. Ceratophalus orthoceras.	Ranunculus hederaceus.	Adonis vernalis. Helleborus foetidus.
Nymphaeaceae. Papaaveraceae. Cruciferae.	Glancium latum, corniculatum Rapistrum perenne. Crambetalaria. Alyssum saxatile, alpestre. Draba muralis, aizoides. Kernera saxatilis. Arabis Turrita. Hesperis tristis, matronalis. Sisymbrium matronalis. stricis-lumnae, austriacum, sinuum, pannonicum, Loeselii. Erysimum virgatum, odoratum, canescens, austriacum. Diplotaxis tenuifolia, muralis.	Glancium corniculatum. Rapistrum perenne. Alyssum saxatile. Thlaspi alpestre, montanum. Arabis brassicaeformis, auribus Turrita. Hesperis matronalis. Loeseli, Columnae, stricis-lumnae, austriacum, sinuum. Erysimum virgatum, odoratum, crepidifolium, Diplotaxis tenuifolia muralis. Hesperis matronalis.	Helianthemum guttatum.	Barbarea praecox. Sisymbrium pannonicum.
Cistaceae. Polygalaceae, Sileneae. et Asteraceae.	Polygala maior. Gypsophila paniculata, Dianthus plumarius. Silene nemoralis. Arenaria grandiflora, muralis. Alsine setacea, fasciculata.	Polygala Chamæbuxus. Tunica Saxifraga. Dianthus Segaueri. Silene viscosa, nemoralis. Alsine setacea.		Stellaria crassifolia. Alsine Stellaria crassifolia. Silene tatarica.

1) Nach Bohrer und Mayer Verzeichniss etc. 2) Nach Koch Synopsis. 3) Nach Babenhorst Fl. Lausit. 4) Nach Schlechtendal Fl. Borelin, und Beck Index pl. quae circa Francofurtum ad Viadr. etc.

	Mähren:	Böhmen:	der Lausitz:	der Mark:
<i>Lineae.</i>	<i>Linum austriacum, tenuifolium, flavum.</i>	<i>Linum austriacum, flavum.</i>		
<i>Moluccae.</i>			<i>Althaea officinalis.</i>	<i>Althaea officinalis.</i>
<i>Hypericinae.</i>	<i>Hypericum pulchrum, kollidatum.</i>		<i>Hypericum pulchrum.</i>	
<i>Papilionaceae.</i>	<i>Genista procumbens. Cytisus elongatus, austriacus. Orobus albus. Lathyrus incurvus. Viola pannonica. Medicago prostrata. Astragalus austriacus, excapus, Onobrychia. Doryenium herbaeum. Trigonella Foeniculum graecum.</i>	<i>Cytisus austriacus, hirsutus. Trigonella montpellica. Oxytropis pilosa. Astragalus austriacus, excapus. Coronilla vaginalis. Orobus albus.</i>	<i>Genista anglica. Ulex euro-paeus.</i>	<i>Oxytropis pilosa.</i>
<i>Rosaceae.</i>	<i>Rosa pimpinellifolia.</i>			
<i>Pomaceae.</i>	<i>Prunus Chamacerasus, Mahaleb.</i>	<i>Prunus Chamacerasus.</i>		
<i>Onagrarinae.</i>			<i>Isnardia palustris.</i>	
<i>Ligulariae.</i>	<i>Lycium virgatum.</i>	<i>Lycium virgatum.</i>		
<i>Paronychiae.</i>	<i>Lepigonum marianum.</i>	<i>Baliarda aquatica.</i>		
<i>Crasulatae.</i>				
<i>Saxifragae.</i>	<i>Saxifraga bulbifera.</i>			
<i>Umbelliferae.</i>	<i>Orlaya grandiflora. Tordylium maximum. Penedanum alsaticum. Seseli glaucum, Hippomarathrum. Oenanthe pimpinelloides. Trinia Hofmanni. Scandix Pecten. Asrantha minor.</i>	<i>Baplerum tenuissimum. Aethusa cynapioides. Seseli glaucum, Hippomarathrum. Penedanum alsaticum, austriacum. Anthriscus trichosperma.</i>	<i>Helosciadium repens.</i>	<i>Helosciadium repens, Tordylium maximum. Scandix Pecten.</i>

Rubiaceae.

Valerianaceae.

Compositae.

Möhren:	Böhmern:	der Lausitz:	der Mark:
<p><i>Asperula galioides.</i> Galium <i>Asperula galioides.</i> tricornae. <i>Valeriana montana, saxatilis.</i></p>	<p><i>Tetelia speciosa.</i> Buphtel- themum. <i>Carduus defloratus,</i> mum salicifolium. <i>Inula ger- denses.</i> <i>Serratula mollis.</i> <i>Echi- mantha.</i> <i>Pulicaria dysenterica.</i> <i>Senecio paludosus.</i> <i>Thrinacia hirta.</i> <i>Podopus.</i> <i>Thrinacia hirta.</i></p>	<p><i>Valerianella coronata, carinata.</i> <i>Valerianella dasycarpa.</i> <i>Senecio annua.</i> <i>Pulicaria</i> <i>Senecio paludosus.</i> <i>Thrinacia hirta.</i> <i>Podopus.</i> <i>Thrinacia hirta.</i></p>	<p>Galium tricornae.</p>
<p><i>Christum tuberosum,</i> polyan- themum. <i>Carduus defloratus,</i> mum salicifolium. <i>Inula ger- denses.</i> <i>Serratula mollis.</i> <i>Echi- mantha.</i> <i>Pulicaria dysenterica.</i> <i>Senecio paludosus.</i> <i>Thrinacia hirta.</i> <i>Podopus.</i> <i>Thrinacia hirta.</i></p>	<p><i>Chr., ensifolia.</i> <i>Aster Tripo-</i> litarum. <i>Lagularia sibirica.</i> <i>Calendula</i> <i>officinalis.</i> <i>Cineraria cam-</i> <i>panica.</i> <i>Senecio Doris.</i> <i>An-</i> <i>themis austriaca.</i> <i>Achillea</i> <i>Xeranthemum annuum.</i> <i>Thrin-</i> <i>acium.</i> <i>Raphanus foetidus.</i> <i>Senecio paludosus.</i> <i>Phoenicopus</i> <i>paludosus.</i> <i>Lactuca scariola,</i> <i>perennis.</i></p>	<p><i>Erica carnea.</i> <i>Gentiana pannonica.</i> <i>Chora</i> <i>perfoliata.</i></p>	<p><i>Solanum villosum.</i></p>
<p><i>Heliotropium europaeum.</i> <i>Lis-</i> <i>thospermum purpureo-coerule-</i> <i>um.</i> <i>Cynoglossum monta-</i> <i>num.</i> <i>Onosma echioides, arc-</i> <i>marium.</i> <i>Echium rubrum,</i></p>	<p><i>Erica carnea.</i> <i>Gentiana pannonica.</i> <i>Chora</i> <i>perfoliata.</i></p>	<p><i>Erythraea linariifolia,</i></p>	<p><i>Solanum villosum.</i></p>

	Mähren:	Böhmen:	der Lausitz:	der Mark:
Solanaceae. <i>Sesofoliarineae.</i>	Physalis Alkekengi. Veronica prostrata, praecox. Verbascum floccosum. Euphrasia lutea. Digitalis lanata. Linaria genistifolia.	Verbascum orientale. Linaria genistifolia. Veronica an-siriaca, praecox.	Solanum villosum. Veronica prostrata, praecox.	Solanum villosum, Orobanche elatior.
Labiatae.	Tenacium montanum. Glechoma hirsuta. Marrubium peregrinum. Sideritis montana. Salvia sylvestris.	Salvia sylvestris. Thymus pannonicus. Dracocephalum austriacum.	Samolus Valerandi.	Tenacium Scordonia.
Primulaceae.	Cyclamen europaeum.	Lysimachia punctata. Androsace elongata. Cyclamen europaeum.	Samolus Valerandi.	Samolus Valerandi.
Plantaginaceae. <i>Amarantaceae.</i> <i>Chenopodiaceae.</i>	Chenopodium maritimum. Atriplex laciniatum, oblongifolium. Salicornia herbacea. Salsola Kali. Kochia scoparia, arenaria, prostrata.	Amarantus sylvestris. Salsola Kali Kochia scoparia. Atriplex laciniatum.	Litorea lacustris. Atriplex hastatum.	Litorea lacustris. Salsola Kali. Atriplex hastatum.
Thymelaeae. <i>Euphorbiaceae.</i>	Daphne Cneorum. Euphorbia falcata, angulata, epithymoides, Gerardiana, virgata.	Euphorbia virgata, falcata.		
Cupuliferae. <i>Berulaceae.</i> <i>Myricaceae.</i> <i>Alismaceae.</i>	Quercus pubescens.	Quercus pubescens.	Myrica Gale.	Betula fruticosa. Alisma peransifolium, natans.

	Mähren:	Böhmen:	der Lausitz:	der Mark:
<i>Poloneae.</i>				
<i>Notidae.</i>			<i>Potamogeton densus.</i>	<i>Potamogeton praelongus.</i>
<i>Orchideae.</i>	<i>Oschis fusca.</i> <i>Gymnadenis odoratissima.</i> <i>Himantoglossum hircinum.</i> <i>Epipactis microphylla.</i>		<i>Najas maior.</i> <i>Malaxis paludosa.</i>	<i>Najas maior.</i> <i>Malaxis paludosa.</i>
<i>Iridae.</i>	<i>Iris germanica,</i> variegata, pallida.			<i>Iris germanica.</i>
<i>Amaryllidaceae.</i>		<i>Leucojum aestivum.</i>		
<i>Liliaceae.</i>	<i>Omithogalum pyrenaicum.</i> <i>Allium rotundum,</i> flavum.	<i>Fritillaria Melegris.</i> <i>Lilium bulbiferum.</i> <i>Allium strictum,</i> rotundum.	<i>Gagea spalhacea.</i> <i>Anthericum Liliago.</i>	<i>Anthericum Liliago.</i>
<i>Cyperaceae.</i>	<i>Schoenus ferrugineus.</i> <i>Carex stenophylla,</i> supina, extensa. <i>Michellii,</i> hordeiformis, divulsa.	<i>Carex stenophylla,</i> supina. <i>Michellii.</i>	<i>Cladium Mariscus.</i> <i>Isolepis Cladium Mariscus.</i> <i>Isolepis supina.</i> <i>Schoenus nigricans.</i> <i>Carex supina.</i>	<i>Isolepis Cladium Mariscus.</i> <i>Isolepis supina.</i> <i>Schoenus nigricans.</i> <i>Blysmus rufus.</i> <i>Carex supina.</i>
<i>Gramineae.</i>	<i>Digitaria ciliaris.</i> <i>Gynodon Dactylon.</i> <i>Cyperis aculeata.</i> <i>alopecuroides.</i> <i>Stipa pennata,</i> capillata. <i>Hierochloa australis.</i> <i>Sclerochloa dura.</i> <i>Sealaha coerules.</i> <i>Triticum glaucum.</i> <i>Tragus racemosus.</i>	<i>Digitaria ciliaris.</i> <i>Coleanthus subhilla.</i> <i>Festuca Dymetala.</i> <i>Triticum rigidum,</i> glaucum.	<i>Digitaria ciliaris.</i> <i>Calama-grostis stricta.</i> <i>Ammophila a vundinacea.</i> <i>Arundo Donax.</i>	<i>Gynodon Dactylon.</i> <i>Calama-grostis stricta.</i> <i>Ammophila arenaria.</i> <i>Stipa pennata,</i> capillata. <i>Festuca borealis.</i> <i>Digitaria ciliaris.</i>

In der folgenden Tabelle weiset die erste Kolumne den Namen der Familie nach, die zweite die Anzahl der Arten im Gebiete unserer Flora (mit Ausschluss der zweifelhaften), die dritte die Anzahl der Arten in der dritten Region, und zwar in der Abtheilung links die Anzahl der überhaupt darin vorkommenden Arten, in der Abtheilung rechts die Anzahl derjenigen Arten, welche nur ausschliesslich hier vorkommen; die vierte dasselbe für die zweite und die fünfte für die erste Region; die sechste die Zahl der Arten, welche in der ersten und zweiten, die siebente, welche in der zweiten und dritten, die achte, welche in der ersten, zweiten und dritten Region zugleich vorkommen; die neunte giebt an den wievielten Theil der gesammten Arten- (Phanerogamen-, ohne Farn) Anzahl des Gebiets die Arten jeder Familie ausmachen, und die zehnte giebt dieselbe Verhältnisszahl in der Form eines Decimalbruches; die eilfte endlich giebt die Anzahl der Arten an, welche in der Umgegend von Breslau bei einem Radius von ungefähr vier Meilen vorkommen.

	Arten in Schlesien.	überhaupt in 3 ausschliess- lich in	überhaupt in 2 ausschliess- lich in	überhaupt in 1 ausschliess- lich in	in 1 und 2.	in 2 und 3.	in 1, 2 und 3.	Verhältn. zur Gesamtzahl.	Theil der Gesamtzahl	im Gebiet von Breslau.
Berberideae	1			1				1300		1
Paoniaceae	1			23	1		3	1300	0,037	33
Ranunculaceae	48	11	5	12	12	3	3	27		1
Rosaceae	2			3	3			650		3
Polygalae	4			2	2			433		4
Fumariaceae	6			3	3			216		4
Papaveraceae	4			5	2			325		4
Cruciferae	4	9	4	40	11	1	4	26	0,034	36
Cistineae	50		4	1	11	1	1	1300		13
Violariae	1			8	1	1	1	81	0,012	1
Droseraceae	16	3	1	14	6			325		2
Rutaceae	4	1		3				1300		1
Acerinae	4			1	1			433		1
Balsamineae	1			1	1			1300		1
Elatineae	3			1	1			433		1
Hypericinae	1			3	6			216		6
Tiliaceae.	6			2	2			650		2
Malvaceae	2			2	2			260		2
Oxalideae	5			5	1			650		5
Lincae	2			2	1			650		2
Geraniaceae	2	1		2	1	1	3	100	0,01	11
Sileneae	13	3		12	2			100		11
Alsineae	23	5	2	23	6	1	2	56	0,018	20
Paronychiaceae	25			22	9			52	0,019	21
	8			8	1			162	0,006	5

	Arten in Schlesien.	überhaupt in 3 ausschliess- lich in	überhaupt in 2 ausschliess- lich in	überhaupt in 1 ausschliess- lich in	in 1 und 2.	in 2 und 3.	in 1, 2 und 3.	Verhältn. zur Gesamtzahl.	Theil der Gesamtzahl.	im Gebiet von Breslau.
Portulacaceae	2		1		1			650		1
Scleranthaceae	2							650		2
Amarantaceae	2							650		2
Chenopodiaceae	16				2			81	0,012	16
Crassulaceae	12	4	2	16	3			108	0,09	6
Saxifragaceae	11	5	3	8	2			118	0,08	3
Umbelliferae	51	10	7	38	8	1	2	25	0,039	31
Adoxeae	1			1				1300		1
Araliaceae	2			1	1			650		2
Halorrhagaceae	5			2	2			260		5
Lythriatae	3			5	1			260		3
Onagrariae	3			3	1			433		3
Tamariscinaeae	15	5	3	11	3	2		87	0,011	10
Pomaceae	1			6				162		4
Rosaceae	7	2	1	5	2	1		260		4
Dryadeae	5	1	1	4	3	1		35	0,028	24
Sanguisorbeae	37	4	4	29	16		1	260		3
Spiraeaceae	5	2	2	3			1	325		2
Amygdaleae	4			2				433		3
Papilionaceae	3			3				19	0,051	58
Rhamnaceae	67	1	1	26	23			650		2
Empetreae	2	1		1	1			1300		
Euphorbiaceae	1			1				93	0,010	12
Gelastreae	14			4				650		2

	Arten in Schlesien.	überhanpt in 3 ausschliess- lich in	überhaupt in 2 ausschliess- lich in	überhaupt in 1 ausschliess- lich in	in 1 und 2.	in 2 und 3.	in 1, 2 und 3.	Verhältn. zur Gesamttzahl.	Theil der Gesamttzahl.	im Gebiet von Breslau.
Staphyleaceae	1		1		1			1300		1
Loranthaceae	1							1300		1
Grossulariaceae	4	2	1	1	1	1		325		2
Cucurbitaceae	1		1		2			1300		1
Viburnaceae	4	2		1	1	1		325	0,014	3
Caprifoliaceae	4		1		1			325		2
Rubiaceae	18	1		2	10	1		72	0,014	13
Valerianaceae	7	1		15	4	1		186	0,006	6
Dipsacaceae	8	1		7	6	2		162	0,006	6
Compositae	141	28	13	108	69	31	9	9	0,106	104
Ambrosiaceae	1			13	1	6	2	1300		1
Campanulaceae	16	4	1	13	1	1	2	81	0,012	11
Ericaceae	17	6	1	16	5	8	6	76	0,013	12
Oleaceae	1			1	2			1300		1
Asclepiadaceae	1		1	1	1			1300		1
Apoecyaneae	1			1	3			1300	0,010	5
Gentianeae	14	4	4	5	3	2	2	93	0,010	6
Convolvulaceae	6			6	3	3	2	216		6
Borragineae	24	2		23	18	3	2	54	0,018	21
Solanaceae	5			1	4			260		4
Scrofulariaceae	66	8	5	57	34	20	4	20	0,05	51
Labiatae	49	3	1	46	33	11	2	26	0,038	41
Verbenaceae	1				1					1
Lenibulariae	4	1		4	2		1	325		2

	Arten in Schlesien.	überhaupt in 3	ausschliess- lich in	überhaupt in 2	ausschliess- lich in	überhaupt in 1	ausschliess- lich in	in 1 und 2.	in 2 und 3.	in 1, 2 und 3.	Verhältn. zur Gesamtzahl.	Theil der Gesamtzahl.	im Gebiet von Breslau.
Primulaceae	15	4	3	5	2	10	7	2		1	87	0,011	9
Plumbaginaceae	1			1		1	4	1			1300		1
Plantaginaceae	6	1	1	4	1	5	4	1		2	216	0,015	4
Polygonaceae	20	3		18		15	15	1			65		18
Thymelaeae				2		2	1	1			650		1
Santalaceae	3	1		2		2	1	1		1	433		1
Aristolochiaceae	1			1		1	1	1			1300		1
Cannabinae	1			1		1	1	1			1300		1
Urticeae	3			3		3	1				433		3
Ulmaceae	2			2		2	1	4		1	650		2
Cupuliferaceae	5	1		4	1	5	2	1		1	260		2
Betulinae	5	1		4	1	4	2	1		1	47		5
Salicinae	28	5	4	22	3	13	13	9	1	2	162		18
Coniferae	9	4	2	6	3	4	3	2			433		4
Nymphaeaceae	3										1300		2
Ceratophyllaceae	1										1300		4
Lemnaceae	1					4	1				325		4
Naiadaceae	4										1300		1
Potamocharitaceae	11					11	10	1			118	0,08	10
Hydrocharitaceae	2						2	1			650		2
Alismaceae	2						2	1			650		2
Butomaceae	1						1				1300		1
Juncaginaceae	3						1	2			433		2
Typheae	5						5				260		5

Aroideae	3																			
Orchideae	35	4	1	26	1	22	2	14	3		325									2
Iridae.	8			5	9	4	8	1	1		39	0,025								4
Amarylloideae	3			3	4	2	3	2	2		162									1
Smilacaceae	8	1	2	5	1	6	3	3	1		433									6
Liliaceae	21	2	2	5	1	18	14	4			162	0,016								16
Colchicaceae	3	1		2		2		2			62									2
Juncaceae	22	7	3	13		16	6	9	3	1	59									15
Cyperaceae	78	19	8	45	4	66	25	30	2	11	17	0,058								57
Gramineae	95	17	6	39	3	83	49	25	2	9	13	0,073								78
	Arten in Schlesien.	überhaupt in 3	ausschliess- lich in	überhaupt in 2	ausschliess- lich in	überhaupt in 1	ausschliess- lich in	in 1 und 2.	in 2 und 3.	in 1, 2 und 3.	Verhältn. zur Gesamtzahl.	Theil der Gesamtzahl.	im Gebiet von Breslau.							

Die hier berechnete Gesamtzahl der phanerogamischen Pflanzen-Arten unseres Gebiets beträgt demnach 1288, wofür wir, in Betracht, dass manche der einzelnen noch als Abänderungen betrachteten Formen sich künftiger Betrachtung als wirkliche Arten erweisen dürften, und in der Ueberzeugung, dass in Zukunft auch noch einige Arten in unserem Gebiet werden aufgefunden werden, die runde Zahl 1300 gesetzt haben. Beinahe drei Vierteltheile, nämlich 964 Arten, werden in der Umgegend von Breslau gefunden, deren Reichthum aus einer gewissen Mannigfaltigkeit der Bodenverhältnisse so wie aus der ausserordentlich genauen Durchsichtung derselben abzuleiten sein dürfte.

Die Familien stehen nach der Artenzahl in folgender Ordnung:

Compositae	141	Valerianeae	7	Oxalideae	}	
Gramineae	95	Fumariaceae	}	Lineae		
Cyperaceae	78	Hypericinae		6		Portulacaeae
Papilionaceae	67	Convolvulaceae				Scleranthaeae
Scrofularinae	66	Plantagineae				Amarantaceae
Umbelliferae	51	Malvaceae				Araliaceae
Cruciferae	50	Polygaleae				Rhamnaceae
Labiatae	49	Halorrhageae	Celastreae			}
Ranunculaceae	48	Rosaceae	Thymeleae			
Dryadeae	37	Sanguisorbeae	5	Ulmeae		
Orchideae	35	Solaneae	Hydrocharideae			
Salicinae	28	Cupuliferae	Alismaceae			
Alsineae	25	Betulinae	Paeoniaceae			
Boragineae	24	Typheae	Berberideae			
Sileneae	23	Papaveraceae	Cistineae			
Junceae	22	Droseraceae	Rutaceae			
Liliaceae	21	Spiraeaceae	Balsamineae			
Polygoneae	20	Grossularieae	4	Adoxeae		
Rubiaceae	18	Viburneae	Tamariscinae			
Ericineae	17	Caprifoliaceae	Empetreae			
Campanulaceae	}	Lentibulariae	Staphyleaceae			
Chenopodeae		16	Lemneae	Loranthaeae		
Violariae	}	Elatineae	Cucurbitaceae			
Primulaceae)		}	15	Acerinae		
Onagrariae)	Lythraeae		Ambrosiaceae			
Gentianeae)	}	14	Amygdaleae			
Euphorbiaceae)		Santalaceae	Oleinae			
Geraniaceae	13	Urticeae	3	Asclepiadeae		
Crassulaceae	12	Nymphaeaceae	Verbeneae			
Saxifrageae)	}	11	Plumbagineae			
Potameae)		Aroideae	Aristolochiaeae			
Coniferae	9	Amaryllideae	Cannabinae			
Irideae	8	Colchicaceae	Ceratophylleae			
Dipsaceae	}	}	Naiadeae			
Smilaceae			8	Resedaceae	Butomeae	
Paronychieae	}	}	2			
Pomaceae			7	Tiliaceae		

Verzeichniss

der

wichtigsten Höhenpunkte der Sudeten

und des

Teschnischen Gebirges.

1911

Die gesammte Gebirgsmasse, welche die südwestlichen Gränzen und Theile des Gebiets, welches die Flora umfast, einnimmt, und welche theils ganz innerhalb dieses Gebiets liegt, theils mit seinem höchsten Rücken oder den am meisten hervorragenden Spitzen dessen Gränze bildet, stellt sich bei dem ersten Ueberblick als ein lang hingedehnter Gebirgszug bei verhältnissmässig geringer Breite dar, der nur hin und wieder kleine Ausläufer von sich entsendet, oder sich zu Gebirgsgruppen gestaltet. Derselbe beginnt in Westen mit der Tafelfichte, südlich von Lauban an der böhmisch-schlesischen und unweit der sächsischen Gränze, an das böhmisch-sächsische oder Lausitzer Gebirge sich anschliessend, und zieht sich in einer südöstlichen Richtung, welche den Meridian unter einem Winkel von 60 Grad, die Linie von West nach Ost unter einem Winkel von 30 Grad schneidet, bis zum Oderthale, oder wenn man will bis zum Berge Baranio südöstlich von der Stadt Teschen an der Gränze von Oesterreichisch-Schlesien und Galizien. Jenseits des Oderthaales, nämlich im Fürstenthume Teschen erhält der Gebirgszug mehr den Character der Gebirgsgruppe, deren einzelne Theile in verschiedenen Richtungen streichen.

Die hier aufgeführten Höhenangaben sind theils von dem verstorbenen Prof. Julius Scholtz berechnet, theils sind sie dem verdienstlichen Werke von Prudlo: Die vorhandenen Höhenmessungen in Schlesien u. s. w. Breslau 1837. entlehnt, welche Sammlung, so viel auch noch hierin zu thun sein wird, doch noch auf lange das brauchbarste Hülfsmittel bleiben wird. Es sind dabei diejenigen Veränderungen vorgenommen worden, welche die neuesten Messungen der Breslauer Sternwarte erforderte, deren Mittheilung ich der freundlichen Güte des Vorstehers derselben, Herrn Prof. von Boguslawski, verdanke. Wenn bei dem Orte Nichts beigesezt ist, so ist allemal der höchste Punkt zu verstehen, bei Städten der Ring. Ueber das Nähere verweisen wir auf das genannte Buch selbst;

Mittagstein	4362
Gr. Teich, oberer Rand	4269
Kl. Teich, dito	4225
dito Spiegel.....	3620
Kl. Koppe oder das Gehänge	4260
Koppenplan, nahe dem Fusse des Kegels	4248
Weisswasser, Quelle	4374
Schneekoppe oder Riesenkoppe	4942
Schwarze Koppe, das Ende des von der Koppe ausgehenden Forstkammes.....	4266

b. Hauptkamm, der böhmische,

welcher mit dem schlesischen zunächst dem hohen Rade durch die Elbwiese zusammenhängt, dann durch die Sieben-Gründe getrennt, östlich wieder mit dem Brunnenberge durch den Koppenplan sich an die Schneekoppe anschliesst, von wo an er wieder durch den Riesen- u. Aupengrund geschieden ist.

Elbwiese, oder Naworer Wiese, am Elbquell.....	4270
Elbfall, oberer Rand	3910
Kesselkoppe, oder der grosse Kesselberg.....	4395
Krkonos.....	4533
Elbgrund Anfang am Zusammenfluss der Elbe und des Weisswassers	2341
Ziegenrücken.....	4403
Brunnenberg, westl. Koppe.....	4762
östliche Koppe am Riesengrunde.....	4728
Spiegelberg.....	3839

c. Nächste Vorberge und Absenkungen. Bauden und Dörfer.

Fuchsbauden, am Fuchsberge, böhm.	3795
Fuchsberg	4200
Gränzbauden, Hübner's.	3177
Molkenberg, auf dem Schmiedeberger Kamm.	2882
Paskretschan.....	2236
Wiesenbaude.....	4362
Hampelbaude.....	3848
Spindlerbaude.....	3080
Neue Schles. Baude.....	3715
Wolfshau.....	2240
Brückenberg	2503

Schlingelbaude	2078
Korallensteine	2716
Zackenfall, mit 80' Höhe	2533
Kochelfall, mit 32' Höhe	1529
Vitriolwerk	1278
St. Peters, Wirthshaus	2378
Petersbaude am Mädelkamme	3928
Arnsdorf, Brücke	1318
Buchwald, Wirthshaus	1316
Falkenberg, bei Fischbach	2003
Friesensteine	2816
Schmiedeberger Berg, Chaussee	2470
Spitzberg bei Grunau	1667
Hermisdorf u. d. Kynast, Schlossbrücke	1051
Kynast	1800
Lomnitz, Dorf	1095
Seydorf, Kretscham	1130
Warmbrunn, das kleine Badehaus	1065

4. Ueberschaar- oder Rabengebirge,

von Liebau südlich an der Schlesisch-Böhmischen Gränze, zwischen Bober und Aupa, durch einen Arm des Bober vom Kolbendorfer Kamme des Riesengebirges getrennt, Porphyrgebirge.

Spitzberg, bei Königshain in Böhmen	2680
Gottschen- oder Kutschenberg	2520

5. Westlicher Theil des Schlesischen Vorgebirges,

in einzelnen Zügen und Gruppen in den Kreisen Bolkenhain, Schoenau, Goldberg, Striegau u. s. w.

Bolkoburg	1172
Pitschenberg bei Ingramsdorf	823
Kreuzberg bei Striegau (Bas.)	1111
Streitberg dito	1132
Hessberg bei Jauer (Bas.)	1300
Gröditzberg bei Goldberg (Bas.)	1237
Wolfsberg dito	1138
Spitzberg bei Probsthain (Bas.)	1566
Bleiberg	1983
Hohgulge	2265

Kapellenberg bei Tief-Hartmannsdorf.....	1909
Kitzelberg bei Kauffung.....	2030
Willenberg bei Röversdorf.....	1130

6. Waldenburger Gebirge,

zwischen dem Zieder, der wüthenden Neisse und Weistriz besteht aus dem Hochwaldgebirge und dem Friedland-Charlottenbrunner Gebirge, grösstentheils Porphyr.

Sattelwald.....	2471
Stritt bei Schömberg.....	2142
Schwarzwaldau.....	1453
Stienerberg bei Liebau.....	2120
Hochwald.....	2681
Kuhberg oder Köhlhauer Berg.....	2014
Hochberg bei Gottesberg.....	2148
Wildberg, der grosse.....	2600
Schwarze Berg im Schwarzwalde bei Alt-Lässig.....	2356
Wilhelmshöhe auf dem Spittelberge.....	1622
Storchberg bei Langwaltersdorf.....	2528
Rothe Höhe bei Adelsbach.....	1432
Fürstenstein, am neuen Schlosse.....	1230
— — Grund, Schweizerei.....	912
Salzbrunn, Spiegel des Brunnens.....	1220
Altwasser, nahe am Brunnen.....	1139
Charlottenbrunn.....	1427
Schindelberg.....	2417
Hornschloss auf dem langen Berge.....	2595
Spitzberg bei Freudenburg und Ruppersdorf.....	2725
Heidelberg bei Reimswaldau.....	2824
Dürres Gebirge.....	2802
Zuckerberg.....	2689
Schwarze Berg bei Neuhaus.....	2612
Kandersberg.....	2036
Breite Stein bei Wäldchen.....	1894
Tannhausen bei dem Zollhause.....	1197

7. Das Zobtengebirge,

eine fast isolirte Berggruppe zwischen der Weistriz; Peilau und Lohe (Laue), aus Gneus und Granit mit Serpentina und Gabbro.

Zobten, Stadt, auf dem Ringe.....	546
Zobtenberg.....	2228

Geiersberg.....	1813
Thal zwischen dem Geiers- und Zobten-Berg.....	1102
Röltchenberg.....	1428

8. Das Eulengebirge,

zwischen der Schweidnizer Weistritz, der Gläzer Neisse und der Steinau, besteht aus vier Bergzügen, dem Braunauer Gränzgebirge von den Quellen der Weistritz bis zur Steinau, dem Fichtiggebirge vom spitzen Berge bei Königswalde bis gegen Schlegel, dem Tannhausner Geb. von den langen Brachen bis zum Neumannsberge bei Rudolfswaldau, dem hohen Eulengebirge von Wüste-Waltersdorf bis an die Gläzer Neisse bei Wartha.

Grösstentheils Granitgebirge, zumal der Hauptzug.

Wüste-Waltersdorf, an der Kath. Kirche.....	1504
Kaschbach.....	2295
Uelmenbrunn an der Höllenlehne.....	1963
Höllensfall bei Steinkunzendorf	1589
Hohe Eule.....	3119
Eulenstein, oder der hohe Stein.....	3000
Ladestatt über Falkenberg.....	2717
Ziegenrücken.....	2925
Reimsberg.....	2846
Sonnenkoppe.....	2951
Kuhberg bei Oberhausdorf.....	2986
Ottenstein.....	2600
Hahnkoppe bei Silberberg	2258
Die grosse Strohhaupe, bei Silberberg, (Festungswerk).....	2220
Der Schlossberg bei Silberberg.....	2065
Hopprich bei Gabersdorf.....	2011
Rübenberg bei Herzogswalde	2150
Eulenberg an der gläzischen Seite der Eule, Dorf.....	2780
Ober-Hausdorf.....	1524
Köpfrig, die Sägemühle.....	1507
Fichtig, der Berg.....	2226
Spitze-B. bei Königswalde.....	2311
Annaberg bei Neurode.....	1939

9. Das Wartha-Reichensteiner Gebirge,

schliesst sich einerseits an die Ausläufer des Eulengebirges, andererseits an das Gläzer Schnee- und Bielengebirge, so wie an das Gesenke an.

Harteberg bei Grochau.....	1266
----------------------------	------

Warthaberg, Kapelle.....	1823
Warthapass, bei der Gränzsäule.....	1489
Spitzberg bei Königshain.....	2272
Vogelsberg bei Folmersdorf.....	2218
Jauersberg.....	2666
Heidelberg.....	2764
Karpenstein.....	2285
Dreiecker bei Landeck.....	2405
Landeck, Georgenbad.....	1382
Krautenwalder Berg.....	2028
Ueberschaar, Berg bei Landeck.....	1988

10. Das Heuscheuer-Gebirge,

zwischen der Steina, Meta und Weistriz, von den Städten Friedland und Schömberg bis gegen Reinerz hin, an das Raben-, Waldenburger-, Mense- und Eulengebirge sich anlehnend, aus jüngerm Quadersandstein bestehend.

Karlsberg, Scholzenwohnung.....	2341
Tafelstein auf der Heuscheuer.....	2714
Grossvaterstuhl dito.....	2817
Eckstein bei Lochwiesen.....	2628
Leiersteig, oben auf der Brücke.....	1355
Cudowa, der Brunnen.....	1079
Albendorf.....	1070
Finkenhübel bei Dürrkuzendorf.....	1471

11. Das Mense-Gebirge oder die Böhmisches Kämme,

wovon der grössere Theil zu Böhmen gehört, zwischen dem vorigen und dem Erliz-Gebirge, von welchem er durch die Reinerzer Weistriz und die Erliz geschieden wird; Gneuss und Glimmerschiefer.

Hohe Mense.....	3316
Grunwald, Oberdorf.....	2750
Seefelder.....	2300
Reinerzkron, Feldkapelle.....	2054
Ziegenanstalt bei Reinerz.....	2236
Reinerz, der Ring.....	1633
Deschnayer Koppe in Böhmen.....	3500
Ratschenberg bei Reinerz.....	2465
Hummelberg dito.....	2190

12. Das Erliz-Gebirge oder Habelschwerdter-Gebirge,

zwischen Mittelwalde und Habelschwerdt und der Erliz bis an die Weistritz bei Reinerz.

Gräzsfichte südw. von Steinbach	2103
Schwarze Berg bei Marienthal	2730
Schnallenstein bei Seitendorf	1782
Drei Fichten (Tannen) zwischen Lichtenwalde und Seitendorf	2216
Eulenberg bei Verlorenwasser	1982
Heidelberg bei Verlorenwasser, (schief. Gneus)	2094
Breiter Berg bei Brand	2396
Schlossköppel bei Hammer, (Sandstein)	2370
Quelle des Kressenbaches bei Nesselgrund	2809
Vogelberg, der grosse bei Nesselgrund, (Sandstein)	2446
Buchenhübel bei Vogtsdorf	2514

13. Das Gläzer Schnee-Gebirge,

um die Städte Landeck, Wilhelmsthal, Altstadt, Grulich u. Habelschwerdt, an den Grenzen von Schlesien, Böhmen und Mähren, zwischen den Flüssen Neisse bei Bobischau, Biele, Wilhelmsthaler Wasser, Graupe, Mora und der stillen Adler.

Klappersteine bei Schneedorf	3492
Siedichfür	3571
Wendlerkoppe bei Lauterbach	2081
Pferderücken (Pherik) gegen Spieglitz	3850
Moraquelle oder Marchbrunn am Schneeberge	4197
Gläzer oder grosse Schneeberg (Gneuss und Glimmerschiefer)	4375
Schwalbensteine	3976
Kleine Schneeberg	3909
Obere Schweizerei	3745
Mittelberg, westlich vom grossen Schneeberge	3703
Lattichkoppe, (das Hohe)	3588
Otterberg	3567
Kleine Heuberg nach Seitenberg	3478
Schwarze Berg bei Weisswasser (Beerköppel oder Puhu, von bester Aussicht)	3714
Wölfelsgrund, Wirthshaus	1722
Spitzberg bei Wölfelsgrund	2609
Dürre Berg bei Kieslingswalde	2889
Steinberg bei Neu-Waltersdorf	1802

Mittelwalde.....	1296
Langenau, Trinkbrunnen.....	1119

14. Das Bielen-Gebirge,

oder mährisch-glänzische Gränz-Gebirge, von Landeck längs der Bielle
aufwärts, über Spieglicz in Mähren bis Schreckendorf.

Olbersdorf, Brücke über die Bielle.....	1376
Neu-Gersdorf, Wirthshaus.....	1770
Bieldorf, die Kirche.....	2067
Preuss. Saalwiese, der Schaafstall.....	2961
Wetzsteinkämmel (Gneuss und Glimmerschiefer).....	2347
Kahle Berg bei Alt-Gersdorf.....	2930
Quellen der schwarzen Bielle.....	2966
Quellen der weissen Bielle.....	3256

15. Das Glänzisch-Neisser Gränz-Gebirge,

zwischen Landeck, Johannisberg, Weidenau und Friedeberg bis zum
Passe von Ramsau zwischen Freiwaldau und Goldenstein.

Gucke bei Reichenstein.....	1052
Johannisberg, Schloss.....	924
Weidenau, Bett der Schlippe.....	751
Spitzberg bei Petersdorf.....	2682
Gross-Kunzendorf, (Marmorbruch).....	976
Friedeberg, an der Jungferndorfer N. Mühle.....	1073
Saalwiesen, mährische.....	3311
Lange Floss.....	3281
Ramsau, Gränztafel.....	2300

16. Das Gesenke,

a. westlicher Theil.

Hägerborn am Hockschar.....	3938
Hockschar oder Freiwaldauer Schneeberg.....	4110
Köpernikstein.....	4387
Schweizerei unter dem Köpernikstein.....	3886
Brünnelhaide, Pyramide.....	4030
Wirthshaus am Haidebrünnel.....	3947
Pass von Waldenburg nach Winkelsdorf.....	3669
Fährmannsstein.....	4191

b. östlicher Theil.

Waldenburg, Scholtisei No. 47.....	1859
Leiterberg, erste Wiese.....	3400
— — zweite Wiese.....	3552
— — höchster Punkt.....	3863
Knoblichberg.....	4222
Altvater, oder mährischer Schneeberg, grosser Vaterberg, (4588 nach v. Vincke, 4576 über dem adr. Meere nach dem K. k. General- stabe).....	4603
Gränzstein am Altvater.....	4573
Peterstein.....	4402
Sattel zwischen Altvater und Peterstein.....	3786
Janowizer Haide.....	4495
Schweizerei am Altvater.....	4073
Bärenkamm.....	4029
Quelle der Biele.....	3982
— der kleinen Oppa.....	4049
— der Mitteloppa, ungefähr.....	3980

c. Vorberge:

Gräfenberg, Sommerhaus auf der Kuppe.....	1941
Hirschbadkamm.....	3023
Nesselkoppe, Aussicht.....	2930
Blaukoppe, am Biberteiche, (Graphit).....	1932
Obergrund, bei dem Localcaplan.....	1900
Querberg bei Zuckmantel.....	2910
Reiwiesen, Kirche.....	2313
Moosebruch bei Reiwiesen.....	2360
Quelle der schwarzen Oppa.....	2480
— der weissen Oppa a. d. Hirschwiese.....	2600
Koppe bei Zuckmantel.....	2748
Herrmanstadt, Wirthshaus.....	2155
Würbenthal, Markt.....	1757
Carlsbrunn, oder Hinnewieder, Carlsquelle.....	2413
Carlsbrunn, Gasthof.....	2374
Jägerndorfer Burgberg.....	1332
Bischofskoppe.....	2717
Oderquellen, 2 Meilen östlich von Ollmütz.....	2000
Oderthal bei Zauchtel, 1 M. nw. v. Neu-Titschein.....	1000

17. Das Teschnische Gebirge.

Chelmberg bei Teschen.....	1276
Kleine Czantory.....	2880
Grosse Czantory.....	2958
Malinow.....	3480
Baranio.....	3650
Sülow.....	3000
Lissa Hora.....	4260
Babia Gora.....	5080
(nach Hopfgarten).....	5040
(bei Wahlenberg Fl. Carp.).....	4800

Höhe der vorzüglichsten Städte

und

anderer Ortschaften des Vorgebirges und der Ebene.

Annaberg bei Cosel.....	1278	Frankenstein.....	891
Basaltkoppe bei Chronstau..	580	Freiburg.....	827
Bärsdorfer Höhe.....	1663	Freiwalddau.....	1285
Bernstadt.....	460	Friedland.....	1356
Berun, der Berg.....	777	Glaz, Ring.....	937
Beuthen in Oberschlesien...	927	Festung, Gallerie.....	1100
Beüthen a. O.....	200	Gläsendorfer Berg.....	1327
Bialazeczka Gora bei Pless..	1116	Glauche, Ober-, Kirche....	692
Bolkenhain.....	1032	Gleiwiz....	722
Bratschberg bei Leobschütz..	1382	Glogau, Gr.....	222
Breslau, Ring.....	377	Gnadenfrei.....	873
Nullpunkt d. Barometer der		Görliz.....	642
Sternwarte, nach geodäti-		Goldberg.....	813
schem Nivellement.....	453.6	Goldenstein in Mähren....	1956
Brieg.....	426	Gorkau.....	582
Camenz.....	741	Gottesberg.....	1767
Chelmburg.....	941	Grochauer Berg.....	1192
Cosel.....	583	Grottkau.....	522
Creuzburg.....	626	Grüssau, Hof des Stifts....	1387
Czernitz, Gypsberg dabei...	809	Gumberg bei Gläsendorf....	1320
Dirschel, Gypsberg.....	804	Habelschwerdt.....	1100
Domanze, Kieferberg.....	583	Heidewilken, Schlosshof....	510
Dyhrenfurth.....	325	Hirschberg.....	1000
Fischerberg bei Peilau.....	1354	Hochkirch bei Trebnitz....	668

Hohenfriedeberg.....	1230	Oswiz, Schwedenschanze ...	416
Jauer.....	610	Ottmachau.....	693
Kaschbach, Wirthshaus.....	1696	Peterswaldau, Schloss.....	880
Katscher, Ring.....	743	Pilsen, Kapelle.....	716
Kleutschberg.....	1490	Pilzberg bei Dirsdorf.....	1080
Königshain bei Glaz.....	1107	Pless.....	804
Spitzberg.....	2272	Radzionkau, Berg dabei ...	1152
Kosemitz, Windmühle.....	1024	Ratibor, Oder.....	620
Krappitz.....	584	Reichenbach.....	806
Kupferberg.....	1530	Reichenstein.....	1085
Kynsburg.....	1440	Riemberg, Warteberg.....	575
Laehnhaus.....	1130	Rosenberg.....	726
Landecke bei Hultschin.....	938	Rummelsberg.....	1227
Landeshut.....	1297	Rumpelbrunnen.....	1584
Langenbielau, Oberhof.....	1084	Sakrauer Berg bei Grosstein.	880
langer Berg.....	1267	Schömberg.....	1617
Lauban.....	669	Schönau.....	790
Leobschütz.....	857	Schmiedeberg.....	1360
Liebau.....	1553	Schurgast.....	470
Liegnitz.....	386	Schweidnitz.....	668
Löwenberg.....	637	Silberberg, Casernea.....	1692
Loslau.....	800	Skarsine, 2 Läden.....	609
Lublinitz.....	834	Steinau, Oder.....	232
Lubschauer Berg.....	1169	Strehlen.....	481
Militzsch.....	323	Strehlitz, Gr.....	770
Münsterberg.....	629	Striegau.....	703
Muskau.....	315	Tarnowiz.....	987
Myslowiz.....	838	Teschen.....	920
Namslau.....	480	Tost ...	808
Neisse, Ring.....	616	Schlossberg.....	838
Neuhaus, Burg.....	1870	Trachenberg.....	268
Neumarkt.....	410	Trebnitz, Tannenberg....	680
Neustadt.....	850	Trockenberg (Suchogara) bei	
Neurode.....	1220	Tarnowiz.....	1130
Nicolai.....	970	Troppau.....	800
Nimptsch.....	790	Ungarberg bei Weigelsdorf..	1339
Oderberg, Schloss.....	668	Verlorenberg b. Girlachsdorf	1108
Oels.....	467	Vogelkippe bei Altwasser ...	1810
Ohláu.....	394	Waldenburg.....	1290
Oppeln.....	505	Wartenberg.....	443

Wartha.....	841	Ziegenbals.....	903
Weinberg bei Hultschin.....	934	Zobten, Ring.....	546
Wüste-Waltersdorf, ev. K....	1560	Zuckmantel.....	1224
Zabrzeg, Weichselüberfahrt.	719		

Die meisten der verzeichneten Höhenangaben gründen sich auf barometrische, nur wenige auf trigonometrische Messungen. Letzterer Art sind die des K. K. Oester. Generalstabes, so wie die von Assmann und Röhl in Berghaus, Herthä III. 1825. Für die Höhenmessungen in Schlesiens haben sich vorzüglich Verdienste erworben: der Generalmajor Lindener zu Glaz (fehlerhafter Abdruck s. Messungen in Hopfgartens Höhen etc. Glaz 1820), Pfarrer Seliger zu Wölfelsdorf, Prof. Jungnitz zu Breslau, Pfarrer Kaluza, Markscheider Länge zu Waldenburg, von Gersdorf auf Meffersdorf, Prof. Gerstner zu Prag, Ober-Bergamts-Assessor von Carnall zu Bonn, ehemals in Tarnowiz, Graf von Schweinitz in Hirschberg, Oberberggrath T. von Charpentier, Oberlehrer Prudlo zu Breslau, Major von Vincke zu Berlin, Hauptmann Lutz zu Breslau, Prof. Julius Scholtz zu Breslau. Eine vollständige Nachweisung und durchgängige Berichtigung der Höhen Schlesiens dürfen wir erwarten, wenn die reichhaltigen Materialien der Abtheilung der Schlesischen Gesellschaft für Sudeten-Kunde zur Bearbeitung kommen werden.

Anweisung

zum

Sammeln, Bestimmen, Trocknen

und

Aufbewahren der Pflanzen.

Das Studium der Botanik hat zu seinem Ziele die Kenntniss der Pflanze. Diese nimmt ihren Anfang von der Kenntniss der Pflanzen. Durch Beobachtung und Vergleichung der Individuen lernt man die Arten kennen, und indem man von diesen zur Kenntniss der Sippen oder Gattungen, dann der Familien oder Ordnungen und Classen aufsteigt, indem man ferner von der Kenntniss der einheimischen Gewächse zu der der ausländischen fortschreitet, welche man sich theils aus gebauten Exemplaren in Gärten, theils aus getrockneten, theils aus Abbildungen verschafft, gelangt man zu einer mehr oder minder vollständigen Einsicht in die Gestalt, Bildung und das Wesen der Pflanze.

Indem unsere Flora, als ein Verzeichniss der in dieser Provinz wachsenden Pflanzen, zu diesem Wege nur die ersten Schritte anbahnt, indem sie als ein Wegweiser dient, diese Pflanzen an ihren Standorten aufzufinden, die gefundenen richtig zu bestimmen und so zu einem Ueberblicke über die ihr eigenen Gewächsformen zu gelangen: haben wir hier nur anzugeben, auf welche Weise diese vorbereitenden Schritte am sichersten und zweckmässigsten gethan werden und wie diese Flora zu benutzen sei, um mit ihrer Hülfe diese zum ferneren Studium der Botanik nothwendige erste Stufe zu erreichen. Es ist aber diese Art der Vorbereitung, oder vielmehr dieser Anfang des Studiums, die Kenntniss der Pflanzenwelt mit der Beobachtung und Sammlung der einheimischen Gewächse zu beginnen, in mehrfacher Hinsicht der richtigste und den Fortschritten förderlichste. Erstens prägt sich dem Blicke und Gedächtnisse nichts fester ein als die im Freien aufgefundenen und in vielen Individuen wiederholt gesehenen Gestalten, da die hier stattfindende Frische dem Eindrücke solche Kräftigkeit und Stärke giebt, dass das Bild am lebhaftesten haftet und sich in der Erinnerung genau und warm reproducirt. Der gesunde und allmählig sich stärkende Blick gelangt zu der Fertigkeit, zugleich mit

den Unterschieden und einzelnen Merkmalen auch das Ganze der Gestalt aufzufassen und sich einzuprägen, und diess um so eher als es an den lebenden Individuen an ihrem natürlichen Standorte geschieht, wo die Summe der äusseren Umgebungen und Lebensmomente zugleich mit aufgefasst wird. Zweitens wird die Beobachtung der Gewächse im Freien daran gewöhnen, sie als lebendige und organisirte Ganze zu betrachten, indem es hierbei möglich ist, alle Theile in ihrer natürlichen Verbindung zu sehen und die mancherlei Veränderungen, denen die Art unterworfen ist, zu erfahren, Vortheile, welche bei getrockneten Pflanzen und Abbildungen wegfallen. Drittens hat die Vegetation eines jeden Landstriches ihre relative Vollständigkeit und wer auch nur eine solche kennen zu lernen Gelegenheit hätte, würde dadurch von der Pflanzenwelt eine wenn auch nur eingeschränkte Kenntniss erlangen.

Wie die botanischen Excursionen, auf denen die Pflanzen an ihrem natürlichen Standorte aufgesucht und beobachtet werden, anzustellen und am zweckmässigsten einzurichten seien, diess lernt man am besten theils von Erfahrenen, theils durch eigene Erfahrung. Doch mögen auch hierüber einige Andeutungen und Winke nicht überflüssig erscheinen. Wir wollen zunächst das Allgemeine hierüber mittheilen und dann als Beispiele und Anhaltspunkte zeigen, auf welche Weise von einigen Hauptpunkten aus dergleichen Excursionen angestellt werden mögen.

Auf Wanderungen zu Fuss wird der Anfänger die Vegetation der Umgegend seines Wohnortes am sichersten und vollständigsten kennen lernen. Denn wenn auch viele Pflanzen so verbreitet sind, dass sie in den meisten Gegenden angetroffen werden, so giebt es doch nicht wenige, welche so an einen bestimmten und durch besondere Verhältnisse characterisirten Wohnort gebunden sind, dass sie vielleicht im Radius von drei bis fünf Meilen nur an einzelnen oder zwei bis drei Stellen vorkommen. Wir sind nur selten im Stande, diese Verhältnisse näher anzugeben, aber ein aufmerksamer und geübter Blick vermag die übereinstimmenden Lokalitäten, die sich bald auch an gewissen daselbst zusammen vorkommenden Pflanzenarten zu erkennen geben, herauszufinden. Daher ist es nothwendig, so viele Theile als möglich und von der verschiedensten Art zu betreten und aufmerksam zu durchmustern. Auch darf man keine Gegend, sie sehe von fern so dürftig aus als sie wolle, zu durchsuchen verschmähen; jede birgt ihr Eigenthümliches und wie der *Coronopus Rullii* auf den Angerplätzen und die *Poa distans* an den übelriechenden Gräben schmutziger Vorstädte wohnen, so wird man auch auf kahlen Sandhügeln, in dürren Haiden und auf den einförmigen Moorwiesen nicht vergeblich nach eigenthümlichen, bisweilen auch seltneren, Pflanzenarten

suchen, und erst neuerlich haben uns die unscheinlichsten Gebüsche die merkwürdigsten Weidenformen geliefert. Als ein schlagender Beweis hiervon kann es gelten, dass in den Umgebungen der Stadt Breslau, die seit länger als 50 Jahren von vielen der aufmerksamsten und kundigsten Botaniker durchsucht waren, in den letzten 20 Jahren eine namhafte Anzahl früher übersehener Arten und Formen aufgefunden worden sind. Oft wird es thunlich sein, einen andern Rückweg zu nehmen, um in kürzerer Zeit möglichst viele Plätze zu besuchen. Man kann es indess als Regel ansehen, dass man um so mehr findet, je genauer man einen kleineren Flächenraum durchsucht, da bei rascherem Vorübergehen dem noch nicht geübten Blicke leicht Vieles entgeht. Bei dem Sammeln der Cryptogamen, welche wegen ihrer Kleinheit nur ganz in der Nähe gesehen werden können, versteht sich dieses ohnehin. Es ist schon angedeutet worden, dass es in mancher Hinsicht vortheilhaft ist, die Vegetation einer einzelnen Gegend recht genau zu kennen: an ein solches Bekanntes knüpft sich alsdann das Neue leichter und sicherer an. Daher wähle man auch bei grösseren Excursionen einen durch geeignete Lage sich empfehlenden Mittelpunkt, von dem man ausgehen und zu welchem man wieder zurückkehren kann. Für grössere Entfernungen wird man nach Belieben und zu grösserer Bequemlichkeit sich der Fahrt zu Wagen oder auf den sich jährlich mehrenden Eisenbahnen bedienen.

Die Excursionen, wie man sie zweckmässigerweise z. B. von Breslau aus veranstaltet, können, sofern sie sich nicht auf die allernächste Umgebung und den Zeitraum weniger Stunden beschränken, auf einen halben, einen ganzen oder ein Paar Tage ausgedehnt werden.

Für die Orte Oswiz, Ransern, Pöpelwiz, Cosel, Masselwiz und Klein Mochbern gegen Abend, Gräbschen, Krittern, Kleinburg, Klettendorf, Oltaschin, Woischwiz und Lambsfeld gegen Mittag, Marienau, Brocke, Pirscham, Klein- und Gross-Tschansch, Tschechniz, Althof, Treschen, Barteln, Bischofswalde, Grüneiche, Zimpel und Schwoitsch gegen Morgen und Hundsfeld, Carlowiz, Bischwiz, Lilienthal, Rosenthal, Schweinern gegen Mitternacht reicht ein halber Tag hin, wofern man nicht mehrere dieser Orte im Laufe eines ganzen Tages zu besuchen vorzieht. — Zu den vorzugsweise zu besuchenden Stellen gehören: die Oderufer und Viehweide bei Pöpelwiz, der Wald bei Oswiz und Ransern, die Dämme und Waldwiesen um Cosel, der Wald und die Loheufer bei Masselwiz, der Weg nach Gräbschen, die Wiesen und Raine um Krittern und Kleinburg, die Brüche und Wiesen um Klein-Tschansch und Pirscham, die Dämme und Waldwiesen um Treschen, Bleischwiz und Althof, der Wald

vor Schwoitsch und der jenseits des Schwarzwassers gelegene Fuchsberg, die Weidenfer bei Bischwiz, die Sandhügel und Dämme bei Carlowiz.

Zu denjenigen Excursionen, welche über einen halben bis zu einem ganzen Tage erfordern, gehören folgende:

Nach Sandberg, wo die Weistriz in die Oder mündet, über Cosel, Kl. u. Gr. Masselwiz, Herrnprotsch oder auch von Masselwiz längs des Oderufers. Zum Rückwege kann man den über Wilxen und Lissa wählen.

Nach Lissa, an der Berliner Strasse. Der durch seinen Reichthum ausgezeichnete Wald erstreckt sich von Lissa aus einerseits nach Stabelwiz und gegen Wilxen und Muckerau, andererseits gegen Goldschmiede und ist bei der grossen Abwechslung hügeligen und tiefen, sandigen, humusreichen und moorigen Terrains reich an vielen und seltneren Gewächsen. Man schlägt den Weg über Masselwiz und Marschwiz ein, oder längs der Chaussee, wo die Umgebungen der Lohebrücke und die dahinter liegenden Wiesen zu beachten sind, oder endlich den über Neukirch und Goldschmiede, und kann auch zweckmässiger Weise bei längerer Frist diese Excursion mit der folgenden vereinigen, indem man entweder von der Lissaer Schäferei aus über Saara und Leuthen den längeren oder längs der Weistriz den kürzeren Weg nach Arnoldsmühl einschlägt.

Nach Arnoldsmühl, über Neukirch und Herrmannsdorf. Jenseits der Weistriz, längs deren Ufer zieht sich ein Laubwald, ehemaliger Park, und rechts von der kleinen Strasse nach Neumarkt ein zweiter, beide reich an seltneren Pflanzen und zumal im Frühlinge höchst anmuthig. Von letzterem aus führen Dämme und Fussteige nach Leuthen und Saara. Man kann diese Excursion zweckmässig ausdehnen, indem man über fruchtbare Wiesen an Waldrändern und durch hübsche Dörfer den Lauf der Weistriz verfolgt, bis Schalkau oder bis Schosniz bei Canth, was jedoch nur in trocknen Sommern geschehen kann.

Nach Schosniz und Canth. Der gerade Weg über Schmolz und Schottgau bietet wenig, doch sind die Umgebungen von Schmolz wohl zu beachten. Der Wald bei Schosniz verdient genau durchsucht zu werden. Mit dem Dampfwagen kann man diese Gegend von Breslau aus in einem Nachmittage besuchen.

Nach Koberwiz, über Klettendorf, Bettlern und Domsiau. Die Umgebungen des Parks bei Koberwiz und die umliegenden Felder gewähren eine reiche Ausbeute zum Theil sehr seltener Arten. Von hier aus werden die Gebüsch um Wirrwiz zu besuchen sein, und damit auch die Durchsuchung der Umgebungen von Guhrwiz und Schiedlagwiz verbunden

werden können. Den Rückweg von Roberwiz kann man über Kl. Tinz oder über Wasserjentsch, Wessig und Oltaschin einschlagen.

Nach Rothsürben über Oltaschin und Eckersdorf, oder über Lambsfeld und Thauer. Diese gen Mittag liegende Gegend ist grösstentheils baumleer, doch bieten die Aecker, Ackerraine, Grabenränder und Wiesen manches Eigenthümliche.

Nach Rottwiz über Kl. Tschansch, Althof und Bleischwiz oder über die Wiesen bei der Althofer Windmühle, oder längs der Ohlauer Chaussee über Tschchniz. Der grosse Oderwald, der sich von Bleischwiz aus erstreckt, und die hinter diesem sich erhebenden Sandhügel mit Kieferwald bieten eine reiche Vegetation und seltene Arten. Man kann den Rückweg über Merzdorf, oder jenseits der Oder über Tschirnau, Margareth und Lanisch durch die Strachate (Oderwald von Treschen gegenüber) und über Barteln nehmen. Auf letzterem Wege verdienen die Umgebungen von Janowiz und Margareth, so wie die Strachate einer genauen Beachtung. Mit Benutzung der Eisenbahn kann man diese Excursion bis Ohlau ausdehnen und von Rottwiz aus in trockenen Sommern längs der Oder über Zedlitz und den durch einige Seltenheiten ausgezeichneten Weinberg dahin gelangen.

Nach Schleibiz, Cranst und der Waldmühle. Der Weg längs der Bernstadter Strasse über Schwoitsch, Wüstendorf und Gr. Nädlitz nach Cranst ist einförmig und wenig ergiebig; man wird daher den nächsten und anmuthigsten Weg über Schwoitsch, die Wildschützer Mühle, Klein-Weigelsdorf, Schleibiz und Cunersdorf nach der Waldmühle einschlagen, und über Claren- und Marien-Cranst etwa nach Margareth, Treschen u. s. w. zurückkehren. Die Umgebungen der Waldmühle, namentlich die Wiesen um Süswinkel gewähren manches Seltner. Ein anderer Rückweg führt über Dörndorf und Gr. Weigelsdorf, von wo man nach dem Mirkauer Busche an der Chaussee nach Oels ausbiegen kann.

Nach Skarsine, am östlichen Flügel des Trebnizer Höhenzuges, dessen grösste Erhebung in einer Linie von hier über Glauche, Trebniz, Heide- wilken, Obernigk und Riemberg sich erstreckt, und der in seinen mannigfaltigen Waldungen, worin Laubholz mit Kieferwald abwechselt oder gemischt ist, und zumal an den Wänden und Lehnen der Hügel eine sehr ausgezeichnete Vegetation birgt. Man schlägt den Weg entweder über Sibyllenort und von da über Bunkay und Lossen, oder von Hundsfeld aus über Sackerau, Domatschine und Bruschwiz oder man wählt den kürzeren Weg über Kl. Bischwiz, Paschkerwiz mit einem merkwürdigen Sandberge und Günterwiz. Um Skarsine sind der Buchenwald, die Höhen um Pollentschine und der nach Glauche zu liegende Wald zu beachten. Man

kann diese Excursion so mit der nächsten verbinden, dass man von Pollentschine aus den Weg längs des Höhenzuges nimmt, theils auf der Höhe, theils in den Schluchten bis zu den Hügeln bei Totschen. Dehnt man diesen Ausflug auf einige Tage aus, so kann man den ganzen Höhenzug in der oben angegebenen Richtung durchwandern, eine der angenehmsten und belohnendsten Excursionen unserer Umgegend. Diess wird man am zweckmässigsten und vollständigsten so einrichten, dass man von Skarsine aus die Dörfer Pollentschine, (Gr. Glauche), (Kl. Totschen), die Totschner Mühle, den Heidekretscham, die Heidemühle, Wiese, Machniz, Trebniz, Pflaumendorf, Burgwiz, Heidewilxen, Obernigk und Riemberg berührt.

Nach Totschen. Die interessante Partie dieser Gegend liegt zwischen Pirbischau (Blössel) und Kl. Totschen, der Totschener Mühle zunächst. Von Breslau aus führt der Fahrweg über Rosenthal, Lilienthal, Hünern, (dahinter seitwärts links gegen Kapsdorf der Goi, ein pflanzenreicher Laubwald), Mahlen, Heidekretscham. Von der Totschner Mühle gelangt man leicht nach Machniz und kann den Rückweg auf der Trebnizer Strasse nehmen.

Nach Trebniz, bekannt durch seinen schönen Buchenwald; die Strasse führt über Hünern, Kapsdorf, Schön-Ellguth (vorher die Wiesen rechts zu beachten), Hochkirch, Machnitz.

Nach Heidewilxen, über Hünern, Simsdorf, Schebiz, Sponsberg. Sowohl der Kieferwald vor H. als auch die Höhen um dasselbe, besonders der Laubwald jenseits des Schlosses, und die nächsten Lehnen an der Strasse nach Prausniz vor Karaschky sind zu beachten; nach Obernigk, besonders nach den Sitten, worin ein Kaltwasserbad angelegt ist, führen verschiedene anmuthige Wege.

Nach Riemberg, dessen interessantester Punkt der Warteberg, eine Viertelstunde vom Dorfe ist, zu dessen Fusse sich theils Nadelwald, theils weite Moor- und Torfwiesen und Brüche ausdehnen, welche auf einem sehr mannigfaltigen Boden viele seltene Pflanzen beherbergen. Der Fahrweg führt über Hünern, Schebiz, Hasenau, Hennigsdorf, Liebenau. Kürzer gelangt man bis Hasenau über Rosenthal und Schweinern. Von Liebenau aus führt der kürzere Waldweg links von der Strasse über Haufen. Auch kann man von Schweinern aus längs der Oder den etwas weitern Weg über Panwiz, Kottwiz und das Städtchen Auras einschlagen.

Mit Hülfe der beiden bis jetzt im Betriebe befindlichen Eisenbahnstrecken nach Freiburg und Oppeln kann man auch entferntere Gegenden von Breslau aus in einem, anderthalb oder zwei Tagen besuchen, von denen wir einige der wichtigsten namhaft machen wollen.

Auf der Freiburger Eisenbahn ist es zunächst der Anhaltspunkt Mettkau, von welchem aus rechts die Umgebungen von Lorzendorf, Wiehan und Borganie, links die von Mettkau, Fürstenau und den Dörfern Mohnau besucht werden können. — Auch gelangt man von hier aus durch Postverbindung nach Gorkau, so dass man nun den Zobtenberg von Breslau aus bequem in einem Tage besuchen kann. Die anliegenden Berge, namentlich der Geiersberg, erfordern etwas mehr Zeit. — Vom Bahnhofe zu Ingramsdorf können die romantischen und geschichtlich denkwürdigen Gegenden um Domanze, Hohen-Poseriz, und Konradswaldau, so wie der Pitschen- und Rabenberg nebst Sasterhausen besucht werden. Auch gelangt man von hier aus auf einem höchst anmuthigen Wege, welcher über die Ortschaften Laasan und Puschkau führt, zu den durch eine reiche Vegetation ausgezeichneten Bergen von Striegau. Die Umgebungen von Freiburg selbst, unter denen der Nonnenbusch und der naheliegende Fürstensteiner Grund vor allen zu nennen sind, gewähren manche eigenthümliche Arten des Vorgebirges. Ausserdem kann man die Excursionen bis Hohenfriedeberg und Reichenau, andererseits über Salzbrunn bis zum Hochwald und auch wohl Sattelwalde, nach Altwasser, so wie oberhalb Bögendorf nach den Bügenbergen, etwa nach Hoh-Giersdorf, ausdehnen. Ferner wird der Eisenbahnzweig nach Schweidnitz das schöne Weistrizthal von Ober-Weistriz bis nach Tannhausen um so vieles näher bringen, dass man von da aus die Excursionen füglich bis in dieses Thal und seine romantischen Seitenthäler z. B. den goldnen Wald, das Schlesierthal wird ausdehnen können. Auch lässt sich von hier aus der Költschenberg und Geiersberg mit Bequemlichkeit besuchen.

Die Bahn nach Oppeln führt uns zunächst nach dem Haltpunkte Leisewitz, von wo aus der merkwürdige Wald bei Seifersdorf zu besuchen ist. Von der Stadt Ohlau aus sind viele interessante Punkte zu besuchen, unter denen wir zunächst den Stadtwald und den Fürstenwald, dann die Ortschaften Kottwitz, welches schon oben angeführt worden ist, Jeltsch, Neuvorwerk, die Garsucher Mühle, Ottag, Bergel und Grüntanne, Jacobine und Kl. Oels hervorheben. Längs der Oder führt die sogenannte alte Strasse über Linden nach Brieg, jenseits der Oder gelangt man durch den grossen Oderwald und auf Dämmen über Scheidelwitz und Michelwitz auf längerem Wege ebendahin. Von Brieg aus ist der Leubuscher Forst und Brieger Stadtwald, und an der Strasse nach Grottkau der Hochwald zwischen Conradswaldau und Zindel zu besuchen. Von Oppeln aus sind es zunächst die an der Stadt liegenden Pascheken, Bolko, der Morizberg, Halbendorf und die Wienower Hügel, in weiterer Entfernung der Kalichtich bei Sawade, die Orte Königshuld und Trenczin, Malapane, vor

allem aber Grosstein, Kleinstein und der Sacrauer Berg, welche durchsucht zu werden verdienen.

Wir reihen hieran eine Anzahl im Vorhergehenden noch nicht erwähneter Ortschaften der Ebene und des Vorgebirges, von welchen aus als Mittelpunkten Excursionen auf die Dauer eines halben, eines oder zweier Tage anzustellen sind, indem wir die durch Pflanzenreichthum oder seltene Arten bemerkenswerthen Stellen ihrer Umgebung hervorheben.

Militsch und Trachenberg. Diese Gegend ist eine zum Theil sehr fruchtbare Niederung längs den Ufern des Bartsch, mit fruchtbaren Wiesen und waldigen Brüchen. Besonders verdienen die grossen Teiche, als die von Militsch etwas über eine Meile entfernten Grabownize-T. und Collize-T. wegen Wasserpflanzen besucht zu werden.

Wohlau ist einer der interessantesten Punkte der schlesischen Ebene. Dicht bei der Stadt sind ausgezeichnete Sumpf- und Moorwiesen um die Schindel- und Giese-Mühle, die man indess neuerdings theilweise auszutrocknen begonnen hat. Die weiter entfernten Orte Arnsdorf, Petranowiz, Polgsen u. a. gewähren reiche Ausbeute an seltenen Arten. Nördlich von Wohlau gegen Winzig und Herrnsstadt sind die letzten Abfälle des Trebnitzer Höhenzuges.

Sprottau; über die Umgebungen, namentlich den Nonnenbusch und den durch seltene Pflanzen ausgezeichneten Hochwald ist oben nöthige Auskunft gegeben.

Bunzlau. Die Umgegend, namentlich die Boberniederung, und die Heidegegenden, sind gleichfalls oben näher geschildert. Als vorzügliche Punkte sind noch Tillendorf, Klitschdorf und Wehrau herzuheben.

Görliz. Auch die Umgebungen dieser Stadt sind reich an interessanten Punkten. Zunächst ist die Kable, dann die Königshainer-Berge, die Landeskrone, und die Ortschaften Hennersdorf, Diehsa und Niesky zu erwähnen, welche von hier aus besucht werden können. Dieser ganze Theil von Schlesien und der ehemaligen Niederlausitz ist reich an Haiden und moorigen Niederungen, in denen zum Theil seltene, diesen Plätzen eigenthümliche Arten gefunden werden.

Hirschberg. Unter den nähern Umgebungen dieser in einem reizenden Gebirgsthale gelegenen Stadt sind auszuzeichnen der Sattel, die Drachenburg, der Prudelberg bei Stonsdorf, Grunau und Flachseifen, die Moore bei Lomniz.

Landshut bildet einen Mittelpunkt für Excursionen nach Rohnaw,

Dittersdorf, Liebau, Grüssau, Schwarzwaldau und Gottesberg, insbesondere auch nach dem Sattelwalde und Hochwalde.

Charlottenbrunn, reich an romantischen Parteen und pflanzenreichen Plätzen, von denen wir als die nächsten den langen Berg, Dirnberg, Kaudersberg, die Wiesen und Wälder um Lehmwasser und Sophieenau, den Blockberg und die langen Brachen erwähnen, als entferntere das Sandgebirge und Reimsbacher Thal, den schwarzen Berg, Neuhaus, den Heidelberg, Ruppersdorfer Spitzberg, langen Berg bei Donnerau mit dem Hornschlosse, die Seiffen und das Weistritzthal gegen Kynau.

Strehlen. Von hier aus wird über Hussinez, Podiebrad und Pogart am bequemsten der Rummelsberg mit seinen Nebenbergen besucht, allenfalls der Rückweg über Krummendorf genommen. Nimmt man von hier den Weg nach Zobten oder dem Geiersberge, so führt uns derselbe durch schöne Punkte, unter andern bei den Teichen von Rothschloss vorüber.

Nimptsch mit seiner ausgezeichneten Lage am Fusse des Gebirges bietet nach verschiedenen Richtungen hin interessante Ausflüge dar. In geringer Entfernung ist der Pangelberg und die Ortschaften Vogelgesang, Wilkau, Gaumiz; in weiterer der Höllengrund mit der Kolonie Schobergrund, Gerlachschorf, Gnadenfrei und Peilau, Diersdorf, Cosemiz und Tepliwoda. Vor Nimptsch ist aber als ein sehr gelegner Punkt das Dorf Jordansmühl zu bezeichnen, von wo aus man den Johnsberg, Schwentnich, den Kupferberg bei Danckwiz, die Sumpfwiesen bei Gr. Jeseriz, den Hartebusch besuchen und auch in nicht zu langer Zeit über Weinberg und Gr. Silsterwiz nach dem Geiersberge gelangen kann.

Münsterberg ist am bequemsten gelegen theils zum Besuche der schon erwähnten Strehlner Berge und des nahen Prieborn, theils der Fortsetzung der so eben erwähnten von Nimptsch her streichenden Hügelkette, welche einerseits nach Kamenz, andererseits gegen Ottmachau verläuft.

Leobschütz, reich an interessanten Umgebungen und seltnen Pflanzen. Zunächst verdient der Stadtwald mit dem Wolfsteiche, dann die Taunlizer Felder und Gröbzig erwähnt zu werden; in weiterer Entfernung die Ortschaften Bratsch, Militseh, Bauerwiz, Füllstein, Resniz, Bladen, insbesondere aber die durch ihre Gypsgruben berühmten Gegenden von Katscher und Dirschel genannt zu werden.

Pless hat in seiner Umgebung mehrere Teiche von ziemlicher Ausdehnung, ausserdem verdient der Badeort Charkow besucht zu werden.

Indem wir die übrigen Punkte von Oberschlesien, welche uns nur theilweise und nicht hinreichend aus eigener Anschauung bekannt sind, übergehen, erwähnen wir nur noch, dass der durch einige seltnere Arten

ausgezeichnete Annaberg von drei Orten, von Krappitz, Leschniz oder Gr. Strehliz aus besucht werden kann.

Zum Beschluss mögen hier noch einige Andeutungen für die Excursionen in die Haupttheile unserer Gebirge folgen.

Eulengebirge. Die verschiedenen Theile desselben können entweder von der Nord- oder von der Südseite bestiegen werden. Der geläufigste Weg führt von Wüstewaltersdorf, ein anderer von Peterswaldau aus auf die hohe Eule, von der man über Dorfbach und Gläzisch Falkenberg wieder in das Thal nach zwei Seiten hinabsteigen kann. Von der hohen Eule führt ein Kammweg bis zur Sonnenkoppe, dem pflanzenreicheren Theile. Diese kann von schlesischer Seite von Langenbielau oder Steinseifersdorf, von der gläzischen am besten von Hausdorf aus bestiegen werden. — Ausserdem bietet Silberberg einen schönen Mittelpunkt um die Ausläufer und Vorberge der Eule zu besuchen, theils die Briesnizer Berge bei Frankenstein, theils das Volpersdorfer Gebirge gegen Neurode oder den Verlauf des Hauptzuges bis gegen Wartha hin.

Isergebirge. Der Besuch dieses Gebirges wird von Flinsberg aus über die Tafelfichte oder von Schreibershau aus über den Hochstein begonnen. Von dem Wirthshause an letzterem aus kann man Tagpartien machen; auch gewähren die Iserhäuser ein Unterkommen.

Riesengebirge. Von den Aufgängen zum Riesengebirge sind die drei gewöhnlichsten zum westlichen Theile von Hirschberg über Warmbrunn, Petersdorf, Schreibershau, den Zackenfall zur neuen Schlesischen Baude; zum mittleren von Schmiedeberg über Buschvorwerk, Steinseiffen, Krummhübel, die Seiffenlehne zur Hampel- und Wiesenbaude; zum östlichen von Schmiedeberg aus über Oberschmiedeberg, den Posenberg, Mittelberg und am Abhange des Forstberges zu den Gränzbauden, dann über die schwarze Koppe und den Forstkamm zur Schneekoppe. Der erste Weg führt zunächst zum Reifträger, den Schneegrabenrändern und dem hohen Rade, die beiden anderen zur Schneekoppe. Von der Schneekoppe bis zum Reifträger führt ein ununterbrochener Fussweg fast durchaus auf der Höhe des Gebirges fort, Kammweg genannt, zugleich meist der Gränze von Böhmen und Schlesien folgend. Ausserdem führen wir noch folgende, zum Theil weniger gangbare und mühsamere Wege auf die Höhe des Gebirges an, deren man sich nach Umständen mit oder ohne Führer bedienen wird. 1. Von Schreibershau über den Rocheifall nach der alten schlesischen Baude und nach der Schneegruben-Baude. 2. Von Warmbrunn über Agnetendorf

nach der Spindlerbaude. 3. Von Seydorf über die Baberhäuser und die Schlingelbaude (entweder auf dem Fahrwege über den kl. Teiche vorüber und an deren Lehne hinauf) zur Hampelbaude. 4. Von Schmiedeberg über Wolfshau und die Forstbouden zur Schneekoppe (oder vom Wolfshau durch die Melzergrube aufwärts).

Wessen Zeit beschränkt ist und wer nur eine oberflächliche Kenntniss von dem Gebirge und seiner Vegetation zu erlangen beabsichtigt, kann die Reise über dasselbe in 4-5 Tagen dergestalt zurücklegen, dass er bei Schmiedeberg beginnend den Weg über die Schneekoppe und den gesammten Kamm, dann abwärts über Schreibershau nach Warmbrunn und Hirschberg in dieser Zeit zurücklegt, und dabei eine ziemliche Zeit auf den Besuch der zur Seite liegenden vorzüglichsten Punkte, als des Riesengrundes, des kleinen Teiches und der Schneegruben und auf das Sammeln von Pflanzen verwendet. Zur genaueren Kenntniss des Gebirges ist aber durchaus eine längere Zeit erforderlich, deren Dauer man, dafern man die Hauptpunkte einigermaßen gründlich kennen lernen will, mit Rücksicht auf die von der Witterung fast immer verursachten Hindernisse, wenigstens auf vierzehn Tage anschlagen kann. Ausserdem da die Flora des Gebirges in eine erste und zweite, oder eine Frühlings- und Sommer-Periode zerfällt, von denen jene durch die Weiden, *Primula minima* und die *Anemoneae*, diese durch die *Hieracia* charakterisirt wird, wird es erforderlich sein, dass man dasselbe zweimal, und zwar das erste Mal nach Umständen der Witterung um das Ende des Mai bis Mitte oder Ende des Juni, das zweite mal aber um die Mitte des Juli, bis um die Mitte des August besucht. Will man es nur einmal besuchen, so ist die passendste Zeit etwa vom 20. Juni bis gegen Ende des Juli. Auch der spätere Herbst gewährt bisweilen noch ziemliche Ausbeute, aus den S. 17, Z. 17 v. u. angegebenen Gründen, auch einige eigenthümliche Arten. Um mit Bequemlichkeit Pflanzen sammeln, untersuchen und trocknen zu können, ist es rathsam, auf verschiedenen Punkten des Gebirges je eine der gelegenen Bouden zu seinem Standquartier für einige Tage zu wählen. Für den östlichen Theil verdient vor allen anderen den Vorzug die Wiesenbaude, auf der weissen Wiese am Abhange des Brunnenberges zunächst unter den Quellen des Weisswassers gelegen, seit vielen Jahren die Hauptherberge der böhmischen und schlesischen Botaniker. Von hier aus können auch bei milder gutem Wetter die weisse Wiese, der Kopenplan, der Rand des Weisswassers nach dem Weisswassergrunde zu und der Brunnenberg darobachtet werden. Auch kann man im Zeitraume je eines halben Tages die Schneekoppe, den Mittagsstein, die Dreisteine, die Teichränder und die Haupttheile der Lehne des kleinen Teiches

besuchen. Dagegen erfordert eine genauere Durchsuchung des Kl. Teiches mit seinen hohen und schroffen Lehnen einen ganzen Tag: man nimmt seinen Weg an dem in der Mitte des Randes hinabführenden Fusssteig, und kann wenn man am Teichbache abwärts geht auf dem von der Schlingelbaude aufwärts führenden Fahrwege über die Hampelbaude zurückkehren; ebenso die Melzergrube, in die man ebenfalls auf einem an der linken Seite hinabführenden Steige gelangt; ferner der Riesengrund, in den am Fusse der Koppe ein betretener Fusssteig hinabführt. Man wird diesen Lehnen eine genaue Aufmerksamkeit widmen, und auch ein beschwerliches Klettern an den steilen Wänden derselben, zumal am sogenannten Riesberge, so wie an den Fällen der Aupe und im sogenannten Riesengraben (unter dem Steinboden, d. i. der östlichen Koppe des Brunnenberges) nicht scheuen. Aus dem Grunde selbst, der gleichfalls manches Seltene darbietet, von den ersten Aupahäusern führt ein beschwerlicher Fusssteig zu einem der merkwürdigsten Punkte des Riesengebirges, dem Teufelsgärtchen oder Rübezahls-Lustgarten hinauf, einer schmalen Schlucht zwischen steilen Felswänden am Abhange des Steinbodens, an denen einige der seltensten Pflanzen gefunden werden. Auch können von der Wiesenbaude aus am Fusssteige nach Hohelnebe, der bei der Kapelle am Brunnenberge vorüberführt, der blaue oder der grüne Grund besucht werden. Von der Wiesenbaude aus gelangt man zu den östlichen Theilen des Gebirges entweder durch den Weisswassergrund auf einem sehr beschwerlichen, für den Botaniker nicht gerade einträglichen Pfade nach dem Dorfe St. Peters, wo am Zusammenflusse der Elbe und des Weisswassers von Osten her der lange (Peters-)Grund und die Bobergründe, von Westen her der Elbgrund und gegen Süden der Ochsengraben, der Anfang des höchst romantischen oberen Elbthales sich öffnen, oder auf einem Bergpfade längs der Südlehne des Ziegenrückens, dem sogenannten Kirchsteige, bis zu demselben Dorfe; oder drittens auf dem gewöhnlichen Kammwege über den Lähnberg und die kleine Sturmhaube zur Spindlerbaude.

Für den westlichen Theil des Riesengebirges kann man nach Umständen als festen Punkt für einige Zeit entweder die Spindlerbaude am Fusse der kleinen Sturmhaube und an der Mädewiese, oder das Dorf St. Peter, oder die Schnee grubenbaude, auch wohl die alte Schlesische Baude wählen: der geeignetste Punkt ist jedenfalls die Schnee grubenbaude, von welcher aus man in einer halben Stunde in den Grund der zweiten Schnee gruben, eines der reichsten Punkte des Gebirges, gelangen kann. Die Durchsuchung derselben, welche sich nicht auf den Grund der Grube beschränken darf, sondern auch auf die Wände und Lehnen, namentlich die west-

liche Lehne mit ihrer Basaltader erstrecken muss, erfordert wenigstens einen halben Tag. Von hier aus steigt man über den untersten Theil der Felsgräte, welche die beiden Gruben ~~abhebt~~, oder auch an deren Hinterrande auf beschwerlichen Pfaden durch Knieholz und nehen den Grubenteichen in die grosse Schneegrube. Von dieser kann man entweder aufwärts bequem auf Viehtrieben nach der Lehne der grossen Sturmhaube, oder ahwärts durch Waldsteige nach dem nach Agnetendorf führenden Commercialwege, andererseits auf schwer zu findendem Pfade nach dem Kochelfalle gelangen. — Ferner können von diesem Standpunkte aus die Elbwiese bis zum Elbfalle, die Panschewiese mit den Lehnen des Krkonos, die Kesselkoppe und Kesselgrube, von welcher ein Fahrweg über die Schlüsselbanden nach St. Peter führt, und der Elbgrund besucht werden. — Für den noch weiter westlich liegenden Theil des Gebirges bietet die neue Schlesische Baude den bequemsten Mittelpunkt dar.

Heuscheneergebirge. Das auf der Hochebene dieses Gebirges gelegene Dorf Carlsberg bietet ein hinreichendes Unterkommen und liegt bequem für eine Durchsuchung desselben nach allen Seiten. Man besteigt dieses Gebirge theils von Wünschelburg aus auf dem steilen Leierstege oder über das Käsebrett, oder bequemer von dem böhmischen Dorfe Kaltwasser, theils von der andern Seite von Reinerz über Friedersdorf oder von Cudowa her, wie denn auch der Fussweg zwischen den genannten Ortschaften über dieses Plateau führt.

Die hohe Mense und die Seefelder werden am bequemsten von Reinerz aus, über Kohlhau bestiegen.

Gläzer-Schneegebirge. Man pflegt den Gläzer Schneeberg meist von zwei Seiten zu besteigen; von Landeck aus über Schreckendorf und Wilhelmsthal durch den Klessengrund; von Habelschwerdt oder Langenau aus über Wölfelsgrund; am zweckmässigsten wählt man den einen Weg zum Hinauf-, den anderen zum Hinabsteigen; auf diesen Wegen berührt man zugleich die pflanzenreichsten Stellen der Lehnen.

Gesenke. Die Durchsuchung des hohen Gesenkes ist etwas umständlicher als die des hohen Riesengebirges, weil auf der Höhe nur wenige Wohnungen gefunden werden, welche ein gastliches Unterkommen gewähren. Am Fusse desselben sind die Ortschaften Lindewiese, Freiwaldau, Thomasdorf, Waldenburg, die Gabel und Carlsbrunn, auf der mährischen Seite Goldenstein, Winkelsdorf, Wiesenberg, Janowiz, Klein-Morau zu bemerken, von wo aus das Gebirge bestiegen werden kann. Auf der Höhe gewähren das Wirthshaus auf der Brünnelbaide (gewöhnlich erst gegen Ende des Mai eröffnet) und die Schweizerei am Altvater

ein ziemliches Obdach, auch für mehrere Tage, dieses für den östlichen, jenes für den westlichen Theil des Gebirges, wenn man nicht vorzieht wieder bis in das Thal der Biele oder Oppa hinabzusteigen; von Freiwaldau bis zur Spitze des Hockschar kann man aufwärts 5 Stunden, von der Brünnelhaide nach Thomasdorf 4, vom Altvater nach Waldenburg 5 und nach Carlsbrunn 6 Stunden rechnen. Man besteigt den Hockschar von Freiwaldau über den Bieberteich oder von Lindewiese aus und gelangt dann auf der Höhe des Kammes über den Kjöpernikstein bis zur Brünnelhaide, von da über den rothen Berg abwärts zum Passe des rothen Berges, über welchen die neue Strasse von Thomasdorf nach Winkelsdorf führt. Von hier kann man entweder nach einem dieser Dörfer herab, oder in der eingeschlagenen Richtung wieder aufwärts über die Stechpläne, den Drehberg mit grossen Hochsümpfen, den Hungerberg (mit der äusserst fruchtbaren und beachtungswerthen Hungerlehne, welche sich gegen die Türkenhäuser öffnet, und Bärenkamm zur Schweizerei am Altvater gelangen. Ist man in das Thal nach Thomasdorf herabgegangen, so steigt man über Waldenburg, den Leiterberg, und die Knoblichwiesen (sic!) wieder zum Altvater auf. Von der Schweizerei aus werden die nächsten Gründe, die Höhe des Altvaters u. s. w. besucht werden, $\frac{1}{2}$ Tag. Um den südlichen Rand des Altvaters und über den ihn mit dem Peterssteine verbindenden Sattel führt am sogen. Blumengarten vorbei der Fahrweg zum Peterssteine ($1\frac{1}{2}$ St.) der sich in dem nach Kl. Mora führenden Weg fortsetzt. Vom Peterssteine aus über die hohe Haide gelangt man in $\frac{1}{2}$ St. zum grossen Kessel, auf den man allein einen ganzen Tag verwenden muss; ferner wird man von hier aus die weitläufige hohe Haide (auch Janowizer Haide genannt) mit den an ihr liegenden Lehnen und Schluchten (über deren Namen man auch von den Anwohnern dieser Gegend keine genügende Auskunft erhält) durchforschen. Will man also von der Schweizerei aus die wichtigsten Punkte, nämlich den Hungerberg mit der Hungerlehne, den grossen Kessel und die anderen Theile der hohen Haide, nebst den Höhen des Altvater und Petersstein durchsuchen, so erfordert diess einen Aufenthalt von 3 — 4 Tagen daselbst. — Ausserdem ist der Weg von Waldenburg über die Gabel nach Carlsbrunn zu empfehlen, von wo aus die Hirschwiesen besucht werden können. Das Thal von Carlsbrunn bietet gleichfalls einen schönen Mittelpunkt zu belohnenden Excursionen, und endlich werden auch von Einsiedel der $1\frac{1}{2}$ St. entfernte Uhustein, so wie von Freiwaldau der merkwürdige Moosebruch bei Reiwiesen (3 St.) zu besuchen sein.

Für das Teschnische Gebirge ist der passendste und geeignetste Mittelpunkt der Badeort Ustron, 2 St. von Teschen, ziemlich im Mittel-

punkte des fruchtbareren Theiles am Fusse des Berges Czantory gelegen. Von hier aus kann man die Wiesen bei Ober-~~...~~, den Niedercker Schlag und die westliche Lehne der kl. Czantory nach anderer Seite hin den Berg Tul, die Ortschaften Konskau, ~~...~~, Guldau, Zeislowiz, die Machova Gora ziemlich in einem halben Tage besuchen. Mehr Zeit erfordert die genaue Durchsuehung der beiden Czantory-B. Die Besteigung des Malinow und des Berges Baranio, indem man seinen Weg im Weichselthale aufwärts durch das Dorf Weichsel ~~...~~ hin und wieder den einmündenden Schluchten einige Beachtung ~~...~~, erfordert zwei Tage und mehr. Diese Gegenden des Gebirges sind nicht ohne einen kundigen Führer zu besuchen. Der westliche Theil des Gebirges, in welchem die Lissa Hora durch ihre Höhe, die isolirte Lage und den Umfang der von ihr eröffneten Aussicht hervortritt, und welche von Krasno ~~...~~ bestiegen werden kann, ist, so viel wir theils von Anderen erfahren, theils selbst beobachteten, pflanzenarm, ja zum Theile steril. Gegen Jablunka hin, welches für diesen und den südlichen Theil bequemer liegt, wird die Vegetation wieder etwas lebendiger. — Von hier aus habe ich zweimal die galizische, 8 Meilen entfernte, Babia Gora besucht. Man legt den Weg dahin zu Wagen über Bielitz und Seynusch zurück, und bedient sich von dem am Fusse liegenden Dorfe Przyborow auf der dortigen kleinen Pferde, da der Hinaufweg lang und ermüdend ist; in der oberen Baumregion pflegt man zu bivouacquiren. Die Flora dieses ausgedehnten Berges ist noch lange nicht hinreichend bekannt, der Besuch desselben aber schon allein wegen der prachtvollen Aussicht auf die Ungarischen Gebirge, namentlich auf die frei vorliegenden Central-Carpaten oder das Tatra-Geb., zu empfehlen.

Wenn man auf dem Gebirge Pflanzen zu sammeln beabsichtigt, so versorge man sich mit einer hinreichenden Menge von Papier, das man im Riesengeb. in den am Fusse des Geb. befindlichen Papiermühlen zu Hirschberg, Giersdorf und Arnsdorf bisweilen in vorzüglicher Qualität erhält, im Gesenke aber oft schwerer zu haben ist und daher von Zuckmantel oder Neisse aus mitgebracht werden muss. Man besorge sich einen Träger für die ganze Excursion. Das Trocknen des Papiers kann in den Gebirgsbauden auf den stets heissen Oefen geschehen. Bei Gebirgsexcursionen wird man wohl thun, das Ziel für eine gegebene Zeit nie zu weit auszudehnen, wobei als Regel gelten kann, dass für das Auge die Entfernungen grösser erscheinen, sobald der Weg auf Kämmen und Höhen geht, kleiner dagegen wenn Gründe und Thäler zwischen liegen. Für den Botaniker sind scharfe Instrumente zum Graben in dem steinigen Boden, und Wasserstiefeln zum Durchsuchen der Moore uner-

lasslich: der Flechtensammler muss ausserdem mit einem Apparat von Meisseln und Hammer versehen sein. Was überhaupt bei Gebirgswanderungen zu beobachten sei, darüber geben die zahlreichen Reisehandbücher die genügende Auskunft, unter welchen das von J. C. G. Berndt v. J. 1828 an Vollständigkeit und Zuverlässigkeit den ersten Rang einnimmt.

Zum Sammeln der Pflanzen pflegt man sich lackirter Kapseln von starkem Blech, welche im Durchschnitt eine Ellipse bilden, zu bedienen: dieselben müssen wenigstens 20 Zoll Länge, einen angemessenen Durchmesser haben, der Deckel nur wenig kürzer als die Kapsel selbst sein und das Schloss desselben leicht aber fest schliessen. Häuft man darin nicht zu viel Pflanzen an und giebt man sie behutsam hinein, so lassen sie sich mit feuchtem Moose oder durch Besprengung mit frischem Wasser, was durch die Zähne in Form eines Staubregens geschehen kann, und bei grosser Hitze mehrmals wiederholt werden muss, längere Zeit frisch erhalten. Will man indess die Pflanzen nur zum Einlegen und Trocknen sammeln, so bedient man sich für kürzere Strecken bei trockner Witterung einer Mappe mit einzelnen Bogen Löschpapiers, in welche die Pflanzen alsbald, oder wenn man eine Anzahl in der Kapsel angehäuft hat, eingelegt werden: in einer solchen Mappe lassen sich in einem dünnen Päckchen eine grosse Menge Pflanzen bequem fortbringen, bis man an Ort und Stelle kommt und zum eigentlichen Einlegen Zeit gewinnt. Für Anfänger jedoch, welche jedenfalls erst die gesammelten Pflanzen betrachten, untersuchen und bestimmen müssen, ist es durchaus rathsam sich der Blechkapseln zu bedienen. Die Mappen mit Papier werden durch eine geeignete Wachstuchhülle gegen Regen geschützt und nach Belieben und nach Maassgabe der Stärke unter dem Arm oder, zumal wenn man dünne Brettchen statt der Mappen vorzieht, mit Riemen am Rücken getragen. Bei längeren Excursionen, Gebirgsreisen, muss man an einem festen Standpunkt Papiervorrath zum Ein- und Umlegen haben. Zum Sammeln der Cryptogamen, als Moose, Flechten u. dgl. sei man mit Papierkapseln von verschiedener Grösse versehen, auf die man sogleich bei dem Aufnehmen den Fundort vermerken muss, um späteren Verwechselungen vorzubeugen. Alle Arten von Süsswasseralgen müssen mit Wasser in kleinen wohlverkorkten Gläschen mit weiter Oeffnung, wie sie in den Apotheken üblich sind, aufgenommen werden. Zum Ausgraben der Wurzeln, besonders tiefer liegender, wobei grosse Vorsicht nöthig

ist, bedient man sich am besten eines Spatels, dessen Griff nur wenig schmaler als der obere Theil ist, fast von der Gestalt eines Apothekerspatels *).

Jede Pflanze muss in möglichster Vollständigkeit aufgenommen werden. Anfänger müssen besonders dazu angehalten werden, die Wurzel mit zu fassen, so dass sie von der Gestalt derselben eine ausreichende Anschauung haben. Manche Wurzeln, wie die zwiebelartigen, liegen tief, andere theilen und verzweigen sich tiefer unter der Oberfläche, manche kriechen weit hin; immer ist die Gestalt der Wurzel zur richtigen Auffassung der Vegetationsweise jeder Art unentbehrlich. Ferner bemühe man sich jede Art in allen ihren Zuständen zu sammeln und kennen zu lernen, also bald nach der Keimung und vor der Blüthe, in welcher Periode die unteren und sogenannten Wurzelblätter noch vorhanden und vollständig sind, dann zur Zeit der Blüthe, drittens gegen die oder in der Frucht reife. Es wird rathsam sein, sich von Früchten eine besondere Sammlung, etwa in Mappenkästchen, anzulegen. Es ist viel belehrender und förderlicher, weniger Arten genau und vollständig kennen gelernt, als viele oberflächlich betrachtet zu haben. Von Sträuchern und Bäumen lassen sich natürlich nur Zweige aufbewahren, jedoch nehme man diese so gross als es angeht und gleichfalls in mehreren Zuständen, da die ausgewachsenen Blätter gewöhnlich von denen der Blüthezeit in manchen Stücken abweichen, auch die der jungen, langen und saftigen Triebe, von denen der kürzer verzweigten Aeste sich bisweilen auffallend unterscheiden. Von Brombeeren und Rosen muss man auch die nicht blühenden und jährigen Triebe einsammeln. Von denjenigen, welche vor der Entfaltung der Blätter im ersten Frühlinge blühen, mache man es sich zum Gesetz, Blüten und Blätter stets von einem Stocke zu sammeln, der daher irgendwie gezeichnet werden muss; über die Weiden z. B. kann man nur so zur Gewissheit kommen und sie gründlich kennen lernen, und nur solche Exemplare sind von bleibendem Werth. Auch muss man bei diesen jüngere Blätter im Sommer und ältere im Herbst sammeln, um die mancherlei abweichenden Gestalten derselben überblicken zu können. Sobald man in der Kenntniss der Arten etwas vorgeschritten ist, wird man es auch nicht unterlassen dürfen, die Abänderungen derselben zu beachten, da man nur dadurch eine richtige Kenntniss der Arten zu erlangen vermag, und sich gewöhnt, die wesentlichen und unwesentlichen Un-

*) In Breslau werden Spatel, welche nach dieser Angabe gefertigt sind, und vor allen anderen den Vorzug verdienen, in der Eisenwaarenhandlung von Jäschke am gr. Ringe vorräthig gehalten.

terschiede rascher aufzufassen. Nur darf man nicht glauben, dass was bei dem einen der Veränderung unterworfen ist, es nothwendiger Weise auch bei anderen sein muss, sondern die Beobachtung muss uns hier stets leiten. Man möge also bedacht sein, eine und dieselbe Pflanze aus verschiedenen Umgebungen, von entfernten Standpunkten, aus feuchtem und trockenem Boden, schattigen und sonnigen Plätzen, besonders auch aus ebenen und bergigen Gegenden zu sammeln; manche Arten verändern ihr Aussehen darnach gar sehr, andere bleiben sich überall fast ganz gleich. Auch möge man nicht übersehen, dass manche in der Grösse fast gleich bleiben, andere nach Umständen variiren. In allen diesen Stücken ist auch die Witterung des Jahres, namentlich Menge und Ueberfluss von Wärme oder Feuchtigkeit von bedeutendem Einflusse. Es ist gut, dass man sich von Anfang an gewöhne, von jeder Art einige Exemplare aufzunehmen, um daran sogleich die gewöhnlichsten Abweichungen wahrnehmen zu können. Die gesammelten Pflanzen müssen sobald als möglich, frisch untersucht und bestimmt, und alsdann, wenn man will, durch Einlegen und Trocknen zur Aufbewahrung zubereitet werden.

Will man sich ein Herbarium zum Gebrauch anlegen, so müssen die Pflanzen so zubereitet werden, dass sie dem natürlichen Zustande so ähnlich als möglich bleiben und die Theile derselben am leichtesten untersucht werden können; damit lässt es sich noch immer vereinigen, denselben ihre Farbe möglichst zu erhalten und ihnen überhaupt ein gefälliges Aussehen zu geben. Man legt die Pflanzen in reines Fliesspapier oder Druckmaculatur, und zwischen je zwei solche Bogen Zwischenlagen von starkem grauen Fliesspapier, sogenanntem Schrenz, welches um so besser ist, je mehr es die Feuchtigkeit aufzunehmen taugt. Bei dem Einlegen oder Auflegen lasse man den Theilen ihre natürliche Lage, breite aber die Blätter und Theile der Blüthe, wenigstens einige, aus, so dass man ihre Gestalt und die inneren Blüthentheile übersehen kann. Dabei leistet ausser der Hand ein Messer und kleine Bleiplättchen, womit man die schon ausgebreiteten Theile festhält, gute Dienste. Man verhüte es, dass zu viele Theile über einander zu liegen kommen und entferne überflüssige Blätter oder Zweige, indem man die Basis des Stiels als Spur stehen lässt. Sehr dicke Stängel und Wurzeln kann man durchschneiden, was man auch oft zur Darlegung des inneren Baues zu thun pflegt. Wenn der Stängel der Pflanze länger ist als der Papierbogen, in welchem sie aufbewahrt werden soll, so schneide man ihn nicht durch, sondern biege ihn ein — auch zweimal um, es wäre denn, dass der untere Theil zu dick wäre. Von rasenförmig wachsenden Pflanzen, wie von vielen Gräsern, lege man, wenn es angeht, ganze Rasen auf, da hierin oft charakteristische

Merkmale liegen. Sehr zarte Blumenkronen, wie die der Iris-Arten, können noch überdiess in Blättchen feinen Papiers eingeschlossen, und dergleichen Papierstreifen zwischen die einzelnen Blumenblätter eingeschoben werden. Man hüte sich, die Pflanzen nass einzulegen, sondern trockne nass gewordene vorher in Fliesspapier ab.

Die also eingelegten Pflanzen, welche einen gleich hohen Stoss bilden müssen, bringe man zwischen zwei Brettchen, und presse sie in einer starken mit Schrauben versehenen Presse ein oder beschwere sie mit Gewichten. Ist der Stoss etwas hoch, so lege man einige Brettchen dazwischen: je mehrere, desto besser. Man presse die Pflanzen nicht zu stark; nach meiner Wahrnehmung ist als das Maximum ein Centner Druck anzusehen; bei vielen genügt schon ein halber Centner. Wir müssen dem Aussprüche Link's „*praefero rudes, parum compressas, elegantibus, maxime compressis*“ beistimmen: nur schwach gepresste Pflanzen taugen zur Untersuchung, resp. Aufweichung in warmem Wasser. Sehr stark gepresste Pflanzen gewähren zwar ein sehr hübsches Bild, halten auch vielleicht die Farbe länger, sind aber zur Untersuchung untauglich. Andererseits ist es nicht rathsam, die Pflanzen innerhalb des Papiers halb verdorren oder durch heisses Papier, oder wohl gar in Backöfen u. dergl. abdörren zu lassen. Sondern man beobachte folgendes Verfahren. Die wie beschrieben eingelegten und mässig beschwerten Pflanzen lege man nach 24 oder 36 Stunden in ganz trocknes, aber nicht warmes, Papier wieder um und wiederhole diess Umlegen in angemessenen Zwischenräumen so oft, bis die Pflanzen vollkommen trocken geworden sind. Bei trockneren Gewächsen wird diess schon nach dem zweiten, bei saftigeren nach dem dritten oder vierten Male der Fall sein, wenn man darauf achtet, dass das Papier ganz trocken sei, und wenn man hinlänglich dicke Zwischenlagen — bisweilen zu 10 — 12 Bogen — giebt; was ich ganz besonders auch für den Fall empfehlen muss, wenn man durch mehrere Tage am Umlegen gehindert sein sollte. Das feucht gewordene Papier wird entweder in Trockenöfen, wie sie die Apotheker haben, oder bei einem Bäcker, auf dem Gebirge auf den Oefen der Bauden, oder auch, was sehr zu empfehlen ist, an der Luft und Sonne getrocknet. Welchen Papier-Sorten man den Vorzug zu geben hat, wird man bald durch die Erfahrung lernen. Man kann auch, um die Pflanzen schneller zu trocknen, sie das zweite oder dritte Mal in warmes Papier umlegen, jedoch gebe ich dem kalten den Vorzug. Solche Pflanzen, deren Blätter oder Blumenblätter sehr zart sind, darf man aus ihrem Bogen nicht früher herausnehmen, als bis sie ziemlich getrocknet sind; daher lege man anfänglich nur den Bogen zwischen trockene Lagen. Pflanzen mit saftigen

Stängeln und Blättern, wie Iris, Sedum, Cactus u. a. m., werden mit einem heissen Plätteisen einigemal überfahren, bis sie gewissermassen getödtet sind; auch pflegt man sie, wie die Arten von Orchis bis zum Blütenstande durch einige Secunden in siedendes Wasser zu tauchen und dann abzutrocknen, sonst werden diese Theile missfärbig und trocknen unter Wochen und Monaten nicht.

Jedes getrocknete Exemplar versehe man mit einem Zettel, worauf der Fundort, das Datum nebst der Jahreszahl und der durch Bestimmung gefundene Name derselben vermerkt ist. Man bewahrt sie am besten in gutem und festem Schreibpapier, von nicht zu kleinem Formate (hüte sich aber vor gewissen Sorten Maschinenpapier, namentlich den durch Chlor gebleichten), entweder lose, oder, sei es auf halben, sei es auf ganzen Bogen, mit Papierstreifen angeheftet. Das Aufkleben der Pflanzen pflegt man jetzt nur bei Normalsammlungen anzuwenden. Die Arten einer Sippe werden in Hüllbogen von blauem Papiere eingeschlagen und die Sippen nach irgend einer bestimmten Anordnung zusammengelegt und in starke Mappen eingeschlossen, welche am besten mit weissen durchgezogenen Leinwandbändern zusammengehalten werden. Sehr zu empfehlen sind auch Schränke mit Fächern, deren Böden beweglich sind, so dass man sie nach Bedürfniss erweitern kann. Ein Herbarium ist desto brauchbarer, in je besserer Ordnung es sich befindet, und der Anfänger wird gut thun, sich bald daran zu gewöhnen. Man achte darauf, die Sammlung an einem trocknen Orte aufzubewahren und vor dem Einstauben zu schützen. Wenn sie grösser zu werden beginnt, so muss man darauf denken, sie vor den zerstörenden Insekten, d. i. namentlich den Larven von *Ptinus Fur*, einem *Anobium* und dem *Chironomus pulsatorius* (Papierlaus) zu schützen; von allen bisher vorgeschlagenen Mitteln scheint das sicherste, wenn auch nicht durchaus probate, zu sein, das Bestreichen mit oder Eintauchen in Sublimatauflösung; man kann die Pflanzen entweder darin völlig einweichen und dann nochmals einlegen und trocknen, oder auch die trocknen mit einem Pinsel bestreichen. Ob diess Verfahren den Pflanzen anderweitig nachtheilig werde, darüber habe ich keine Erfahrung; doch habe ich in fünf Jahren, seitdem ich es anwende, nichts der Art wahrgenommen. Oeftere Durchsicht der Sammlung schützt dieselbe am besten vor Verderbniss, was allerdings nur so lange angeht, als sie noch nicht von grossem Umfange ist.

Das Bestimmen der Pflanzen hat seine besonderen Schwierigkeiten und hier bedarf es vorzüglich der Anweisung des Lehrers. Wären die Linnéischen Classen das, was sie scheinbar sind, wirklich, nämlich ächt künstliche, d. h. gäbe es keine Ausnahmen, so wäre das Bestimmen dar-

nach freilich das bequemere und leichtere; man mag sich denn auch, so lange es nicht anders geht, der von Pag. xix. bis XLVIII. gegebenen Uebersicht bedienen, um zum Namen der Sippe zu gelangen, unter die eine vorliegende Art gehört. Deenoch rathen wir auch den Anfängern, sich bald in der Bestimmung nach der natürlichen Classification zu versuchen, sobald er die nöthigen Grundbegriffe gefasst und Einsicht in die Hauptabtheilungen erlangt hat, weil diese Uebung förderlicher und belehrender ist; hierzu ist allerdings erforderlich, dass die Pflanze vollständig mit Blüthe und Frucht vorliege. Zunächst ist nach den angegebenen Kennzeichen die (Classe und die) Familie zu ermitteln, welcher sie angehört; die Sippe und die Art wird sich dann bei einiger Aufmerksamkeit mit Sicherheit ergeben. Hat man aus den Hauptfamilien einige Arten auf diesem Wege kennen gelernt, so erkennt man dann die Verwandten an dem Totaleindrucke, den der sogenannte habitus macht, bald wieder. Zur richtigen Erkennung der Arten wird man auch auf den in der Flora angegebenen Standort und die Blüthezeit, so wie die in den Anmerkungen beigefügten Merkmale zu achten haben. Bei der Untersuchung bedient man sich einer einfachen Loupe, mit einem oder zwei Gläsern. Zur Untersuchung der Cryptogamen so wie des innern Baues und der Elementartheile der Phanerogamen, bedarf man eines zusammengesetzten Microscopes, von der Art, wie sie in den Werkstätten von Schiek in Berlin und Plössl in Wien gefertigt werden.

Geschichte
der
Schlesischen Flora.

Die ersten Notizen, welche sich über einige Schlesische Pflanzen vorfinden, giebt der berühmte Leibarzt des Kaiser Rudolph des Zweiten *P. Andr. Mathiolus* (+ 1577), der erste Botaniker, welcher das Schlesische Riesengebirge besuchte, und des daselbst wachsenden *Geum montanum* gedenkt*). Einiger Gewächse des Gesenkes, namentlich des *Delphinium elatum*, *Gentiana punctata*, *Ledum palustre* und *Vaccinium uliginosum* gedenkt *Carol. Clusius* in der *Historia rariorum stirpium per Pannoniam Austriam etc. observatarum*, Antverp. 1583, welche ihm der Geheimerath des Bischofs zu Breslau *Achilles Cromer* zu Neisse geliefert hatte. Derselbe gedenkt auch des Arztes *Friederich Sebiz*, von dem er *Andromeda polifolia* erhielt. Die italienischen Botaniker *Paolo Boccone* und *Peter Anton Micheli* berührten auf ihren Reisen bald vor und nach 1700 auch Schlesien, der erstere auch Breslau, und gaben in ihren Werken Kunde über mehrere Schlesische Pflanzen.

Der hirschbergische Arzt *Caspar Schwenkfelt*, (geb. zu Greifenberg 1563, starb zu Görlitz 1609) gab zuerst ein Verzeichniss der Naturprodukte Schlesiens nach den drei Reichen, in welchem auch die Pflanzen nach den vor Linné üblichen Benennungen nach dem Alphabet aufgeführt und von einigen Synonymen, Citaten und den gebräuchlichsten Provinzialnamen, hie und da auch von einigen Bemerkungen, welche theils die Gestalt, theils den medizinischen Gebrauch betreffen, begleitet sind. Seine Kenntniss der Schlesischen Gewächse ist mit Rücksicht auf seine Zeit nicht unvollkommen, und als erster Versuch hat dieses Werk kein gemeines Verdienst. Voran geht eine Beschreibung von Schlesien und

*) Commentar. in Dioscoridem Lugd. 1554. Siehe hierüber und über die nächst folgenden, wie auch über Schwenkfelt, Volkmann und Mattuschka *Göppert*, in *Schles. Provinzialbltt.* 1832. IV. VIII. IX., *Treviranus*, ebendasselbst 1830. XI.

Eintheilung der Vegetation nach den Bodenverhältnissen. Die Beschreibung der Pflanzen ist in zwei Büchern abgefasst, von denen das erste die wildwachsenden, das zweite die damals in Gärten cultivirten aufzählt. Die Zahl der wildwachsenden, die Cryptogamen mit eingerechnet, beträgt 898, darunter die meisten seltneren Sudetenpflanzen. Er schied die gebauten sehr genau von den wildwachsenden. Das Werk führt folgenden Titel: *Stirpium et Fossilium Silesiae Catalogus, in quo praeter etymon, natales, tempus, natura et vires cum variis experimentis assignantur, concinnatus per Casparum Schwenkfelt, Reip. Hirschb. Phys. Ordinar. cum indice remediorum.* Lips. 1801. 4o.

Der Arzt *Israel Volkmann* zu Liegniz, von 1660 — 1706 beschäftigte sich eifrig mit der Erforschung der vaterländischen Flora und besuchte öfter das Riesengebirge. Ein grosses Werk, das die Beschreibung einheimischer und ausländischer Pflanzen umfasste, und zu welchem sein Sohn *Ge. Ant. Volkmann* eine grosse Anzahl Abbildungen fertigte, war bis zum Jahre 1710 zu 10 Folio-Bänden herangewachsen, unter dem Titel *Phytologia magna*, fand aber keinen Verleger und befindet sich gegenwärtig auf der Kgl. Bibliothek zu Dresden.

Ueber ein in London 1717 in Folio unter dem Titel *Jacobi Petiveri Plantae Silesiacaе rariores ac desideratae ex Schwenkfeldio excerptae et methodo Rajano dispositae* erschienenes Kupferwerk fehlt uns nähere Kunde.

In des *Gottfr. Heinr. Burghart*, Arztes zu Breslau und Brieg, *Jte Sabothicum*, Breslau u. Leipzig 1736 befindet sich p. 126 — 138 eine Aufzählung von 90 auf dem Zobtenberge gefundenen Gewächsen.

Der Breslauische Arzt *Chr. Gottfr. Rudolph*, geb. 1732 starb i. J. 1767 noch ehe er seine *Flora Vratislaviensis*, die er in eine *Flora Silesiaca* zu erweitern gedachte, herausgeben konnte. Sein literarischer Nachlass kam in die Hände des Grafen von *Mattuschka*.

Der Graf *Heinr. Gottfried von Mattuschka*, geb. zu Jauer 1734, starb 1779, ist der Begründer der Pflanzenkenntniss in Schlesien. Seine Schriften, welche noch heut gesucht werden, haben kein geringes Verdienst, und wenn man bedenkt, dass die Sammlung der Schlesischen Flora und die Bestimmung derselben nach den Linnéischen Namen — wovon der grösste Theil richtig war — ganz allein seine Arbeit und dass er fast ohne Vorgänger war, so muss man den Eifer, die Ausdauer und die Sorgfalt seiner Leistungen dankbar anerkennen. Nach der Weise seiner Zeit wandte er keine Mühe auf Beschreibung oder kritische Sichtung der Arten, es lag ihm nur daran, die gefundenen Pflanzen nach der Lin-

neischen Nomenclatur richtig zu bestimmen und den Pflanzenfreunden der Provinz ein Hilfsbuch zur Erkenntniss der Arten in die Hand zu geben. In seiner ersten in deutscher Sprache geschriebenen Flora Silesiaca, Breslau bei W. G. Korn 1. 2. in 8o. 1776. 77., gab er weitläufige Beschreibungen der Pflanzen nach Haller's und Jacquin's Muster und fügte eine reichhaltige Sammlung aller üblichen deutschen Benennungen und Synonyme, von denen er viele in Schlesien selbst gesammelt hatte, hinzu; ausserdem Bemerkungen über medizinischen und ökonomischen Gebrauch, die mit ausführlicher Sorgfalt gesammelt waren. Bei seinem zweiten Buche der Enumeratio Stirpium in Silesia sponte crescentium, Breslau bei W. G. Korn 1779, 8o., hatte er mehr und hauptsächlich die Botaniker im Auge; in dieser Schrift zeigten sich die bedeutenden Fortschritte, welche seine Kenntniss gemacht hatte, in der grösseren Zahl der Arten, — man findet hier schon mit wenigen Ausnahmen sämtliche häufiger vorkommende Schlesische Pflanzenarten, soweit sie damals unterschieden werden konnten, und auch viele seltene aufgeführt, — in deren theilweise richtigeren Bestimmung, so wie auch in den hier und da angehängten, die Kennzeichen der Art angehenden Bemerkungen, welche von ihm selbst herrühren. Sie umfasst mit Einschluss der Cryptogamen 1221 Arten. Lange Zeit hindurch blieb dieses Buch das einzige Hilfsmittel zur Bestimmung für Anfänger. Eine Sammlung von Abbildungen, Handzeichnungen und Abdrücken nach Kniphofscher Manier von ihm selbst illuminirt oder aus der Oesterreichischen Flora von Jacquin copirt, die seine Veröffentlichung ihn der Tod hinderte, so wie sein Herbarium, welches noch gegenwärtig von der Familie aufbewahrt. Unter den von Martussekka in der Enumeratio aufgeführten Arten sind bisher in Schlesien nicht aufgefunden worden und daher entweder verschwunden, oder was vom grösseren Theile gelten mag, unrichtig bestimmt, folgende: *Iris germanica* u. *squalens*, *Agrostis minima*, *Stipa pennata* u. *juncea* (beide vielleicht noch aufzufinden), *Briza Eragrostis*, *Bromus squarrosus* (vielleicht *B. patulus*), *Cynosurus durus* (auch von v. Albertini in Zobten angegeben), *Plantago subulata*, *Galium glaucum* (vermuthlich *G. sylvaticum*), *Lithospermum purpureo-coeruleum*, *Anchusa tinctoria*, *Certusa Matthioli*, *Campanula speculum* u. *hybrida*, *Lonicera alpigena* (wahrscheinlich eine Form der *L. nigra*), *Gentiana lutea*, *Caucalis leptophylla*, *Scandix Pecten*, *Seseli tortuosum* u. *saxifragum*, *Aethereum Liliago*, *Ornithogalum pyrenaeum*, *Epilobium latifolium*, *Polygonum viviparum*, *Saxifraga Cotyledon* (siehe diese S. Atzen und diese ehemals im

Riesengebirge gesammelt worden sein?), *Stellaria dichotoma*, *Adonis vernalis*, *Sideritis montana*, *Betonica Alopecuros*, *Melissa Calamintha* u. *Nepeta*, *Lepidium alpinum* (*Cardamine resedifolia*?), *Geranium lucidum*, *Fumaria capnoides*, *Scorzonera laciniata*, *Crepis foetida*, *Prenanthes viminea*, *Lactuca quercina*, *Carduus defloratus* u. *tuberosus*, *Gnaphalium Stoechas*, *Senecio incanus* u. *paludosus*, *Buphtar* ~~salicifolium~~, *Centaurea Calcitrapa*, *Satyrion hibernicum*, *Ophrys insectifera*.

In den Jahren 1787 und 1790 erschienen die beiden ersten Bände der Schlesischen Flora von *A. J. Krocke* unter folgendem Titel: *Antonii Joannis Krocke, Medic. Dr. Flora Silesiaca renovata, emendata, continens Plantas Silesiae indigenas, de novo descriptas, ultra nongentas, circa mille auctas, nec in Flora Silesiaca pristina, nec in Enumeratione stirpium Silesiacarum reperiundas, secundum systema sexuale Linnaei digestas, rariores tabulis aeneis illuminatis illustratas. In operibus Linnaei non inventas, ex aliis clariss. auctoribus determinatas vel determinandas. Vratislav. sumpt. Guil. Theoph. Korn. 8o. I. 689. p. II. p. 1. 406 p. p. 2. 522 pag.* Diese beiden Theile begreifen die ersten 19 Linnéischen Classen. Der dritte Theil erschien auf Kosten des Verfassers im J. 1814, wo es auf dem Titel heisst: *nunc ultra ter mille plantas Silesiae indigenas auctae*, mit einem Index, enthält 374 Seiten und schliesst die 23ste Classe mit Nummer 1823. Sie enthalten auf 105 Tafeln Abbildungen einiger seltneren, aber auch vieler gemeinen schlesischen Pflanzen von geringem Werthe; die im dritten Theile befindlichen 9 Tafeln sind illuminirt. Diesen folgten endlich im J. 1823 zwei Bände unter dem Titel: *Antonii Krocke Supplementum seu Volum. IV. Flora Silesiaca etc.*, 345 und 334 Seiten, mit 4 Kupfertafeln, worin bis zur neunzehnten Classe einschliesslich noch 780 Pflanzen aufgeführt sind. Krocke war geboren zu Breslau im Jahre 1743 und starb als praktischer Arzt und Geh. Medizinalrath daselbst im J. 1823. Sein Herbarium befindet sich noch im Besitze der Familie. Sein Verdienst besteht darin, dass er eine namhafte Anzahl neuer Arten theils in den Umgebungen von Breslau, theils in entfernteren Theilen der Provinz, zumal Oberschlesiens, auffand, und allen Varietäten und abweichenden Formen grosse Aufmerksamkeit widmete. So wurden von ihm zuerst *Limosella*, *Lindernia*, *Cuscuta monogyna*, *Leonurus Marrubiastrum*, *Juncus atratus*, *Senecio barbaeifolius*, *Leersia oryzoides*, *Polycarpum*, beobachtet; einige Selten-

heiten der Gegend von Grosstein bei Opatowitz aufgeführt, die Gegenden von Leobschütz und das Riesengebirge näher untersucht. Manche von den von ihm zuerst aufgeführten Arten verdankte er den Beiträgen theils seiner Schüler (er macht Menzel, Schmid, Giesche, Pilz, Wolf, Neugebauer namhaft), theils der noch zu erwähnenden Starke, Blottner, Weigel, Günther und des Oeconomie-Inspector Löwe. Schon aus der Anzahl der von ihm aufgeführten phanerogamischen Arten, welche in den drei ersten Bänden sich auf 1823 und mit den im Supplementum aufgeführten auf 2603 beläuft, kann man bemessen, dass die hier aufgeführten Arten theils nicht wirklich dergleichen sind, theils nicht als einheimische angesehen werden können. Fürs erste sind viele aus Gärten stammende, sogenannte *auguae hortorum*, oder in Gärten gebaute, mit der Bemerkung: „*otiam extra hortos*“ in die Reihe aufgenommen; zweitens sind sehr viele Varietäten und Formen mit geringfügigen Abweichungen, zumal in dem Supplementum als Arten aufgeführt; drittens setzte Kr. zu grosses Vertrauen in die Angaben anderer, welche bisweilen sein Zutrauen gemissbraucht haben mögen und nahm manche Angaben Mattuschka's und Schmidt's ohne nähere Prüfung auf. In der Bestimmung der Arten war Kr. nicht immer ganz glücklich, wie man denn bei ihm unter anderen *Valeriana dioeca* als *V. saxatilis*, *Juncus capitatus* als *Schoenus ferrugineus*, *Plantago arenaria* als *P. Psyllium*, *Stellaria uliginosa* als *St. lateriflora* n. sp., *Potentilla Güntheri* als *P. opaca*, *Geum rivale monstrosum* als *Anemone dodecaphylla*, *Lindernia Pyxidaria* als *Anagaloides procumbens* n. g. et sp., *Crepis virens* als *C. pulchra*, *Senecio tenuifolius* als *S. squulidus*, *Orchis maculata* als *O. candidissima* n. sp. und *O. angustifolia*, *Carex Drymeja* als *C. pendula*, *Dactylis glomerata* als *Aira antartica* abgebildet, und *Corrigiola* als *Polygonum ramosissimum*, *Carex limosa* als *C. magellanica* u. s. w. aufgeführt findet.

In *Fr. Willib. Schmidt's Flora Boemica inchoata* Cent. 1 — 4. Prag 1793 u. 94. sind eine Anzahl Pflanzen des Riesengebirges aufgeführt, von denen manche heutiges Tages vergeblich dort gesucht werden, manthe wohl auch nie dort vorgekommen sein mögen und sich von falschen Angaben herschreiben. Schmidt hat manche Varietäten als Arten beschreiben und sich auf unzuverlässige Angaben verlassen, auch aus Mattuschka und Krocker Mehreres ohne weiteres aufgenommen. Die daselbst aufgeführten Arten, welche nicht wieder im Riesengebirge aufgefunden worden sind, sind *Veronica fruticulosa*, *Satyrion alpinum* und *nigrum*, *Arachnites alpina* und *musciflora*, *Valeriana saxatilis*, *Gentiana purpurea*, *acaulis* und *lutea*,

Androsace lactea, *Myosotis nana*, *Viola alpina*, *Ornithogalum pyrenaicum*, *Narthecium ossifragum*. Andere sind falsch bestimmt oder nur Formen bekannter Arten.

C. Ludw. Blottner, geb. zu Fraustadt in Schlesien 1773, starb als Brunnenarzt zu Reinerz 1802, ein Schüler Wildenows, hatte bei Weigel in Haselbach sich mit der Flora des Riesengebirges bekannt gemacht, und lieferte Krocker und Günther mehrere Beiträge zur Schlesienschen Flora aus dem Riesengebirge und der Grafschaft Glaz. Er schrieb Botanische Beiträge in Hoffmann's Flora von Deutschland 1800, und einzelne Notizen in der von ihm herausgegebenen Gläzischen Monatschrift, worin er unter andern die *Primula glaciensis* vom Ratschenberge (d. i. eine einblüthige Varietät von *Primula elatior*) beschrieb.

Joh. Chr. Starke, geb. zu Driesen in der Neumark 1744, Pastor zu Gr. Tschirnau bei Gubrau seit 1775, starb daselbst d. 1. Juni 1808, hat sich viel mit Botanik überhaupt, insbesondere auch mit der Erforschung der Schlesienschen Flora beschäftigt. Er war ein erfahrener Pflanzenkenner und umsichtiger sorgfältiger Forscher und stand mit Wildenow und andern botanischen Notabilitäten in Verkehr, mit Günther in ununterbrochener Correspondenz. Sein Herbarium befindet sich im Besitze der Schlesienschen Gesellschaft für vaterländische Cultur, und die Schlesienschen Exemplare desselben sind dem Schlesienschen Herbarium derselben mit Starkes eigenen Bemerkungen einverleibt. Ausserdem, dass er viel zur richtigen Bestimmung der Schlesienschen Gewächse beitrug, hat er namentlich zuerst *Arenaria tenuifolia*, *Polygala amara* und die noch nicht wieder aufgefundene *Salix Starkeana* Willd. (*S. depressa* Linn.) gefunden.

Ignaz Seliger, geb. 1752, starb als Pfarrer und erzbischöflicher Notar zu Wölfelsdorf und Uhrniss in der Grafschaft Glaz am 30. April 1812, war ein eifriger Pflanzenforscher und durchsuchte mit einem unermüdlichen Eifer seine Umgebungen, namentlich den Gläzer Schneeberg. Sein Hauptaugenmerk verwandte er auf die Cryptogamen, vorzüglich die Moose, Lebermoose und Pilze, namentlich die kleineren Holzpilze und seine reichhaltigen Sammlungen davon, die zum Theil in die Hände Günthers kamen, haben noch spätern Untersuchungen viel Interessantes dargeboten. Siehe Weigel's geogr. Beschreibungen von Schlesien III. p. 114.

Joh. Adam Valent. Weigel, geb. zu Sommerhausen bei Würzburg 1740, starb zu Haselbach bei Schmiedeberg in Schlesien i. J. 1806. Die Naturaliensammlung seines Verwandten Dr. Treu zu Nürnberg hatte die Liebe zum Naturstudium erweckt, dem er auf der Universität Altorf

und auf mehreren Reisen oblag. Seit 1778, wo er Prediger zu Haselbach wurde, liess er sich die Erforschung der Schlesischen Flora und Fauna angelegen sein, deren Resultate er in dem Schlesischen Pflanzenkalender oder Verzeichniss der in Schlesien wildwachsenden Pflanzen, wie sie in jedem Monate blühen, 1791. 8. *) und in der Geographischen, naturhistorischen und technologischen Beschreibung des Herz. Schlesiens I — IX. 1800 — 1806 mittheilte. Unter den von ihm aufgefundenen Arten ist die *Salix Weigeliana* Willd. (d. i. *S. phyllicifolia* Linn. nach Fries) die bekannteste, in der Beschr. v. Schl. 2, pag. 93 als *S. arbuscula?* *myrsinites* aufgeführt. In dieser Beschreibung findet man Verzeichnisse der Floren der einzelnen Fürstenthümer und zwar: I. p. 35. vom F. Schweidnitz, II. p. 66. vom F. Jauer, III. p. 15. vom F. Münsterberg, p. 104 vom F. Brieg, IV. p. 49. von den Seefeldern, p. 94. von der Grafschaft Glatz, V. p. 24. vom F. Liegnitz, p. 161. vom F. Glogau, VI. p. 42. vom F. Breslau, VII. p. 11. vom F. Oels, VIII. p. 48. vom F. Oppeln. Ein Theil der hier aufgeführten Arten ist unter Angabe dieser Autorität aus Krockers Flora aufgenommen.

Nicht unwichtige Beiträge zur Kenntniss der Flora des Riesengebirges lieferte *Thadd. Hänke* in den Beobachtungen auf einer Reise in das Riesengebirge, Dresden 1791. in 4. Besonders diente die genaue Beobachtung zur Berichtigung früherer unsicherer Angaben. Bekanntlich unterschied Hänke zuerst die Krummholzkiefer unter dem Namen *Pinus Pumilio*.

Der Gärtner *Ludwig* zu Meffersdorf untersuchte behufs seiner verkäuflichen Moossammlungen besonders die Cryptogamen — vorzüglich die Moos-Flora des Riesengebirges.

Eine neue Periode in der Erforschung der Schlesischen Flora begann mit *C. Chr. Günther*, Apotheker und Medizinalassessor zu Breslau, geb. zu Jauer den 10. October 1769, gest. zu Breslau den 18. Juni 1833. Nachdem er unter Wildenow's Anleitung eine Vorliebe für die Botanik gefasst und dieselbe in dem Naturalienkabinet des Apotheker Meyer zu Stettin bekräftigt hatte, machte er sich die Erforschung seiner vaterländischen Flora zur Aufgabe, und indem er mit allen Freunden der Naturkunde, besonders der Botanik, Verbindung anknüpfte und unterhielt, blieb er lange Zeit der Mittelpunkt aller hierauf gerichteten Bestrebungen. Er erkannte, dass es zur Belebung des Interesses und zur dauerhaften Vereinigung der Schlesischen Pflanzenfreunde kein geeigneteres

*) Diese Schrift zu erlangen, ist mir bisher noch nicht gelungen.
Wimmers Flora. Thl. II.

Mittel gebe, als eine Sammlung der Schlesischen Pflanzen in getrockneten Exemplaren zu veranstalten; und hatte er dabei auch die Förderung der vaterländischen Pflanzenkunde im Auge, so mochte er bei dem Beginne dieses Unternehmens doch noch nicht ahnen, dass er hierdurch die erste und festeste Grundlage zu den künftigen die Schlesische Flora betreffenden Arbeiten legen würde. Im Jahre 1811 kam Günther auf den, wie gesagt, höchst glücklichen Gedanken, ein Herbarium vivum der Schlesischen Phanerogamen, mit Einschluss der Farnkräuter, auf Subscription centurienweise herauszugeben, und nachdem er den um die Naturkunde in Schlesien hochverdienten Schummel zum Theilnehmer gewonnen hatte, wurde sofort an die Ausführung gegangen. Obwohl sich kaum 30 Subscribenten meldeten, und die Kosten dieses Unternehmens den Ertrag um mehr als das Dreifache überstiegen, setzte er dasselbe mit beharrlicher Ausdauer bis zur fünfzehnten Centurie, später unter Grabowski's und meiner Mitwirkung fort. Dieses Unternehmen hatte zur Folge, dass alle Theile Schlesiens, in denen sich ein Pflanzenfreund oder Kundiger fand, eifrig durchsucht, und von den Theilnehmern desselben häufige Reisen nach allen Theilen, zmal des Gebirges unternommen wurden, dass ferner von sämmtlichen Arten eine grosse Menge gesammelt und die wichtigeren Abänderungen sorgfältig beobachtet, aus den schwierigeren Sippen aber die zahlreichsten Sammlungen zusammengebracht wurden, dass endlich alles und zumal das minder Geläufige und Sichere sorgfältig und zu wiederholtenmalen untersucht und theils den stimmberechtigten Monographen, theils anderen berühmten Botanikern zur Begutachtung vorgelegt wurde. In den späteren Centurien wurden besonders die schwierigeren Sippen: *Rosa*, *Rubus*, *Mentha*, *Hieracium*, *Salix*, in den hervorstechendsten Formen und mit den wichtigsten Abänderungen gegeben. Um den Inhalt der Centurien und überhaupt den Umfang der phanerogamischen Flora von Schlesien übersichtlich vor Augen zu legen, liess Günther im Verein mit Grabowski und mir im Jahre 1824 eine *Enumeratio stirpium phanerogamarum quae in Silesia sponte proveniunt* in Breslau bei Korn erscheinen. Auch den Cryptogamen widmete Günther unablässige Aufmerksamkeit, und in Verbindung mit Seeliger, Starke, v. Flotow u. a., brachte er eine reiche Sammlung auch der Schlesischen Arten zu Stande, welche den Bearbeitern dieser Familie manchen nicht unwesentlichen Dienst geleistet hat*).

*) Einen Abriss seines Lebens und Wirkens siehe in Schles. Provinzialblätter, Januar 1834.

Emil Schummel, Sohn des auch in der schriftstellerischen Welt rühmlichst bekannten Professor Schummel am Elisabetanum zu Breslau, geb. daselbst am 23. Mai 1785, gegenwärtig Lehrer an der chirurgischen Lehranstalt und mehreren Schulanstalten Breslaus, wurde zur Beschäftigung mit der Naturkunde besonders hingeführt durch den oben-erwähnten Pastor Weigel, bei welchem er einen Theil seiner Knabenjahre verlebte. Seinem scharfen Blicke, seiner vorurtheilfreien Beobachtung und unermüdlichem Fleisse gebührt der Ruhm, die Flora seines Vaterlandes zuerst in ein helleres Licht gesetzt zu haben; er durchforschte auf zahllosen Excursionen nicht allein die Umgegend von Breslau nach allen Richtungen, sondern auch, und zwar mit Vorliebe, die Gegenden des Riesen- und Gläzer-, so wie des gesammten Schlesischen Vorgebirges; nicht leicht sind die genannten Gegenden von einem andern so genau und so vielfältig durchsucht worden. Ihm haben wir daher die erste Auffindung einer Menge von Arten, die Berichtigung vieler in den früheren Floren befindlicher Irrthümer, so wie nicht minder die Unterscheidung mehrerer bis dahin noch nicht bekannter Arten zu verdanken. So wurden von ihm zuerst *Alchemilla fissa*, *Rhinanthus pulcher*, *Ranunculus nemorosus* (noch ehe er von Decandolle beschrieben wurde) als selbstständige Arten unterschieden, und die hybride Natur der *Salix rubra* Huds. erkannt. Schummel trat zwar nicht als Schriftsteller im Gebiete der vaterländischen Flora auf, aber es muss ausdrücklich erwähnt werden, dass er nicht nur durch seine vieljährige Thätigkeit, auch als Mitherausgeber der *Centurien*, unseren späteren Arbeiten die bedeutendste Förderung und wichtigste Vorlage verschafft hat, sondern auch durch eine lange Reihe von Jahren die Jüngeren durch Lehre und Beispiel angeleitet und der Führer aller Beflissenen, namentlich der jüngeren Pharmaceuten, gewesen ist, wo er die keimende Neigung zu befeuern, die entstandene zu bekräftigen und zu leiten bemüht war.

Heinrich Grabowski, geb. zu Leobschütz im Jahre 1792, erlernte die Pharmacie bei Günther, versah durch eine Reihe von Jahren die Bade-Apotheke zu Cudowa, wurde dann Apothekenbesitzer zu Oppeln, und starb zu Breslau am 1. October 1842. Die Schlesische Flora hat seinem geübten Blicke und seiner ausdauernden Liebe zu deren Erforschung sehr viel zu verdanken. Die Umgebungen von Cudowa durchforschte er genau, und er benutzte die Gelegenheit, welche die Grafschaft Glaz, namentlich die hohe Mense bot, eine fast immense Sammlung der dort vorkommenden *Aconitum*-Formen zusammenzubringen, eine Arbeit, welche uns, wenn auch nur auf negative Weise, ihre guten Früchte getragen hat. Von allen Botanikern Schlesiens hat er zuerst das Gesenke genauer durch-

sucht, und durch Aufspürung der wichtigsten Punkte desselben dieses interessante Gebirge gewissermassen den Botanikern aufgeschlossen; er hat dasselbe acht und zwanzigmal bereiset und darin Vieles neue und merkwürdige entdeckt. Ebenso wurde von ihm zuerst das Teschnische Gebirge besucht. Nächst dem besteht sein Hauptverdienst, das Fincke mit ihm theilt, in der genauesten Durchforschung der Umgebungen von Oppeln und in der Sammlung aller zu erlangenden Materialien zu einer Flora von Oberschlesien. Er nahm seit 1819 an der Herausgabe der Centurien, im J. 1824 an der der Enumeratio etc. und 1827 — 29 an der der Flora Silesiae etc. Theil. In den letzten Jahren stellte er das Resultat seiner Bemühungen um die Oberschlesische Flora in der „Flora von Oberschlesien und dem Gesenke, Breslau bei Goschorsky 1843“ zusammen, deren Vollendung und Publikation er selbst nicht mehr erlebte*).

Der *Verfasser dieser Flora* hatte längere Zeit hindurch an der Herausgabe der Schlesischen Centurien, so wie der Enumeratio etc. Theil genommen, als er mit der Genehmigung Günthers daran ging, die zahlreichen Vorarbeiten und ziemlich vollständigen Materialien, welche hauptsächlich durch Schummels, Günthers und Grabowskis Bemühungen zu Stande gekommen waren, im Verein mit letzteren zu einem Gesamtbilde der phanerogamischen Vegetation Schlesiens zu verarbeiten. So kam die Flora Silesiae, Vratislav. Korn. 3 Tomi in 8. 1827 — 29 zu Stande, eine Arbeit, der es zum Verdienst gemacht worden ist, dass die Arten nach sorgsamer und vorurtheilsfreier Beobachtung unterschieden und begränzt, die Abänderungen genügend beachtet und die Beschreibungen nach der Natur entworfen waren; die Verfasser erkannten selbst nur zu gut die nicht unerheblichen Mängel derselben. Im Jahre 1832 folgte eine Bearbeitung in deutscher Sprache (Flora von Schlesien. Handbuch zur Bestimmung und Kenntniss der phanerogamischen Gewächse dieser Provinz etc. Berlin bei Rücker), und im Jahre 1840 eine neue nach der Ordnung des natürlichen Systems (Flora von Schlesien, preussischen und österreichischen Antheils u. s. w. Breslau bei Hirt). Er liess es sich angelegen sein, die vorzüglichsten Gegenden der Provinz aus eigener Anschauung kennen zu lernen und deren Flora, so viel als möglich, selbst zu erforschen; bei der Bereisung des Teschnischen Gebirges wurde von ihm auch zweimal die Babia Gora in Galizien besucht, wo zuerst *Luzula spadicea*, Ce-

*) Eine Biographie desselben siehe in Nowack's Schriftsteller-Lexicon.

rastium alpinum und Sedum purpureum gefunden wurden. Folgende Arten wurden von ihm zuerst in Schlesien beobachtet oder unterschieden: Polygala comosa, Viola Riviniana, stricta und pratensis, Malva borealis, Stellaria Friesiana, Cerastium brachypetalum und alpinum, Epilobium virgatum, Asperula Aparine, Valerianella Auricula, Crepis sibirica, Cuscuta Epilinum, Myosotis caespitosa, Orobanche pallidiflora, Mentha rubra, Salix hippophaëfolia, Ceratophyllum submersum, Caulinia fragilis, Potamogeton obtusifolius und pectinatus, Orchis incarnata, Gladiolus Boncheanus, Juncus fusco-ater, Dichostylis Micheliana, Eriophorum gracile, Carex stricta und caespitosa, Calamagrostis Halleriana, Avena praecox, Bromus erectus. Auch hat sich derselbe die fortgesetzte Beobachtung der Sippen Rubus, Hieracium und Salix, über deren Arten-Unterscheidung unter den Botanikern noch immer grosse Divergenz der Ansicht herrscht, zur Aufgabe gemacht, und die Beobachtung der in Schlesien vorkommenden Wasseralgen wenigstens begonnen.

von *Mückusch*, k. k. Hauptmann in Troppau, unternahm wiederholte Wanderungen in das Gesenke, über dessen Flora wir durch ihn die ersten Mittheilungen erhielten, wovon ihm jedoch nur einige der zugänglichsten Theile bekannt waren; manche seiner Angaben aus dem Gesenke und Troppauer Kreise haben sich nicht bestätigt. Er verehrte der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur eine Sammlung getrockneter Pflanzen jener Gegenden, welche dem Schlesischen Herbarium einverleibt worden ist.

Augustin Schramm, Professor am Gymnasium zu Leobschütz, durchsuchte mit Sorgfalt und Genauigkeit die Gegend um Leobschütz, worüber er in zwei kleinen Schriften: Die Pflanzen des Leobschützer Stadtwaldes, 1833, und: Die seltneren Pflanzen der Schles. Flora in den Umgebungen von Leobschütz, 1840, welche als Schulprogramme erschienen, Mittheilung machte. Von ihm wurden unter anderen Elatine Hydropiper und Alsinastrum, Campanula bononiensis, Carex pilosa zuerst in Schlesien aufgefunden.

Endler, Kupferstecher zu Breslau, hat in seinem als Zeitschrift erschienenen Kupferwerke, der Naturfreund, in 11 Bänden, Br. 1809—1824, eine Anzahl Schlesischer Pflanzen, theils nach wildgewachsenen, theils nach Garten-Exemplaren, grösstentheils naturgetreu und geschickt, aber meist nicht vollständig genug, abgebildet.

Treviranus, L. Chr., Professor der Botanik, früher zu Breslau, gegenwärtig in Bonn, hat auf mehreren Excursionen einige Beiträge zur Schlesischen Flora gegeben: er entdeckte bei Breslau *Lycopodium inundatum*, am Geiersberge mit Schummel die *Euphorbia pilosa*, bei Lüben *Silene chlorantha*, und mit Göppert unternahm er zuerst eine Reise in das Teschnische Gebirge.

Göppert, H. R., Professor der Medicin und Botanik zu Breslau, hat auf wiederholten Reisen über die Flora mehrerer Gegenden von Schlesien wichtige Mittheilungen gegeben, besonders auch zur Kenntniss der Schlesischen Moose. Vorzüglich sind es die Umgebungen von Sprottau, deren Vegetation durch ihn näher bekannt geworden ist, woselbst er zuerst *Corrigiola litoralis* und *Erica Tetralix* entdeckte. Seine Verdienste für die Kenntniss der fossilen Pflanzenwelt sind in der gelehrten Welt rühmlichst bekannt.

Remer, J., Professor der Medicin und Sanitätsrath zu Breslau, durchforschte die Umgegend von Breslau und besonders einige Theile des Gläzer- und Riesengebirges. Wir verdanken ihm die Entdeckung von *Equisetum Telmateia* und *Potamogeton rufescens* und die Moosflora Schlesiens manche wichtige Bereicherung.

Beilschmied, T., Dr. und ehemals Apotheker zu Ohlau, rühmlichst bekannt durch seine ausgebreitete Literaturkenntniss und seine verdienstvollen phytogeographischen Arbeiten, widmete der Aufklärung der Schlesischen Flora grosse Sorgfalt. Wir verdanken ihm Mittheilungen über die Gegenden von Creuzburg und Beuthen a. d. O., die Umgebungen von Ohlau wurden durch ihn zuerst genauer bekannt.

Köhler, Vorsteher einer Mädchenanstalt zu Schmiedeberg, ein eifriger Entomolog, sammelte und untersuchte mit grossem Eifer die Arten von *Rosa* und *Rubus* seiner Gegend. Von den Rubi unterschied er noch mehrere Arten als Weihe, trug aber durch genaue Sonderung der Formen zur Kenntniss dieser verwickelten Sippen viel bei.

Kaiser, ehemals Rector zu Schmiedeberg, jetzt Professor am Gymnasium zu Brieg, beobachtete längere Zeit hindurch die Flora des Riesengebirges, aus welcher wir ihm manche wichtige Beiträge, unter anderen die Entdeckung von *Meum athamanticum*, *Veronica alpina* und *Hieracium echioides* verdanken.

Albertini, Bischof der Herrnhutischen Brüdergemeinden, durchsuchte vorzüglich die Umgebungen von Gnadenberg bei Bunzlau und Gnadenfrei bei Reichenbach. Wir hatten Gelegenheit, handschriftliche Mittheilungen über seine Beobachtungen einzusehen.

Tausch, Prof. zu Prag, besuchte das Riesengebirge seit einer langen Reihe von Jahren, und bereicherte die Flora desselben durch einige interessante Entdeckungen, unter denen *Carex vaginata* und *Geum pyrenaicum* die bedeutendsten sind. Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte er die Formen der alpinen und subalpinen *Hieracia* und der *Salix Lapponum* und *silesiaca*; leider nur zu dem Zwecke, um die vielen Gestalten derselben, als eben so viele unhaltbare Arten in die Welt zu senden.

Kotschy, C., Pastor zu Ustron bei Teschen, und dessen Sohn, der durch seine Reisen im Orient rühmlich bekannte *Theod. Kotschy*, durchforschten das gesammte Teschnische Gebirge. Wie wir ihnen die erste Kenntniss von dessen Vegetation verdanken, so haben sie uns fortwährend die Seltenheiten und neuen Funde jener schönen Gegenden mitzutheilen nicht unterlassen. Neuerdings verdanken wir manche interessante Mittheilung von daher der Gefälligkeit des Pastor *Zlik* zu Teschen.

Fincke, Apotheker früher in Oppeln, jetzt zu Krappitz, durchforschte gemeinschaftlich mit *Grabowski* die Umgebungen von Oppeln und das Gesenke. Viele der dort gemachten Entdeckungen verdanken wir seinem unermüdlichen Eifer.

Beinert, Apotheker zu Charlottenbrunn, entdeckte zuerst in Schlesien *Epipogium Gmelini*, *Cypripedium Calceolus*, *Narcissus Pseudo-Narcissus* und *Woodsia ilvensis*. Die Flora der Umgegend von Charlottenbrunn wurde durch seine vieljährigen Forschungen vollständig bekannt; auch den Pilzen seiner Gegend, namentlich den grösseren, widmete er grosse Aufmerksamkeit. Endlich verdankt ihm die fossile Flora Schlesiens viele der wichtigsten Aufschlüsse und Entdeckungen.

Fachs, Rector der Schule zu Rosenberg, gab über die Flora der Gegenden von Proskau und Rosenberg zuerst genauere Auskunft; von ihm wurden *Scabiosa suaveolens* und *Senecio vernalis* zuerst in Schlesien aufgefunden.

Kölbing, F. W., Professor zu Gnadenfeld in O. S., schrieb eine Flora der Oberlausiz, Görliz. Zobel. 1828., welche einige gegenwärtig zu Schlesien gehörige Gegenden umfasst, und durchforschte zu verschiedenen Zeiten die reichen Umgebungen von Gnadenfeld. Aus den gemeinschaftlichen Forschungen desselben, seines Bruders, Reichels, Hasses, Wencks, Wetschkys und Mettetal's, welche sämmtlich längere oder kürzere Zeit daselbst verweilten, wurde eine handschriftliche Flora der Gegend von Gnadenfeld zusammengetragen.

Kelch, Oberlehrer am Gymnasium zu Ratibor, durchsuchte die Umgegend von Ratibor, besonders die Hügel der Gypsregion um Katscher und Dirschel, wo es ihm gelang, unter mehreren selteneren Formen von *Orobanche*, auch zuerst die *O. major* L. (*stigmatodes* Wimmer), *Galega officinalis* und *Ranunculus illyricus* zu entdecken, auch fand derselbe zuerst auf dem Weinberge bei Hultschin *Clematis recta* (vielleicht verwildert) und an der Babia Gora *Veronica aphylla*.

Neumann, Apotheker zu Wünschelburg, hat uns zuerst genaue Auskunft über die Vegetationsverhältnisse seiner Gegend, namentlich des Heuscheuer-Gebirges verschafft und die Verbreitung und Häufigkeit, so wie die Höhengrenzen der Pflanzen daselbst sorgfältig beobachtet. Wir verdanken ihm insbesondere die Kenntniss der Hochmoore desselben, unter welchen der grosse See die erste Stelle einnimmt, und die Entdeckung der *Pinus obliqua* Suter (*uliginosa* Neumann, *Pumilio forma arborescens* nach Schauer), so wie der *Saxifraga caespitosa*.

Schneider, Robert, Dr., Oberlehrer an den Kgl. Schulanstalten zu Bunzlau, hat mit besonderer Sorgfalt die Umgebungen von Bunzlau durchsucht und die Vegetationsverhältnisse derselben in Beziehung auf Schlesien und im Vergleich mit einigen anderen Gebieten Schlesiens dargestellt. (Die Vertheilung und Verbreitung der schlesischen Pflanzen, nachgewiesen in vierzehn Gebieten der schlesischen Flora u. s. w. Nebst einer botanisch-geognostischen Karte von Bunzlau. Auch unter dem Titel: Beiträge zur schlesischen Pflanzenkunde. Breslau. Grass, Barth u. Comp. 1838.) Ausser anderen werthvollen Mittheilungen verdanken wir ihm die Entdeckung von *Medicago minima* und *Carex arenaria*.

Elsner, Dr. Moritz, Colleague am Magdalenaecum zu Breslau, theilte die Resultate seiner mehrjährigen verdienstvollen Beobachtungen über die Flora des Hirschberger Thales und Riesengebirges und die Vegetationsverhältnisse dieser Gegenden in zwei Druckschriften mit: *Flora von Hirschberg und dem angrenzenden Riesengebirge*. Breslau. Aderholz. 1837. und *Synopsis Florae Cervimontanae. Dissertatio botanica*. Vratisl. Aderholz. 1839. In der letzteren finden sich über die Höhegebiete des Gebirges und die Höhengrenzen der Arten manche belehrende Winke und erläuternde Tabellen. Wir verdanken ihm ausserdem die Entdeckung der *Moehringia muscosa* und des *Nasturtium officinale*.

v. Flotow, Major a. D., früher in Wohlau, nunmehr seit einer Reihe von Jahren in Hirschberg, beobachtete sowohl die phaneroga-

mische Flora dieser Gegenden, als auch vorzugsweise die cryptogamische, namentlich die der Lichenen. Seine gründlichen und gediegenen Studien der Lichenen haben ihm in diesem Zweige der Wissenschaft eine entscheidende Auctorität und europäischen Ruf verschafft; die Resultate derselben liegen in den *Lichenes exsiccati* desselben, und in vielen einzelnen Abhandlungen in Zeitschriften, namentlich auch in der Regensburger Botanischen Zeitung, so wie in dem Verzeichnisse der Flechten des Riesengebirges in *Wendt's: Die Heilquellen zu Warmbrunn*, vor. Auch den Moosen und Lebermoosen widmete derselbe grosse Aufmerksamkeit. Ausser manchen anderen Seltenheiten verdanken wir ihm die Entdeckung von *Carex microstachya* und *Artemisia pontica*.

Nees von Esenbeck, Chr. G., Professor und Director des botanischen Gartens zu Breslau, Präsident der Leopold. Academie der Naturforscher, hat, seitdem er seinen Wohnsitz in Schlesien genommen, besonders zur Kenntniss der Flora der Gebirgsgegenden die wichtigsten Beiträge gegeben, namentlich in *Wendt's: Die Heilquellen zu Warmbrunn*, ein Verzeichniss der phanerogamischen Flora von Warmbrunn und dem Riesengebirge, in *Bannerth's: Die Heilquellen zu Landeck*, ein Verzeichniss der Flora der Umgebungen von Landeck. Ein Denkmal der gründlichsten Forschungen und des meisterhaften Scharfblickes ist die „Naturgeschichte der Europäischen Lebermoose mit besonderer Beziehung auf Schlesien und die Oertlichkeiten des Riesengebirgs,“ auch unter dem Titel: *Erinnerungen aus dem Riesengebirge*. 3 Bändchen in 8. Berlin bei Rucker und Breslau bei Grass, Barth u. Comp. 1833 — 1838.“

Sendtner, Candidat zu München, bereisete während eines zweijährigen Aufenthaltes zu Malitsch bei Jauer in Schlesien mehrere Theile der Provinz, namentlich auch den gesammten Gebirgszug der Sudeten, zur Erforschung der Laubmoos-Flora, und stellte die Resultate seiner Beobachtungen, die viele neue Entdeckungen einschlossen, und der Musterrung aller vorhandenen namhaften Moossammlungen aus Schlesien in einer *Muscologia Silesiaca* zusammen, welche bis jetzt noch im Manuscript in den Händen ihres Verfassers ist, da die Veröffentlichung im Wege des Buchhandels bisher noch nicht möglich gewesen ist. Wir sehen der Publication derselben mit Verlangen entgegen.

Koerber, Dr., College am Elisabetanum zu Breslau, widmete im Verein mit v. Flotow der Lichenen-Flora grosse Aufmerksamkeit. Wir erwarten von ihm eine *Synopsis Lichenum Silesiae* (oder Ger-

maniae), eine Arbeit, welche ihr Verfasser vielleicht auf sämtliche Schlesische Cryptogamen auszudehnen sich entschlossen dürfte.

Krause, Pharmaceut zu Breslau, hat sich um die Erforschung der Flora sowohl der Umgebungen von Breslau, als auch einiger Theile des Gebirges grosses Verdienst erworben. Die oben gegebene Uebersicht der Flora der Umgegend von Breslau ist von demselben gearbeitet worden. Eine Menge neuer Standorte seltner Arten sind durch ihn bekannt geworden, und mit beharrlicher Umsicht hat er die Formen vielgestaltiger Sippen verfolgt. Wir verdanken ihm insbesondere die Entdeckung von *Moenchia erecta*, *Salix cinereo-repens*, *Sal. cinereo-purpurea*, *S. Smithiana*, *Papaver dubium*, *Campanula latifolia* für die Ebenen-Region, *Aster alpinus*.

Scholtz, Dr. H., praktischer Arzt zu Breslau, legte die Resultate seiner Beobachtungen in einer Inaugural-Dissertation: *Enumeratio Filicum in Silesia sponte crescentium*. 1836. und in einer Flora der Umgegend von Breslau. Breslau Schulz u. Comp. 1842, nieder. Wir verdanken demselben die Entdeckung der *Poa Eragrostis*.

Max von Uechtritz, zu Breslau, hat viele Beiträge zur genaueren Kenntniss der Schlesischen Flora, namentlich der ehemaligen Lausitz, der Umgebungen von Altwasser, Reinerz, Langenau und des Gesenkes, theils in Vorträgen in der Schlesischen Gesellschaft, theils in Aufsätzen in der Regensburger bot. Zeitung und in einer eigenen Druckschrift: *Kleine Reisen eines Naturforschers*. Breslau, Korn d. ä. 1822. gegeben.

H. Güntzel-Becker und *C. Güntzel* in Wohlau haben die merkwürdigen Umgebungen dieser Stadt mit grosser Sorgfalt durchsucht. Nächst vielen anderen wichtigen Mittheilungen wurden von ihnen zuerst *Scorzonera purpurea*, *Herminium Monorchis*, *Holoschoenus filiformis* beobachtet.

Mayer, Aug., Oberamtmann zu Gr. Herlitz bei Troppau, durchsuchte nach Mückusch die Umgebungen von Troppau und das Gesenke. Im Verein mit dem Buchhändler Rohrer in Brünn gab er im J. 1835 heraus: *Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements, oder systematisches Verzeichniss etc.*, worin auch die in den Fürstenthümern Troppau, Jägerndorf und Teschen beobachteten Phanerogamen verzeichnet sind.

Ausserdem haben sich durch Bereicherungen der Flora und Beobachtungen der Vegetation ihrer Gegend verdient gemacht: Apotheker *Heinrich* (*Carex chordorrhiza*), Apotheker *Hertzsch* (*Herniaria*

hirsuta, Flora von Leschnitz, Tost und Lauban), Prof. *Henschel* zu Breslau (*Glaux maritima*), Candidat *Kabath* zu Gleiwitz (*Elatine triandra*, Flora um Gleiwitz), Lehrer *Letzner* zu Breslau (*Trifolium striatum*), *G. Reichenbach d. j.* zu Dresden (*Centaurea nigra*), *Reissek*, Adjunct am Hofnaturalien cabinet zu Wien (Teschisches Gebirge), Apotheker *Riesenberger* in Krummhübel (*Linnaea borealis*), Dr. *Sadebeck* zu Breslau (Flora von Strehlen, *Hieracium rigidum*), Prof. *Schauer* zu Greifswald (*Euphorbia stricta* L., Flora des grossen Kessels im Gesenke), Apotheker *Schmidt* zu Breslau (*Plantago maritima*), Apotheker *Schmaeck* zu Bolkenhain (*Dianthus arenarius*), Cantor *Siegert* zu Breslau (*Erysimum repandum*), Lehrer *Unverricht* zu Fürstenstein (Flora von Freiburg und Fürstenstein), *Vogel* aus Paris (*Salix nigricans*), O. L. G. Referend. *Wichura* in Breslau (*Sturmia Loeselii*, *Salix purpureo-repens* mas., Gegend von Ohlau), Intendantur-Assessor *Winkler* in Coblenz (*Sedum album*, Gegend von Jordansmühl), Apotheker *Wessel* in Zduny (*Androsace septentrionalis*, *Elymus arenarius*), Pharmaceut *Zoetfel* zu Breslau (*Astragalus Hypoglottis*).

Uebersicht
der
fossilen Flora Schlesiens

von
Dr. H. R. Goepfert.

[Illegible text]

Einleitung.

Die vegetabilische Petrefaktenkunde ist erst in der neuesten Zeit zum Range einer selbstständigen Wissenschaft erhoben worden. Bis zum Jahre 1804 oder bis auf *Schlotheim's* erstes Werk, wurden die sogenannten versteinten (wohl richtiger als versteinerten) Pflanzen, oder diesen ähnliche Gebilde, in sogenannten Oryctographien oder Lithographien, oder auch als ein Anhang zu mineralogischen Werken aufgeführt. In diesem Jahre zeigte *Schlotheim* in einem diesem Gegenstande gewidmeten Werke (Flora der Vorwelt oder Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen, 1. Abtheil. Gotha 1804.), dass durch eine sorgfältigere Betrachtung und Beschreibung fossiler Pflanzen, die er besonders von Farnkräutern liefert, sich vielfache Beziehungen zu unserer gegenwärtigen Flora nachweisen liessen. Die eigentliche wissenschaftliche Begründung dieses Zweiges der Naturwissenschaften durch systematische Behandlung verdanken wir dem Grafen *Caspar von Sternberg*, (Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt. Leipzig u. Prag 1820 — 1838. 1 — 8 Heft. Fol. Mit 133 Tafeln) dessen Schöpfung nun bald darauf durch *Adolph Brongniart's* treffliche Auseinandersetzung der hierbei in Anwendung kommenden Grundsätze eine höchst willkommene Erweiterung erhielt (Sur la classification et la distribution des Végétaux fossiles par Mr. *Adolph Brongniart*. Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. T. VII. Paris 1821. pag. 203 — 240 et pag. 293 — 347. avec 6 planches. — Prodrôme d'une histoire des Végét. fossiles par Mr. *Adolph Brongniart*. Paris 1828. 8. pag. 222. — Histoire des Végét. fossiles ou Recherches botaniques et géologiques sur les Végétaux renfermes dans les diverses couches

du globe. Paris 1828 — 1838. 15 Livraisons avec 185 planches). Genaue Beschreibungen der fossilen Reste mit steter Hinsicht auf die ihnen analogen jetztweltlichen Formen bezeichneten von nun an die Richtung der neu begründeten Wissenschaft, womit ich nun noch Forschungen über den Zustand und die Art und Weise der Veränderungen, welche sie bei ihrer Fossilisation erlitten, verband, eine Untersuchungsweise, die man vielleicht nicht mit Unrecht als die physiologische der fossilen Flora bezeichnen dürfte. Indem sich nun immer mehr klar herausstellte, dass die jetzige Vegetation mit der vorweltlichen zu einer Flora gehört, in welcher die einzelnen Familien durch vielfache Mittelformen, die bald in der Jetztwelt, bald in der Vorwelt sich befinden, unter sich ein harmonisches Ganze bilden, erscheint es wohl vollkommen gerechtfertiget, in einem Werke, welches sich mit der jetztweltlichen Flora beschäftigt, auch der vorweltlichen zu gedenken; daher ich gern der diesfallsigen Aufforderung meines sehr geehrten Freundes, Herrn Direkt. Prof. Wimmer Folge leiste und hier versuchen will, eine gedrängte Uebersicht meiner Beobachtungen über die fossile Flora Schlesiens zu geben, die freilich noch grosser Erweiterung bedürfen, um auf Vollständigkeit einigermaßen Ansprüche machen zu können. Zuvor sei es mir verstattet, über die früheren Bemühungen in diesem Zweige vaterländischer Naturgeschichte kurz zu berichten*), worauf dann Abhandlungen über die Lagerstätte und die Erhaltung der fossilen Pflanzen folgen und die Uebersicht der Gattungen und Arten den Beschluss machen soll.

*) Ueber die Bestrebungen der Schlesier, die Flora der Vorwelt zu erläutern, von H. R. Goepfert, Schlesische Provinzialblätter August u. September 1834.

I. Ueber die früheren Arbeiten im Gebiete der Schlesischen Petrefaktenkunde.

Der Vater der schlesischen Naturgeschichte, *Caspar Schwenkfeld* (*Stirpium et fossilium Silesiae catalogus* 1601), erwähnt schon drei Arten in Schlesien gefundenen versteinten Holzes.

Kundmann (*Promptuarium rerum naturalium et artificialium Vratislaviensè præcipue quas collegit Dr. J. Chr. Kundmannus Vratisl. 1727. 4. 364. S. 67.*) liefert Verzeichnisse von den in Breslau und in anderweitigen Sammlungen vorhandenen Petrefakten und giebt zwar nur einige Abbildungen von Dendriten, äussert aber sehr richtige Ansichten über die Bildung von Versteinungen.

Herrmann (dessen *Masographie* Brieg 1711. 4. S. 329.) liefert auf Tab. XIV. f. 6 die erste Abbildung einer schlesischen Versteinung, nämlich in rohen Umrissen die Ansicht eines versteinten Holzstammes.

Höchst wichtig ist *Volkmann's* mit Recht heut noch im In- und Auslande geschätzte *Silesia subterranea*, die im J. 1720 in 4. erschien. In diesem Werke wird zuerst der überaus bedeutungsvolle und folgenreiche Satz ausgesprochen, dass die bei uns gefundenen Versteinungen ihrem specifischen Charakter nach als unbekannte und durch die grossen Fluthen aus fremden Ländern hergeführte oder als degenerirte auch wohl als ganz und gar verlorengegangene Arten zu betrachten sein möchten, was *Jussieu* (*Mém. de l'Acad. royale Ann. 1718. p. 287*) gleichzeitig in sofern von den Farnkräutern noch genauer bestimmte, als er meinte, dass ihre Originale entweder in südlichen Erdstrichen wie in Ost- und Westindien zu finden sein müssten, oder dass sie gar nicht mehr vorhanden wären. Zur Gewissheit ward die letztere jetzt fast allgemein verbreitete Ansicht durch

Schlotheim's oben angeführte treffliche Arbeit erhoben und wirklich so entschieden auch oft die Aehnlichkeit eines auf unseren Kohlenschiefern vorkommenden fossilen Farnkrautes mit einem der Jetztwelt erscheint, so wird man bei näherer Untersuchung doch bald enttäuscht und findet vorher kaum geahnte Abweichungen.

Volkmann's Arbeiten wurden in der nun folgenden Zeit im Auslande mehr benutzt als in Schlesien, denn ein volles Jahrhundert verfloss ehe diese Studien wieder bei uns aufgenommen wurden, was im J. 1820 von *J. G. Rhode*, einem in mehrfacher Hinsicht verdienten Gelehrten, geschah. (Dessen Beiträge zur Pflanzenkunde der Vorwelt nach Abdrücken in Kohlenschiefer und Sandstein aus schlesischen Steinkohlenbergwerken Breslau 1820—24.) Ungeachtet einiger Irrthümer, zu denen er durch eine falsche Ansicht über das Vorhandensein von Blüten hingerrissen wurde, bleibt ihm das grosse wissenschaftliche Verdienst, die verschiedene Art und Weise wie die Abdrücke entstanden sind und sie sich gegenwärtig uns darstellen, zuerst näher und mit grosser Klarheit auseinandergesetzt und die Wichtigkeit der die sogenannten Steinkerne umgehenden Kohlen oder bedeckenden Kohlenhaut nachgewiesen zu haben, welche er mit Recht als die Oberhaut oder Rinde der Pflanze betrachtete. Im Jahre 1834 beschloss ich, mich mit diesen Untersuchungen zu beschäftigen und wandte mich im Januar desselben Jahres in einer öffentlichen Aufforderung, meine Bestrebungen durch Beiträge zu unterstützen, an unsre Landsleute, die auch mit der grössten Bereitwilligkeit meinen Wünschen entgegen kamen, so dass ich bald über ein nicht unbedeutendes wissenschaftliches Material zu gebieten hatte, welches ich seit jener Zeit in verschiedenen einzelnen Abhandlungen und selbständigen verschiedenen Werken veröffentlichte*). Die Sammlung selbst vermehrte sich so fortdauernd,

*) Die fossilen Farn-Kräuter von H. R. G. mit 44 Tafeln 4. Text 486. 8. Breslau 1836. Besonderer Abdruck des Supplements zum 17ten Bande d. Nova Acta Acad. C. L. C. Naturae Curios.

a. Ueber die fossile Flora der Quadersandstein-Formation in Schlesien mit 8 Tafeln in Fol. u. Q.

b. Ueber die fossile Flora der Gypsformation zu Dirschel in Ober-Schlesien. Mit zwei Tafeln.

c. Ein Beitrag z. Flora des Uebergangsgebirges mit 1 Tafel.

Abhandl. in dem 19. Bd. 2. Abthl. der Nova Acta Acad. C. L. Nat. Cur. Bresl. u. Bonn 1842.

Die Gattungen der fossilen Planzen verglichen mit denen der Jetztwelt, durch Abbildungen erläutert. Liefer. 1—4 mit 40 Tafeln. 4. 1841—43.

dass sie jetzt schon nur von wenigen an Umfang und Reichthum des noch nicht publicirten Materials übertroffen werden dürfte, indem ich das Glück hatte nicht bloß wie anfänglich in Schlesien, sondern später noch vom Auslande durch Beiträge jeder Art unterstützt zu werden. Sie besteht gegenwärtig aus 4526 Exemplaren, von denen 2290 auf die Pflanzenreste aus dem Uebergangs- und dem älteren Steinkohlengebirge, 318 auf die aus den secundären Formationen und 1918 auf die der tertiären Schichten kommen.

II. Uebersicht der Lagerstätte der fossilen Pflanzen Schlesiens.

Bekanntlich sind die sogenannten Ur- oder plutonischen Gebirge so wie die vulkanischen grösstentheils ungeschichtet oder höchstens nur undeutlich in Schichten gelagert und entschieden versteinungsleer, während die geschichteten dagegen sämtlich mehr oder minder zahlreiche Reste von Pflanzen und Thieren enthalten. Jene, welche in Schlesien die höchsten Erhebungen des Landes in mehr oder minder zusammenhängenden Zügen bilden, wie Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Porphyr, oder vereinzelt vorkommen, wie Kieselschiefer, Urkalkstein, Diorit, Hornblendeschiefer, Gabbro, Serpentin und Basalt gehören daher nicht in den Kreis unsrer Betrachtung, sondern nur die letzteren, die wir unter folgende Gruppen vertheilen:

- 1) Gruppe der gegenwärtigen Bildungen.
- 2) Gruppe der Geschiebe.
- 3) Gruppe der Bildungen über der Kreide oder des sogenannten Tertiärgebirges.
- 4) Gruppe der Kreide.
- 5) Gruppe der Oolithen.
- 6) Gruppe des Muschelkalkes oder der Trias.
- 7) Gruppe der Kohlen und
- 8) Gruppe der Grauwacke.

I. Gruppe der gegenwärtigen Bildungen.

Diese Gruppe, welche, wie man glauben sollte, sehr bestimmt begränzt zu sein scheint, ist bei näherer Betrachtung nicht immer so leicht von vorweltlichen Bildungen zu unterscheiden, denn die gegenwärtige Beschaffenheit der Erdoberfläche ist durchaus nicht abgeschlossen, im Gegentheil finden fortdauernde, aber langsame nicht unbedeutende Veränderungen statt, welche ganz ähnliche Resultate hervorrufen wie sie entschieden in der Vorwelt, nur überall in grösserem Maassstabe, wahrzunehmen waren. Die Untersuchung dieser interessanten Vorgänge, welche wir insbesondere Hoff, Lyell u. A. verdanken, haben wesentlich zu einem besseren Verständniss der Vorgänge in der Urzeit beigetragen. Noch heutzutage werden durch vulkanische Kräfte Berge erhoben, Seen und Teiche trocken gelegt und andere vorher trockne mit der gesammten Vegetation unter Wasser gesetzt und schichtenweise abgelagert, noch gegenwärtig ereignen sich nach meinen Untersuchungen, worauf ich, wenn ich von der Bildung der fossilen Bildung der Pflanzen sprechen werde, noch einmal zurückkomme, vor unsern Augen dieselben Prozesse, denen wir die Erhaltung der fossilen Pflanzen verdanken. In den Kreis unserer Betrachtung gehören die Ablagerung des Raseneisensteines und die Torfbildung, welche beide in Schlesien oft in grosser Ausdehnung, die letzteren bis in die höchsten Regionen des Landes, wie auf dem Kamm des Riesengebirges verbreitet sind. Die Bildung des ersteren, zu welcher das Pflanzenreich durch seinen Eisengehalt auch wesentlich beiträgt, geschieht gegenwärtig noch vor unsern Augen, und darf hier wohl desswegen nicht unerwähnt bleiben, weil oft vegetabilische Theile mit hineingezogen werden und andererseits sie mit der Torfbildung innig verknüpft vorkommt. Ohne die noch unentschiedene Frage näher zu betrachten, welcher Antheil den von Ehrenberg entdeckten in durch Eisenoxyd roth gefärbten Wässern so häufig vorkommenden Eisenthierchen, *Gaillonella ferruginea*, bei diesem Prozesse zuzuschreiben ist, will ich hier nur anführen, dass das Raseneisenerz sich fortwährend noch in verschiedener Tiefe 1—2 Fuss unter der Dammerde bildet, wo kohlsaures eisenhaltiges Wasser auf Wiesen oder Mooren fliesst und dort längere Zeit stehen bleibt, welches seinen Eisengehalt theils aus den Vegetabilien, theils von den überall verbreiteten Geschieben von Thoneisenstein entlehnt. Die Kohlensäure entweicht, Eisenoxydhydrat schlägt sich nieder, leichtlösliche, in den verrotteten Vegetabilien vorkommende phosphorsaure Verbindungen werden zersetzt und die Phosphorsäure tritt an das Eisen, so dass dadurch ein Gemenge aus Eisenoxydhydrat und phosphorsaurem Eisen entsteht, welchem als weniger

wesentliche Bestandtheile, Sand, Thon, vegetabilische Substanzen beige-
 mengt erscheinen, um welche sich jener Niederschlag in concentrisch
 schaaliger Form ablagert. Durch neue Niederschläge werden diese ein-
 zeln Körner an einander gekittet, und so grosse zusammenhängende
 Massen gebildet, die oft stützartig erscheinen und bekanntlich namentlich
 in Niederschlesien im Sprottauer und Saganer Kreise und in der benach-
 barten Lausitz zur Roheisengewinnung benutzt werden. $1\frac{1}{2}$ Meile von
 Sprottau bei Petersdorf liegt an einer Anhöhe, die offenbar in sehr alter
 Zeit das Ufer eines Landsee's bildete, ein solches felsähnliches Gebilde zu
 Tage, welches 10—12 Fuss mächtig ist. Um mich zu überzeugen, in wel-
 cher Zeit wohl diese Bildung erfolgt, liess ich im März 1841 auf einer
 Wiese bei Sprottau, von welcher man kurz vorher den Eisenstein gewon-
 nen hatte, an verschiedenen Punkten Pfähle, in welche 2—3 Zoll tiefe
 schräg in das Holz gehende Löcher angebracht waren, bis in die Tiefe ein-
 schlugen, in welcher die Eisensteinbildung vor sich ging und fand im
 April 1843, als ich die Pfähle wieder herauszog, dass sich in diesen Lö-
 chern eine dreiviertel Zoll dicke schon ziemlich feste Eisenmasse abgelag-
 ert hatte. Eine weitere Ausführung dieser in der gegenwärtigen Zeit
 wohl auch in technischer Hinsicht nicht unwichtigen Beobachtungen be-
 halte ich mir noch vor.

Die Entstehung vieler Torflager setzt bedeutende Niveauver-
 änderungen des Landes und der Gewässer voraus, wie wir aus der Be-
 schaffenheit der darin begrabenen und gegenwärtig auf ihnen befindlichen
 Vegetation zu schliessen berechtigt sind, wie z. B. in dem sogenannten Sprot-
 tabruch bei Primkenau, zu Kadlau und Nimkau bei Neumarkt, in welchen
 sich mit Torfund unter Torf grosse Stämme von Eichen, Kiefern und Buchen
 befinden, obschon der sumpfige Boden nur gegenwärtig Erlen und Weiden
 trägt. Immer aber gelang es mir bis jetzt die in diesen Lagern vorkom-
 menden vegetabilischen Reste ganz unzweifelhaft auf die gegenwärtige
 Vegetation zurückzuführen. Ganz deutlich erkannte ich in dem Torfe von
 Kadlau Kiefernzapfen, (*Pinus sylvestris*), Haselnüsse (*Corylus Avellana*)
 Eicheln von der Stieleiche (*Quercus pedunculata*) Samen von *Potamogeton*,
Menyanthes trifoliata, *Sparganium* und andere Sumpfpflanzen, Strünke
 von *Sium*, *Phellandrium* wie von *Arundo phragmites*, *Typha*, Riedgräsern.

Sehr merkwürdig erschien mir namentlich in Kadlau, was auch
 Hr. von Raumer auf den grossen Torfbrüchen zu Kaltwasser bei Liegnitz
 beobachtete, in glänzende Kohle verwandelte mit der braunen Torfmasse
 vermischte Reste, deren Entstehung, auf nassem Wege sich wohl kaum
 bezweifeln lässt. Besonders grosse Ablagerungen von Stämmen scheinen
 innerhalb der Bette unserer grossen Ströme, wie z. B. in der Neisse bei

Löwen und in der Oder sich an mehreren Punkten zu befinden, die auch auf bedeutende Niveauveränderungen schliessen lassen. Auf eine interessante Weise tritt dies Verhältniss in der Nähe von Breslau an beiden Ufern der alten Oder besonders am linken zwischen der Rosenthaler und Oswitzer Brücke hervor, was mir besonders dadurch merkwürdig erschien, als man hier im Kleinen die Prozesse vor sich gehen sieht, denen wir die Erhaltung der Pflanzen der Vorwelt verdanken, wie die Bildung der Kohle auf nassem Wege, die der Steinkerne, der Abdrücke und der Versteinung durch Eisenoxydhydrat.

2. Gruppe der Geschiebe.

Unter dieser Gruppe verstehen wir die lose über Thalflächen und Ebenen verbreiteten Steinblöcke, Massen von Sand, welche alle unter dem Namen von Diluvium begriffen werden und in Schlesien überall die Ebene erfüllend, an vielen Punkten, wie im Oelser, Trebnitzer, Freistädter, Glogauer und Grünberger Kreise kleine Gebirgszüge bilden. Je entschiedener diese Bildung durch eine grosse, wahrscheinlich aus dem Norden hereinbrechende Ueberschwemmung veranlasst ward, wie die Uebereinstimmung jener Geschiebe mit den Gebirgsformationen Schweden's und Finnland's beweist, um so interessanter war es, die Höhe genau kennen zu lernen, bis zu welcher sie noch abgelagert vorkommen, weil man hieraus auf den Umfang jener Ueberschwemmung Schlüsse zu ziehen vermag. Hr. Markscheider Bocksch hat diese Frage gelöst, indem er das Vorkommen von solchen grossen Sandablagerungen und Geschieben im flachen Thale von Salzbrunn und Weissstein auf den Feldern zwischen Weissstein und dem östlichen Fusse des Hochwaldes (1370 F. Höhe), auf dem Fuchsberge (1446 F.) in Niederaltwasser, in der Sandgrube bei der evangelischen Kirche in Waldenburg (1043 F.), bei der Ziegelei von Ober-Waldenburg (1400 F.) und in Mittelhermsdorf (1390 F.) noch nachwies, woraus es sehr wahrscheinlich wird, dass jene Ueberschwemmung die Höhe von 1446 F. über das gegenwärtige Niveau der Ostsee erreichte. Auch in Oberschlesien sind diese Massen in einer mehr oder minder mächtigen Decke verbreitet, aus welcher fast insularisch die älteren Gebirgsarten hervorragen. Sie kommen hier auch nicht nur auf den Höhen, sondern oft noch in bedeutender Tiefe versenkt vor, ja man hat sie bis zu 54 F. tief unter dem Rasen beobachtet. — In den zur Uebergangs-Formation gehörenden Kalkmassen, die z. B. bei Vielgut im Bernstädtchen und Sorau in der Niederlausitz in solcher Menge vorkommen, dass sie schon mehrere Jahrhunderte zu ökonomischen Zwecken

benutzt werden, so wie in den Feuersteinen der Kreidebildung findet man zahlreiche thierische Versteinerungen; von Pflanzenresten beobachtet ich bis jetzt nur versteinertes Holz, welches in einzelnen mehr oder minder grossen Stücken mit jenen Geschieben zugleich, aber immer nur vereinzelt, nicht mit dem Muttergestein, wie jene thierischen Versteinerungen zugleich angetroffen wird, daher ich, da die Untersuchungen über nordische versteinerte Hölzer noch gänzlich fehlen, nicht mit Bestimmtheit anzugeben vermag, zu welcher Formation sie zu rechnen sind, obschon sie höchst wahrscheinlich über die Kreideformation nicht hinausreichen dürften. Sie gehören nach meinen gegenwärtigen, noch nicht ganz beendigten Untersuchungen drei Pflanzenfamilien der Jetztwelt an, nämlich den Cykadeen, den Coniferen und den Cupuliferen und sind sämmtlich durch Kieselmasse versteinert.

3. Gruppe der Bildungen über der Kreide oder das sogenannte Tertiärgebirge.

Diese Gruppe ist in Schlesien sehr wenig entwickelt, so dass bei uns die Haupteigenthümlichkeit derselben, nämlich der häufigen Wechsel von marinen Ablagerungen mit Süsswasserbildungen, gar nicht hervortritt, und hierzu allein nur die Braunkohle zu rechnen, welche im Allgemeinen sehr verbreitet in manchen Gegenden in grossen Lagern unter einer mehr oder weniger bläulichen Lette angetroffen wird. Fast in jeder Tiefe im aufgeschwemmten Lande in Ober- wie in Niederschlesien in der Decke aller älterer und jüngeren Formationen findet man selbst bis zu bedeutender Tiefe von 200 F., wie sich hier beim Graben des artesischen Brunnen zeigte, einzelne Stücke bituminösen Holzes gewöhnlich von brauner Farbe oder auch von Glanzkohlen ähnlicher Beschaffenheit, ganze Lager aber am Ufer unserer grösseren Flüsse, wie z. B. der Neisse, der Oder oder in einzelnen Vertiefungen Becken abgesetzt, woraus unstreitig wie auch aus der Beschaffenheit der in derselben begrabenen unserer gegenwärtigen sehr verwandten Vegetation hervorgeht, dass sie zu der jüngsten von Lyell und Deshayes neueren Pliocen genannten Abtheilung gehören. Um zu zeigen, welche Wechsellagerungen hier vorkommen, will ich hier die Schichten anführen, die hieselbst im Jahre 1835 beim Graben eines artesischen Brunnen durchsunken wurden, dessen Mündung 403,2 P. F. über dem Meeresspiegel lag. Zunächst durchsetzte man eine 37 F. mächtige Kiesschicht, darauf ein 76½ F. mächtiges Lettenlager, worauf eine Sandschicht folgte, die indessen nur 2½ Fuss anhielt. Sie lag auf einer 25—26 F. mächtigen Lettenlage, nach wel-

cher abermals eine noch dünnere Sandschicht mit einer sechszig mächtigen Lettenschicht wechselte. Nach öfterem Wechsel von dünneren Sand- und stärkeren Lettenschichten erreichte man eine wasserhaltige Sandschicht mit einer dünnen Unterlage von Schwefelkies in einer Tiefe von 196–201 F. und stiess dann auf eine 11 Fuss mächtige Schicht von blauem Thon mit eingesprengtem bituminösem Holze, welcher sich nach einer 4 F. dicken Schicht blauen wasserhaltigen Sandes wiederholte und bis zu 235 F. anhielt, wo man leider den Versuch einstellte, der bei weiterer Fortsetzung gewiss erspriessliche Resultate geliefert hätte. An folgenden Punkten sind bis jetzt mehr oder minder erfolgreiche Versuche auf Braunkohle gemacht worden: Schweinitz, Schloin, Schönau, Heinersdorf, Buchelsdorf bei Grünberg, Nenkersdorf bei Beuthen an der Oder, Naumburg am Bober, Saarau, Rauske, Laasan, Ingramsdorf bei Striegau, Polgsen bei Wohlau, Grochau bei Frankenstein, Patschkau, Leutsch und Blumenthal bei Neisse, Matzkirch bei Leobschütz, Schönwitz, Halbendorf, Chrzambzezeit und Chrzowitz bei Oppeln, Schwanzowitz bei Brieg, Mahliau bei Trebnitz und Dambitsch bei Prausnitz, Rosenthal und Carlowitz bei Breslau.

Ogleich die mikroskopische Untersuchung der verschiedenen, in Schlesien aufgefundenen Braunkohlenlager noch lange nicht beendet ist, so kann ich doch so viel behaupten, dass die in denselben begrabene Flora unserer heutigen sehr ähnlich war, Laub und Nadelholz, insbesondere *Taxus*-Arten, Lerchenbaum vorherrschten, unter deren Schutze wohl eine krautartige Vegetation auch entspross, von welcher aber bis jetzt wenigstens noch nichts Näheres, einzelne unbestimmbare Reste ausgenommen, aufgefunden worden ist. —

4. Gruppe der Kreide.

Von den hierher gehörenden Gliedern finden wir in Schlesien den jüngeren Gyps, die Kreide, den Grünsand oder Quadersandstein. —

Der jüngere Gyps oder das Gyps- und Mergelgebirge (nach von Carnall, dessen bergmännisches Taschenbuch S. 108.) der ältere und jüngere Flötzgyps von Oeynhausens, oder das Gypsgebirge, welches Pusch als ein Glied der Kreideformation betrachtet, aus Thon und Mergel mit untergeordneten Kalkstein- und Gypsmassen zusammengesetzt, befindet sich in dem Dreieck, welches von dem oberschlesischen Muschelkalke, dem Nordrande der Karpathen und dem Ostrand der Sudeten gebildet wird. Man findet es bis jetzt in folgenden Gegenden:

a) Am Rande des Grauwackengebirges bei Dirschel, Katscher und Deutsch-Neukirch. —

b) In den Thaleinschnitten bei Palchanetz, oberhalb Troppau am Oppa-Ufer bei Rösnitz, Schreibersdorf, Koberwitz, Hultschin und Koblau sämmtlich westlich des Oderthales. —

c) Am westlichen und südlichen Rande des Kohlengebirges zwischen Rybnick und Loslau von dort sich nach der Oder und südwärts nach dem Oelsathale verbreitend, besonders in den Thälern sichtbar, während die Höhen mit Kies, Sand und Lehm bedeckt sind. —

d) In der Niederung zwischen Gleiwitz und Laband zur Linken des Klodnitzthales im Dorfe Niepatschütz, sich hier anlehnend an den steilen Rand des Muschelkalkes. —

e) Zwischen Gleiwitz und Nikolai in einem Bohrloche auf der Höhe zwischen Schloss Chutow und Klein-Paniow. —

f) Bei Gunkau und Gollawitz am ehemaligen Beruner Teichrande. —

Alle unter a, b und c angegebenen Parthieen hängen höchst wahrscheinlich in der Tiefe unter sich zusammen; auch ist diess von d und e zu vermuthen, die Verbindung des Letzteren mit f nicht sicher vorauszusetzen, obwohl es merkwürdig erscheint, dass alle 3 Parthieen in einer geraden Linie liegen (*v. Carnall*).

Nur von dem ersten Punkte in den den Gyps bei Dirschel und Katscher begleitenden Kalkmergeln sind vegetabilische Reste bekannt, die von mir a. a. O. beschrieben und abgebildet worden sind, aus welchen man auf eine der unsrigen ebenfalls sehr verwandte, obschon der Art nach verschiedene aus Laub und Nadelhölzern bestehende Flora zu schliessen berechtigt ist. Auf dem rechten Ufer der Oder ist nur bei Pshaw dieselbe Conifere wie bei Katscher der *Pinites gypsaceus* aufgefunden worden. —

Der Kreidekalkstein macht unverkennbar die Ausfüllung eines Beckens von einer der Richtung des Oderthales oberhalb Oppeln entsprechenden Längenausdehnung. Er scheint bei Oppeln selbst am mächtigsten zu sein, senkt sich nördlich allmählig unter aufgeschwemmtes Land, wie bei Döbern, Carlsmarkt etc., während er sich südlich bei Gross-Schimnitz auf Thoneisensteingebirge ruhend dort nur noch 20 F. stark hervorhebt. Entschieden ganz vereinzelt ist das Vorkommen zu Dembio zwischen Oppeln und Malapane. Thierische Versteinerungen trifft man häufig in den Brüchen bei Oppeln, Döbern und Schimnitz, von Pflanzen sind mir ausser strukturlosen Kohlenresten nur ein einziges Fukoidenähnliches Gebilde zu Gesicht gekommen.

Von einem bei Wirsingawe zwischen Wohlau und Winzig 7 Meilen von Breslau gelegenen Dorfe entdeckten kreideähnlichen Kalksteinlager, in welchem trefflich erhaltene Dicotyledonen, von unseren Laubhölzern gänzlich verschiedene, der Gattung *Credneria* zugehörnde Blattabdrücke vorkommen, bleibt es noch unentschieden, ob es als anstehend zu betrachten, oder was vielleicht wahrscheinlicher der Fall sein möchte, als grossartige Geschiebemasse, ähnlich wie jene Uebergangskalklager bei Sorau und Vielgut bei Oels, anzusehen ist. —

Der Quadersandstein oder Green-Sand der Engländer kommt in Niederschlesien und der Grafschaft Glaz in grosser Ausdehnung vor. Die bedeutendste Niederlage desselben befindet sich wohl am Nordrande des Riesengebirges von Goldberg an über Löwenberg, Bunzlau bei Tillendorf bis an den Queis bei Wehrau, Tiefenfurt und bis an die Neisse. Sie öffnet sich gegen Nordwest dem flachen Lande zu und wird im Osten von älterm Gestein bedeckt. —

Der Quadersandstein liegt hier theils auf Thonschiefer, theils auf buntem Sandstein, theils auf Muschelkalk, jedoch fehlt hier eine grosse Reihe von Flötzgebirgsarten, (zwischen ihm und dem Muschelkalk (nämlich Keuper- und die ganze Jura- oder Oolithgruppe), welche in anderen Gegenden so sehr zur Mannigfaltigkeit der fossilen Flora beiträgt. In der Grafschaft Glaz beginnt der Hauptzug des Quadersandsteins in der Gegend von Oberlangenu, Rieslingswald und Habelschwert, verbreitet sich von da nordwestlich zwischen Reinerz und Wünschelburg, dort vom Gneis, hier von dem rothen Sandsteingebilde begränzt, nach Böhmen über Politz, wieder zwischen Schömberg und Friedland bis Grüssau in Schlesien.

Die in ihrer allgemeinen Verbreitung so eben geschilderte Formation enthält zwei eigenthümliche Glieder, wie sie weder nach den Gesteinen, noch nach den organischen Einschlüssen in anderen Gegenden Deutschlands vollkommen gleich sich wiederholen dürften.

1) An der Nordseite des Riesengebirges die Steinkohlenbildung bei Wenig-Rackwitz und Ottendorf in der Löwenberger Gegend, welche in gleicher Weise und verbunden mit Thoneisensteinlagern bei Wehrau am Queis wieder vorkommt und

2) in der Grafschaft Glaz die versteinungsreichen Schichten von Rieslingswalde. —

Die Steinkohlenbildung der Löwenberger Gegend ist nach *v. Dechen* eine lokale Einlagerung im Quadersandstein. Deutlich erkennt man in ihnen noch die Holzstruktur trefflich erhaltener Coniferenstämme und in den Schiefen Früchte von Coniferen, und ein nur mit tropischen Farn

vergleichbares Farnkraut. Die Gegend von Wehrau, der Geburtsort des unsterblichen *Werner*, ist ganz besonders interessant. Hier befindet sich ein mächtiges, den Queis in seiner ganzen Breite durchsetzendes und in ihm und an seinen Ufern in mehreren hundert Fuss Länge entwickeltes Conglomerat, welches in ungemeiner Menge, aber überall zertrümmertes, zum Theil versteinertes, zum Theil noch biegsames bituminöses Holz, *Pinites Wernerianus* mihi enthält, ein äusserst merkwürdiges Vorkommen, wie ich es bisher noch nicht beobachtete. —

In der Grafschaft Glaz sondern sich die der Kreideformation angehörenden Schichten sehr bestimmt in eine obere kalkige Abtheilung, wie zu Rieslingswalde, und eine untere sandige, von welchen die erstere nach *Geinitz's* Untersuchungen dem Plänerkalke, und die andere dem Quadersandsteine in Sachsen entspricht. Vegetabilische Versteinerungen sind im Quadersandsteine seltener als thierische und im eigentlichen Quadersandsteine bis jetzt bei Neuen, Tiefenfurt, Wehrau bei Bunzlau, Giersdorf bei Löwenberg, Raspenau bei Schömberg entdeckt worden. Zum erstenmal unter den bis jetzt geschilderten fossilen Floren Schlesiens begegnen wir hier einer von der gegenwärtigen schlesischen sehr verschiedenen Vegetationsform, indem sie einen tropischen Charakter zeigen, wie insbesondere die in ihr entdeckten baumartigen Farnkräuter und Palmen lehren, die also ein Klima voraussetzen, wie es jetzt zwischen oder in der Nähe der Wendekreise in der Jetztwelt angetroffen wird. *Römer* und *Beyrich* ziehen aus thierischen Versteinerungen den Schluss, dass die Rieslingswalder Schichten der obersten Abtheilung der Kreideformation angehören, jedoch auch die vegetabilischen Petrefakten rechtfertigen diese Ansicht, indem sich unter ihnen nur Dikotyledonen, unserer heutigen Flora sehr entsprechende Blätter, aber keine der tropischen im wahren Quadersandstein vorkommende Formen vorfinden.

5. Oolithengruppe.

Diese Formation fehlt in Niederschlesien gänzlich und findet sich nur in Oberschlesien in einigen Gliedern entwickelt, nämlich im polnisch-schlesischen Thoneisensteingebirge als mittlerer oder brauner Jura und als weisser Jurakalk.

In dem Thoneisensteingebirge finden wir als herrschende Massen grauen Thon, Letten oder Sand, also rein mechanische Ablagerungen, in ihnen als untergeordnete Massen zahlreiche, bald aus zusammenhängenden flötzartigen Schichten, bald aus einzelnen mehr oder weniger dicht an einander liegenden Knollen oder Sphärosideriten, von Quentchen- bis

zu Centner-Schwere zusammengesetzte Thoneisensteinlager, vermischt zuweilen mit schwachen Kohlenflötzen oder bituminösem Holze. Die Verbreitung des Thoneisensteingebirges ist ungemein beträchtlich, in sofern man nach *v. Carnall* wohl annehmen kann, dass alle bekannten Vorkommnisse mit einander in der Tiefe zusammenhängen. Vom Malapaner Thal beginnend, können wir die Formation nordwärts durch die Kreise von Lubliniz, Rosenberg und Kreuzburg, bis in das Grossherzogthum Posen in den Schildberger Kreis, östlich auch weit hinein noch nach Polen verfolgen. Westlich finden wir dieselbe bei Falkenberg wieder und müssen annehmen, dass sie im Oderthale den Kreidekalkstein unterteufe; ferner südlich des Klodnizthales in der Gegend von Kieferstädtel, sich von da südlich nach Rybnik, so wie westwärts bis in die Nähe von Ratibor verbreitend. Ungeachtet der grossen Ausdehnung dieser Formation sind im Ganzen Versteinungen selten, thierische noch häufiger als vegetabilische. Erstere in Schlesien insbesondere bei Landsberg, Wiechrow, Bodzanowiz und Sternaliz, wo die grösseren Knollen oft Ammoniten einschliessen, die Pflanzenreste fast nur bei Ludwigsdorf und Matzdorf bei Kreuzburg. Der Charakter dieser Vegetation, so gering auch die Zahl der bis jetzt entdeckten Arten ist, trägt einen tropischen, also von der gegenwärtigen schlesischen sehr verschiedenen Charakter, Lykopen, Farn, (*Camptopteris*) und Cykadeen, selbst noch Calamiten machen denselben aus.

In dem weissen Jurakalk der zweiten Abtheilung der in Schlesien vorkommenden Oolithengruppen, dessen Hauptmasse im benachbarten Königreich Polen und zwar in dem Striche von Wielun und Krakau liegt, von welcher aber blos ein kleiner und zwar aus den polnischen unteren Schichten bestehender Theil nach Oberschlesien von Woischnick über Lubliniz bis nach dem Lubezko sich verbreitet, hat man bis jetzt wohl zahlreiche thierische Reste, aber noch keine vegetabilischen Reste entdeckt. Durch die unter der Aufsicht des Herrn *v. Carnall* in der Gegend von Lubliniz angestellten Versuche ist die Auflagerung des weissen Jurakalkes auf der braunen oder mittleren erwiesen worden. Der schlesische polnische Jura besteht also nur aus 2 durch die Petrefakten scharf getrennten Schichten, der an andern Orten mit ihm so oft vorkommende pflanzenreiche Lias fehlt gänzlich.

6. Abschnitt. Gruppe der Trias oder Muschelkalkgruppe.

Von den drei Gliedern dieser Gruppe, Keuper, Muschelkalk und bunter Sandstein, fehlt der erstere in Schlesien gänzlich, so wie auch

der bunte Sandstein nur sehr isolirt vorhanden ist und nur der Muschelkalk kommt in grösserer Ausdehnung vor. In Niederschlesien begegnen wir dem Muschelkalk zuerst östlich von Bunzlau bei Nischwitz, Alt- und Neu-Warthau, von hier sich bis Gr. Hartmannsdorf, etwa 1 Meile Länge erstreckend, aufgelagert auf buntem Sandstein. Er lässt sich jedoch unter der Sandbedeckung bis Bunzlau nicht verfolgen. Um so merkwürdiger ist das Hervortreten desselben in 3 Meilen Entfernung, genau auf dem Fortstreichenden in nordwestlicher Richtung bei Wehrau am Queis, der hier ebenfalls bunten Sandstein als Liegendes zu haben scheint.

Der bunte Sandstein, aus feinkörnigen, lagerartigen und bisweilen plattenförmigen, hellroth oder weiss gestreiften und gefleckten Schichten bestehend, kommt noch auf einigen andern Punkten dieser Gegend, südlich von Löwenberg, rechts und links von Nieder- und Ober-Moys, südlich von Goldberg bei Taschenhof, zu beiden Ufern der Katzbach sich in einem weitem Bogen bis nach Hasel und Prausniz erstreckend, immer ruhend auf Zechstein, so wie auch südlich von Lähn, bedeckt von Quadersandstein, vor (*v. Dechen.*).

In viel grösserer Ausdehnung ist der Muschelkalk in Oberschlesien durch die darin besonders häufig vorkommenden charakteristischen Ueberreste von Meeresthieren nachgewiesen. Er bildet hier seiner Hauptmasse nach einen langen Zug, der zwischen Deutsch-Piekar und Siemanowiz aus dem Königreich Polen herübertritt und mit 1 — 3 Meilen Breite über Beuthen, Tarnowiz, Tost, Gross-Strehliz bis nach der Oder fortläuft, um erst jenseits dieses Thales bei Krappiz unter das aufgeschwemmte Land unterzutauchen. Insularisch heben sich aus letzterem nördlich des Hauptzuges die Parthien: bei Georgenberg, Boruschowiz und Tworog, südwärts dagegen diejenigen bei Mikultschüz, Petersdorf und Laband hervor, von denen indessen nach *v. Carnall* unbedenklich anzunehmen ist, dass sie in der Tiefe mit der Hauptmasse zusammenhängen. Entschieden von der Hauptmasse getrennt scheinen jedoch die Bildungen bei Sakrau und Nikolai, bei Poprotzan und Cielmitz bei Lendzin, Berun, Gross-Chelm, und endlich noch in einer grösseren Ausdehnung zwischen Jmielin und Dzierzkowiz, wo sie aber vielleicht mit den Kalkmassen im benachbarten Freistaat Krakau zusammenhängen. Kleinere ganz vereinzelte Parthien finden sich bei Chropalschow, Rattowiz, Kostrow. Keuper fehlt gleichfalls wie in Niederschlesien und auch der bunte Sandstein ist hier erst auf einigen Punkten an dem Rande des Muschelkalkes und überall nur in geringer Breite beobachtet, wie bei: 1) Chorzow, 2) Deutsch-Piekar, 3) Bobrek, 4) Radziwinken, 5) in der Gegend von Tost, an den Abhän-

gen der Kalkberge bei Schierott, Rotlischowiz, 6) zwischen Zierowa und Krappiz. Die Vorkommnisse 1 — 4 ruhen auf Steinkohlengebirge, die anderen wahrscheinlich auf Grauwacke. In diesem ausgedehnten, durch zahlreiche Steinbrüche aufgeschlossenen Terrain hat man bis jetzt nur im Muschelkalke vegetabilische Reste, nämlich eine Fucoidea (*Caulerpites Blandowskianus mihi*) in Böhm's Kalkbruch bei Tarnowiz und einzelne der Glanzkohle ähnliche Kohlenfragmente entdeckt; der in anderen Gegenden, wie z. B. im Elsass hieran so reiche bunte Sandstein hat bei uns noch nichts geliefert.

7. Gruppe der Kohle.

Sie zerfällt in 2 Abtheilungen, in die Formation des Kupferschiefers und die der Steinkohle. Die beiden Glieder der ersteren, der Zechstein und das Rothliegende, kommen nur in geringer Ausdehnung in Niederschlesien vor, fehlen gänzlich in Oberschlesien. Das Rothliegende unmittelbar auf Porphyr, Mandelstein und Thonschiefer gelagert, grösstentheils konglomeratartig, enthält Quarz, Hornstein, Schiefer in einem eisenschüssigem und thonigen Bindemittel, ist oberhalb zuweilen weiss. Verkohlte Holzstücke sollen in ihm vorkommen, die ich jedoch noch nicht Gelegenheit hatte, näher zu untersuchen. Der Zechstein, von geringer Mächtigkeit aber beständigem Aushalten, zeigt mannigfache Abänderungen von Kalkstein, Dolomit und gelblichem Mergelschiefer. Er erscheint westlich von Löwenberg an isolirten Punkten zu Logau am Queis, Giesmannsdorf und von Kunzendorf bis zum Bober, in zusammenhängenden Zügen so wie in ähnlicher Verbreitung wieder südlich von Goldberg bei Neukirch, zu beiden Seiten der Katzbach bis Conradswalde, immer hier auf Rothliegendem gelagert, welches letztere bei Conradswalde verschwindet, so dass der Zechstein hier unmittelbar den Thonschiefer zum Liegenden hat. Vegetabilische Petrefakten sind in diesem Gebiete bis jetzt noch nicht entdeckt worden.

Die Steinkohlenformation ist in Nieder- und Oberschlesien in grosser Ausdehnung entwickelt. In Niederschlesien in nicht unbeträchtlicher Höhe zum Theil auf Grauwacke ruhend, von Kohlensandstein bedeckt, häufig von hohen Porphyrkegeln durchbrochen, in Oberschlesien in einer fast ebenen Gegend verbreitet, nur in einer einzigen Gegend an älteres oder Grauwackengebirge sich anschliessend, bei allen anderen Parthieen, die sich aus jüngeren Massen, Inseln gleich hervorheben, kennt man das Liegende noch nicht. Die niederschlesische Steinkohlenformation, von Schatzlar in Böhmen beginnend, geht in 10 Meilen Länge

nördlich nach Landshut, von hier östlich nach Gottesberg, Waldenburg, wo die Breite am grössten ist, dann südöstlich über Tannhausen, Rudolphswalde, Neurode bis Eckersdorf in die Grafschaft Glaz. Sie besteht aus dem Steinkohlensandstein und Conglomeraten, aus Schieferthon und Steinkohlenflötzen, welche letztere in ihrer Mächtigkeit sehr verschieden sind und überdies durch die dazwischen auftretenden Porphyrmassen mannigfache Unterbrechungen und Störungen erlitten haben.

Sehr merkwürdig sind noch die zu dieser Formation gehörenden Lager von bituminösem Kalk, die in Schlesien zu Klein-Rathen bei Wünschelburg und dann in dem benachbarten Böhmen am Ufer der Steine, bei Braunau und Ruppertsdorf im rothen Sandstein vorkommen. Am letzteren Ort kommen keine Pflanzen, aber ausgezeichnete Fische, *Palaeoniscus vratslaviensis* Agass., an ersteren Orten aber auch ausser Fischen sehr merkwürdige Pflanzen vor.

In Oberschlesien kommt das Steinkohlegebirge an 5 Punkten zum Vorschein.

1) Zwischen Rybnik und Loslau bei Czerniz und Birtultau, wozu auch die kleine Parthie bei Pshaw zu rechnen ist, obschon Gypsgebirge dazwischen liegt.

2) Der Zug von Czerwonkau und Dubensko, Belk und Nikolai und dann

3) bei Zabrze über Königsgrube, auch Myslowiz, Brzenskowiz und Kosztow von da bis ins Königreich Polen und ins Krakauische fortsetzend.

4) Die von Muschelkalk umgebene Parthie bei Koslowagora, welche ebenfalls nach Polen herüberreicht.

5) Tritt das Kohlegebirge südlicher Seits bei Lendzin und besonders bei Chelm und Kopciowiz aus der jüngeren Masse hervor.

Es dürfte nach *v. Carnall* keinem Zweifel unterliegen, dass alle diese Parthien nicht nur unter sich, sondern auch mit denen im Königreich Polen und Freistatt Krakau in der Tiefe zusammenhängen. Gewöhnlich sehr feinkörniger, selten konglomeratartiger Sandstein herrscht überall vor, Steinkohlenflötze sind oft sehr mächtig, der Schieferthon oft ausserordentlich reich an Sphärosideriten, wie zu Zabrze und Orzesche, die zur Eisengewinnung dienen, und bemerkenswerth endlich die Steinkohlenflötzbrände, welche in vorgeschichtlicher Zeit stattgefunden haben müssen und zum Theil noch fort dauern, wodurch die verschiedenen Sandsteine und Schieferthone in Porzellanjaspis umgewandelt wurden, in welchen dann die Abdrücke der Pflanzen ganz besonders scharf begränzt erscheinen.

Keine der bis jetzt genannten Formationen birgt eine so eigenthümliche, von der gegenwärtig so verschiedene Flora als die der älteren Steinkohle, wie dies auch bei uns in Schlesien der Fall ist. Baumartige Farnstämme, unendlich zahlreiche Blättchen oder Wedel von Farn in jeder Grösse, die Calamiten oder Stämme mit paralleler Längsstreifung, absatzweiser Gliederung mit und ohne Scheiden und Fruchtföhren, äholic unseren Schaftheu- oder Equisetum-Arten, die caktusähnlichen Stämme der Stigmarien, die oft mit 3—6 F. dicker, mit zierlichen Fischschuppen vergleichbarer Rinde versehenen Stämme mit gabelförmigen Aesten der Lepidodendreae, welcher unseren heutigen freilich nur krautartigen Lykpodien entsprechen, die baumartigen Sigillarien, deren grösstentheils nur erhaltene Rinde aus senkrechten parallel neben einander liegenden Röhren zu bestehen scheint (daher früher auch Röhrenbaum, Syringodendron genannt), müssen nebst einigen Palmenarten in grossen Wäldern vereint, bei fast fehlendem, kleineren Unterholze, der Vegetation der Vorwelt, einen ganz eigenthümlichen und einförmigen Charakter verliehen haben, da im Verhältniss der Masse die in der Steinkohlenformation begrabene Vegetation, sollte sich auch unsre Kenntniss derselben noch so sehr erweitern, immer nur aus einer sehr geringen Zahl von Arten besteht. Die Steinkohlen selbst verdanken ihren Ursprung, wie heut nicht mehr bezweifelt wird, zusammengehäuften verschiedenartigen Pflanzen, die aber durch mannigfache grösstentheils wohl nur auf nassem Wege erfolgte Veränderungen, wie ausser vielen anderen von mir und Anderen schon mehrfach geführten Beweisen, unter andern auch aus der meist geschichteten Lagerung der Flötze sich ergibt, ein so unkenntliches Aeussere erlangt haben, dass man nur selten noch Strukturverhältnisse, geschweige wohl erhaltene ganze Pflanzen darin zu unterscheiden vermag, jedoch giebt es einige Gruben bei Nicolai und Myslowitz, in denen ausnahmsweise Sigillarien auf und in der Steinkohle sehr häufig vorkommen; wie denn auch auf der Carl Gustav Grube bei Charlottenbrunn in Niederschlesien ein Kohlenflötz erschurft ward, welches nach Beinert's und meinen Untersuchungen deutlich aus erkennbaren Resten von Calamiten, Lepidodendron und Sigillarien gebildet wurde. (Ueber Verbreitung der fossilen Gewächse in der Steinkohlenformation von H. R. Goeppert und C. Beinert in Karst und v. Dechen Arch. Bd. XV. Hft. 2.) Am besten erhalten finden wir die Pflanzen in den mit den Flötzen wechselnden Schieferthonen, zuweilen wohl auch in den Steinkohlensandsteinen erhalten und keinesweges so ohne alle Ordnung zusammengehäuft, wie man vielleicht beim ersten Anblick vermuthen dürfte. Nach *Beinert's*, einem der ausgezeichnetsten Förderer unserer vaterländischen fossilen Flora,

und meinen freilich bis jetzt nur auf einen kleinen Distrikt, nämlich in dem Flötztraktus von Tannhausen über Charlottenbrunn bis in das sogenannte Zwickeralth angeestellten Untersuchungen (v. a. a. O.) ergibt sich Folgendes:

Das Hangende und das Liegende der Schieferthone zweier über ein ander liegender Flötze unterscheidet sich weniger durch die physische Beschaffenheit, als durch die in ihnen liegenden Pflanzen, obschon sie sämmtlich zu einer Vegetationsperiode gehören, indem gewisse Arten dem einen fehlen, während sie in dem andern häufig angetroffen werden. So ist in den von uns untersuchten Flötzen des liegenden Schieferthons die *Stigmaria* in Quantität des Umfanges und der Verbreitung vorherrschend, während mit Ausnahme des *Calamites ramosus* fast alle anderer Pflanzen zurücktreten. Den hangenden Schieferthon begleiten überall in grosser Menge *Calamites Cisti*, *Sagenaria aculeata*, *Sphenopteris acuta*, die übrigen Arten kommen nur vereinzelt, nur sparsam vor, ja einzelne Arten einer und derselben Gattung werden an andern Stellen durch andere ersetzt. An Orten, wo z. B. *Calamites Cisti* und *C. cannaeformis* fehlen, tritt *Calamites ramosus* zahlreicher auf. Häufig finden wir die einzelnen, zu einander gehörigen Theile in nicht zu grosser Ferne von einander, wie z. B. die Blätter bei den *Lepidodendron*-Arten, bei den Stämmen, die Wurzeln, Früchte bei den *Calamiten*, Thatsachen, die wohl nicht selten auch anderswo vorkommen, wenn man durch glückliche Funde in den Staud gesetzt werden dürfte, die Abstammung der einzelnen Bruchstücke zu erkennen. Hieraus scheint aber hervorzugehen, dass die Pflanzen in ihrer gegenwärtigen Lagerstätte auch nicht zu weit von dem Punkte entfernt sind, wo sie einst vegetirten, wofür auch ihre sonstige gute Erhaltung spricht. Nicht uninteressant erscheint in dieser Beziehung ein *Calamites decoratus*, welcher, wie ich bisher wenigstens noch nicht beobachtet, senkrecht in den Schichten gelagert, gewissermassen stehend, wie es scheint, unter wenig stürmischen Verhältnissen, ausgefüllt ward, so dass seine Aeste selbst noch in ihrer natürlichen Lage in gleichmässiger Entfernung von einander sich befinden. — Einer besonderen Erwähnung verdienen die versteinten Stämme, welche im Gebiet der niederschlesischen Steinkohlen vorkommen. Die grösste Anhäufung derselben befindet sich zu Buchau bei Neurode. Früher lagen eine grosse Anzahl derselben zu Tage, die aber seit einigen Jahren zu mancherlei andern Zwecken, in dem benachbarten Buchau zu Thürschwellen, Brückenpfeilern benutzt worden sind. Nur einige ragen noch hervor und über einen prächtigen aus dem Felsen in 6 F. Länge hervorgehenden Stamm dieser Art von 30 Z. Durchmesser und 6 F. Länge geht das Gleis eines Fahrweges

hinweg. Ihre ursprüngliche Lage scheint mit dem Striche der in ihrer Nähe befindlichen Steinkohle beinahe parallel zu sein. Ein anderer sehr merkwürdiger versteinter Stamm, für dessen Erhaltung besser gesorgt ist, liegt in einem Kohlensandsteinbruche der Aue bei Waldenburg. Früher bei Eröffnung des Steinbruches an 60 F. lang, ist er gegenwärtig noch in 12 F. Länge bei $2\frac{1}{2}$ —3 F. Dicke erhalten und zu fernem Schutze mit einem kleinen Häuschen bedeckt. Er gehört nicht zu den Eichen wie man gewöhnlich sagt, sondern zu den coniferen-ähnlichen Araucarien der Jetztwelt, jedoch wegen Undeutlichkeit der Jahresringe nicht zu Araucarites, sondern zu Pissadendron. (Endl. et Ung.)

8. Grauwackengruppe oder Uebergangsgebirge.

Es gehören hierher zwei Gebirgsarten, die Grauwacke und der Thonschiefer. Das Uebergangsgebirge der Grauwacke ist in Ober- und Niederschlesien sehr verbreitet, in Oberschlesien auf dem linken Oderufer in dem schlesisch-mährischen Gebirge und den Karpathen, im Fürstenthum Neisse und im Leobschützer Kreise so wie (wiewohl nur vereinzelt) auf dem rechten Oderufer bei Zirowa und bei Tost, aber hier rücksichtlich seiner fossilen Flora noch unerforscht. Nur aus einem Steinbruche in Grauwacke bei Leobschütz besitze ich ein Exemplar eines Calamiten, der wenigstens in Schlesien dieser Form eigenthümlich zu sein scheint. Die Grauwacke ist im Ganzen ziemlich einförmig zusammengesetzt und besteht entweder aus feinen oder gröblichern Sandkörnern, die durch graue Thonmassen oder auch durch Kalk innig verbunden sind.

In Niederschlesien zerfällt das Uebergangsgebirge nach *v. Raumer*, *Zobel* und *Carnall* in 3 Abtheilungen, in das Hausdorfer, in das südliche oder Gläzer und in das nördliche Uebergangsgebirge. — Das Hausdorfer Uebergangsgebirge bildet nur einen schmalen Streifen, der nordwestlich und südöstlich zwischen dem unterliegenden Gneiss und der ihn bedeckenden Steinkohlenbildung hervortritt. —

Das südliche oder Gläzer Uebergangsgebirge füllt eine Lücke zwischen dem Gneiss des Eulengebirges, dem Volpersdorfer Gabbro und dem Ostgläzer Syenit aus. —

Das nördliche Uebergangsgebirge begleitet den Vorderrand der Ur-schiefer des Riesengebirges von der Gegend von Schatzlar über Rudolstadt und Freiburg in einer hufeisenförmigen Gestalt. Am mächtigsten ist es zwischen Landshut und Rudolstadt. Thierische Reste fehlen hier, dagegen befindet sich hier eine der grössten und durch mehrere eigenthümliche Formen. ausgezeichnete Niederlage fossiler Pflanzen. —

Kolossale Felsblöcke bestehen, wie z. B. in dem eine halbe Stunde von Landshut entfernten Steinbruch zum blauen Stern ganz und gar aus Calamiten und grossen Lycopodienstämmen, und riesige aber auch doch unendlich zarte Farn trifft man im Innern der dortigen Grauwacke an. — Ferner verdient der im dortigen Conglomerat des Uebergangsgebirges, am Burgberge noch vorhandene sogenannte versteinte Baum eine Erwähnung, ich sage, der sogenannte versteinte Baum, weil wir nicht die durch Stein selbst ausgefüllte Substanz des Baumes vor uns sehen, sondern nur das Bergmittel, welches sich in den Raum verbreitet, in dem er sich einst vor dem Verfaulen befand. Es ist daher gewissermaassen nur ein Abguss oder sogenannter Steinkern, wie diess die Alten nannten, der aber nichtsdestoweniger ausser der allgemeinen äusseren Form auch noch die Beschaffenheit der Rinde deutlich erkennen lässt. Schon im Jahre 1720 beschrieb Volkmann diese merkwürdigen Reste, und L. Langhanss, Konrektor zu Landshut, widmete ihnen im Jahre 1735 eide eigene Gelegenheitschrift. Diese Stämme, oder Abgüsse der Stämme, befinden sich an einer Felswand des sogenannten Burgberges, in dem Hofe eines Hauses in der Vorstadt von Landshut, welches daher den Namen zum steinernen Baume führt. Der eine dieser Stämme liegt horizontal, kommt nur in der Länge von 8 Fuss zu Tage und ist ganz durch grüblisches Conglomerat ausgefüllt. Der zweite stand zu Rechten unfern davon in einem Winkel von 75 bis 80 Grad, also ziemlich aufrecht, war 12 Fuss lang und noch durchschnittlich 10 Zoll breit. Leider fehlt aber grösstentheils der ausgefüllte Stamm, der zu Volkmann's Zeiten, ja noch bis zu Anfang dieses Jahrhunderts, vorhanden war, wo ein Reisender denselben mit sich genommen und nach Amerika gebracht haben soll. Jetzt sieht man fast nur noch die Rinde der hinteren Seite, die etwa $1\frac{1}{2}$ Zoll dick, aber vorläufig dauerhaft an die Wand des Felsens befestigt erscheint, und einen seitlichen Ast, von welchem es jedoch zweifelhaft ist, ob er diesem Stamme gehört. Zwischen dieser Rinde und dem noch übrig gebliebenen Stamme liegt eine dünne Schicht einer kohlig-pulverigen Masse. Der Stamm selbst gehört der untergegangenen Familie der Lepidodendreae an, wie ich nächstens in meinem Werke: *Genera plantarum fossilium* weiter nachweisen werde. —

Von Landshut und Rudolstadt bis nach Altwasser ruht auf der Grauwackenformation das Steinkohlengebirge. Es ist in diesem weiten Zuge von sehr mannigfacher äusserer Beschaffenheit und eben so verschiedenem Gehalt. Pflanzen, Farn, Calamiten, Lepidodendra kommen vermischt mit Seethieren vor, wie z. B. bei Altwasser, und letztere in ganz vorzüglicher Qualität und Quantität bei Ober-Kunzendorf bei Freiburg, wo

grosse Felsblöcke von Calamoporen, wahre Korallenbänke, angetroffen werden. Pflanzen treten jedoch hier zurück, und nur eine einzige Landpflanze, die *Lycopodites acicularis mihi* mit *Terebratula prisca*, in einem Stück vereint ist bis jetzt in diesem äusserst interessanten Punkte hier beobachtet worden. —

Was nun die Strukturverhältnisse dieser verschiedenen, zur Uebergangsformation gerechneten Ablagerungen insbesondere mit Rücksichten auf die neuesten so wichtigen Untersuchungen *Murchison's* betrifft, so glaubt *Beyrich*, gestützt auf die vergleichende Untersuchung der daselbst beobachteten thierischen Petrefakten (Ueber die Entwicklung des Flötzgebirges in Schlesien von *Dr. Beyrich*, Karsten und v. Dechen Archiv 16. Bd. 1844.), dass die ganze Masse des Hausdorfer sowohl wie die des nördlichen Uebergangsgebirges als jener unteren Abtheilung der englischen Steinkohlenformation gleichstehend zu betrachten sei, deren Ablagerung der Bildung der Steinkohlenflötze selbst voranging, und höchstens dem Ober-Kunzendorfer Sandstein, das Alter deronischer aber gewiss nicht älterer silurischer Schichten, die bei uns gänzlich fehlen, zugeschrieben werden könne.

In dem zweiten älteren Gliede der Uebergangsformation, dem Thonschiefer, welcher in Niederschlesien in grosser Ausdehnung zum Theil an den Granit-Gneus des Riesengebirges gränzend zwischen dem Bober, der Kätzbach und der wüthenden Neisse und auch in Oberschlesien im Fürstenthum Neisse als Ausläufer der grösseren Massen dieser Formation im Oesterreichischen vorkommt, sind noch keine Petrefakten entdeckt worden. —

II. Ueber die verschiedenen Zustände, in welchen sich fossile Pflanzen befinden und die Ursachen derselben.

Ueber den Zustand, in welchem sich fossile Pflanzen befinden, habe ich früher zwei Abhandlungen geschrieben (*Poggendorf, Annal. Bd. XXXVIII. p. 561—574, und Bd. XLII. p. 593 u. 607.*), deren

wesentlichen Inhalt ich mir um so eher erlauben darf hier mit einigen Verbesserungen und Erweiterungen anzuführen, als diesen Untersuchungen grösstentheils in Schlesien gemachte Beobachtungen zu Grunde liegen. —

Die fossilen Pflanzen kommen nach meinen Beobachtungen in folgenden Zuständen vor:

1. Stämme, Blätter, Blüten, Früchte zwischen den Stein- und Erdschichten gelagert, von der biegsamen nur schwach gebräunten Beschaffenheit bis zu allen Stufen der Verkohlung.

2. Als Abdrücke der Rinde der Pflanzen, deren Inneres zerstört und durch Steinmasse ausgefüllt ist.

3. Nicht die Gesammtmasse des Innern, sondern auch die einzelnen Theile, die Zellen und Gefässe der Pflanzen sind durch Steinmasse ausgefüllt, aber nicht, wie man gewöhnlich sagt, in Stein verwandelt.

1. Stämme, Blätter, Blüten, Früchte zwischen den Stein- und Erdschichten gelagert, von der biegsamen, nur schwach gebräunten Beschaffenheit bis zu allen Stufen der Verkohlung.

In dem Schieferthon und Eisenstein der älteren Steinkohlenformation finden wir die krautartigen Theile der Pflanze gewöhnlich verkohlt, mehr oder minder erhalten vor, so dass bei dem Trennen der Schieferthonschicht entweder die Pflanze auf einer Platte sichtbar wird, oder wenn die Substanz derselben nicht hinreichend fest ist, zum Theil in der darüber liegenden Schicht, auf der ihre Form als Abdruck vorhanden ist, hängen bleibt. Höchst selten sieht man die Pflanzen in dieser Formation zwischen den Schieferplatten noch völlig biegsam, schwach gebräunt oder wie getrocknet, wie ich dies in Zwickau und in dem Jura-Thoneisenstein Oberschlesiens zu Matzdorf bei Kreuzburg, ein wahres Lycopodium, aber auch in Niederschlesien bei Waldenburg, die Scheide eines Calamiten, zu Charlottenbrunn Blätter einer Grasart, zu Liebau, Neurode noch biegsame ovale Saamen beobachtete, in welchen Fällen man noch allerdings die anatomische Structur in ihrer grössten Zartheit (unter andern Oberhaut mit Stomatien) antrifft, während man dies bei den in schwarze Kohle verwandelten Pflanzen nicht zu erkennen vermag. In dem in Schlesien vorkommenden Schieferthon ist die Substanz der Pflanzen, obschon

verkohlt, gewöhnlich noch vorhanden, die aber fehlt, wenn sie durch Erdbrände vernichtet ward, wie z. B. in der Fanny-Grube bei Königshütte in Oberschlesien und zu Planitz in Zwickau; oder auch andere Umstände ihre Erhaltung verhinderten, wie z. B. bei den Cykadeenwedeln in der Jurathoneisensteinformation in Ludwigsdorf bei Kreuzburg; in den Sphärosideriten Englands, in dem mit den Schieferthonschichten vorkommenden, gewöhnlich das Dach der Flötze bildenden Kohlensandstein, so wie in der schlesischen Grauwacke bei Gläzisch Falkenberg und bei Landshut.

Abdrücke auf oder in der Steinkohle selbst findet man nicht häufig. Sie beschränken sich auf *Stigmaria*, *Lepidodendra*, *Sigillaria*, *Farn*, welche letztere aber am seltensten vorkommen, oder Blätter von *Monocotyledonen* ähnlichen Palmen und Gräsern. Nur in Oberschlesien wie in dem grössten Theil des Steinkohlenzuges zwischen Czerwonkau und Dubiasko bei Nicolai und in dem Haupttractus von Zabrze über Königsgrube bis Myslowitz sah ich namentlich auf den obersten Lagen der Kohle ausserordentlich viel Abdrücke von *Sigillarien*-Arten. Zuweilen ist die organische Substanz durch metallische Stoffe ersetzt, selten durch Bleiglanz oder Kupfererz, häufiger durch Schwefelkies. Konzentrische Rosettenartige Krystallisationen von Schwefelkies zwischen den Schieferthonen, wie man sie an mehreren Punkten findet, glaubte einst Rhode für Blüten erklären zu dürfen.

In der Juraeisensteinformation, im Pläner und Quadersandstein Schlesiens, scheint das Organische zu fehlen und nur der Abdruck desselben vorhanden, nur im Gips Oberschlesiens bei Katscher sah ich *Dicotyledonen*blätter wohl erhalten, wie dies denn auch meistens in der Braunkohlenformation, wie z. B. in Grünberg, Muskau, Görlitz der Fall ist.

Die Bildung der eben beschriebenen fossilen Gewächse kann man sich am leichtesten versinnlichen, indem man Pflanzen der Jetztwelt, insbesondere die dazu vorzüglich geeigneten Farnkräuter zwischen weiche Thonplatten bringt, im Schatten trocknet und dann allmählig bis zum Glühen erhitzt. Je nach dem verschiedenen Grade der Hitze erhält man die Pflanzen von dem getrockneten braunen bis zum völlig verkohlten Zustande, zuweilen auch noch glänzend schwarz, auf der Platte selbst anliegend, wenn man den Thon mit gepulverter Steinkohle oder Asphalt vermischt. Erhitzt man die Thonplatten bis zum Glühen oder bis zum völligen Verbrennen der darin eingeschlossenen Vegetabilien, so erhält man beim Zerschlagen den Abdruck der obern und untern Seite, wie dies auch in der Natur an oben erwähnten Orten, namentlich in Schlesien, im

Sandstein aller Formationen vorkommt. Ich bin weit davon entfernt, durch diese Experimente die Bildung auf trockenem Wege nachweisen zu wollen, sondern hege wohl vielmehr die Ueberzeugung, dass sie gewiss in den meisten Fällen auf nassem Wege eingeleitet, hie und da aber vielleicht durch hohe Temperatur vollendet oder beschleunigt wird. — Wenn man nach Entfernung des Wassers thonige Teichgründe untersucht, findet man häufig zwischen dem Thon mehr oder minder gebräunte Vegetabilien, die fossilen Produkten oder Abdrücken täuschend ähnlich sehen. Dasselbe suchte ich auf dem Wege des Experimentes nachzuahmen, indem ich eine Anzahl von Vegetabilien zwischen Thonplatten einschloss und ein Jahr lang in den Grund des 6Fuss tiefen Wallgrabens des hiesigen botanischen Gartens versenkte, woraus sich ähnliche Produkte ergaben.

Die Hölzer der ältern Kohlenformation sind in der Regel versteint, selten verkohlt.

Die Hölzer der Keuper-, Oolith- und Braunkohlenformation 1) sind ebenfalls oft versteint, auch bituminös, mehr oder minder schwarz oder braun, in letzteren oft so erhalten, dass sie heut noch verarbeitet werden können, mit vollkommen weisser Farbe, wie eben geschnittenes Holz der Jetztwelt sah ich sie ebenfalls, aber in Bernstein eingeschlossen in einem ausgezeichneten Stück der Sammlung des Hrn. *Berendt* in Danzig und in zwei ähnlichen Exemplaren meiner Sammlung.

Sehr interessante, gelungene Versuche über die Bildung von Torf und Braunkohle auf nassem Wege verdanken wir Hrn. *A. F. Wiegmann* (über die Bildung und das Wesen des Torfes von Dr. *A. F. Wiegmann*, Prof. in Braunschweig, 1837. S. 60 u. s. f.) In alten Bergwerken, wie z. B. in den Steinkohlenbergwerken von Charlottenbrunn, findet man zuweilen Holzreste von alten Verzimmerungen, die in glänzend schwarze Braunkohle übergegangen sind. — Dass sich endlich wirklich, wenn es noch irgend eines Beweises bedürfte, selbst Pechkohle auf nassem Wege bildete, zeigen die in Braunkohlenwerken, z. B. in Zittau in der Oberlausitz nicht seltenen Exemplare, wo in Grünberg in einzelnen Stämmen noch biegsame Braunkohle mit Pechkohle schichtenweis abwechselt und auf die interessanteste Weise die in glänzende Pechkohle verwandelten Stücke des Bernsteinbaumes *Pinites succinifer*, an und innerhalb welcher noch wohl erhaltener durchsichtiger, keine Spur von Schmelzung zeigender Bernstein befindlich ist. — Der Uebergang in erdige, strukturlose Braunkohle erfolgt natürlich durch Verwesung der Holzfaser, welcher Prozess nach meinen Beobachtungen bei den Coniferen wenigstens in den innern oder secundären Schichten der Holzzellen beginnt, indem sie sich

loslösen und wie Schuppen das Innere anfüllen, wobei natürlich die den Coniferen so eigenthümlichen Tüpfel auf den Wandungen der Holzzellen immer undeutlicher erscheinen, bis die Metamorphose auch die äussere Schicht ergreift und die Intercellularsubstanz, somit der Zusammenhang des Ganzen gestört wird. Die Intercellularsubstanz, welche bekanntlich bei den lebenden, wie auch bei gut erhaltenen fossilen Coniferenholzern, die zwischen den prosenchymatösen Holzzellen befindlichen Intercellulargänge erfüllt, beginnt bei dieser Zersetzung auch zu verschwinden, wie ich auf sehr ausgezeichnete Weise bei einem Exemplar des fossilen Taxusholzes sah.

Wahrscheinlich hat sich die ganze in den Steinkohlen begrabene vegetabilische Masse in einer noch stärkeren Auflösung und Zersetzung befunden als in der erdigen Braunkohle, wie wenigstens die so häufig vorkommende geschichtete Beschaffenheit derselben zu beweisen scheint. *Link* vergleicht in einer am 28. Juli 1838 in der Berliner Akademie vorgelesenen Abhandlung die Steinkohlenlager mit Torfmooren und weist dies durch vergleichende mikroskopisch anatomische Untersuchungen an Torf und Steinkohlen aus verschiedenen Gegenden nach, eine Ansicht, die gewiss viel für sich hat, und auch durch das häufige Vorkommen von Stämmen in der Kohle bestätigt wird. Dass hier und da bald mehr Stämme, bald anderswo mehr die gesammte übrige Vegetation Antheil an der Bildung der Kohle haben mögen, leuchtet von selbst ein und lässt sich aus localen Verhältnissen leicht erklären, bei welcher Gelegenheit ich an eine vom Hrn. Beinert und mir gemeinschaftlich in der C. G. Grube bei Charlottenbrunn gemachte, S. 176. bereits erwähnte Beobachtung erinnere. Das Hangende oder das Dach einer ganzen Strecke derselben besteht aus dichtem, feinkörnigen Sandsteine, der seiner ganzen Länge nach mit Abdrücken von Calamiten, Sigillarien und Lepidodendron bezeichnet ist. Diese Abdrücke sind in der That Hohldrücke und zwar grösstentheils der noch mit der Rinde versehenen, zuweilen aber auch entrindeten Stämme, woraus hervorgeht, dass die Stämme, als sie mit Sand bedeckt wurden, zum Theil entrindet waren; jedenfalls aber der grösste Theil dieser Steinkohle, die unmittelbar unter dem Dache, aber nur von 8—10 Zoll Mächtigkeit fortläuft und selbst die in dem Dache befindlichen Hohldrücke ausfüllt, diesen Stämmen ihren Ursprung verdankt.

2. Abdrücke der Rinde der Pflanze, deren Inneres zerstört und entweder hohl oder durch mineralische Massen ausgefüllt ist.

Der grösste Theil der in den Steinkohlen vorkommenden Stämme gehöret hierher. In der jüngeren Formation wird diese Bildung nur seltener und in der Braunkohle erinnere ich mich nicht, sie jemals beobachtet zu haben. Der organische Körper gerieth einst zwischen die weichen Schichten, wodurch ein Abdruck der äussern Oberfläche der Rinde entstand, während später die Masse oder das Innere desselben wahrscheinlich durch Fäulniss zerstört und durch anorganische, in der Nähe vorhandene, allmählig erhärtende Substanz ersetzt ward. Steine mit solchen Eindrücken nannten die älteren Lithologen *Spurensteine*, die Ausfüllungsmasse des Innern *Steinkerne*. Die Rinde der Stämme ist entweder in Steinkohlen ähnliche Masse verwandelt und zeigt dann noch so viel Structur, als man mit unbewaffnetem Auge auch an lebenden Pflanzen gesehen haben würde, oder sie ist auch zerstört und nur als ein kohliges Staub vorhanden, der zwischen dem Abdruck und dem Steinkern liegt, wie dies in Schlesien häufig im Kohlensandstein und im Uebergangsgebirge bei Landshut fast allgemein vorzukommen pflegt. In dem Abdruck erscheint Alles concav, was auf dem der Stamm oder der Rinde convex zu sehen war.

Die deutlichste Vorstellung von diesem ganzen Prozess erlangt man, wenn man in weichen Gips einen Pflanzentheil, etwa einen Fichtenast bringt, das Ganze trocken werden lässt und die leere Stelle desselben wieder durch Gips ausfüllt. Dieser Abguss nun entspricht dem Steinkern, der ihn umgebende Gips dem *Spurensteine*. Auch habe ich im Jahre 1841 einige Beobachtungen über diesen Prozess zu machen Gelegenheit gehabt, die unter andern nachweisen, wie es wohl geschah, dass von so vielen Stämmen nur die zarte Rinde erhalten und von der Structur des oft sehr umfangreichen Stammes selbst gar nichts mehr vorhanden ist. Das Flussufer der sogenannten alten Oder bei Breslau zwischen der Rosenthaler und Oswizer Brücke, besteht, wie man namentlich in wasserarmen Jahren sehr deutlich sehen kann, oberhalb aus einer 3—4 F. starken Sandschicht, auf welche ein eisenoxydreicher Lehm von 2—3 F. Dicke und unter dieser 1—2 F. mächtige Schicht von bläulichem Letten folgt, welche fast unmittelbar über dem sandigen Bette des Flusses liegt und schon bei mässigem Wasserstande gewöhnlich von Wasser bedeckt wird. Dieser bläuliche Letten, oder auch der unmittelbar darüber liegende Lehm,

enthält, und zwar ganz besonders häufig in der Nähe jener grossen, querliegenden Stämme, in Schichten von 3—4 Zoll Dicke, eine ungeheure Menge Blätter, die ich in ihrer horizontalen Lage längs dem ganzen Odufer der angegebenen Gegend wohl an 400—500 F. weit verfolgte, und die, meinen Nachgrabungen zufolge, sich in noch unerforschter Verbreitung auch noch weit unter das Ufer selbst erstreckte. Da bei dem gegenüber an der Rosenthaler Seite liegenden Ufer dieselben Verhältnisse stattfinden, und auch hier in gleicher Länge eine horizontal gelagerte Blätterschicht nebst Stämmen zum Vorschein kommt, so ist es mehr als wahrscheinlich, dass hier ein ganzer Wald begraben liegt, der der Urzeit Breslaus angehört, und vielleicht heute noch der Förderung werth zu achten sein dürfte.

Die stark gebräunten, aber grösstentheils noch wohlerhaltenen, zwischen den Thonschichten liegenden Blätter lassen sich vollkommen gut als Blätter der Sommereiche, *Quercus pedunculatu* W., erkennen, welche gegenwärtig noch in Schlesien die Ebenen und Flussthäler bewohnt, während *Quercus Robur* mehr der gebirgigen Gegend angehört, und auch dort selten ist. Jener schwärzliche, nach Schwefelwasserstoffgas riechende Thon ist mit Bruchstücken von Aesten und Wurzeln von Eichen, Equiseten und anderen Pflanzenarten erfüllt, die in einem Verkohlungsprozess begriffen sind. Bei einigen ist die Rinde bereits verkohlt, der Holzkörper davon so völlig gelöst, dass er selbst im feuchten Zustande leicht herausgenommen werden kann, und beim Austrocknen eines solchen Stückes leicht herausfällt, während die Rinde ziemlich fest am Thone haftet, und einen Abdruck ihrer Form bewirkt hat.

Die festeren Holzstämmchen sind nicht zusammengedrückt, wohl aber gewöhnlich die, bekanntlich nur lockerer Zellgewebe, vereinzelte Gefässbündel und weite Luftgänge enthaltenden Stängel und Wurzeln von *Equisetum arvense*.

Wenn nun jene Thonschichte, wie dies in wasserarmen Sommern der Fall ist, völlig austrocknet, werden dann beim Wiederkehren der Fluth die bereits lockeren Holzkörper mit Leichtigkeit herausgeschwemmt, und der auf diese Weise entstandene leere Raum mit Sand und Thon ausgefüllt, wie dies denn auch hier der Fall gewesen ist, indem man hie und da bereits mehr oder minder durch Thon und Sand ausgefüllte Holzstämmchen und Equiseten-Stängel findet*). Zuweilen ist auch die lockere

*) Interessant war es mir, hier wahrzunehmen, wie es zugeht, dass die Querwand, welche bei den Equiseten die Glieder von einander trennt, nicht die Ausfüllung hindert. Sie löst sich nämlich von allen Seiten mehr oder min-

kohlige Rinde mit entfernt worden, so dass wir nur eine Ausfüllung ohne dieselbe vor uns sehen.

Die Anwendung dieser Beobachtungen auf die Bildung der fossilen Pflanzen ergibt sich nun von selbst. Wir finden bekanntlich Steinkerne, die grösstentheils noch mit der in Kohle verwandelten Rinde versehen sind, wie dies in der älteren Kohlenformation, besonders bei den Calamiten, Lepidodendreen, Sigillarien und Stigmarien der Fall ist, aber auch dergleichen ohne die in Kohle verwandelte Rinde, wie besonders häufig in der Grauwacke und in den Sandsteinen der meisten Formationen, die dann auf ihrer Oberfläche nur den Abdruck der inneren oder der dem Stamme zugekehrten Seite der Rinde zeigen. Ebenso lehren diese Beobachtungen, auf welche Weise auch die festeren Dicotyledonenhölzer Veranlassung zur Bildung von Steinkernen geben können.

3. Die einzelnen Theile der Pflanzen, die Zellen und Gefässe sind mit Steinmasse ausgefüllt, oder, wie man fälschlich sagt, in Stein verwandelt.

Die versteinende Flüssigkeit drang in das Innere der Pflanzen, erhärtete in den innern Räumen der Zellen und Gefässe, während die Wandungen derselben sich mehr oder minder erhielten. Diese Ausfüllung geschah durch verschiedene mineralische, im Wasser aufgelöste Stoffe, am häufigsten durch Kieselerde, seltener durch Kalk oder Gips, Eisenoxyd, am seltensten durch Thon, dem nur sehr wenig Kieselerde beigemischt ist, oder auch wohl durch ein Gemisch von mehreren der genannten Stoffe. Genaue chemische, das quantitative Verhältniss dieser Stoffe besonders berücksichtigende Analysen, fehlen leider noch. Schon die älteren Naturforscher, von *Ar Agricola* bis auf *Walch*, *Schulze* und *Schröter* hatten im Ganzen eine sehr richtige Vorstellung von diesem Prozess und glaubten selbst an die Anwesenheit von organischen Substanzen in den versteinerten, ehemals lebenden Körpern, doch begnügte man sich in der neueren Zeit fast ganz allgemein mit der unbestimmten Annahme einer Verwandlung der organischen in die anorganische Substanz, ohne das gegenseitige Verhältniss beider irgend zum Gegenstand

der vollständig los, und wird so von dem eindringenden Ausfüllungsmaterial im wahren Sinne des Wortes bei Seite geschoben. Dies giebt viel Aufschluss über die Ausfüllung der Calamiten, die bekanntlich als Equisetaceen auch mit Scheidewänden versehen waren, bei denen man in der That bis jetzt niemals eine Scheidewand vollkommen erhalten angetroffen hat.

der Untersuchung zu machen. Zunächst bemühte ich mich, einige in der Jetztwelt versteinte Hölzer zu erhalten, indem ich die Meinung der oft dieserhalb verlachten älteren Schriftsteller theilte, dass dergleichen auch wohl noch heut entstehen könnten. So erhielt ich in der That durch Hrn. Oberforstrath *Cotta* zu Tharand und später von Hrn. Kaufmann *Laspe* in Gera Stücke einer Eiche aus einem Bach bei Gera, welcher in einem unbekanntem Zeitraum durch kohlensauren Kalk versteint worden war, was man beim Durchsägen derselben zuerst bemerkt hatte. Diese Stücke sind so hart, dass sie Politur annehmen, und die Gefässe und Zellen derselben mit Ausschluss einiger Markstrahlen-Zellen vollständig mit kohlensaurem Kalk ausgefüllt. Noch merkwürdiger erscheint mir ein ebenfalls von Hrn. Oberforstrath *Cotta* mitgetheiltes Stück Buchenholz aus einer alten, wahrscheinlich römischen Wasserleitung im Bückeburgischen, in welchem die Versteinerung sich auf einzelne der Länge nach durch das Holz sich erstreckende zylinderförmige Stellen beschränkt, so dass man beim ersten Anblick glauben konnte, wie auch Hr. *Robert Brown*, der diese Stücke bei Hrn. *Cotta* sah, meinte, es seien dort Risse oder durch Fäulniss entstandene Lücken gewesen, die von dem Kalk ausgefüllt worden waren. Von Fäulniss ist aber an dem diese Stelle umgebendem Holze keine Spur wahrzunehmen und bei mikroskopischer Untersuchung sieht man auf den verkalkten, ganz weiss erscheinenden Stellen dieselbe vortrefflich erhaltene Structur, wie auf dem benachbarten Holze. Bei dem Uebergiessen von Säuren kommt die bis dahin durch den Kalk ganz und gar bedeckte Holzsubstanz in vollkommenem Zusammenhang zum Vorschein, welche bei der Eiche noch Gerbestoff enthält. Es geht daraus unter andern hervor, dass der Versteinerung keineswegs immer eine Fäulniss der organischen Substanz, wie die ältern Lithologen meinten, vorherzugehen braucht. Jedoch gelang es mir nicht bloss durch Kalk, sondern auch durch Eisenoxyd bewirkte Versteinerungen zu beobachten, die in der That auch am häufigsten vorkommt, wie z. B. an bearbeitetem, mit eisernen Nägeln versehenen, der Feuchtigkeit ausgesetzten Holze, wie an Zäunen, Pfählen, Särgen u. dgl. In der oben bezeichneten, bei Breslau befindlichen Gegend, nämlich in der auf und um die Blätter liegenden Lehmschicht hatte ich nun Gelegenheit noch gegenwärtig vor sich gehende Erfüllung der in denselben befindlichen Vegetabilien mit Eisenoxydullösung, oder die Versteinerung durch Eisenoxyd in vielfachen Formen und Uebergängen zu sehen. Durch Haarröhrchen-Anziehung nahmen die Holzästchen und zarten Würzelchen das unstreitig durch Vermittelung der Kohlensäure aufgelöste Eisenoxydul auf; auf welche Weise die zartesten in diesem Boden vorkommenden vegetabilischen Theile mit

demselben erfüllt werden, so dass man beim Zerbrechen eines solchen Lehmstückes in der Richtung der Pflanzenstückchen überall rothe Streifen erblickt, und unter dem Mikroskop die zarten, durch Eisenoxyd (in welches das Eisenoxydul allmählig übergeht) ausgefüllten Zellen zu erkennen vermag. Hierdurch wird nun der Beweis geführt, dass auch krautartige vegetabilische Theile versteinen können. Im Innern können nun aber bei einer abermaligen Ueberschwemmung die mehr oder minder hohlen Pflanzentheile, wie z. B. Stengel der den fossilen Calamiten so ähnlichen Equiseten, leicht ausgefüllt werden, so dass also Versteinung und Ausfüllung hier zusammen vorkommen, wie ich auch in der That bei einigen vorweltlichen Pflanzen, z. B. bei *Stigmaria* beobachtete, deren Holzkörper versteint, die Centralachse nebst den letztere durchsetzenden Holzbündeln gewöhnlich ausgefüllt erschien. Dagegen gelang mir bis jetzt noch nicht, eine in unserer Zeit gebildete Kieselversteinung zu sehen.

Durch diese Erfahrungen veranlasst, untersuchte ich nun auch die vorweltlichen versteinten Hölzer. Die im Ganzen seltenen durch Kalk versteinten Hölzer, wie die aus dem Uebergangsgebirge bei Hausdorf und Glüzisch Falkenberg in der Grafschaft Glaz vorkommenden Hölzer, sowie die in diesem Werke beschriebene *Stigmaria* als aus der ältesten überhaupt Versteinungen führenden Formation, die aus dem Lias bei Kloster Banz, Bamberg, Boll, so wie von Aidaniel aus der Krimm, aus dem Oolith zu Withby, der berühmte Stamm von Craigleith in Schottland aus der Kohlenformation, von Loebejun, das sogenannte Sündfluthholz aus der Wacke, die die Erzgänge bei Joachimsthal und Weipers durchsetzt, (eine Conifere), das sogenannte Trüffelholz, Truffardino von Monte Viale bei Vicenza, verhielten sich wie die Obigen und lieferten die organische Faser in um so stärkeren Zusammenhang, je verdünnter die Salzsäure war, deren ich mich zur Auflösung des Kalkes bediente. Aus den ersten beiden schied sich auch noch ein bituminöses, wie ein Gemisch von Kreosot und Steinöl riechendes Oel aus, woraus also, beiläufig bemerkt, hervorgeht, dass, da jene durch Kalk versteinten Hölzer unmöglich einer sehr hohen Temperatur ausgesetzt sein konnten, Bitumen auch auf nassem Wege gebildet worden ist.

Durch Gips versteinte Hölzer kommen sehr selten vor. Ich habe bis jetzt nur an einem einzigen Ort in der jüngeren Kohlenformation zu Katscher in Schlesien dergleichen beobachtet. Ein ganzer, über 4 Centner schwerer Stamm befindet sich im hiesigen akademischen Mineralienkabinet. Die Holzfaser ist nur theilweise versteint, theilweise noch ganz biegsam und gebräunt. Als ich nun durch Flusssäure die Kiesel Erde aus den ver-

kieselnen Hölzern entfernte, fand ich in sehr vielen noch so gut conser-
virte Zellen und Gefässe vor, dass man hieraus noch die Gattung des
Holzes zu bestimmen vermochte. Je nach der Beschaffenheit des Holzes,
in welchem sich das Holz vor oder nach der Versteinung befand, war
natürlich die Menge jener Faser verschieden, bei sehr vielen fehlte sie
aber auch ganz; doch spricht dies keinesweges gegen die aufgestellte
Theorie dieses Prozesses.

In den Hölzern, welche nur sehr wenig oder gar keine organische
Substanz nach der Behandlung mit Flusssäure zurücklassen, wie im All-
gemeinen die meisten mit den nordischen Geschrieben in Schlesien, Polen,
Preussen, Pommern, Mecklenburg, Brandenburg vorkommenden Hölzer
(Bemerkungen über die als Geschiebe im nördlichen Deutschland vorkom-
menden versteineten Hölzer, *Bronn* und *Leonhard Zeitschrift* 1839.
S. 518), die häufig so verwittert sind, dass die einzelnen Jahresringe sich
leicht von einander trennen lassen, so wie einige opalisirte Hölzer der
Braunkohlenformation zu Ober-Cassel, zu Eger, Hölzer aus dem Porphyr
zu Chemnitz und zu Charlottenbrunn, die meisten achatisirten Hölzer
Sachsens, in denen der Quadersaudsteinformation Schlesiens, Aachens
u. m. a. ist dieselbe offenbar erst nach der Imprägnation oder der Ver-
steinung entweder auf nassem oder trockenem Wege entfernt worden.
Die Struktur aber ward dadurch nicht vernichtet, indem durch die ver-
steinende Masse in jeder Zelle und jedem Gefässe gewissermassen ein
Steinkern gebildet, und so natürlich auch die Beschaffenheit der Wände
erhalten worden war. Gingen nun diese Wände auch selbst verloren,
ward demohnerachtet doch ihre Gestalt von dem Steinkern oder der Aus-
füllungsmasse bewahrt. Um mich auch auf dem Wege des Experimentes von
der Richtigkeit dieser Annahme zu überzeugen, setzte ich in einem klei-
nen Schmelztigel feingeschliffene Quer- und Längsschnitte versteineter
Coniferen-Hölzer, die wie die von Buchau in Schlesien noch ihre ganze
organische Faser enthalten, drei Viertelstunden lang der Weissglühhitze
eines Sefsströmschen Ofens aus. Die verschiedenartig gefärbten Hölzer
waren dadurch ganz milchweiss geworden und zeigten unter dem Mikro-
kope noch ganz deutlich die frühere, die Coniferen characterisirende
Structur, jedoch mit dem Unterschiede, dass die eigenthümlichen Tüpfel
auf den Wänden nun nicht mehr vertieft, sondern schwach erhaben, wie
kleine Wärzchen, bei sehr starker Vergrösserung erschienen, woraus,
wenn es noch irgend eines Beweises bedürfte, die neuere Ansicht über die
Beschaffenheit der Tüpfel der Coniferen, dass sie nämlich durch Ver-
tiefungen in der Gefässwandung gebildet wurden, noch mehr Bestätigung
erhielt.

Abgesehen davon, dass wir mittelst der eben beschriebenen Methode in manchen Fällen das bisher die Untersuchung der fossilen Hölzer so sehr erschwerende Schleifen derselben entbehren können, ergeben sich wohl hieraus entscheidende Aufschlüsse über die Beschaffenheit und Bildung der Versteinerungen überhaupt. Es scheint nun nicht mehr unerklärlich, warum wir in den meisten Fällen bei den versteinten Hölzern die einzelnen Theile derselben, Rinde, Holz, Splint, Mark und die einzelnen Jahresringe nicht bloss wohl erhalten, sondern oft noch mit den natürlichen Farben, oder wenigstens doch scharf durch Farben von einander getrennt erblicken. Die versteinenden Flüssigkeiten durchdrangen zuerst, wie schon erwähnt, die Wände der Holzzellen und Gefässe, später wurden die Höhlungen derselben selbst ausgefüllt. Je langsamer, gleichförmiger und ruhiger dies erfolgte, um desto deutlicher erscheint die Structur und der Durchmesser der Gefässe. Da ferner, wie ich schon oben gezeigt habe, Fäulniss der organischen Substanz durchaus nicht vor der Versteinung erforderlich war, geschah es, dass auch in den Zellen befindliche feste Körper in günstigen Fällen erhalten wurden, wie *Robert Brown* im zelligen Gewebe eines versteinten Cycaditenstammes Theile von *Chalcedon* gefunden hat, welche der Form nach dem Gummi in den Stämmen der lebenden Cycadeen gleichen (*Buckland Geol. u. Mineralog. übers. von Agassiz II, Bd. Anmerk. zu Tab. LXII.*). *Corda* beobachtete in den Parenchymzellen fossiler Farne (*Protopteris Colteana, Sternb. Flora der Vorwelt VII. u. VIII. Heft, Tab. LXVII. fig. 3*) noch einzelne, *Amylum* ähnliche Körner; harzähnliche Klümpchen sah ich in den Harzgängen einiger verkieselter Coniferen, insbesondere in einem aus Oberschlesien stammenden Geschiebe. — Spuren von Verletzungen durch Insecten habe ich bis jetzt noch nicht bei den Hölzern des Uebergangsgebirges und der Steinkohlenformation beobachtet, wohl aber in den mit nordischen Geschieben vorkommenden Hölzern in den rheinischen Holzopalen, insbesondere im Quadersandstein Schlesiens, Lausitz und dem Grünsand von Aachen (H. 215. der Berl. Samml.) und von *Rovali* in der Ukraine. In letzterem, von Hrn. *Dubois de Montpereux* mir mitgetheilten Exemplare sind wie in dem von Aachen die Wurmgänge mit bröcklicher Masse ausgefüllt, die zum grössten Theile aus kleinen, aber versteinten Holzsplitterchen besteht, wie wir auch in den Wurmhängen der Jetztwelt, aber natürlich nicht versteint antreffen. — Sie ähneln denjenigen, welche *Cerambyx*-Arten hervorzubringen pflegen. In dem Holz von Aachen befinden sich längliche, an beiden Enden abgerundete, aus Kiesel bestehende Körper, die ziemlich durchsichtig aber nicht ganz fest, äusserlich glatt erscheinen, die man vielleicht für Steinkerne der Maden oder Larven

halten kann, welche sich in diesen Gängen in den einst lebenden Bäumen befinden. Holz mit Ammoniten fand ich in der Juraeisensteinformation von *Wichorw* in Schlesien und einen Lycopoditen mit Terebrateln in dem Uebergangskalk bei Kunzendorf in Schlesien. (*Lycopodites acicularis* mihi.)

Wenn wir nun untersuchen, durch welche Mittel wohl jene im Wasser fast unauflöselichen versteinenden Mineralien in solcher Menge den Pflanzen zugeführt wurden, so glaube ich, dass dies eben nur unter Vermittlung ähnlicher Kräfte, wie in der Gegenwart, nämlich durch das Wasser, aber in einer sehr langen Zeit geschah und das Wasser der Vorwelt keine grössere auflösende Wirkung besass, als das der Jetztwelt. Die Kiesel-erde ward durch das blosse Wasser, welches bekanntlich die Kiesel-erde, obschon freilich nur in sehr geringer Menge ($\frac{1}{1000}$ nach *Kirwan*) aufnimmt: Eisen, Kalk, Kupfer unter Mitwirkung der Kohlensäure aufgelöst, welche letztere Substanzen sich dann nach Entfernung der Kohlensäure in den Gefässen der Pflanzen absetzen. Sollte die Kohlensäure wirklich, wie dies Hrn. *Ad. Brongniart's* Untersuchungen sehr wahrscheinlich machen, in der Vorwelt in grösserer Menge als heute vorhanden gewesen sein, so dürfte dies allein nur als das einzige Agens betrachtet werden müssen, welches diesen Bildungsprozess in der Urwelt mehr als in der Jetztwelt begünstigte. Zu der oben angeführten Behauptung liefern übrigens die in der Jetztwelt beobachteten Versteinungen den Beweis, der vollständig genannt werden dürfte, wenn es nur noch gelänge, woran ich aber nicht zweifele, auch eine jetztweltliche Kieselversteinung ausfindig zu machen. Die Hinweisung auf die Zeit ist durchaus keine leere Ausflucht, da die Auflösung des versteinenden Materials nur sehr verlangsamt sein konnte, weil sonst nicht Ausfüllung des Innern, sondern Umkleidung des Aeussern, also Inkrustation erfolgte, die zwar die Erhaltung des Organischen bewirkte, aber die Versteinung verhinderte, wie wir dies bei dieser, unserer Zeit angehörenden Bildung deutlich sehen. Wenn, wie diess bei den durch kohlen-sauren Kalk oder Eisenoxyd gebildeten Inkrustationen der Fall ist, die Kohlensäure entweicht, so schlagen sich die genannten in grösserer Menge aufgelösten mineralischen Substanzen nieder, umhüllen allmählig das Vegetabil und verhindern somit, nachdem eine feste Kruste gebildet worden ist, die weitere Einwirkung auf dasselbe. Es wird daher eingeschlossen und im vertrockneten Zustande gut erhalten, kann aber niemals mehr versteinen. Unter fort-dauernder Einwirkung der Feuchtigkeit verwest es endlich, lässt aber den Abdruck zurück, welche Weise die poröse Beschaffenheit des Kalktuffs entsteht, der sich in vielen Gegenden, wie z. B. in Jena am Fürstenbrunnen, um Gotha, Karlsbad, am Tivoli und an vielen Orten in so grosser Menge erzeugt.

In Schlesien hatte ich bis jetzt Tuffbildung mit Abdrücken nur selten Gelegenheit zu sehen, wie z. B. in der Nähe einer kalkhaltigen Quelle zu Heide-Wilken bei Trebnitz. Je reicher an kohlensaurem Kalk die Quellen sind, desto schneller bilden sich diese Niederschläge. In Tivoli findet die Inkrustation organischer Körper nach *Charles Moxon* schon innerhalb wenigen Tagen statt. (*Fror.* Neue Not. S. 152 u. 156. N. 186. 1839) während bei dem Sprudel zu Carlsbad wenigstens eine Woche dazu erforderlich ist. Oft sind die Pflanzen an den unteren Theilen schon inkrustirt, während sie oben noch fortwachsen, wie ich sehr deutlich an Moosen bei dem oben erwähnten Fürstenbrunnen beobachtete. Ausser Kalktuff von verschiedenen Orten besitze ich in meiner Sammlung zwei durch Eisenoxyd zusammenge kittete, aus kleinen Kieseln bestehende Massen, wovon die erstere aus einem Steinkohlenbergwerk stammend, ein Messer, die andere, auf einem Schlachtfeld bei Hohenfriedeberg gesammelt, eine breitgedrückte Bleikugel nebst einer Silbermünze enthält.

In Beziehung auf das Vorkommen von theilweise versteinten urweltlichen Hölzern, wie in den meisten Braunkohlengruben angetroffen werden, namentlich solchen, die im Innern versteint, und von allen Seiten noch von unverändertem Holze umgeben sind, glaube ich, dass es sehr wohl geschehen konnte und noch geschieht, man erinnere sich an die oben angeführte jetztweltliche Eiche und Buche, dass ein noch mit den Wurzeln im Boden befestigter, lebender Stamm theilweise und dann allmählig vollkommen versteint. Eben so gut, wie das Innere bei den durch Frost getödteten Stämmen oft vollkommen abgestorben, vertrocknet oder verfault angetroffen wird, und nur eine geringe Zahl von äusseren Schichten das Leben des Gewächses erhält, so kann auch das Innere auf die oben angegebene Weise ausser Beziehung zu der übrigen Organisation gesetzt werden. Jedenfalls empfehlen wir bei künftigen Analysen versteinter Hölzer auch die des Muttergesteines beizufügen. Wenn man z. B. wie in der aus Riesel und Kalk bestehenden Wacke bei Gläzisch Falkenberg alle darin vorkommenden Vegetabilien nur durch kohlensauren Kalk versteint antrifft, wird man unwillkürlich an die schon so oft beobachtete Wahlanziehung erinnert, welche die Wurzeln lebender Pflanzen auf organische und anorganische Substanzen ausüben.

Wenn man, was bisher noch nicht geschah, auf ähnliche Weise die fossilen Thiere untersuchte, würde man, in soweit ich in Folge einiger Erfahrungen zu beurtheilen vermag, zu einem verwandten Resultat gelangen, oder sich überzeugen, dass der Prozess, durch welchen sie bis auf unsere Zeit erhalten wurden, sich auf ähnliche Weise, wie in den Pflanzen gestaltete. Dann möchte es wohl an der Zeit sein, für beide Reiche

das Wort *Versteinung*, wohl richtiger als *Versteinerung*, nicht ohne Unterschied für alle fossilen organischen Körper, wie dies bisher ganz allgemein geschieht, sondern nur für diejenigen zugebrauchen, deren innere Organisation wirklich durch mineralische Substanzen verhärtet ist. Die Bezeichnung *fossile Pflanzen* und *fossile Thiere* würde unstreitig als allgemeiner am passendsten sein, die wir hiermit in Vorschlag bringen und auch für die Pflanzen überall anwenden werden.

IV. Uebersicht sämmtlicher, bis jetzt von mir in Schlesien beobachteten, fossilen Pflanzen.

A. *Plantae cellulosae* (Zellenpflanzen.)

I. *Plantae cellulosae aphyllae*. (Blattlose Zellenpflanzen.)

1. Familie. *Fungi*. Pilze*).

Pyrenomycetes. Kernpilze.

Excipulites Goepf.

Kleine fast mikroskopische becherförmige sitzende in die Blattsubstanz etwas eingesenkte Pilze. — Die Kernhülle (*Perithecium*) fest, hart, anfänglich fast geschlossen, später geöffnet mit ganzem Rande. —

Excipulites Neesii Goepf. die fossilen Farnkräuter, Taf. XXXVI. Fig. 4. S. 421.

Auf dem Wedel eines fossilen Farnkrautes *Hymenophyllites Zobelii* Goepf. Kohlenformation von Waldenburg.

Anmerk. Zu den sogenannten zufälligen Bildungen oder in die Kategorie der im fossilen Zustande so häufig kugelförmigen Absonderungen

*) Die in der heutigen Flora noch existirenden Familien glaubte ich hier nicht näher charakterisiren zu dürfen, nur die ausgestorbenen sind ausführlicher erwähnt.

gehören Sphaerien oder Lycogala-Arten ähnliche runde durch Eisenoxyd röthlich gefärbte, auf Sandstein oder in Blasenräumen desselben so wie auch auf der Oberfläche oder im Innern von versteinertem Holze vorkommende kugelförmige Körperchen von verschiedener Größe (S. meine Abh. über die Flora des Quadersandsteins, S. 111. Tab. XLVI. Fig. 9 — 13. Tab. XLVII. Fig. 14.), die man wohl sehr leicht für Pilze erklären könnte.

2. Fam. Lichenes. Flechten.

Auf Rinde aus der Braunkohle zu Muskau bemerkte ich eine der *Verrucaria nitida* Fries. der Jetztwelt täuschend ähnliche Flechte: *Verrucarites geanthracis mihi*.

3. Fam. Confervae.

In der Kreide bei Oppeln scheinen dergleichen vorzukommen, doch bedürfen sie noch genauerer Untersuchung.

4. Fam. Fucaeae vel Fucoideae. Seetange.

Chondrites Sternb.

Das Laub nervenlos, lederartig, fadenförmig, gabelförmig, ästig, mit cylindrischen Aesten, häufig zusammengepresst.

Chondrites trichomanoides Goeppl. d. fossil. Farnkr. Tab. XXX. 2. b.

Im Stinkkalkschiefer zu Ottendorf unfern der schlesischen Grenze mit *Lycopodien* und *Fischen* (*Palaeoniscus lepidurus* Ag.)

Sphaerococcites Sternb.

Das Laub nervenlos, fast lederartig, flach gablig oder gefiedert, zuweilen auch fadenförmig.

Sphaerococcites Blandowskianus Goeppl. manuscript. In Böhm's Kalksteinbruch bei Tarnowitz (v. Blandowski).

Münsteria Goeppl.

Das Laub stengelartig, röhrig, cylindrisch, oder einfach rasenartig zusammengehäuft, gablig, mit erhabenen Querstreifen versehen. Die Sporenbehälter punktförmig, zerstreut, sehr häufig zwischen den Querstrichen in das Laub versenkt.

Münsteria Schneideriana Goeppl. Flora des Quadersandsteins in Schlesien. Nova Acta Acad. C. L. C. Nat. Cur. Vol. XIX. P. II. p. 115. Tab. LI. Fig. 3.

Zu Rieslingswalde in der Grafschaft Glaz und zu Neuen bei Bunzlau (Dr. *Schneider*). — Im Quadersandstein bei Habelschwert, Alt-Waltersdorf und Melling (*Petzeld, Otto*).

Cylindrites Goepp.

Laub cylinderförmig, stellenweise höckrig oder scheinbar blasig aufgetrieben, mit aufgeschwollenen keulenförmigen Spitzen. Die Sporangien knötchenförmig spiralig gestellt aber noch zweifelhaft.

Cylindrites spongoides Goepp. l. c. Tab. XLVI. Fig. 1—5 und Tab. XLVIII. Fig. 1. 2.

Cylindrites daedaleus Goepp. l. c. Tab. XLIX. — Im Quadersandstein bei Schandau in Sachsen und bei Habelschwert.

Cylindrites arteriaeformis l. c. Tab. L. — Im Quadersandstein zu Rieslingswalde (*Otto*).

Anmerk. Die ganze Gattung ist noch sehr zweifelhaft, die erste Art gehört vielleicht zu den Spongien, die beiden andern zu zufälligen Bildungen. Ich habe sie nur beschrieben und abgebildet, um die Aufmerksamkeit Anderer auf diese sonderbaren Gebilde zu leiten.

II. *Plantae cellulosaе foliosae.* (Beblätterte Zellenpflanzen.)

5. Fam. *Musci hepatici.* Lebermoose.

Auf Stämmen in den Braunkohlenlagern bei Grünberg erkannte ich Lebermoose, ähnlich *Jungermannia dilatata*, jedoch in sehr verrottetem Zustande, so dass ich diess nur hier bemerke, um diesen Gegenstand der Beachtung zu empfehlen.

***B. Plantae vasculares.* (Gefäßpflanzen.)**

III. *Monocotyledones cryptogamae.* (Kryptogamische Monokotyledonen.)

6. Fam. *Equisetaceae.* Schaftheuarten.

Calamites Suck. et Schloth.

Stengel fast cylindrisch, längsstreifig gefurcht, gegliedert, die Streifen mit den Gliedern abwechselnd, zuweilen auch fortlaufend. Scheiden anliegend oder abstechend. tief gezähnt oder an deren Stellen an der

Spitze der Glieder zwischen den Streifen oder Furchen symmetrisch gestellte Knötchen. Fruktifikation noch unbekannt.

Calamites pachyderma Brong.

Kohlen-Formation Waldenburg.

C. remotus Brong.

K. F. Charlottenbr.

C. cannaeformis Schloth.

K. F. Ober- und Niederschlesiens nicht selten.

C. Pseudo Bambusia Schloth.

K. F. Waldenb.

C. Mougeotii Brong.

C. decoratus Schloth.

K. F. Ober- u. Niederschlesien.

C. Voltzii Brong.

C. approximatus Sternb.

K. F. Charlottenbr. selten.

C. Succowii Brong.

K. F. Ober- und Niederschlesien.

C. tumidus Sternb.

K. F. Waldenb.

C. dubius Sternb.

K. F. Waldenb.

C. ornatus Sternb.

C. verticillatus Lindl.

K. F. Waldenb.

C. nodosus Sternb.

K. F. Charlottenbr.

C. cruciatus Sternb.

K. F. Charlottenbr.

C. Brongniartii Sternb.

C. regularis Sternb.

K. F. Waldenburg selten.

C. undulatus Sternb.

K. F. O. u. Niederschlesien, aber selten.

C. Cistii Brong.

K. F. O. u. N. Schlesien häufig.

C. transitionis Goep. manusept.

Im Uebergangsgebirge bei Landshut und bei Altwasser.

C. stigmarioides Goep. manusept.

Im Uebergangsgebirge bei Landshut.

Calamites tuberculatus Goepf.

Im Uebergangsgebirge bei Landshut.

C. Lehmannianus Goepf. icon. ined.

Brauner Jura oder Thoneisenstein zu Wilmsdorf bei Landsberg.

Equisetites Sternb.

Stengel röhrig, cylindrisch längsstreifig gefurcht, gegliedert, einfach oder unter den Gliedern ästig, mit unter den Gliedern eingefügten vielzähligen oder vielspaltigen Scheiden versehen. Fruktifikation endständig, zapfenförmig, rundlich, länglich, anfänglich von den obersten Scheiden eingehüllt, dann frei mit fünfseckigen Fruchthältern.

Equisetites mirabilis Sternb.

K. F. Waldenburg und Altwasser. Sehr selten.

Equisetites dubius.

K. F. Waldenb.

Bornia Sternb. et Goepf.

Stengel cylindrisch, baumartig gegliedert längsstreifig, mit an den Gliedern verdickten, über dieselben aber hinausgehenden Streifen.

Bornia scrobiculata St. (Schloth. Nachtr. zur Petrefaktenkunde.)
S. 208. Tab. XX. F. 4.

Uebergangsgebirge bei Landshut.

7. Fam. Asterophyllitae Ung.

Krautartige, oft auch baumartige Gewächse mit gegliederten ästigen, meist gestreiften beblätterten Stengeln. Blätter quirlförmig, linear frei oder an der Basis vereinigt. Fruktifikation endständig, seitenständig, ährenförmig. Fruchthälter quirlförmig frei eiförmig zusammengedrückt.

Asterophyllites Brong.

Stämme selten einfach, gewöhnlich ästig mit gegenüberstehenden Aesten. Blätter aber mehr oder minder linienförmig zugespitzt oder stumpflich mit einem einfachen Mittelnerven und frei bis zur Basis. Früchte einsamig achselständig sitzend.

Asterophyllites equisetiformis Sternb.

K. F. Waldenburg, Albendorf, Neurode, Zalenze in Oberschlesien.

A. grandis Lindl. et Hutt.

K. F. Zalenze.

A. dubius Br.

Mit den Vorigen.

A. charaeformis Goepf.

A. tenuifolius Br.

K. F. m. d. Vorigen.

Asterophyllites tuberculatus Br.

K. F. Albendorf.

A. longifolius Br.

K. F. Charlottenbr.

A. foliosus Lindl. et Hutt.

K. F. Charlottenbr.

A. galioides Lindl. et Hutt.

K. F. Waldenb.

A. diffusus B.

K. F. Charlottenbr.

A. rigidus Br.

Mit der Vorigen.

A. giganteus mihi. (*Hippurites* Lindl. et Hutt.)

K. F. Waldenb.

A. Neumannianus Goepp. manusept.

Stinkkalk bei Tunschendorf, Grafschaft Glaz, in Albendorf mit *Neuropteris conferta* Sternb. — (Neumann in Wünschelburg.)

Annularia Sternb.

Stengel steif mit gegenüberstehenden oberhalb der Blätter ansitzenden Aesten. Blätter quirlförmig, flach, gewöhnlich fast stumpf, von einem Mittelnerven durchzogen an der Basis vereinigt.

Annularia spinulosa St.*A. radiata* St.*A. fertilis* St.

Sämmtlich K. F. Niederschlesiens.

Volkmania Sternb.

Stengel zuweilen fast baumartig gegliedert, längsstreifig, blattlos mit ährenförmigen Fruktifikationen. Eine noch unvollständig bekannte Gattung, deren Arten wohl fruktificirende Exemplare anderer im fruchttragenden Zustande noch nicht bekannter Equisetaceen sein dürften, wie dies von *Germar* für die *Volkmania gracilis* nachgewiesen ward, die nichts anderes als ein fruktificirendes *Sphenophyllum Schlotheimii* ist; inzwischen wollen wir die Gattung noch für die Exemplare, welche noch nicht auf ihre Stammarten zurückgeführt worden sind, beibehalten.

Volkmania polystachya St.

K. F. Charlottenbrunn und Waldenburg selten.

V. arborescens Sternb.

K. F. Albendorf.

Volkmania hottonioides Goepf.

Stinkkalk bei Ottendorf.

Sphenophyllum Br.

Stengel einfach oder ästig, mit 6—12 quirlförmig gestellten bis an ihre Basis freien, keilförmigen ganz oder ausgerandeten, zwei- oder fast dichotom, oder auch mehrtheiligen Blättchen. Fruktifikationen ährenförmig.

Sphenophyllum Schlotheimi Br.

Nicht selten K. F. O. u. Niederschlesien.

Sph. saxifragaefolium Goepf.

Mit der Vorigen aber noch häufiger.

Sph. erosum Lindl. et Hutt.

Charlottenbr. selten.

8. Fam. Lycopodiaceae.

Lycopodites Brong.

Strauch- oder baumartige Gewächse mit gefiederten gabelförmigen Aesten, mit vielreihigen spiralig gestellten mehr oder minder zugespitzten sitzenden einnervigen gleichen oder auch ungleichen Afterblättchen (*Stipulae*) ähnlichen Blättchen, die nach dem Abfallen eine mit einem erhabenen Punkt bezeichnete Narbe zurücklassen. Fruktifikationen in Schlesien noch nicht gefunden.

Lycopodites acicularis Goepf. Beitrag zur Flora des Uebergangsgebirges. Nova Acta Acad. C. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XIX. P. II. P. 382. Tab. LXVIII.

Uebergangskalk bei Ober-Kunzendorf bei Freiburg mit Korallen und Conchylien *Terebratula prisca* (*Bocksch*).

Lycopodites juliformis Goepf. icon. ined. *Rhode's* Beitr. zur Pflanzenkunde d. Vorw. Tab. X.

Rother Kohlensandstein bei Neurode (*Rhode*).

Lycopodites phlegmarioides Sternb.

K. F. Waldenb.

L. selaginoides Sternb.

K. F. Waldenb.

L. elegans Sternb.

K. F. Waldenb.

L. longifolius Goepf. ic. inedit.

K. F. Zalenze in O. Schl.

L. oocephalus Lindl. et Hutt.

K. F. Charlottenbr.

Lycopodites Bronnii Sternb.

Im Stinkalkschiefer bei Tunschendorf Grafschaft Glaz und in dem benachbarten, schon in Böhmen liegenden Ottendorf.

L. Meyerianus Goeppl. manuscript.

In dem braunen Jura oder Thoneisenstein zu Matzdorf bei Kreuzburg.
(Dr. Meyer.)

Lepidodendron Sternb.

Baumartige, rundliche, gabelästige Stämme, mit linienförmigen, in spiraligen Reihen stehenden Blättern dicht bedeckt, die nach dem Abfallen rhomboedrische dicht an einander stehende Blattnarben zurücklassen, auf deren oberem Theil (der eigentlichen Basis des Blattes) beinahe im Centrum sich eine kleinere, breitgedehnte, fast rhombische (nach oben zuweilen mehr bogenförmige, mit nach Aussen gekehrter Convexität und seitlichen spitzen Winkeln) durch 3 kleine erhabene, neben einander stehende Punkte gezeichnetes Närbchen (*cicatricula*) befindet, von welcher eine erhabene Linie senkrecht herabgeht, die die ganze Narbe in 2 gleiche Hälften theilt. — Früchte, zapfenähnlich, an der Spitze der Zweige. Die innere Struktur der Stämme der jetztweltlichen Lycopodien analog.

Lepidodendron manebacense Sternb.

R. F. Albendorf.

Sagenaria Brong.

(*Lepidodendri species* Sternb.)

Baumartige, rundliche, gabelästige Stämme, mit runden grossen Astnarben und linienförmigen oder auch eiförmigen zugespitzten Blättern dicht bedeckt, die nach dem Abfallen spiralig zu 4 gestellte verkehrt eiförmige längliche einander genäherte von einer mehr oder weniger tiefen Furche umgebenen Narben zurücklassen, auf deren oberem Theil excentrisch eine rhombische gewöhnlich mit 3 Punkten bezeichnete kleinere Narbe sich befindet, von der eine erhabene, die ganze Narbe in zwei fast gleiche Hälften theilende Linie nach dem unteren spitzen Winkel verläuft.

Bei älteren Stämmen verschwinden allmählig jene so charakteristischen Narben und machen einer rissigen Rinde Platz, so dass man dann nur noch an den Astansätzen oder an dem jüngeren Theil des Stammes sie zu erkennen vermag. (icon. inedit.)

Sagenaria aculeata Presl.

R. F. Häufig in Ober- und Niederschlesien.

S. rugosa Presl.

R. F. Charlottenbr. Waldenb.

Sagenaria crenata Presl.

K. F. Chartottenbr. u. Waldenb., Liebau, Albendorf.

S. Volkmanniana Presl.

K. F. Selten Charl., Waldenb.

S. obovata Presl.

Häufig Ober- und Niederschlesien.

S. Puschiana Goep. manuscript.

Kohlensandstein bei Nicolai.

S. caudata Presl.

K. F. Charl.

S. rimosa Presl.

K. F. häufig in Niederschlesien.

S. Goepertiana Presl.

K. F. Selten Charl.

S. umbonata Goep. manuscript.

K. F. Charl., Waldenb.

S. longissima Goep. manuscript.

K. F. Charl.

S. Rhodiana Presl.

K. F. Charl.

T. affinis Presl.

K. F. Waldenb.

Aspidiaria Presl.

(Lepidodendri species Sternb.)

Baumartige Stämme mit je 4 spiralig gestellten, einander genäherten verschiedengestaltigen 5- oder 6-eckigen elliptischen oder birnförmigen 5- oder 6-eckigen platten oder längsstreifigen Narben, auf ihr entweder in der Mitte oder excentrisch eine kleinere Narbe, die entweder flach fünfeckig, oder rundlich eben sowohl konvex wie eben, kammförmig hervorragend ist oder durch drei Punkte ersetzt wird.

Aspidiaria Schlotheimiana Presl.

K. F. Albendorf in N. Schlesien.

A. Mieleckiana Goep. die fossil. Farnkräuter (Tab. XLIV. Fig. 1.)

K. F. Waldenb.

A. undulata Presl.

K. F. Waldenb. Charl.

A. appendiculata Presl.*A. Steinbeckiana* Goep. die fossil. Farnkr. Tab. XLI. Fig. 4. 5.*A. Charpentieriana* Goep., die fossil. Farnkr. Tab. XLII. Fig. 1.

Mit den Vorigen.

Ulodendron Lindl. et Hutt.

Baumartige, zylindrische Stämme mit den Narben der abgefallenen Aeste und Blätter versehen; die der ersteren in quaternärer spiraliger Stellung oder zweihig kreisförmig elliptisch, ausgehöhlt, die der letzteren ebenfalls spiralig rhombisch oder rhomboidisch einander sehr genähert mit sehr kurzen, flachen, kegelförmig spitz zugehenden Blättchen.

Ulodendron majus Lindl. et Hutt.

U. punctatum Presl.

U. Rhodeanum Presl.

U. ellipticum Presl.

Sämmtlich in der K. F. bei Waldenb., aber selten.

Bothrodendron Lindl. et Hutt.

Stämme mit ähnlichen Astnarben wie bei der vorigen Gattung und entschieden gablig. Die Blattnarben aber entfernt, obschon spiralig stehend punktförmig.

Bothrodendron dichotomum mihi.

K. F. Waldenb.

Megaphytum Artis.

Baumartige zylindrische zur Zeit nur noch sehr unvollkommen gekannte Stämme mit herzförmig rundlichen hohlen, gewöhnlich längs-streifigen zweihig gestellten Ast-Narben, so wie Punkten und Streifen auf der übrigen Oberfläche, die auf Blattansätze schliessen lassen.

Megaphytum majus Presl.

K. F. Waldenb.

Halonia Lindl. et Hutt.

Stämme gablig mit doppelgestaltigen spiralig gestellten Narben, die einen grössern zitzenförmig hervorragend, die kleineren punktförmig flach.

Halonia Beinertiana Goepf.

K. F. Charl.

Lepidofloyos Sternb.

Baumartige Stämme, bedeckt mit spiralen und dicht aneinanderstehenden aus zackigen Schuppen gebildeten Narben.

Lepidofloyos laricinus St.

K. F. in Niederschlesien häufig.

Rnorria Sternb.

Baumartige Stämme mit gabelförmigen Aesten und centraler Achse, dicht besetzt mit kegelförmigen (einst fleischigen) spiralig gestellten angedrückten Blättchen und hier und da mit rundlichen Astnarben versehen.

Knorria imbricata Sternb.

Im Grauwackensandstein bei Landshut und im Kohlendstein bei Waldenb.

Dechenia Goepp.

Baumartige Stämme, bedeckt mit gedrängt quaternär spiralg gestellten rundlich länglichen durch concentrische Streifung ausgezeichneten Blattpolstern, in deren Mitte die wahrscheinlich zylindrischen Blättchen befestigt waren.

Dechenia euphorbioides Goepp. Gatt. der fossil. Pfl. Lief. 3 und 4 Taf. III. Fig. 4.

Im Grauwackensandstein bei Landshut.

9. Fam. *Stigmarieae* Ung. et Goepp.

Stämme mit gabelförmigen Aesten, die mit spiralg stehenden Narben bedeckt und innerhalb mit einer gefässführenden Achse versehen sind, die sich in dem aus Treppengefässen und Markstrahlen gebildeten Holzkörper befindet. Blätter cylindrisch.

Stigmaria Brong.

Stämme gablig ästig aus Treppengefässen und Markstrahlen gebildet, mit spiralg stehenden mehr oder minder centraler gefässführender Achse, von welcher in horizontaler Richtung nach den rundlich-zylindrischen einfach gabligen spiralg gestellten Blättern Gefässbündel verlaufen. Die nach dem Abfallen der dichotomen Blätter zurückbleibenden Narben rund, in der Mitte mit einem kleinen zitzenförmigen Knötchen umgeben von 2 Kreisen.

Stigmaria ficoides Brong.

β . *undulata* Goepp. Gatt. d. fossil. Pfl. 1. u. 2. Heft Tab. IX. Fig. 9.

γ . *reticulata* Goepp. a. a. O. Fig. 11.

δ . *stellata* Goepp. a. a. O. Tab. IX. Fig. 12.

ϵ . *sigillarioides* Goepp. a. a. O. Tab. X. Fig. 13.

In der ganzen Kohlenformation Schlesiens sehr verbreitet, so wie auch im Uebergangskalkstein zu Gl. Falkenberg und im Grauwackensandstein bei Landshut.

Didymophyllum Goepp.

Baumartige rundliche Stämme, innerhalb mit einer gefässführenden Achse, deren linienförmige Narben immer zu 2 einander genähert erscheinen, äusserlich mit spiralg etwas entfernt zu 2 stehenden an der Basis vereinigten, wahrscheinlich einst fleischigen Blättern.

Didymophyllum Schottini Goepp. Gatt. d. fossil. Pflanzen 1. u. 2. Heft Tab. XVIII.

In der Grauwacke bei Landshut mit Calamiten, Stigmarien. Selten.

Ancistrophyllum Goepf.

Baumartige Stämme, innerhalb mit gefässführender Achse, mit Narhen, ähnlich den Blattnarben der Stigmarien, äusserlich mit spiraligstehenden hakenförmigen, wahrscheinlich einst fleischigen Blättern bedeckt.

Ancistrophyllum stigmariaeforme Goepf. Die Gatt. der fossil. Pfl. 1. u. 2. Heft, T. XVII.

Mit der Vorigen bei Landshut. Selten.

Sigillaria Brong.

Baumartige Stämme, zuweilen gabelig getheilt, mit centralem, durch halbmondförmige Gefässbündel eingefasstem Marke und einem aus Treppegefässen und Markstrahlen zusammengesetzten Holzkörper, ästig, mit rundlich grössern vertieften gefurchten, ungleichen quaternär gestellten und kleineren rundlichen quirlförmigen Astnarben, daher gegliedert; übrigens gefurcht mit parallelen röhrenförmigen Rippen, die mit einer Rinde bedeckt sind auf der in quaternärer Stellung scheibenförmige rundliche längliche an beiden Enden abgestumpfte oder auch mehr oder minder Beckige Narben sich befinden, auf deren oberen Theile drei Gefässnarben: zwei halbmondförmige mit der Convexität gegeneinander gerichtete und eine mittlere rundliche. Nach Entfernung der Rinde bleibt auf der Oberfläche des Stammes gewöhnlich nur die mittlere rundliche Narbe zurück.

Sigillaria transversalis Brong.

S. elongata Br.

S. reniformis Br.

S. pachyderma Br.

S. ornata Br.

S. hexagona Br.

S. alternans Br.

S. laevigata Br.

S. subrotunda Br.

S. obliqua Br.

S. pyriformis Br.

S. Knorria Br.

S. elliptica Br.

S. Saulii Br.

S. scutellata Br.

S. strieta Br.

S. Dournaisii Br.

S. cuspidata Br.

Sämmliche vorstehende Arten in der Kohlenformation von Charl. und Waldenb.

S. hippocrepis

K. Sandstein bei Nicolai in Oberschl.

S. tessellata Br.

Charl., Waldenb.

S. contracta Br.

K. F. Waldenb.

S. Schlotheimiana Br.

K. F. Waldenb.

S. elegans

K. F. Liebau.

S. Ottonis Goepp.

Stinkkalk bei Tunschendorf und Ottendorf.

S. oculata

K. F. Ober- und Nieder-Schl. häufig.

S. mammillaris Br.

S. monostachya Lindl.

S. flexuosa Lindl. et Hutt.

Alle drei zu Waldenb.

S. Mentzeliana Goepp. ic. ined.

K. F. Zalenze.

10. Fam. Filices, Farnkräuter.

* Trunci.

Karstenia Goepp.

Kriechende, knotenlose Farnstämme mit entfernt aber spiralig stehenden Blattpolstern, übrigens fast glatter Rinde. Die Blattpolster kreisrund, in der Mitte mit konvex zitzenförmiger Narbe, umgeben von einem mehr oder minder erhabenen Ringe oder auch ohne einen solchen Ring.

Karstenia omphalostigma Goepp. d. fossil. Farnkr. S. 452. Tab. XXXIII. Fig. 1.

K. mammillaris Goepp. a. a. O. Tab. XXXIII. Fig. 4—5.

K. F. beide Arten zu Charl.

Protopteris Sternb.

Baumartige zylindrische knotenlose Stämme mit durch den Abfall der Blätter oder Wedel entstandenen Blattpolstern bedeckt. Die Blattpolstern in quaternärer spiraliger Lage mehr oder minder genähert eiförmig.

mig rundlich oder kreisförmig in der Mitte mit einer hufeisenförmigen, durch den Ausgang der Gefäßbündel bedingten Narbe, an den Rändern mit kleinen punktförmigen Narben.

Protopteris Singeri Presl. *Caulopteris Singeri* Goepp. d. fossil. Farnkräuter S. 449. Tab. XLI. Fig. 112. und Flora des Quadersandsteins a. a. O. Tab. XLI. Fig. 1. 2.

Im Grünsand zu Giersdorf bei Löwenberg.

** Frondes.

1. Danaeaceae Goepp.

Sporangien oder Fruchthälter auf der unteren Seite dem Rande genähert durch eine Spalte aufspringend. Wedel gefiedert. Die seitlichen Nerven gehen im rechten Winkel aus dem Mittelnerven.

Glockeria Goepp.

Die Sporangien eiförmig am Rande des Wedels auf den seitlichen Nerven sitzend vielleicht in einer Längsrinne aufspringend. Der Wedel gefiedert.

Glockeria marattioides (Goepp. der fossil. Farnkr. S. 379. Tab. XXXIX. Fig. 23.)

K. F. Charl.

Danaeites Goepp.

Sporangien linienförmig parallel auf den gabligen Seitennerven aufsitzend.

Danaeites asplenioides Goepp. die fossil. Farnkr. S. 381. Tab. XIX. Fig. 4. 5.

2. Gleicheniae Goepp.

Nach der neuerdings (Gattungen der fossil. Pfl. Heft 3 und 4,) angestellten Revision der früher hierher gerechneten Arten haben wir in Schlesien keine hierher gehörende aufzuführen.

3. Neuropterides Goepp.

Wedel einfach oder doppelt gefiedert. Die Fiedern frei oder angewachsen mit Seitennerven, die entweder alle von der Basis aus sich gablich fächerförmig verbreiten oder reihenweise aus einem deutlich vorhandenen aber von der Spitze sich in Theilungen auflösenden Mittelnerven entspringen.

Fruchtifikationen punktförmig (oder traubig?)

Neuropteris Brong.

Wedel einfach oder doppelt gefiedert. Die Fiederblättchen an der Basis herzförmig oder fast herzförmig frei, nur mit dem mittleren Theile befestigt, selten gänzlich angewachsen und herablaufend. — Die Mittelnerven ziemlich dick, vor der Spitze des Fiederblättchen sich in dichotom

tome Theilungen auflösend; die bogenförmig aufsteigend einfachen, gabligen oder doppelten Seitennerven entspringen abwechselnd reihenweise aus demselben. Die Fruktifikation zur Zeit noch nicht bekannt, punktförmig rundlich oder in Aehren.

Neuropteris microphylla Brong.

K. F. Waldenb.

N. cordata Brong.

K. F. Waldenb.

N. angustifolia Br.

K. F. Charl.

N. acutifolia Br.

K. F. Zalenze in Ob. Schl.

N. flexuosa Br.

K. F. Albendorf in N. Schl.

N. gigantea Sternb.

K. F. Sehr verbreitet.

N. tenuifolia Br.

K. F. Waldenb.

N. Loshii Br.

Grauwackensandstein bei Landshut.

N. conferta St. Goëpp. Gatt. d. fossil. Pfl. 5. u. 6. Hft. Tab. VIII. et IX. Hft. Fig. 2.

N. obliqua Goëpp. Gatt. d. fossil. Pfl. 5. u. 6. Hft. Tab. XI. Fig. 1.

Beide im Stinkkalkschiefer bei Ottendorf.

N. conjugata Goëpp. Gatt. d. fossil. Pfl. 5. u. 6. Hft. Tab. X. Fig. 5.

K. F. Waldenb.

Odontopteris.

Die Wedel einfach oder doppelt gefiedert. Die Fieder an die Basis der Spindel ganz angewachsen oder frei. Mittelnerven nur schwach angedeutet, mit einfachen oben gabligen aus dem Mittelnerven oder auch aus der Basis des sitzenden Blattes entspringenden, bis in den Blattrand verlaufenden Seitennerven.

Odontopteris Lindleyana β . *macrophylla* Goëpp. der fossil. Farnkr. S. 438, Taf. 1. Fig. 7. u. 8.

O. stipitata Goëpp. d. Gatt. d. fossil. Pfl. 5. u. 6. Hft. Tab. VII. Fig. 2.

O. Neumanniana Goëpp. icon. inedit.

O. Neesiana Goëpp. (*Gleichenites Neesii* Goëpp.) d. fossil. Farnkr. Tab. II.

Die 3 letzten Arten im Stinkkalkschiefer bei Tunschendorf in der Grafschaft Glaz.

Cyclopteris Brong.

Der Wedel gestielt oder sitzend, fächer- oder halbkreisförmig, ganzrandig oder eingeschnitten gelappt, oder auch gefiedert. Die Fiederblättchen halbkreisförmig oder länglich, an der Basis gewöhnlich ungleich oder herzförmig, mit sehr vielen von der Basis an sich schon fächerförmig vielfach gablig verbreitenden Nerven.

Fruktifikationen noch zweifelhaft, vielleicht randständig.

Cyclopteris obliqua Br.

R. F. Waldenb.

C. tenuifolia Goep. d. Gatt. d. fossil. Pfl. 5. u. 6. Hft. Hft. IV. u. V. Fig. 11 und 12. Grauwacke bei Landshut.

C. obliqua Br.

R. F. Waldenb.

C. gigantea Goep. d. fossil. Farnkr. Tab. VII.

R. F. Charl.

C. heterophylla Goep. d. fossil. Farnkr. Tab. 35. Fig. 1 u. 2. Grauwackenkalkstein bei Gläzisch-Falkenberg.

C. otopteroides Goep. d. fossil. Farnkr. Tab. XXXV. Fig. 7.

R. F. Zalenze O. Schlesien.

C. oblongifolius Goep. d. foss. Farnkr. Tab. XXI. Fig. 4. 5.

R. F. Charl.

C. Boeckschiana Goep. d. foss. Farnkr. Tab. XXXVI. Fig. 6.

Grauwackensandstein bei Gläzisch Hausdorf.

C. orbicularis Brong.

R. F. Waldenb.

Noeggerathia Sternb.

Die Wedel gefiedert gestielt. Die Fiedern verkehrt ei- oder keilförmig stengelumfassend mit sehr zahlreichen einander gleichen von der Basis aus entspringenden fast parallelen einfachen oder in der Mitte sich gablig theilenden Nerven.

Fruktifikationen unbekannt.

Noeggerathia obliqua Goep. d. Gatt. d. foss. Pfl. 5. u. 6. Heft. Tab. XII. Fig. 2.

Grauwackensandstein bei Gläzisch Hausdorf.

N. Beinertiana Goep. d. Gatt. d. foss. Pfl. 5. u. 6. Heft. Tab. XII Fig. 3.

R. F. Charl.

4. *Sphenopterides* Goep.

Laub 2—3fach fiederspaltig oder gefiedert, mit ganzrandigen oder gewöhnlich gelappten, an der Basis keilförmigen Fiederblättchen und ge-

fiederten Nerven, seitlich schief aufsteigende in jedem einzelnen Lappen einfach oder gablig gefurchten Seitennerven aus einem keineswegs starren, sondern hin- und hergebogenen Mittelnerven.

Fruktifikationen punktförmig oder randständig.

Sphenopteris Brong.

Der Wedel 2—3 fach gefiedert oder 2—3 fach fiederspaltig, mit gelappten, selten ganzrandigen, an der Basis keilförmigen Fiederblättchen, deren untere Lappen grösser als die übrigen gezähnt oder wieder fast gelappt sind. Die Nerven gefiedert: der Mittelnerven ziemlich deutlich angedeutet, fast auslaufend hin und her gebogen, die secundären oder Seitennerven schlaff, schief aufsteigend, einfach oder gablig, zuweilen mit in jedem einzelnen Lappen 2—3 fach gabligten Aesten.

Fruktifikation punktförmig, oder zuweilen wie ein verdickter Rand erscheinend, ähnlich den Früchten unserer *Cheilanthes*-Arten.

Sphenopteris Davallia Goepf. d. foss. Pflanzen. 3. u. 4. Heft. Tab. XI. Fig. 2 u. 3.

K. F. Charl.

Sph. distans Sternb. Goepf. d. foss. Farnkr. Tab. IX. Fig. 1. 2.

K. F. in Niederschlesien sehr verbreitet.

Sph. latifolia Br.

K. F. in Ober- und Niederschlesien fast das häufigste Farnkraut.,

Sph. elegans Br.

K. F. Waldenb.

Sph. divaricata Goepf. d. foss. Farnkr. Tab. XIII. Fig. 1. 2.

K. F. Charl.

Sph. microloba Goepf. d. foss. Farnkr. Tab. XIII. Fig. 1—3.

K. F. Charl.

Sph. tridactylites Br.

K. F. Waldenburg.

Sph. meifolius β *trifidus* Goepf. d. foss. Farnkr. T. XV. Fig. 3. 4.

K. F. Albendorf in N. Schlesien.

Sph. grypophylla Goepf. d. foss. Farnkr. Tab. XXXVI. Fig. 1. 2.

K. F. Waldenb.

Sph. Höninghausi Br.

Thoneisenstein bei Zalenze.

Sph. rigida Br.

K. F. Waldenb.

Sph. trifoliolata Br.

K. F. in N. Schlesien sehr verbreitet.

Sph. obtusiloba Br.

Mit der vorigen.

Sph. Gravenhorstii Br.

K. F. Charl.

Sph. Schlotheimii Br.

K. F. Waldenb.

Hymenophyllites Goepp.

Wedel sehr zart, hautartig, 2—3 gefiedert, unregelmässig eingeschnitten, gelappt oder spaltig, mit an der ziemlich steifen, aber dünnen Spindel herablaufenden Fiederblättchen oder Lappen. Die Nerven gefiedert auslaufend in jedem Lappen entweder einfach oder auch gablig.

Fruktifikationen rundlich auf den Endigungen der Fiederlappen sitzend.
Hymenophyllites quercifolius Goepp. d. foss. Farnkr. Tab. XIV. Fig. 1 und 2.

K. F. Neurode.

H. Humboldtii Goepp. d. foss. Farnkr. Taf. XXXI. Fig. 1 und 2.

K. F. Waldenb.

H. Gersdorfii Goepp. d. foss. Farnkr. Taf. XXXVII. Fig. 1. 2.

Grauwacke bei Landshut.

H. furcatus Goepp.

K. F. Neurode, Waldenb., Charl.

H. dissectus Goepp.

H. Zobelii Goepp. d. foss. Farnkr. Taf. XXXVI. Fig. 3—4.

Beide zu Waldenb.

Trichomanites Goepp.

Wedel zart 2- oder 3fach gefiedert oder vielfach zusammengesetzt mit rundlicher Spindel und gabelförmig getheilten Faden oder linienförmigen Fiederblättchen und gefiederten einfachen Nerven. Fruktifikationen rundlich auf der Spitze der Lappen sitzend.

Trichomanites Beinerti Goepp. d. foss. Farnkr. Tab. XI. Fig. 3. 4.

Steffensia Goepp.

Wedel 2—3fach gefiedert mit fiederspaltigen eiförmigen Fiederblättchen. Die Nerven in jedem Lappen gefiedert, strahlenförmig auslaufend, gegen den Rand hin rundlich, Fruchthäufchen tragend.

Steffensia davallioides Goepp. d. foss. Farnkr. Tab. XI. Fig. 3. 4.

K. F. Waldenb.

5. Pecopterides Goepp.

Wedel einfach, gefiedert, oder 2—3fach fiederspaltig oder 2—3fach gefiedert, mit an der Basis entweder gleichen oder erweiterten, der Spin-

del ansitzenden oder unter sich vereinigten, sehr selten an der Basis etwas verengerten Fiedern. Mittelnerven sehr entschieden vorhanden, auslaufend mit verschieden gestalteten Seitennerven, in schmalen Fiedern: gabelförmig, mehr oder minder steif und horizontal, in breiteren Fiedern: unter mehr spitzen Winkeln von ihm ausgehend mit 2 oder 3fach gabeligen, auch zuweilen unter einander anastomosirenden, daher ein vollkommenes Gefässnetz bildenden Aesten, in denen hie und da sogenannte verdickte oder blinde Endigungen der Nerven vorkommen.

Fruchtifikation randständig oder in rundlichen mit der Nervenverbreitung in inniger Beziehung stehenden Fruchthäufchen.

Beinertia Goepp.

Wedel gefiedert. Nerven gefiedert, die Seitennerven aus dem auslaufenden Mittelnerven schief aufsteigend, gabelig, wiederholt gabeltheilig, sehr stark hervortretend, vielleicht einst Fruchthäufchen tragend, ähnlich den Gattungen der Jetztwelt *Gymnogramma*.

Beinertia gymnogrammoides Goepp. d. foss. Farnkr. S. 279. Tab. XVI. Fig. 4 5.

K. F. Charl.

Asplenites Goepp.

Wedel gefiedert, 2—3fach gefiedert, mit gleichförmigen oder ungleichen schief rhombischen Fiederblättchen. Fruchthäufchen linear, auf dem Rücken der vom Mittelnerven schief vom auslaufenden Mittelnerven mit einer Hülle oder Indusium versehen, ähnlich befestiget, wie bei den jetztweltlichen *Asplenien*.

Asplenites heterophyllus Goepp. d. foss. Farnkr. S. 278. Tab. XVIII. Fig. 1.

A. crispatus Goepp. a. a. O. S. 279. Tab. XVIII. Fig. 2. 5.

K. F. Beide Arten zu Charl.

A. ophiodermaticus Goepp. a. a. O. S. 280. Tab. XVII. Fig. 1. 2.

A. trachyrrhachis Goepp. a. a. O. S. 291. Tab. XVII. Fig. 3. 4.

A. divaricatus Goepp. a. a. O. S. 282. Tab. XX. Fig. 1. 2.

K. F. Alle drei Arten zu Waldeub.

A. nodosus Goepp. a. a. O. S. 280. Tab. XIV. Fig. 1—3.

K. F. Schwarzwaldau bei Landshut.

Woodwardites Goepp.

Wedel fiederspaltig. Die netzförmigen Nerven bilden Maschen von ungleicher Form, die zunächst dem Mittelnerven verlängert, auf welchen die länglichen Fruchthäufchen sitzen, die der Mitte sechseckig, wo gegen den Rand hin einzelne einfache oder auch gabelige Nerven sich erstrecken.

Woodwardites obtusilobus Goepf. d. foss. Farnkr. S. 289. Tab. XXI. Fig. 1.

W. acutilobus Goepf. a. a. O. Tab. XXI. Fig. 2.

K. F. Waldenb.

Alethopteris Goepf.

Wedel 2—3 fach fiederspaltig oder eben so gefiedert. Die Seitenerven aus dem steif ausgehenden Mittelnerven in rechtem oder fast rechtem Winkel ausgehend einfach oder gablig, mit einfachen oder minder getheilten Aesten. Die zuweilen zurückgerollten Ränder der Fiederblättchen bei manchen Arten lassen auf randständige Fruktifikationen wie etwa *Pteris* der Jetztwelt schliessen.

Alethopteris Lonchitidis Sternb.

K. F. O. u. Niederschlesien.

A. Sternbergi Goepf.

K. F. Waldenburg.

A. Mantellii Goepf.

K. F. Waldenburg.

A. Dournaisii Goepf.

K. F. Waldenburg.

A. aquilina Goepf.

K. F. Waldenburg.

A. urophylla Goepf.

K. F. Zalenze in Oberschlesien.

A. Serlii Goepf.

K. F. Charlottenbrunn.

A. Serra Goepf.

K. F. Waldenburg.

A. nervosa Goepf.

K. F. Zalenze und Waldenburg.

A. muricata Goepf.

K. F. in Ober- und Niederschlesien.

A. Brongniartii Goepf.

K. F. Albendorf in N. Schlesien.

A. ovata Goepf.

K. F. Waldenb.

A. sinuata Goepf.

K. F. Waldenb.

Cyatheites Goepf.

Wedel 2 — 3 fach fiederspaltig oder 2 — 3fach gefiedert. Die im rechten oder beinahe rechten Winkel aus dem Mittelnerven ausgehenden

Seitennerven gablig, ziemlich grade mit einfachen, seltener gabligem Aesten, in deren Theilung die rundlichen Fruchthäufchen in 2 Reihen sitzen. Das Indusium an der Spitze aufspringend.

Cyatheetes arborescens Goepp.

Stinkkalkschiefer zu Tunschendorf.

C. Oreopteridis Goepp.

K. F. Waldenburg.

C. Miltoni Goepp.

K. F. Waldenburg und Landshut.

C. dentatus Goepp.

K. F. Charlottenbrunn.

Balantites Goepp.

Wedel gefiedert. Fruchthäufchen rund, kopfförmig dem Rande eingefügt und über denselben hinausragend.

Balantites Martii Goepp. d. foss. Farnkr. Tab. XXXII. Fig. 5. G.

K. F. Charlottenbrunn.

Polypodites Goepp.

Wedel einfach oder doppelt fiederspaltig, entweder mit unter einem spitzen Winkel hervortretenden gablig gebogenen Seitennerven, deren kürzerer Ast, gewöhnlich nach innen gebogen, das Fruchthäufchen trägt, oder wie bei dem doppelt fiederspaltigen Wedel in jedem Fiederlappen gefiederte Nerven mit schiefen, graden und einander parallel verlaufenden, gegen den Rand hin Fruchthäufchen tragenden Aesten.

Polypodites sphaerioides Goepp. die fossil. Farnkr. T. XXII.

Fig. 1.

K. F. Charlottenbrunn. Eine noch zweifelhafte Art.

P. Schneiderianus Goepp. icon. ined.

Kohlenschiefer der Quadersandsteinformation zu Wenig-Rackwitz bei Löwenberg. (*Dr. Schneider.*)

Pecopteris Brong.

Wedel einfach, zweifach, oder auch mehrfach gefiedert. Die Fiederblättchen an der Basis erweitert, gewöhnlich getrennt, mit ihrer ganzen Basis ansitzend, zuweilen auch unter einander verbunden oder herablaufend, mit einem gewöhnlich auslaufenden und graden, zuweilen aber auch gebogenen, vor der Spitze 2theiligen Mittelnerven, von welchem unter spitzem Winkel die gabligem Seitennerven ausgehen, die gewöhnlich wieder getheilt mehr oder minder bogenförmig aufsteigende Aeste besitzen. Fruktifikation rundliche in 2 Reihen stehende Fruchthäufchen.

Pecopteris Pluckenetii Br.

K. F. Waldenburg.

P. Güntheriana Goep. (*Aspidites Güntheri* Goep. foss. Farnkr. S. 360. Tab. XXXV. Fig. 5 et 6.)

K. F. Waldenburg.

P. dicksonioides Goep. (*A. dicksonioides* Goep. a. a. O. S. 361. Tab. XXVIII. Fig. 1.)

K. F. Charlottenbrunn.

P. caudata Lindl. et Hutt.

K. F. Waldenburg.

P. Biotii Brong.

K. F. Waldenburg.

P. silesiaceae Goep. (*Aspidites silesiacus* Goep. a. a. O. S. 364. Tab. XXVII. et XXXIX. Fig. 1.)

P. microcarpa Goep. (*A. Aspidites microcarpus* Goep. a. a. O. S. 367. T. XXII. Fig. 3. 4.)

K. F. Waldenburg.

P. Jägeriana Goep. (*Aspidites Jägeri* Goep. a. a. O. S. 368. Tab. XXII. Fig. 6. 7.)

K. F. Waldenburg und Landshut.

P. decussata Goep. (*Aspidites decussatus* Goep. a. a. O. S. 369. Tab. XXVI. Fig. 1. 2.)

K. F. Waldenburg.

P. elongata Goep. (*Aspidites elongatus* Goep. a. a. O. S. 370. Tab. XXIV.)

K. F. Waldenburg.

P. Erdmengeriana Goep. (*Aspidites Erdmengeri* Goep. a. a. O. S. 370. Tab. XXV.)

K. F. Waldenburg.

P. stricta Goep. (*Aspidites strictus* Goep. a. a. O. S. 371. Tab. XXI. Fig. 11. 12.)

Grauwackensandstein bei Landshut.

P. nodosa Goep. (*Aspidites nodosus* Goep. S. 372. Tab. XXIII. Fig. 1.)

K. F. Waldenburg.

P. leptorrhachis Goep. (*Aspidites leptorrhachis* Goep. a. a. O. S. 373. Tab. XXIII. Fig. 2.)

K. F. Waldenburg.

P. oxyphylla Goep. (*Aspidites oxyphyllus* Goep. a. a. O. S. 374. Tab. XXX. Fig. 1.)

K. F. Charlottenbrunn.

P. Glockeriana Goep. (*Aspidites Glockeri* a. a. O. 375. Tab. XXIX. Fig. 1.2.)

β falciculata Goep. (A. Glockeri *β falciculatus* a. Goep. a. a. O. Tab. XXIX. Fig. 3. 4.

K. F. Waldenburg.

Näher zu ermitteln:

Bockschia flabellata Goep. d. foss. Farnkr. Taf. I. Fig. 1. 2.

K. F. Charlottenb.

IV. Monocotyledones phanerogamae.

11. Fam. Gramineae.

Poacites Brong.

Schmale Blätter mit parallelen Rändern, einem Mittelnerven und zahlreichen parallelen Seitennerven.

Poacites latifolius Goep.

K. F. Charlottenbrunn.

12. Fam. Liliaceae.

Artisia Sternb.

Baumartige, rundliche, einfache Stämme, durch querliegende, schmale, bandförmige, an beiden Enden zugespitzte, einander genäherte, den ganzen Stamm umfassende schwärzliche Narben ausgezeichnet, als Reste der stengelumfassenden Blätter, wie sie bei den baumartigen Liliaceen der Jetztwelt *Yucca* vorzukommen pflegen.

Artisia transversa Sternb.

K. F. Waldenburg. Belk in O. Schlesien.

13. Fam. Palmae.

Flabellaria Brong.

Stämme zur Zeit noch unbekannt. Blätter gestielt, fächerförmig.

Flabellaria chamaeropifolia Goep. Uebersicht d. Arb. und Veränd. d. schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur im. J. 1834. Breslau, 1835. S. 86. Goep. Flora des Quadersandsteins Acta. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XIX. P. II. p. 120. Tab. LII. Fig. 1—3.

Im Quadersandstein bei Tiefenfurth.

V. Dicotyledones monochlamydeae.

14. Fam. Cycadeae.

* Trunci.

Raumeria Goep. ic. inedit.

Stamm äusserlich bedeckt mit den breiten rhombischen Narben der Wedel, zwischen denen sich noch ein ziemlich festes zur Rinde gehörendes, von verlängerten Zellen und Gefässen bestehendes Gewebe befindet, wodurch sich derselbe von allen bis jetzt bekannten vor- und jetztweltlichen Cykadeenstämmen auffallend unterscheidet.

Raumeria Schulziana Goep. icon inedit.

Im aufgeschwemmten Lande am Klodnitzkanal bei Gleiwitz.

Anmerk. Der berühmte Cykadeenstamm zu Dresden gehört zu derselben Gattung *Raumeria Reichenbachiana* Goep. manusept.

** Frondes.

Pterophyllum Brong.

Wedel gefiedert, gestielt, mit 2reihigen, mehr schmalen als breiten, linienförmigen, mit ihrer gauzen Basis an der Spindel festsitzenden, oft mit ihr zusammenfliessenden abgestumpften oder auch spitzen Fiedern, die von einander vollkommen gleichen, parallelen und einfachen (ungeheilten) Nerven durchzogen werden.

Pterophyllum Oeynhausianum. Uebersicht der Arbeiten der schles. Gesellsch. im Jahre 1843. Tab. I. Fig. 1. 2. 3.

Pt. Carnallianum Goep. a. a. O. Tab. I. Fig. 4.

Pt. propinquum Goep. a. a. O. Tab. I. Fig. 5.

Alle 3 vorstehenden Arten in Thoneisenstein der Juraformation oder dem mittleren oder braunen Jura zu Ludwigsdorf bei Kreuzburg in O. Schlesien.

Pt. gonorrhachis Goep. a. a. O. Tab. I. Fig. 6.

Thoneisenstein der Steinkohlenformation zu Königshütte in Ober-Schlesien.

15. Fam. Coniferae.

Araucarites Sternb. et Goep.

Aestige, kegelförmige Stämme mit mehr oder minder deutlichen concentrischen Holzlagen oder Jahreslagen, zusammengesetzt aus Markstrahlen und porösen Holzzellen. Markstrahlen aus einfachen Zellenreihen. Die Poren oder Tüpfel auf der den Markstrahlen zugewendeten Seite in 2—3fachen spiraligen Reihen und einander so genähert, dass sie

sich mit den Rändern gegenseitig berühren und daher sechseckig erscheinen.

Araucarites Buchianus Goep. icon. ined.

Uebergangskalk bei Glüzisch Falkenberg.

A. Rhodeanus Goep. icon. ined.

K. F. Buchau in der Grafschaft Glaz.

A. Beinertianus Goep. icon. inedit.

K. F. Charl.

A. carbonarius Goep. icon. ined.

Hie und da Bruchstückweise in der Oberschlesischen Steinkohle.

Pinites With. Goep.

Aestige, kegelförmige Stämme mit Markcylinder, Markstrahlen aus einfachen Zellenreihen, porösen, in concentrischen Kreisen gelagerten Holzzellen, deren Poren oder Tüpfel auf der den Markstrahlen zugewandten Seite von einander etwas entfernt, entweder in einfachen oder auch doppelten Längsreihen, aber dann immer neben einander stehen.

Pinites gypsaceus Goep. über d. fossile Flora der Gypsformation zu Dirschel in O. Schlesien. N. Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XIX. P. II. Tab. LXVI. Fig. 1. 2. Tab. LXVII. Fig. 4—12.

Gypsformation zu Dirschel in Oberschlesien.

P. Protolarix Goep.

Braunkohlenlager bei Laasan.

P. Wernerianus Goep. ic. ined.

Im Conglomerat des Teufelswehres bei Wehrau am Queiss (dem Geburtsorte des unsterblichen *Werner*).

P. resinosus Goep. ic. ined.

Geschiebe in Oberschlesien.

P. Weimannianus Goep. icon. ined.

Geschiebe im aufgeschwemmten Lande bei Grünberg, Glogau, Sprottau.

** Strobili.

P. ovoideus Goep. a. a. O. N. Acta. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Pur. Vol. XIX. P. II. Tab. LXVI. Fig. 3.

Gypsformation zu Dirschel in O. Schlesien.

Piceites Goep.

Blätter einzeln linienförmig, viereckig in doppelter Spirale in 8 Reihen. Zapfen aus glatten Schuppen.

Piceites geanthracis Goep.

Braunkohlenlager bei Mahliau bei Trebnitz und bei Grünberg.

Dammarites Presl.

Zapfen kreiselförmig, rundlich, durch zahlreiche in quaternärer

spiraliger Richtung stehende, dachziegelförmig etwas angedrückte dicke, ausserhalb convexe Schuppen gebildet.

Dammarites crassipes Goepp. Fl. d. Quadersandst. a. a. O. S. 122. Tab. LIII. Fig. 3.

Im Quadersandstein bei Schömberg.

Taxites Goepp.

Stämme ästig, kegelförmig von innerer Struktur wie *Taxus* der Jetztwelt, ausgezeichnet insbesondere durch die Spirallinien, welche auf allen innern Seiten übrigens auch noch mit Poren versehenen Holzzellen zu sehen sind, welche übrigens ähnlich wie bei *Pinites* in der Regel nur auf der den Markstrahlen zugewendeten Seite stehen.

Taxites Ayckci Goepp. Karsten u. v. Dechen Archiv Bd. XV. Heft 2. Tab. XVII. Fig. 11—13.

In dem Braunkohlenlager bei Leutsch bei Neisse, bei Patschkau, bei Grünberg und bei Laasan.

16. Fam. Cupuliferae.

Quercites Goepp.

Baumartige Stämme von ähnlichem Bau wie unsere jetztweltlichen Eichen, nämlich: Deutlich durch dickwandigere Zellen begränzte Jahresringe, ausgezeichnet grosse im Alter durch Parenchymzellen ausgefüllte concentrisch stehend punktirte Gefässe im Anfange derselben, kleinere zerstreut im übrigen Theile des Holzkörpers, welcher aus auf allen Wandungen punktirten Prosenchymzellen und aus grossen und kleinen Markstrahlen gebildet ist.

Quercites primaevus Goepp. (*Klödenia quercoides* Goepp. in von Leonh. u. Bronn n. Jahrb. 1839. Tab. III.

Als Geschiebe im aufgeschwemmten Land, in mehr oder minder ansehnlichen Bruchstücken auf den Hügeln von Jakobskirch bei Glogau, Grünberg, Metschlau bei Neustädte!, bei Liegnitz (Klose).

Fagites Goepp.

Fagites gypsaceus Goepp.

Ein *Fagus sylvatica* L. ähnliches Blatt. Goeppert Flora der Gypsformation in O. Schlesien. N. Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XIX. P. II. p. 372. Tab. LXVII. Fig. 1. 2.

Im Gypsmergel bei Dirschel in O. Schlesien.

Carpinites Goepp.

Carpinites gypsaceus Goepp. Aehnlich den Blättern von *Carpinus*

Betulus Goep. Flora der Gypsformation in O. Schlesien a. a. O. Tab. LX. Fig. 2.

Im Gypsmergel bei Dirschel in O. Schlesien.

Carpinites arenaceus Goep. Flora des Quadersandsteins in Schlesien. N. Acta. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XIX. P. II. p. 372. Tab. XLVII. Fig. 19. 20.

Im oberen Grünsand zu Kieslingswalde.

17. Fam. Betulaceae,

Alnites Goep.

Alnites. Aehnlich den Blättern von *Alnus incana* Goep. Flora der Gypsformation. a. a. O. Tab. LXVII. Fig. 5. 7.

Im Gypsmergel zu Dirschel in O. Schlesien.

18. Fam. Salicineae.

Salicites Goep.

Salicites Petzeldianus Goep. Aehnlich den Blättern von Weidenarten.

Goep. Flora des Quadersandsteins in Schlesien. N. Acta. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XIX. P. II. p. 127. Tab. XLVII. Fig. 18 b.

Oberer Grünsand zu Kieslingswalde.

Anhang.

Unbestimmte Familie, ähnlich den Plataneae.

Verkehrt oder ei- oder herzförmig, an der Basis fast zweilappig gestielte Blätter. Die Blattnerven von vierfacher Beschaffenheit: die primären ziemlich grade, die an der Basis befindlichen im rechten Winkel, die übrigen secundären und tertiären in spitzen Winkeln abgehend.

Credneria Schneideriana Goep. icon.

Im Quadersandstein bei Tiefenfurth.

Credneria Beckeriana Goep. ic. ined.

Kreidekalkstein unbest. Formation bei Wirsingawe zwischen Wohlau und Winzig.

Fructus:
Carpolithes.

In der älteren Kohlenformation kommen zahlreiche Arten von Früchten vor, die höchst wahrscheinlich Dicotyledonen angehören. Gewöhnlich sind sie ausgefüllt oder Steinkerne, und nur selten vermag man noch anatomische Struktur darin wahrzunehmen. Einige stimmen mit den schon abgebildeten Arten überein, einige sind neu:

Cardiacarpos acutus Lindl. et Hutt. foss. Flora of great Britain. I. t. 76. p. 210.

Carpolithes alatus Lindl. et Hutt. a. a. O. II. Tab. 87. p. 15—17.

C. macropterus Corda. Zur Kunde der Karpolithen. Vers. d. Gesellschaft. d. anat. Mus. in Böhmen. 2841. S. 102. Tab. II. Fig. 18. 19.

C. cycadoideus Corda. a. a. O. Tab. II. Fig. 1. 2.

C. bivalvis Goepp. ic. ined.

C. membranaceus Goepp. ic. ined.

C. emarginatus Goepp. ic. ined.

C. cordatus Goepp. ic. ined.

C. amygdalaeformis Goepp. ic. ined.

C. operculatus Goepp. ic. ined.

C. petiolatus Goepp. ic. ined.

C. apiculatus Goepp. ic. ined.

Sämmtlich a. d. K. F. Charl. Waldenb. und Liebau.

C. Mentzelianus Goepp. ic. ined.

Aus einer über dem Kohlensandstein bei Königshütte liegenden Sand-
schicht (*Mentzel*).

C. ovoideus Goepp. ic. ined.

Belk in O. Schles. (*v. Blandowski*);

Uebersicht.

Verbreitung der Arten.

Gattungen.	Grauwacke Uebergangs- geb.	Kohlengeb.	Trias.	Oolith- gruppen.	Kreide- Grüns.	Gruppe über der Kreide.	Geschiebe.	Zahl sämmt- licher Arten.
Alethopteris	—	13	—	—	—	—	—	13
Alnites	—	—	—	—	1	—	—	1
Ancistrophyllum .	1	—	—	—	—	—	—	1
Annularia	—	3	—	—	—	—	—	3
Araucarites	1	3	—	—	—	—	—	4
Artisia	—	1	—	—	—	—	—	1
Aspidiaria	—	6	—	—	—	—	—	6
Asplenites	—	6	—	—	—	—	—	6
Asterophyllites ..	—	13	—	—	—	—	—	13
Balantites	—	1	—	—	—	—	—	1
Beinertia	—	1	—	—	—	—	—	1
Bockschia	—	1	—	—	—	—	—	1
Bornia	1	—	—	—	—	—	—	1
Bothrodendron ..	—	1	—	—	—	—	—	1
Calamites	3	19	—	1	—	—	—	23
Cardiocarpus	—	1	—	—	—	—	—	1
Carpinites	—	—	—	—	2	—	—	2
Carpolithes	—	13	—	—	—	—	—	13
Chondrites	—	1	—	—	—	—	—	1
Credneria	—	—	—	—	2	—	—	2
Cyatheites	—	4	—	—	—	—	—	4
Cyclopteris	3	6	—	—	—	—	—	9
Cylindrites	—	—	—	—	3	—	—	3
Dammarites	—	—	—	—	1	—	—	1
Danaeites	—	1	—	—	—	—	—	1
Dechenia	1	—	—	—	—	—	—	1
Didymophyllon ..	1	—	—	—	—	—	—	1
Excipulites	—	1	—	—	—	—	—	1
Equisetites	—	2	—	—	—	—	—	2
Fagites	—	—	—	—	1	—	—	1
Flabellaria	—	—	—	—	1	—	—	1
Glockeria	—	1	—	—	—	—	—	1
	11	98	—	1	11	—	—	122

Gattungen.	Grauwacke Uebergangs- geb.	Kohlengeb.	Trias.	Oolith- gruppen.	Kreide- Grüns.	Gruppe über der Kreide.	Geschiebe.	Zahl sämt- licher Arten.
Halonia	11	98	—	1	11	—	—	122
Hymenophyllites.	—	1	—	—	—	—	—	1
Karstenia	1	5	—	—	—	—	—	6
Knorria	—	2	—	—	—	—	—	2
Lepidodendron ..	—	1	—	—	—	—	—	1
Lepidoflojos	—	1	—	—	—	—	—	1
Lycopodites	1	7	—	1	—	—	—	9
Megaphyton	—	1	—	—	—	—	—	1
Münsteria	—	—	—	—	1	—	—	1
Neuropteris	1	10	—	—	—	—	—	11
Noeggerathia ...	1	1	—	—	—	—	—	2
Odontopteris	—	4	—	—	—	—	—	4
Pecopteris	—	18	—	—	—	1	—	18
Piceites	—	—	—	—	—	—	—	1
Pinites	—	—	—	—	2	2	2	6
Poacites	—	1	—	—	—	—	—	1
Polypodites	—	1	—	—	1	—	—	2
Protopteris	—	—	—	—	1	—	—	1
Pterophyllum ...	—	1	—	3	—	—	—	4
Quercites	—	—	—	—	—	—	1	1
Raumeria	—	—	—	—	—	—	1	1
Sagenaria	—	13	—	—	—	—	—	13
Salicites	—	—	—	—	1	—	—	1
Sigillaria	—	29	—	—	—	—	—	29
Sphaerococcites .	—	—	1	—	—	—	—	1
Sphenophyllum ..	—	3	—	—	—	—	—	3
Sphenopteris	—	15	—	—	—	—	—	15
Steffensia	—	1	—	—	—	—	—	1
Stigmaria	—	1	—	—	—	—	—	1
Taxites	—	—	—	—	—	1	—	1
Trichomanites ...	—	1	—	—	—	—	—	1
Ulodendron	—	4	—	—	—	—	—	4
Volkmannia	—	3	—	—	—	—	—	3
Woodwardites ..	—	2	—	—	—	—	—	2
Verrucarites	—	—	—	—	—	1	—	1
67 Gattungen in 20 Familien.	15	225	1	5	17	5	4	272

Schlussfolgerungen.

Die Gesamtzahl sämmtlicher bis jetzt in Schlesien entdeckten fossilen Pflanzen, beträgt 272 Arten, die in 67, zu 20 verschiedenen Familien gehörenden, Gattungen und in 7 verschiedenen Formations-Gruppen, aber in sehr abweichendem Verhältniss vorkommen. So machen die der ersten oder des Ueberganges nur etwa $\frac{1}{8}$ (genauer $\frac{4\frac{1}{2}}{27\frac{1}{2}}$), die der Kohlenformation beinahe $\frac{2}{8}$ ($\frac{3\frac{1}{2}}{27\frac{1}{2}}$), die der gesammten Trias $\frac{1}{2}$, des Grünsandes $\frac{1}{7}$ ($\frac{4\frac{1}{2}}{27\frac{1}{2}}$), der Gruppe über der Kreide $\frac{1}{8}$ ($\frac{3\frac{1}{2}}{27\frac{1}{2}}$) der Geschiebe, (die vielleicht sämmtlich zur Kreideformation gehören) $\frac{1}{8}$ ($\frac{3\frac{1}{2}}{27\frac{1}{2}}$) aus, ein Verhältniss, welches von der gegenwärtigen Flora, Schlesiens wesentlich abweicht, deren an phanerogamen 1300 Arten zählenden Flora der Cryptogamen nicht zu gedenken, in 106 Familien vertheilt sind. Bis zur Gruppe der Kreide behielt übrigens die fossile Vegetation einen von der gegenwärtigen sehr verschiedenen tropischen Charakter und nur von da an kommen mit unserer jetzigen Flora sehr verwandte Arten vor. Nur die beiden ersten Gruppen, die Uebergangs- und die Kohlengruppe, haben einige Arten mit einander gemein, von den übrigen ist dies nicht nachgewiesen und auch erfahrungsgemäss noch nicht wahrscheinlich. Die Mannigfaltigkeit der Gattungen und Arten würde grösser sein, wenn die an andern Orten, wie z. B. in Würtemberg und Elsass an fossilen Pflanzen so reichen Trias, der Grünsand sich nicht so arm zeigte und endlich die so sehr ausgezeichnete Flora des Lias uns ganz fehlte. Es darf wohl nicht erst bemerkt werden, dass die Zahl der bei uns vorkommenden Pflanzen weit grösser ist, als sie zur Zeit angegeben werden konnte und mit Gewissheit hoffe ich, sie bald erweitert zu sehen, wenn sich das Interesse für das Studium noch vermehren sollte, wozu ich durch diese Uebersicht beizutragen hoffe.

Wenn wir nun unsere fossile Flora mit der anderer Länder vergleichen, so besitzen nur Sachsen und England zur Zeit vollständige Uebersicht der fossilen Flora. In Sachsen (Gaa von Sachsen oder physik. geograph. geognost. Skizze f. d. Königreich Sachsen, d. Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach, der Herzogthümer Sachsen; Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen, d. Fürstenth. Schwarzburgischen und Reussischen Lande, der Herzogth. Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Köthen, die Provinz Sachsen und die Preuss. Lausitz,

bearbeitet von Prof. Dr. C. Fr. Neumann, Prof. Dr. B. Cotta, Dr. H. B. Geinitz, Hauptm. A. v. Gutbier, M. A. Schiffner u. Hofrath Dr. L. Reichenbach, finden wir ähnliche Formationen und diese, mit einer fossilen Flora in verwandten numerischen Verhältnissen, nämlich die des Uebergangsgebirges mit 3, überreich wie bei uns die Kohlenformation mit 195 Arten, worunter die bei uns noch niemals beobachteten schönen Staarsteine, oder Psarolithen, (eine Hauptzierde der fossilen Flora Sachsens) Zechstein und Kupferschiefer mit 14 Arten, die bei uns auch vermisst werden, der Muschelkalk mit 3 noch unbestimmten Arten, die Juraformation geht zur Zeit noch leer aus, die Kreideformation mit 14 Arten, die Gruppe über der Kreide ohngefähr 12 Arten, also in allen Formationen zusammen 241 Arten. Von England lieferte in neuester Zeit *John Morris* ein alphabetisches Verzeichniss der bis jetzt dort entdeckten Pflanzen (A catalogue of british fossils, comprising all the genera and species hitherto described with references to their geological distribution and to the localities in which they, have been found by John Morris London 1843). Die Zahl derselben beträgt an 518 Arten, wovon 276 der Kohlenformation, 93 der bei uns nur durch 5 Arten repräsentirten Oolithengruppen, 15 der Lias, 20 der Grünsand oder Quadersandstein und der Wealdenformation und 114 der Kreide angehören. Die grosse Zahl der letztern besteht grösstentheils aus zum Theil trefflich erhaltenen Früchten, welche auf der Insel Sheppey entdeckt worden sind. Wenn wir erwägen, dass ein grösserer Umfang der Kohlenförderung auch die Gelegenheit zur Entdeckung fossiler Pflanzen vermehrt, die Englands aber die in Schlesien um mehr als das 50fache übertrifft*), so werden wir unstreitig von dort aus wohl noch die grössten Bereicherungen für die fossile Flora zu erwarten haben, da auch dort das Interesse für diese merkwürdigen Ueberreste fortdauernd im Zunehmen begriffen ist. Gegenwärtig steht die Menge derselben mit der geringen Zahl der in Schlesien eröffneten Kohlengruben in keinem Verhältniss.

*) Schlesien lieferte im Jahre 1838, 3,307,235 Tonnen Steinkohlen. England ohngefähr nach Taylor's Berechnung 363 M. Ctr. ohngefähr 160 M. Tonnen.

Alphabetisches Register
der
Standorte
schlesischer Pflanzen.

Adersbach Pag. 126.

**Aagnetendorf 18. 121. 180. 248.
248. 307. 358. 364. 427.**

**Aagnetendorfer Schneegrube 124.
219 278. 306.**

**Althof 8. 12. 36. 42. 60. 67. 103.
166. 186. 195. 204. 219. 301.
308. 372. 404. 441.**

Alt-Lisehna 49.

**Altwater, im Gesenke 18. 36. 37. 46.
59. 72. 90. 93. 110. 114. 212.
127. 140. 168. 186. 197. 207.
208. 208. 211. 226. 243. 277.
285. 298. 306. 315. 319. 336.
336. 340 356. 362. 362. 364.
371. 377. 380. 385. 388. 389.
398. 398. 402. 404. 413. 418.
419. 426. 427. 429. 509.**

Altwasser 282.

Altwasser, Vogelkippe bei 112.

**Annaberg, bei Leschnitz 138. 161.
173. 178. 254. 292. 299. 366.
366. 367. 497. 498. 502.**

Annaberg bei Neurode 277.

**Arnoldsmühle 6. 13. 13. 17. 22. 42.
43. 61. 71. 94. 115. 116. 140.
141. 169. 172. 184. 186. 280.
273. 276. 281. 286. 296. 296.
318. 320. 331. 333. 363. 371.
373. 374. 401. 405. 405. 409.
434. 477.**

Arnsdorf bei Wohlau Pag. 66. 284.

Aschitzau 48. 82 396.

**Aupengrund im Riesengebirge 12.
47. 59. 186. 197. 293. 360. 396.
404. 496. 507. 510.**

Babek 354.

**Babia Gora 7. 12. 12. 59. 74. 88.
89. 90. 91. 93. 104. 140. 140.
142. 143. 208 212. 213. 220.
226. 227. 229. 240. 278. 309.
333. 339. 340. 371. 388. 425.
426. 427. 430. 465. 466. 472.
501.**

Baberhäuser 128. 202. 226. 232.

Badewitz bei Leobschütz 362.

Baerengrund 237. 255. 255. 359.

Baerenkamm im Gesenke 460.

Baerzdorf bei Ohlau 137.

Bankau bei Kreuzburg 305. 394.

Bankwitz 162. 204 464. 464.

**Baranio 7. 19. 46. 47. 168. 186.
198. 199. 207. 211. 212. 226.
227. 229. 237. 254. 275. 306.
314. 364. 378. 382. 388. 413.
426.**

Barteln 27. 230. 460.

Baude, alte schles. 104. 308.

**Baude, neue schles. 234. 308. 314.
333.**

Bauerwitz 150. 240. 288 356. 359.

Baumgarten bei Ohlau 458.

a*

- Bannau bei Glogau Pag. 370.
 Beitsch 171.
 Belkau 325. 352.
 Benisch bei Tr. 178. 267. 401.
 Berbisdorf, Nieder- 248. 305. 347.
 354. 359.
 Berg, lange, s. Charlottenbrunn.
 — breite, s. Striegau.
 — rothe, s. Rother Berg.
 — schwarze, } s. Charlotten-
 — spitzige, } brunn.
 Berge, Camenz-Rogauer, s. Camenz.
 — Janowizer, s. Janowiz.
 — Kosemizer, s. Kosemiz.
 Bergel, bei Ohlau 180.
 Bernstadt 354. 494.
 Beskiden bei Te. 207.
 Bettlern 67. 112.
 Beuthen 34. 97. 117. 123. 148. 165.
 192. 227. 274. 275. 308. 313.
 314. 341. 369. 424. 438.
 Beuthen a. d. Oder 10. 26. 30. 36.
 42. 66. 87. 88. 92. 95. 99. 100.
 102. 107. 112. 116. 118. 121.
 123. 130. 139. 153. 155. 160.
 164. 199. 230. 235. 263. 271.
 282. 283. 284. 285. 290. 300.
 301. 304. 352. 363. 381. 391.
 418. 435.
 — — Fasanerie 349.
 Bieberteich im Gesenke 128. 356.
 Bielau bei Neisse 123.
 Bieliz bei Te. 231. 485.
 Bielizer Gebirge 211.
 — — a. d. Schindelbaude 378.
 Birawa 196.
 Birkenbrück 48. 160. 226. 306. 395.
 400. 401.
 Birnbäumel 11. 11. 11. 44. 63. 65.
 245. 246. 247.
 Bischoffskoppe Pag. 267. 359.
 Bischoffswalde 5 8. 60. 67. 71. 104.
 107. 107. 169. 223. 229. 230.
 259. 271. 301. 330. 332. 369.
 380. 404. 406. 408. 434. 456.
 Bischwiz, Kl. 171. 288. 396.
 Bischwiz a. d. W. 5. 7. 8. 10. 43.
 48. 52. 56. 60. 61. 76. 83. 91.
 94. 97. 100. 102. 107. 117. 121.
 121. 122. 142. 165. 169. 169.
 188. 211. 213. 223. 233. 252.
 270. 275. 275. 290. 298. 303.
 313. 314. 329. 341. 345. 351.
 352. 358. 385. 404. 407. 408.
 431.
 Bladen bei Leobschütz 150. 204. 461.
 Bladniz bei Te. 395.
 Blauer Grund im Riesengeb. 47.
 Bleischwiz 45. 210. 325. 335. 373.
 386. 416. 449.
 Blockberg bei Charlottenbrunn 255.
 Bloßessel 175.
 Blogotizer Berg 366.
 Bobergebüsche bei Bunzlau 257.
 Boberinsel bei Bunzlau 252.
 Boberlachen bei Bunzlau 205. 307.
 348.
 Boberlehnen bei Bunzlau 90.
 Boberrührsdorf 9. 328.
 Bobrek bei Te. 285.
 Boegenberge 281.
 Bohrau 162. 282.
 Bojanow bei Ratibor 152. 281.
 Boidensdorf 170.
 Bolkenhayn 68. 236. 237. 303. 359.
 382.
 Bolko bei Oppeln 230. 449. 494.
 Borschen bei Wohlau 271.
 Brachen, lange, s. Charlottenbrunn.
 Braetersdorf bei Tr. 196.

- Brande bei Militsch, s. Militsch.
 Brandkoppe 232.
 Bratsch bei Leobschütz 356. 365.
 Braunsdorf bei Tr. 82. 119. 120.
 170. 271. 368. 372.
 Breitenau 329.
 Brenna 369.
 Bresa, Kl. bei Bohrau 282. 306.
 228. 382.
 Bresau 140.
 Breslau 82. 84. 84. 117. 117. 122.
 123. 139. 185. 194. 225. 235.
 239. 267. 268. 292. 294. 296.
 304. 330. 391. 392. 433. 438.
 452. 456. 471. 473.
 — — am Dome 322.
 — — a. d. Jesuiter Kirche 322.
 — — Kratzbusch bei 113. 335.
 — — am Lehmdamm 31. 36.
 70. 84. 117. 155. 284. 322.
 344. 348. 352. 390. 393. 414.
 — — am Mathias Thor 186. 322.
 — — a. d. alten Oder 28. 33.
 84. 136. 136. 152. 220. 227.
 269. 283. 284. 452. 472. 477.
 — — Schiesswerder 71.
 — — Ziegelthor i. d. Ohlau 348.
 391.
 Brieg 30. 91. 123. 230. 374.
 Briesau 27. 354.
 Briesniz 137.
 — — am Hirschfelde 179. 422.
 Briesnizer Berge 113. 266. 341.
 Brodtbaude 356.
 Bruch bei Neumarkt 305. 445.
 Brückenberg bei Arnsdorf 202. 282.
 462. 464.
 Brünnelhaide im Ges. 12. 126 242.
 243. 254. 319. 362. 362. 377.
 385. 398. 419. 502.
 Brunnenberg i. Riesengeb. Pag. 126.
 142. 197. 202. 334. 396. 497.
 Bruschwiz 376. 395.
 Buchwald bei Hirschberg 393.
 — — bei Schmiedeberg 107. 364.
 394.
 Bunkey bei Sibyllenort 12. 17. 35.
 476.
 Bunzlau 5. 7. 9. 15. 20. 26. 30.
 47. 52. 53. 55. 58. 61. 69.
 74. 75. 76. 77. 82. 84. 85. 85.
 86. 87. 87. 91. 92. 98. 103.
 107. 107. 110. 112. 112. 116.
 117. 118. 119. 123. 136. 139.
 143. 144. 148. 149. 151. 166.
 172. 184. 192. 194. 199. 220.
 240. 245. 246. 248. 251. 252.
 255. 256. 262. 269. 290. 294.
 298. 300. 304. 308. 314. 329.
 347. 352. 363. 386. 410. 414.
 418. 420. 424. 435. 438.
 — — i. d. Heide 96. 137. 421.
 Burgwiz bei Trebniz 358.
 Burkersdorf 80. 206.
 Camenz bei Frankenstein 180.
 — — bei Troppau 162. 364. 393.
 400.
 — — Rogauer Berge 161.
 Canth 130. 299.
 Carlowiz 10. 14. 26. 32. 32. 56. 63.
 66. 77. 82. 90. 107. 113. 130.
 139. 144. 162. 219. 260. 261.
 273. 287. 292. 294. 312. 319.
 351. 375. 386. 413. 418. 421.
 421. 429. 434. 438. 442. 455.
 469. 480. 481. 485. 487. 487.
 Carlsberg bei Beuthen a. O. 198.
 Carlsbrunn 9. 18. 19. 36. 72. 74.
 80. 122. 128. 145. 179. 186. 198.

202. 232. 233. 234. 285. 314.
 366. 413. 417. 426. 474.
 Carlsthal 38. 175. 179. 424.
 Carlswaldau, lange Berg b. 462.
 Carolath 257. ,
 Cavalierberg 404.
 Cawallen 150. 158. 201.
 Charkow bei Pless 48.
 Charlottenbrunn 3. 4. 13. 16. 18.
 19. 20. 22. 22. 32. 35. 36. 37. 38.
 42. 44. 46. 53. 59. 68. 72. 74. 76.
 80. 85. 87. 91. 96. 100. 103. 107.
 110. 112. 113. 114. 121. 123.
 123. 124. 134. 135. 136. 139.
 144. 148. 161. 165. 165. 175.
 179. 180. 183. 186. 198. 201.
 204. 206. 212. 213. 213. 217.
 218. 219. 230. 233. 236. 245.
 248. 249. 250. 252. 258. 259.
 260. 265. 277. 284. 286. 290.
 296. 306. 314. 364. 372. 420.
 426. 432. 436. 468. 497. 502. 504.
 Charlottenbrunn:
 — — Freudenschloss 232. 370.
 378.
 — — Heidelberg 199.
 — — lange Brachen 255.
 — — Lorbeerberg 227. 242.
 — — schwarze Berg 124. 249.
 270. 370. 417. 469.
 — — spitzige Berg 199. 417.
 Chmielowiz bei Oppela 80. 385.
 Chromstau 191. 319.
 Chroszcziz 138.
 Chroster Wald in O. S. 449.
 Chrumeziz 40.
 Chrzeliz 226. 404.
 Conradswaldau bei Landshut 59.
 Conradswaldau am hohen Berge 124.
 232. 245. 248. 270.
 Cosel in O.-S. Pag. 487. 497. 504.
 Creuzburg 24. 149. 166. 220. 245.
 245. 246. 247. 290. 346. 354.
 390. 395.
 Cudowa 7. 18. 19. 26. 35. 36. 53.
 61. 110. 111. 112. 119. 132. 133.
 136. 151. 179. 186. 201. 204.
 206. 218. 226. 231. 233. 248.
 248. 249. 255. 281. 283. 286.
 297. 308. 333. 356. 366. 395.
 397. 426. 430. 436. 447. 462.
 486.
 Czantory 4. 14. 16. 22. 38. 38. 53.
 59. 128. 180. 186. 189. 199. 206.
 213. 230. 270. 333. 356. 359.
 362. 365. 366. 368. 372. 374.
 382. 407. 413. 462. 462. 502.
 502. 507.
 Czeislowiz bei Ustron 341. 359.
 360. 369. 394.
 Czenschkowiz in O. S. 93. 184.
 227. 356.
 Czerschück 271.
 Czisock a. d. O. 271.
 Czorno-Vyssula 229.
 Dalkau 90. 161. 162.
 Damrau 254. 297.
 Dankwiz b. Jordansmühle 184. 231.
 305. 365. 446.
 — — Kupferberg 196. 271. 280.
 Deichsel, schnelle am Spitzberg b.
 Bunzlau 234.
 Dembio bei Oppeln 227.
 Derschau 22.
 Deutschhammer 11. 11. 12. 43. 44.
 47. 80. 95. 106. 245. 246. 281.
 306. 326. 445. 509.
 Deutsch Rasselwiz 79.
 — — Neukirch 472.
 — — Tscherbewey 154. 358. 359.

- Diehsa bei Görlitz Pag. 365. 404.
 Diersdorf bei Nimptsch 195.
 Dirschel 165. 184. 225. 231. 232.
 — — Gypsberge bei 56. 242.
 272. 280. 280. 446. 473.
 Dittersbach 378.
 — — Pass bei 51. 59. 225.
 Dittersdorf bei Jauer 160.
 Dittmansdorf 67.
 Djeschwiz 272.
 Dohlen-See a. d. Heuscheuer 339.
 Domanze 10.
 Domatschine 35. 143.
 Dombrowa bei Gleiwiz 471.
 Dombrowka bei Kreuzburg 245.
 248.
 Dominowka 229.
 Domslau 87. 164. 212. 420.
 Donatiusberg bei Trebniz 173.
 Donnerau, Ober- 89. 114. 237. 255.
 308. 359.
 — — lange Berg 4. 137. 226.
 227. 242. 263. 308. 326. 360.
 370. 417. 462.
 Dorftesehen 64. 89. 281. 287. 382.
 386. 394. 420.
 Drachenburg 183.
 Drahmischl b. Te. 198. 199. 301.
 Dreisteine im Riesengeb. 208.
 Dreiwasser bei Lömniz und Ober-
 Donnerau 270.
 Drüssel bei Bunzlau 160. 306. 376.
 388.
 Drüsselaecker 30.
 — — busch 165. 166.
 Dürrhartau 180.
 Dürrjentsch 10.
 Dürstenhof bei Tr. 359. 382. 414.
 Dunkelthal im Riesengeb. 474.
 Dyhrnfurth 51. 60. 97. 100. 110.
 113. 121. 175. 285. 290. 297.
 315. 375. 425.
 Dzingelau bei Te. 422.
 Eckersdorf bei Bunzlau 48. 95. 198.
 354. 400. 404.
 — — bei Troppau 53. 170. 184.
 — — Hohenstein bei 422.
 Eichberg bei Briesniz 170. 198.
 218.
 — — b. Bunzlau 13. 82. 90. 162.
 Eiglau 285..
 Eilauer Felder bei Sprottau 379.
 Einsiedel 9. 36. 65. 121. 135. 175.
 178. 200. 237. 277. 285. 314.
 329. 368. 413. 464. 509.
 Eisersdorf bei Glaz 293. 381.
 Elbfall 19. 175.
 Elbgrund 18. 20. 59. 106. 127. 127.
 128. 179. 186. 202. 219. 232.
 234. 253. 278. 284. 319. 333.
 336. 426. 474. 504.
 Elbquellen 278.
 Elbwiese 19. 121. 122. 135. 202.
 202. 210. 230. 275. 277. 336.
 362. 394. 398. 402. 410.
 Ellgut in O. S. 230. 254. 368.
 — — Nieder-, am Annaberg
 451.
 — — Schön- 153. 282. 368.
 431. 443.
 Endersdorf bei Tr. 141.
 Erbersdorf bei Tr. 196. 240. 414.
 — — Neu- 359. 401. 436.
 Eule 179. 212. 266. 281. 284. 296.
 307. 333. 497. 502.
 Eulengebirge 4. 13. 38. 68. 183.
 198.
 Falkenberg 30. 141. 148. 196. 292.
 341. 352.
 Falkenberge 209. 365.

- Fichtig bei Königswaldau Pag. 226.**
 232.
Fischbach 277.
Fischerberg bei Polsniz 103. 271.
 303. 372.
Försterbach bei Bunzlau 95. 165.
 179. 307. 404. 409.
Folgen bei Freiburg 366.
Folgenhäuser 375 381.
Fraustadt 78. 227.
Freiburg 22. 22. 53. 186. 294. 306.
 382. 471.
Freiwaldau 30. 65. 137. 186. 186.
 277. 464.
Freudenthal 340.
Freudenschloss s. Charlottenbrunn.
Freyhahn 308. 436.
Freystadt a. d. Oelse 120. 125 332.
Friedeck 151. 225. 376.
Friedewalde 43. 58. 76. 181. 275.
 290. 306. 352. 355. 360. 385.
 387. 390. 395. 395. 396. 400.
 401. 402. 408. 409. 420. 510.
Friedrichswaldau, Ob.- bei Guhrau
 312.
Fuchsberg im Riesengeb. 226.
 — — bei Schwoitsch 89. 90.
 96. 103. 190. 213. 238. 284.
 287. 294. 319. 375. 413.
Füllstein 155. 217. 218. 371.
Fürstenstein 14. 22. 22. 35. 53.
 103. 114. 121. 124. 128. 129.
 135. 136. 144. 145. 161. 165.
 175. 183. 196. 206. 218. 223.
 226. 237. 249. 252. 271. 282.
 292. 297. 341. 366. 370. 372.
 432.
 — — am Riesengrabe 462.
Fuhrmannsteine im Ges. 93.
Fulneck bei Troppau 65. 183.
- Gabel im Ges. Pag. 234.**
Gabiz 172. 409.
Gablau am Sattelwald 145.
Galgast 436.
Garsuche 95. 137. 141. 196. 274.
 305. 329. 347. 364. 387. 395.
 396. 400. 400. 503. 510. 510.
 511.
Geiersberg 7. 14. 16. 18. 59. 64.
 107. 109. 140. 140. 155. 156.
 161. 165. 170. 183. 184. 195.
 206. 213. 213. 225. 233. 243.
 244. 248. 248. 254. 284. 293.
 295. 302. 319. 319. 361. 366.
 368. 368. 372. 372. 374. 375.
 378. 383. 386. 395. 397. 400.
 400. 405. 420. 457. 462. 488.
 500.
Georgenberg s. Striegau.
Geppersdorf 16. 369.
 — — am langen Berge 374.
Gesenke 3. 4. 16. 19. 37. 47. 50.
 53. 106. 108. 112. 114. 124. 134.
 136. 156. 178. 194. 199. 201.
 202. 208. 211. 212. 227. 230.
 241. 245. 245. 246. 267. 274.
 278. 307. 308. 315. 326. 333.
 361. 372. 374. 384. 396. 404.
 409. 454. 465. 466. 469. 497.
 499. 502. 504.
 — — Kämme des 68. 104 110.
 208. 208. 208. 382. 417. 418.
 498.
Giersdorf bei Hirschberg 34. 91.
 307. 364. 394. 398. 497.
 — — bei Bunzlau 252.
Giesemühle bei Wohlau 356. 360.
 402.
Giesmannsdorf 16.
Gilswiz 14. 271. 341. 394.

- Glauche** Pag. 96. 166. 179. 302. 358.
 364. 388. 497. 498. 501. 504.
Glaz 9. 382.
Gleiwiz 18. 113. 195. 300. 511.
Glogau, Gross- 78. 308.
 — — **Ober-** 227. 228.
Gnadenberg 8. 95. 141. 186. 226.
 250.
 — — **Teiche, bei** 102. 394.
 398.
 — — **Wasser** 307.
Gnadenfeld 151. 158. 205. 385.
 428. 462. 464. 473. 507.
Gnadenfrei 10. 136. 213.
Gniechwis 353.
Goberschau bei Cosel 494.
Godula bei Ustron 366.
Görliz 36. 63. 68. 199. 365. 420.
Goldbach bei Bunzlau 284.
Goldmühle bei Bunzlau 94. 100.
 102. 124. 162. 165. 186.
Goldschmiede 137. 140. 162. 192.
 270. 393. 398. 408. 469.
Goldwald bei Weistriz 36.
Golleschau bei Ustron 224. 495.
Gorkau 322.
Goslawiz bei Oppeln 155.
Gotschdorf 120. 340. 356.
Gottesberg 89. 196. 370.
Grabownize T. 305. 346.
Graebchen 59. 67. 83. 85. 87. 87.
 87. 121. 122. 150. 153. 153.
 155. 172. 233. 238. 262. 263.
 283. 393. 424. 453.
Gräfenberg 277. 292. 461. 468.
 479.
Grätz 60. 60. 61. 65. 148. 150.
 151. 155. 161. 161. 179. 180.
 284. 326. 359. 409. 432.
Grafenschaft Glaz Pag. 3. 68. 106. 108.
 114. 124. 133. 134.
Greiffenstein 378.
Grenzbauden 72. 94. 123. 207.
Greulich 48. 246. 247. 248. 352.
 354. 383. 395. 396. 397.
Grocheberg bei Frankenstein 75.
 249.
Gröbel 308. 354. 401.
Gröbelberge 209.
Gröbelzeche 397.
Gröbnig bei Leobschütz 265.
Grödiz 7. 13. 23. 53. 61. 70. 91.
 96. 129. 135. 156. 162. 162.
 165. 250. 288. 306. 408.
Grödizberg 3. 13. 144. 160. 161.
 161. 165. 179. 183. 218. 248.
 248. 281. 307. 422. 425. 432.
Groschowiz 285.
Gross-Dübern bei Oppeln 511.
Gross-Hennersdorf 233. 286. 290.
 348. 358. 398.
 — — **Herliz** 155. 162. 165.
 217. 218. 228. 280. 284. 313.
 366.
 — — **Lassowiz** 175.
 — — **Mochbern** 70. 121. 136.
 228.
 — — **Rake** 84. 100. 113. 121.
 122. 155. 171. 210. 211. 220.
 238. 240. 256. 282. 285. 297.
 299. 386.
Grosstein bei Oppeln 12. 14. 18. 20.
 21. 69. 76. 109. 138. 140. 154.
 181. 184. 184. 200. 203. 243.
 271. 280. 295. 298. 299. 303.
 375. 420. 421. 446.
Gross-Tschansch 74. 121. 143.
 241. 261. 304. 315. 335. 392.
 403.

- Gr.-Tschirnau Pag. 21. 69. 228. 334.
 — — Weigelsdorf 66. 87. 119.
 159. 255. 256.
 — — Zeebe bei Bunzlau 11. 137.
 149. 160. 165. 228. 230. 249.
 296. 306. 395. 396. 400. 401.
 408.
 Grosse Keilig im Ges. 362.
 — — See a. d. Heuscheuer 47.
 48. 141. 186. 247. 253. 305.
 339. 352. 397. 399. 401. 404.
 410. 426.
 — — Teich 168. 208. 396.
 Grubensteine im Riesengeb. 425.
 Grudschütz 159. 170. 448. 495.
 Grünberg 375. 381. 472.
 Grünbusch bei Hirschberg 36.
 Grüneiche 5, 36. 44. 56. 92. 130.
 139. 184. 241. 243. 269. 283.
 284. 290. 330. 331. 341. 344.
 391. 393. 461. 477. 484.
 Grüntanne bei Ohlau 135. 150.
 507.
 Grunau bei Hirschberg 447.
 Grundwasser-See a. d. Heuscheuer
 339.
 Gruowalder Thal 38. 242. 378.
 Günterwiz 379.
 Guhrau 82. 227. 351. 425. 436.
 Guhrwiz 143. 399. 507.
 Guldau bei Troppau 354. 375.
 Gurék bei Teschen 184. 283.
 Haatsch bei Ratibor 456.
 Habelschwerdt 133. 292.
 Habendorf bei Reichenbach 161.
 255. 327. 366.
 — — , a. d. langen B. 12. 422.
 Hahnhäuser bei Schönau 364.
 Halbendorf in O. S. 254. 281. 285.
 Hampelbaude 314.
 Hartau u. dem Hurkenwold Pag. 50.
 372.
 Harteberg bei Frankenstein 7. 127.
 140. 140. 149. 155. 196. 225.
 238. 281. 284. 295. 372. 375.
 Hartlieb 14.
 Hartmannsdorf 18. 161. 358. 361.
 420.
 Hasenau 18. 234. 284.
 Hauffen bei Auras 96. 132. 190.
 205. 395. 398.
 Hausdorf 136. 186. 283. 248.
 Hausdorfer Gebirge 248. 374.
 — — am Zentner 128. 133.
 135. 136. 156. 296. 277. 306.
 307. 417.
 Haynfall 128.
 Haynwasser 348.
 Hegerwald bei Jägerndorf 364.
 Heidelberg, s. Charlottenbrunn.
 Heiligenbruch bei Freistadt 52.
 Heller, letzter 158.
 Hennigsdorf 506.
 Henschelkoppe b. Neurode 183. 248.
 Herdberg 248.
 Herischdorf 91. 348. 354. 414.
 Herliz 9. 17. 23. 59. 61. 64. 82.
 116. 145. 150. 179. 180. 184.
 213. 240. 248. 254. 267. 281.
 284. 295. 306. 315. 340. 368.
 381. 382. 393. 405. 414. 420.
 421. 428. 432. 438.
 — — Horka bei 260.
 — — Schlossberg 223.
 Herrmannsdorf b. Br. 87. 309.
 — — am Hessberge 366.
 — — bei Troppau 59.
 Herrmannstadt 329. 413.
 Hermersdorf 184. 405. 421.
 — — Ziegenkoppe 422.

- Hermisdorf Pag.** 387. 395.
Herrnamtschelniz bei Wohlau 144.
Herrnprotsch 61. 140.
Hessberg bei Jauer 218. 252. 266.
Heuscheuer 46. 89. 129. 168. 179.
 186. 198. 199. 212. 245. 245.
 246. 306. 333. 335. 364. 382.
 384. 396. 417.
Heydewilken 14. 43. 44. 63. 96.
 134. 148. 159. 162. 165. 174.
 240. 248. 276. 283. 295. 397.
Hillersdorf 20.
Hirschberg 7. 14. 15. 16. 20. 23.
 53. 56. 65. 68. 74. 77. 77. 80.
 85. 89. 94. 96. 98. 99. 100.
 104. 110. 113. 118. 135. 136.
 140. 144. 145. 151. 153. 156.
 165. 175. 193. 217. 220. 236.
 249. 250. 251. 253. 256. 260.
 264. 281. 283. 286. 290. 294.
 308. 331. 352. 388. 400. 458.
 477.
Hirschberg am Molkenbach 447.
Hirschwiesen im Ges. 59. 128.
 201. 364. 505.
Hochkirch 160.
Hochstein 183.
Hochwald 51. 226. 387. 430. 436.
 — — Gebirge 179.
Hochwalder Berg 462.
Hockschar 12. 38. 59. 114. 122.
 140. 168. 183. 186. 197. 208.
 208. 209. 219. 220. 243. 254.
 319. 333. 334. 340. 370. 371.
 377. 398. 402. 413. 419. 426.
 426. 507. 509.
Höfchen 48. 87. 101. 113. 121.
 136. 150. 155. 164. 201. 231.
 231. 233. 238. 263. 282. 283.
 — — Maria- 65.
Hohe Berg, s. Conradswaldau.
Hohe Mense 4. 14. 19. 20. 32. 46.
 59. 129. 145. 168. 179. 199.
 210. 212. 234. 298. 333. 358.
 360. 371. 382. 396. 426.
Hohe Rad im Riesengeb. 12. 208.
 402. 429. 509.
Hohenbohrau bei Beuthen 165.
Hohenfriedeberg 129. 137. 140.
 — — am Galgenberge 358.
Hohlstein bei Bunzlau 113. 286.
 296. 370. 372. 376.
 — — bei Löwenberg 281.
Horka, s. Herliz.
Hornschloss 20. 36.
Horzina Wiese bei Gr. Herliz 368.
Hoseniz 21. 89. 305. 352. 365. 383-
 390. 394. 395. 295. 396. 397.
 397. 398. 400.
Hrabinerberg 96.
Hube 87. 163. 238.
Hühnern 9. 59. 61. 85. 121. 122.
 164. 212. 270. 282. 288. 296.
 303. 396. 424.
Hultschin 195. 358. 447.
 — — Landecker bei 35. 38. 38.
 96. 170. 291.
Hummel 258.
 — — schloss 255.
Hundsfeld 20. 47. 87. 97. 231. 262.
 304. 331. 348.
Hungerberg im Gesenke 270. 304.
 462.
 — — lehne im Gesenke 110.
Jablunka 96. 186.
 — — Schanze 231.
Jacobine bei Ohlau 5.
Jacobsdorf 226.
Jacobswalde 35. 149. 246. 246.
 247. 354. 385. 445. 449. 509.

- Jacobswalder Haide Pag. 245. 390.
510.
- Janowiz bei Breslau 478. 480. 482.
- Jänowizer Berge b. Liegniz 183. 185.
- Jägerndorf 6 18. 23. 27. 42. 61.
82. 84. 87. 116. 118. 138. 148.
150. 155. 161. 171. 175. 178.
180. 200. 217. 218 248. 255.
260. 271. 282. 295. 314. 340.
347. 360. 365. 372. 375. 386.
393. 420 424. 432.
- — Burgberg bei 90. 262.
- Janowizer Haide 140. 362. 402.
- Jauer 50. 65. 370. 375.
- Janersberg 50. 96. 179. 186 281. 374.
- Jeltsch 456. 507.
- Jeseriz, Gross- 448.
— — Klein- bei Jordansmühle
227. 356.
- Johannisfeld 9 381.
- Jordansmühle 89. 180. 238. 243.
- Iser 106. 168. 183. 232. 246. 447.
— — kamm 104.
— — wiese 16. 22. 48 76. 135.
327. 335 336. 340. 364.
- Jungferndorf 27. 393.
- Käthenloch bei Reimsbach 175.
- Kadlau 227. 448.
- Kahle bei Görlitz 282.
- Kalichteich 36. 136. 137. 284. 346.
348. 390. 398. 414.
- Kammelwiz 228.
- Kappellenberg bei Hirschberg 283.
— — bei Heinzendorf 360.
— — bei Wartha 103. 422.
- Kapsdorf bei Trebniz 56. 99. 153.
202. 231. 233. 282. 299. 300.
358. 365. 399. 401. 404. 408.
431. 462.
— — im Goi bei 6. 7. 13. 17.
22. 37. 43. 43. 59. 83. 94. 96.
100. 116. 122. 153. 189. 211.
240. 242. 250. 259. 261. 285.
296. 297. 320. 360. 364. 394.
400. 401. 422. 431. 494.
- Karauschke 298.
- Karbischau bei Oppeln 189.
- Karchwiz 254.
- Kardubiez 507.
- Karlsberg a. d. Mora 385.
- Karlsdorf 327.
- Karlsruhe 305.
- Kascherey bei Strehlen 234.
- Katscher 10. 101. 109. 138. 151.
153. 158. 164. 184. 184. 195.
203. 217. 223. 240. 288. 292.
299. 319. 456.
— — Gypsgruben 186. 242.
- Kauffung 96.
— — Kitzelberg 32. 139. 209.
254. 255. 283. 303. 356. 358.
359. 408. 432.
— — Mühlberg 303.
- Keilig, Grosse- 362.
— — Kleine- 105.
- Kessel, im Gesenke 11. 12. 14. 18.
20. 35. 35. 36. 37. 38. 64. 88.
90. 93. 101. 110. 114. 121. 123.
126. 127. 140. 142. 159. 175.
179. 183. 186. 191. 197. 202.
207. 207. 208. 211. 213. 214.
223. 226. 232. 240. 240. 242.
243. 248. 248. 253. 254. 255.
272. 277. 278. 285. 293. 296.
298. 304. 311. 318. 327. 334.
336. 358. 371. 380. 388. 389.
396. 402. 404. 404. 406. 407.
413. 415. 419. 425. 427. 429.
430. 446. 448. 452. 453. 460.

465. 467. 501. 502. 507. 509.
 510.
 Kesselbuden 202. 207.
 Kesselgrube 121. 142. 210. 213.
 253. 336. 388. 406. 426. 474.
 — — koppe 7. 12. 16. 18. 19.
 88. 93. 197. 208. 209. 210.
 253. 278. 362. 396. 404. 448.
 451.
 Ketschdorf 83. 96. 180. 359.
 Kieferstädtel 149. 447.
 Kiowiz 11.
 Kirchberg bei Jägerndorf 422.
 Kittlitzreben bei Bunzlau 376.
 Kitzelberg, s. Kauffung.
 Kleinburg 59. 92. 99. 113. 157.
 158. 171. 223. 238. 313. 352.
 424. 432. 453. 462. 485.
 Kleinoels 53. 138. 178. 236.
 Kleinstein bei Oppeln 158. 200.
 451.
 Klein-Kletschkau 24. 71. 155. 171.
 184. 214. 328. 348.
 — — Kotzenau 137. 247.
 — — Lassowiz 79.
 — — Laudan 118.
 — — Schimniz 302. 303.
 — — Tarnau 302.
 — — Tinz 30. 158. 433.
 — — Tschansch 261.
 — — Weigelsdorf 56. 70. 100.
 136. 252. 329. 476.
 — — Zeche 150. 166. 252.
 Kleine Schnee-grube 7. 12. 34. 58.
 88. 92. 93. 93. 126. 179. 183.
 242. 261. 308. 430. 483. 501.
 506.
 Kleine Teich 12. 12. 35. 46. 53.
 90. 109. 112. 114. 121. 127. 143.
 175. 207. 210. 223. 226. 240.
 253. 272. 277. 319. 327. 336.
 374. 380. 407. 425. 427. 427.
 458. 489.
 Klessengrund 121. 145. 202. 226.
 382.
 Klettendorf 55. 70. 85. 121. 122.
 151. 188. 270. 274. 298. 403.
 420.
 Kleutsch 161.
 Klitschdorf 48. 160. 195. 247. 249.
 354. 394. 428.
 Klitschdorfer Haide 140. 149. 150.
 246. 421.
 Klodniz bei Gleiwiz 450.
 Klokacz-Gebirge 53. 53. 68. 96.
 134. 170. 186. 384.
 Knoblauchwiese 123. 380.
 Knopfmühle bei Breslau 504.
 Koberwiz 8. 10. 14. 21. 43. 53. 60.
 67. 75. 87. 100. 112. 155. 158.
 160. 162. 164. 186. 188. 189.
 194. 195. 195. 204. 204. 212.
 228. 229. 231. 233. 247. 255.
 258. 279. 282. 282. 288. 292.
 299. 300. 306. 308. 323. 335.
 348. 353. 357. 358. 361. 364.
 372. 382. 392. 393. 395. 397.
 399. 403. 404. 405. 408. 482.
 506.
 Rochelfall 38. 46. 124. 179. 356.
 364. 509.
 Költzsch 87.
 Königshuld bei Oppeln 9. 11. 11.
 12. 43. 44. 48. 63. 72. 95. 141.
 159. 195. 226. 245. 245. 246.
 246. 247. 260. 304. 335. 352.
 374. 397. 397. 398. 400. 404.
 410. 480. 487. 506.
 Köpernik 36. 46. 100. 126. 140.

168. 191. 362. 385. 389. 398.
402. 406. 419. 427.
- Kösling bei Katscher 5. 299. 462.
- Konska 49. 381.
- Koppe, (Schnee-) 12. 90. 143.
207. 272. 272. 278. 385. 389.
402. 404. 416. 425. 429. 509.
— — Schwarze 76.
- Koppelwiesen 128.
- Koppenbach 127.
- Koppenplan 208. 208. 275. 385.
389. 394. 402. 418. 429.
- Koppiz bei Teschen 495.
- Koschendorf 282. 365.
- Kosel bei Breslau 462.
- Koseler Wald bei Breslau 51. 70.
74. 165. 171. 206. 220. 271.
284. 368. 379. 391. 398.
- Rosemizer Berge 149. 389. 420.
- Kostenblut 91.
- Kottwitz bei Ohlau 27. 140. 140.
149. 154. 329. 369. 408. 416.
420. 441.
- Kotzerke 347.
- Krampiz 284.
- Krappiz 292. 298. 447. 448. 449.
464.
- Krasno bei Te. 328.
- Kratzbusch, s. Breslau.
- Krauschen bei Bunzlau 145. 248.
249. 328. 388. 405.
— — Hügel bei 166. 183.
- Kreba 159. 305. 353.
- Kreisewiz bei Leobschütz 158. 161.
- Kreutzendorf bei Tr. 394.
- Kristelwiz 288.
- Kritschen, Waldmühle bei 175. 318.
417. 494. 504.
- Krittern 14. 46. 102. 165. 171.
194. 206. 256. 282. 288. 358.
399. 408. 452. 461. 461. 462.
462.
- Krkonos 12. 454.
- Kroischwitz 68. 200.
- Krummbübel 18. 91. 121. 190. 254.
359.
- Kryzanowiz u. d. Weide 328. 386.
- Kürschnerberg bei Bunzlau 376.
- Kunau 20. 329.
- Kunzendorf bei Neurode 144. 156.
— — bei Neustadt 102.
— — u. d. Walde 174.
- Kupferberg 3. 20. 80. 80. 83. 85.
85. 87. 89. 91. 107. 114. 123.
123. 130. 136. 144. 144. 161.
179. 180. 180. 217. 218. 219.
230. 236. 249. 255. 260. 308.
319. 300. 370. 382. 388. 492.
— — Kreuzwiese bei 357.
- Kynast 18. 91. 283.
- Kynau 18. 72. 80. 103. 186. 284.
- Kynau, in d. Seiffen 166. 360.
- Kynauer Haide bei Grünberg 64.
- Lähn 91. 255.
- Lähnhaus 126. 179. 218.
- Lahnberg 152.
- Lahnberg im Riesengebirge 509.
- Lambsfeld 150. 158. 298. 375. 393.
399. 407.
- Landeck 65. 374. 382.
— — Saalwiesen bei 108. 207.
388.
- Landecke, s. Hultschin.
- Landeshut 233. 255.
— — Conradswaldau bei
— — Schreibendorf bei 9.
- Landshut bei Freiwaldau 341.
- Landskrone 23. 161. 218.
- Lange bei Laskowiz 287.
- Langenau 249. 277. 333.

- Langensau, Nieder- Pag. 170. 370.**
 378.
Langenbielau 206. 255.
Lanisch 138.
Larischau 395.
Laskowiz 82.
Leerbeutel 70. 71. 449. 496.
Lehndamm, s. Breslau.
Lehmgruben 27. 87. 100. 113. 114.
Lehmwasser 114. 255. 308. 402.
 470.
Leipe 58. 148. 390.
Leisniz 17. 161. 195. 356. 366. 371.
Leiterberg im Gesenke 20. 32. 36.
 121. 145. 186. 198. 201. 207.
 211. 219. 226. 234. 242. 270.
 298. 362. 388. 419.
Leitersdorf 178.
Lenschin 22. 400.
Leoschütz 6. 16. 16. 17. 23. 23.
 32. 51. 51. 56. 59. 61. 85. 85.
 89. 91. 98. 110. 130. 135. 140.
 140. 148. 149. 150. 150. 155.
 161. 164. 166. 173. 180. 203.
 217. 218. 231. 234. 236. 243.
 249. 268. 274. 292. 294. 296.
 297. 308. 335. 348. 363. 364.
 365. 366. 366. 371. 374. 374.
 375. 376. 379. 379. 383. 396.
 405. 406. 509.
 — — Hospitalmühle 217.
 — — Tausalzer Felder 450.
Leschniz 178. 451. 451.
 — — Annaberg b., s. Annaberg.
Leuthen 14. 61. 220. 300. 405.
Leutmannsdorf b. Schweidniz 369.
 445.
Lewien 35. 138. 448.
Lichten bei Tr. 395.
Lichtenwaldau 375.
- Liebau Pag. 225. 282.**
Liebenau 404. 408. 421. 482. 511.
Liebestorf am Sattelwalde 292.
Liegniz 253.
Lilienthal 8. 12. 46. 102. 198.
 261. 334. 335. 387. 409. 418.
 444. 446. 446. 480. 481. 482.
Lindewiese 253.
Liptin bei Tr. 191.
Lischna 254. 381.
 — — Alt- 49.
 — — Ober- 285. 557. 358.
 359. 361.
Lissa 6. 7. 10. 12. 13. 13. 14. 15.
 17. 20. 22. 22. 26. 30. 37. 48.
 43. 43. 44. 44. 46. 47. 48. 52.
 53. 57. 58. 63. 64. 65. 66. 67.
 70. 71. 72. 74. 80. 89. 90. 94.
 95. 96. 100. 103. 104. 107. 107.
 107. 110. 115. 122. 136. 136.
 137. 138. 138. 140. 140. 142.
 143. 144. 148. 150. 151. 154.
 154. 155. 155. 156. 158. 158.
 158. 160. 161. 162. 165. 166.
 166. 169. 171. 172. 174. 175.
 181. 182. 192. 195. 195. 196.
 196. 198. 198. 201. 202. 203.
 210. 210. 214. 215. 219. 228.
 229. 231. 233. 241. 243. 247.
 248. 248. 251. 254. 255. 256.
 258. 259. 260. 261. 261. 261.
 262. 272. 272. 273. 273. 275.
 275. 276. 281. 282. 283. 287.
 296. 296. 297. 299. 302. 303.
 305. 306. 306. 307. 308. 309.
 315. 318. 319. 320. 327. 333.
 334. 335. 361. 351. 354. 358.
 359. 360. 360. 360. 362. 363.
 364. 366. 368. 369. 372. 372.
 373. 375. 381. 385. 388. 388.

387. 387. 392. 393. 394. 394.
 395. 395. 395. 396. 396. 397.
 400. 401. 401. 402. 403. 404.
 404. 404. 405. 405. 407. 408.
 408. 408. 408. 409. 409. 413.
 416. 418. 418. 421. 421. 422.
 431. 468. 469. 480. 497. 498.
 504. 509.
 Lissa Hora 137. 248. 254. 306.
 507.
 Lobenstein 168.
 Lodniz 9. 382. 420.
 Löwen 199.
 Lobe 99. 392.
 Lomna 326.
 — — thal 38. 170. 186.
 Lomniz bei Charlottenbrunn 106.
 128. 440.
 — — im Riesengebirge 233. 242.
 246. 247. 307. 354. 364. 381.
 Lorbeerberg, s. Charlottenbrunn.
 Leosdorf 14.
 Looswiz 249. 395.
 Lubliniz 227.
 Luck bei Troppau 183.
 Ludwigsdorf bei Creuzburg 113.
 Ludwigsthal im Ges. 9. 32. 145.
 242. 507.
 Lüben 66. 82. 150. 248.
 Machova Gora 17. 38. 341. 356.
 Mädelsteine 35.
 Märzdorf bei Ohlau 416.
 Magniz bei Trebniz 22. 70. 137.
 138. 162.
 Mahlen 14. 32. 44. 44. 48. 64.
 82. 94. 115. 132. 135. 137.
 140. 144. 162. 166. 238. 240.
 247. 248. 248. 248. 249. 249.
 270. 300. 327. 382. 388. 400.
 431. 469.
 Maiwaldau Pag. 5. 381. 397.
 Malapane 11. 11. 12. 44. 53. 63.
 95. 137. 140. 149. 191. 195.
 196. 245. 247. 260. 284. 302.
 319. 372. 509.
 Malinow bei Ustron 179. 203. 211.
 275.
 Malschwiz bei Beuthen 151. 160.
 198. 249. 400.
 Manze 178.
 Margareth 171. 456. 477. 478.
 487. 511. 511.
 Margarethenmühle bei Breslau 118.
 165. 353.]
 Maria Höfchen, s. Höfchen.
 Marienau 5. 9. 15. 61. 67. 84.
 86. 97. 107. 117. 130. 143. 194.
 199. 223. 257. 307. 313. 341.
 346. 347. 347. 347. 349. 391.
 391. 394. 414. 416. 433. 433.
 435.
 Mariencranst 149. 178. 306. 307.
 372.
 Masselwiz 44. 46. 56. 96. 117.
 123. 138. 153. 171. 205. 221.
 229. 258. 262. 284. 290. 330.
 348. 359. 365. 374. 381. 391.
 391. 511.
 Masselwiz, Gross- 477.
 Mathiasthor, s. Breslau.
 Matskirch 358. 383.
 Medzibor 282.
 Meffersdorf 213. 270. 356. 362.
 364. 364.
 Mehltheuer bei Strehlen 204.
 Mellendorf 160.
 Meltsch 152. 254. 255. 267. 358.
 424. 432.
 Melzergrundo. Grube 143. 232. 253.
 254. 270. 368. 388. 474.

- Milchkretscham** Pag. 118.
Militsch 69. 95. 133. 141. 220.
 287. 290. 299. 347.
 — — i. d. Brande bei 345.
Militsch bei Cosel 511.
Mirkau 65. 66. 159. 381. 420.
Mirschelwiz 204. 288.
Mislastowiz 381.
Mislowiz 20. 264.
Mittagstein 35. 425. 427.
Mittelberg 60. 110. 133. 155. 165.
 223. 422.
Mockwiz bei Grottkau 138.
Mölke bei Neurode 124. 165.
Mönchhof 17. 38. 115. 318. 354.
Mösning bei Tr. 360.
Mohelnizer Jägerhaus 507.
Mois bei Bunzlau 32. 70.
Molkenberg 38. 104.
Moosebruch bei Reiwiesen 47. 186.
 284. 307. 329. 339. 398. 410.
 413.
Mora a. d. —, bei Tr. 330. 332.
Morau im Gesenke 9. 507.
Morawiz bei Tr. 138.
Morizberg bei Oppeln 184. 221.
 225. 243. 306.
Muchoniz 303.
Muckerau 119. 196. 272.
Mühlberg, s. Kauffung.
Mühlbock bei Bunzlau 79. 399.
Müncher Haide bei Bischwiz 240.
 296. 422.
Münsterberg 236.
Muhrau, am Striegauer Wasser 234.
 314.
Muskau 159. 246. 247. 400.
Nachod, am Grenzamte 139.
Nackel bei Oppeln 331.
Naitschüz bei Beuthen a. d. O. 376.
Nassidel Pag 472.
Navshy bei Tr. 287.
Neisse 9. 234.
Neplachowiz bei Tr. 428.
Nessel Ulrich im Ges. 105.
Neudorf bei Breslau 199. 233. 263.
 425.
Neudörfel bei Lissa 159. 327.
Neu-Erbersdorf bei Tr.
Neugarten bei Ratibor 447. 450.
Neukirch bei Breslau 74. 82. 92.
 119. 158. 196. 198. 269. 359.
 399.
Neukirch bei Goldberg 283.
 — — Poln. in O. S. 184. 452.
Neuland 174.
Neumannskoppe bei Scharfeneck
 135. 223.
Neumarkt 47. 129.
Neurode 80. 85. 124. 274. 364.
 365. 398.
 — — Annaberg b., s. Annaberg.
 — — Henschelkoppe b., s. Henschelkoppe.
 — — Kunzendorf b., s. Kunzendorf.
 — — Mölke b., s. Mölke.
Neusalz 227.
Neuscheitnich 257. 283. 316. 391.
 — — a. d. Passbrücke 164. 438.
 473.
Neustadt 59. 65. 148. 236. 237.
 — — Kunzendorf b., s. Kunzendorf.
Neuvorwerk bei Ohlau 36. 136.
 394. 398.
Neuwarthe bei Bunzlau 226.
Niedeck bei Ustron 387.
Niedecker Schlag 132. 356. 407.
Niedergrund bei Zuckmantel 395.

- Niedergrund, Berbisdorf, s. Berbisdorf.
 — — Langenau, s. Langenau.
 Nierodzin 17.
 Niesky 53. 65. 246. 246. 247. 362. 394. 398. 398. 400.
 Niklasdorf bei Silberberg 341.
 — — bei Strehlen 195.
 Nimkau 360.
 Nimptsch 53. 144. 180. 184. 188. 262. 292. 292. 299. 366. 460.
 — — Diersdorf bei
 — — Schobergrund bei 149. 206. 295. 462.
 — — Woiwelwiz bei
 Nischwiz 32. 40. 165.
 — — Kalkbruch bei 428.
 Ober-Donnerau, s. Charlottenbrunn.
 — Friedrichswaldau bei Guhrau, s. Guhrau.
 — Glogau, s. Glogau.
 — grund 368.
 — Lausiz 499.
 — Lischna, s. Lischna.
 Oberrnigk 298. 375. 458. 485.
 Ober-Rathen b. Wünschelburg 369.
 Ober-Schlesien 112. 179. 188. 267.
 — weichsel 120. 145. 495.
 Oberwiz bei Krappiz 507.
 Ober-Zauche bei Glogau 160.
 Oehab bei Te. 264. 282. 288.
 Ochsenkopf 246.
 Ochsenstall im Gesenke 460.
 Oderberg 117.
 Oels 60. 65. 354. 494.
 Ohlau 5. 7. 8. 13. 15. 16. 17. 20. 22. 22. 26. 30. 32. 34. 42. 46. 53. 53. 55. 58. 60. 60. 74. 76. 77. 77. 78. 83. 84. 84. 85. 87. 90. 91. 92. 97. 97. 100. 102. 103. 104. 107. 107. 107. 110. 112. 113. 113. 116. 117. 118. 118. 119. 121. 123. 123. 124. 129. 130. 136. 136. 137. 139. 143. 144. 148. 150. 150. 155. 158. 159. 160. 162. 164. 164. 165. 165. 166. 171. 171. 175. 184. 188. 189. 192. 194. 195. 198. 199. 213. 220. 227. 228. 229. 230. 234. 235. 239. 240. 245. 246. 247. 248. 248. 250. 251. 252. 254. 256. 257. 260. 262. 262. 265. 269. 271. 272. 275. 282. 283. 284. 285. 288. 292. 296. 297. 298. 301. 301. 304. 305. 306. 306. 307. 313. 314. 318. 322. 328. 331. 341. 346. 347. 349. 360. 363. 368. 369. 371. 372. 374. 375. 382. 390. 391. 393. 394. 395. 401. 402. 405. 408. 408. 414. 417. 418. 424. 428. 435. 460. 461. Ohlau, am Weinberge 32. 150. 299. 375. 413. 460. 461. 461. 464.
 — Seifersdorf bei, s. Ohlau.
 Obbersdorf bei Troppau 141. 340. 401.
 Oldrzychowiz 217.
 Oltaschin 10. 158. 164. 204. 223. 381. 448. 461.
 Oppa, s. Troppau.
 Oppafall im Gesenke 46. 128.
 Oppeln 3. 5. 7. 8. 10. 13. 13. 15. 16. 17. 17. 22. 23. 26. 26. 30. 30. 32. 34. 34. 34. 42. 47. 53. 55. 56. 58. 60. 60. 61. 61. 64. 65. 65. 67. 67. 76. 77. 82. 83. 84. 85. 85. 87. 92. 96. 96. 98. 99. 100. 101. 103. 107. 107.

107. 111. 112. 113. 113. 117.
 117. 118. 118. 119. 121. 123.
 123. 130. 132. 133. 135. 137.
 139. 143. 144. 148. 149. 149.
 150. 150. 151. 151. 153. 160.
 162. 162. 164. 164. 164. 166.
 169. 171. 175. 178. 184. 186.
 186. 192. 194. 195. 198. 200.
 204. 220. 228. 229. 231. 233.
 235. 236. 238. 239. 246. 248.
 248. 249. 251. 252. 256. 258.
 262. 262. 269. 271. 272. 274.
 280. 282. 282. 283. 283. 284.
 285. 286. 287. 288. 290. 292.
 292. 294. 294. 298. 298. 299.
 300. 301. 303. 304. 305. 306.
 307. 308. 312. 313. 314. 315.
 318. 328. 332. 335. 341. 346.
 347. 349. 352. 354. 360. 363.
 365. 371. 378. 379. 386. 387.
 391. 393. 393. 394. 395. 396.
 399. 401. 402. 408. 408. 409.
 409. 412. 418. 428. 432. 457.
 464. 495. 497.
 Oppeln, Pascheken 230. 285. 296.
 330. 494.
 Ostry bei Teschen 138. 364.
 Oswiz 5. 7. 8. 8. 10. 15. 27. 31.
 32. 34. 34. 36. 43. 44. 48. 53.
 55. 56. 60. 61. 63. 66. 66. 67.
 67. 70. 83. 84. 85. 89. 97. 97.
 103. 107. 107. 112. 117. 121.
 129. 139. 148. 154. 154. 156.
 164. 166. 169. 169. 171. 189.
 194. 195. 204. 221. 230. 243.
 251. 256. 269. 273. 275. 287.
 288. 292. 294. 301. 304. 312.
 313. 314. 327. 334. 341. 349.
 353. 363. 369. 375. 376. 380.
 381. 403. 410. 424. 424.
 Oswiz, Schwedenschanze b. Pag. 90.
 272.
 Ottag bei Ohlau 17. 82.
 Ottendorf bei Beuthen a. d. O. 188.
 318.
 Ottmuth bei Krappiz 451.
 Ottwiz 46. 184. 254. 292. 308.
 Palhanez bei Troppau 67. 348. 393.
 400. 408. 409.
 Palomb 38. 170. 326.
 Pangel bei Nimptsch 460.
 Panschewiese 336.
 Pariz 246.
 Pasche bei Beuthen 171. 303. 414.
 Pascheken, s. Oppeln.
 Paschkerwiz 26. 53. 65. 77. 85.
 87. 119. 139. 213. 221. 231.
 233. 273. 282. 290. 300. 405.
 414. 418. 429.
 Pass bei Dittersbach.
 Passbrücke, s. Neu-Scheitnig.
 Payuch bei Ustron 341.
 Peilau 136. 262. 286. 287. 381.
 Pelz- oder Lohebrücke 158. 158.
 408. 462. 470.
 Petersbaude 207.
 Petersdorf im Riesengeb. 247.
 — — bei Oswiz 385.
 Petersstein im Gesenke 7. 12. 16.
 35. 36. 64. 76. 88. 90. 93. 123.
 186. 191. 197. 208. 213. 223.
 232. 243. 255. 277. 304. 327.
 334. 336. 336. 374. 380. 385.
 404. 426. 427. 429. 507. 510.
 Petranowiz bei Wohlau 190. 363.
 Pfaffenberg 360.
 Pikau bei Tr. 360.
 Pilsniz 74. 103. 136. 153. 154.
 166. 174. 198. 214. 229. 258.

272. 298. 313. 320. 323. 331.
 359. 374. 376. 457. 477.
 Pirscham 30. 97. 180. 186. 195.
 341. 386.
 Planurberg im Riesengeb. 32.
 Pless 79. 253. 264. 342. 347.
 Plohmühle 250.
 Pochmühle bei Troppau 103.
 Podiebrad bei Strehlen 103.
 Pöpelwitz 7. 30. 31. 36. 61. 63.
 70. 82. 84. 97. 97. 104. 139.
 164. 171. 195. 228. 238. 250.
 257. 269. 283. 283. 290. 320.
 330. 331. 375. 391. 394. 428.
 431. 477.
 Polanowitz 136.
 Polgsen 124. 247. 370. 457.
 Pollenschine 14. 37. 59. 74. 189.
 201. 250. 271.
 Poln. Neudorf bei Breslau 112. 262.
 375. 376. 414. 464.
 — Neukirch in O. S., s. Neukirch.
 — Steinau bei Breslau 189.
 — Tarnau bei Beuthen a. d. O.
 98. 149. 175. 195. 227. 305.
 346. 349. 400.
 — Wartenberg 137.
 Polsniz 32. 42. 63. 64. 155. 243.
 Praunsitz 84. 220. 290. 351. 394.
 Prieborn b. Strehlen 280. 299. 397.
 Primkenauer Haide 305.
 Probsthayn, Spitzberg bei, s. Spitz-
 berg.
 Proskau 34. 53. 59. 95. 226. 240.
 243. 248. 252. 284. 295. 303.
 364. 365. 382. 448. 498. 509.
 Proskauer Haide 428.
 Prottsch a. d. W. 99. 299. 307.
 Przybor bei Oppeln 124. 304. 487.
 Pudelbaude 210. 275. 277. 314. 333.
 Pudschütz bei Praunsitz Pag. 301.
 Pürbischau 158. 379.
 Quarz bei Glogau 151.
 Quirl 269.
 Raase 255.
 Rackau 230.
 Rad, hobe, s. Hohes Rad.
 Radosch bei Gnadenberg 140.
 — — Wald bei 364.
 Radwanitz 195.
 Ransern 32. 44. 45. 46. 61. 63.
 66. 67. 103. 107. 117. 130.
 136. 138. 169. 189. 201. 204.
 233. 276. 282. 298. 349. 353.
 449. 462. 511.
 Ratibor 164. 164. 178. 227. 274.
 281. 285. 294. 365. 377. 453.
 472. 497. 509. 511.
 — Schillersdorfer Wald bei 502.
 Reichenau am Sattelwald 227.
 Reichenbach 53. 128. 162. 186.
 233. 255.
 Reichenstein 65. 65. 67. 180. 462.
 — — Schlackenthal bei 206.
 359. 472.
 Reimsbach 91. 382.
 Reimswaldau 255. 359. 397. 460.
 464.
 Reinberg 87.
 Reinerz 4. 18. 19. 20. 37. 38. 46.
 59. 129. 139. 144. 149. 150.
 180. 186. 200. 201. 203. 226.
 227. 233. 237. 240. 255. 255.
 270. 277. 292. 304. 308. 333.
 356. 358. 364. 368. 374. 395.
 436. 495. 507.
 Reinschdorf bei Cosel 503.
 Reiwiesen 47. 186. 284. 307. 329.
 339. 398. 410. 413.

Rengersdorf bei Glaz Pag. 20.

Riegersdorf 65.

Riemberg 14. 15. 35. 37. 46. 47.

58. 60. 67. 72. 80. 96. 110.

132. 134. 135. 137. 141. 148.

151. 154. 162. 178. 181. 183.

190. 192. 195. 196. 196. 201.

202. 203. 206. 211. 219. 238.

240. 245. 247. 248. 249. 249.

252. 282. 290. 295. 315. 318.

327. 329. 334. 360. 360. 365.

368. 374. 383. 386. 387. 394.

395. 396. 400. 400. 401. 401.

402. 404. 407. 408. 409. 428.

448. 449. 468. 480. 482. 488.

— — Wartberg bei 69. 138.

156. 395. 397.

Riesengebirge 4. 14. 20. 50. 106.

107. 114. 123. 124. 127. 128.

134. 140. 142. 142. 179. 183.

194. 199. 201. 208. 208. 211.

212. 220. 227. 230. 240. 245.

245. 246. 248. 278. 299. 309.

315. 315. 326. 333. 339. 361.

362. 371. 382. 384. 389. 396.

397. 404. 409. 413. 418. 454.

465. 466. 497. 498. 499. 501.

509. 509.

— — Kamm des 68. 208. 208.

208. 275. 416. 417.

Riesengrund 12. 16. 19. 19. 35.

76. 93. 100. 101. 114. 121. 127.

168. 191. 210. 223. 234. 248.

253. 277. 278. 284. 298. 319.

333. 336. 361. 374. 380. 426.

469. 497. 507.

— — am Kiesberg 450. 450.

501. 502. 502.

Rischeley 431.

Rogan Pag. 119. 274.

Rohnstock 16. 375.

Rohrbach 382.

Roseberg 11. 14. 14. 17. 60.

149. 150. 159. 191. 195. 227.

228. 230. 237. 240. 247. 284.

292. 295. 341. 354. 368. 400.

410.

Rosenthal bei Beuthen a. d. O. 98.

346.

Rosenthal bei Breslau 7. 84. 97.

117. 130. 136. 139. 164. 261.

262. 283. 330. 331. 394. 478.

482.

— — bei Bunzlan 124.

Rothe Berg im Gesenke 219. 378.

398. 426. 464.

Rothenburg 247.

Rothkretscham 122. 252. 303.

Rothlach 14. 23. 341.

Rothschloss 160. 382.

Rothwasser 347.

Rückerts bei Reinerz 149. 150.

246. 249.

Rummelsberg 3. 53. 54. 110. 127.

135. 149. 186. 225. 243. 245.

252. 295. 362. 366. 372. 389.

488. 498.

Rybnik 220.

Saalwiesen bei Landeck, s. Landeck.

Sackerau bei Breslau 17. 24. 82.

175. 231. 404.

Sadewitz b. Oels 482. 506. 511. 512.

Sakrau bei Oppeln 302.

Sakrauer Berg 127. 155. 214. 378.

507.

Sagan 78.

Saliswald 155.

Salzbrunn 16. 53. 61. 80. 80. 118.

119. 154. 156. 180. 217. 230.

236. 237. 255. 257. 259. 308.
 331. 359. 370. 420. 431. 477.
 Salzbrunn, Wilhelmshöhe 432.
 Salzgrund 198.
 Sandberg 97. 100. 171. 201. 214.
 332. 441.
 Sandgebirge 51. 70. 281. 326.
 374.
 Sandhübel bei Freiwaldau 196. 290.
 Sattelwald 32. 274. 372. 397. 430.
 432. 436.
 Sattler 38. 46. 53. 53. 114. 166.
 169. 180. 210. 218. 234. 243.
 306. 307. 401. 408.
 Saubsdorf bei Freiwaldau 93. 255.
 Sauteich bei Bunzlau 84.
 Sayne 84. 393.
 Schäbicz 259.
 Schauermühle 186. 213. 361. 362.
 Scheitnich 27. 30. 34. 34. 45. 46.
 46. 53. 59. 84. 86. 97. 104.
 112. 114. 117. 139. 139. 165.
 169. 171. 195. 199. 204. 204.
 223. 251. 254. 269. 304. 307.
 308. 330. 331. 346. 347. 347.
 348. 349. 355. 369. 371. 376.
 380. 386. 420. 431. 433. 435.
 438. 441. 449. 456. 464. 477.
 Schellenberg bei Tr. 223.
 Schibiz bei Teschen 504.
 Schiedlagwiz 30.
 Schillermühle bei Gohlau 295.
 Schillersdorf bei Ratibor 38. 456.
 Schindelmühle b. Wohlau 360. 396.
 402.
 Schippowiz 286.
 Schlackau bei Tr. 89. 383.
 Schlackenthal b. Reichenstein.
 Schlansdorf 220.
 Schlawa b. Beuthen Pag. 141. 227.
 307.
 Schleibiz 30. 35. 76. 107. 213.
 255. 282. 358. 364. 395. 448.
 494. 504.
 Schlosierthal 36. 103. 109. 114.
 128. 145. 175. 223. 374. 389.
 397. 426. 462. 464.
 Schles. Baude, alte } s. Baude.
 — — — neue }
 Schliesa 188. 306.
 Schlingelbaude 7. 175. 202. 207. 254.
 Schmelzberg bei Cudowa 23. 139.
 204. 461.
 Schmiedeberg 38. 61. 77. 80. 130.
 132. 132. 133. 133. 180. 206.
 232. 233. 237. 248. 255. 257.
 277. 314. 327. 339. 360. 378.
 382. 462.
 — — Mittel- 94.
 — — Ober- 22. 94. 255.
 Schmolz 100. 408. 424.
 Schneeberg 4. 14. 18. 19. 20. 32.
 37. 38. 46. 47. 59. 64. 104.
 121. 129. 140. 145. 168. 175.
 179. 183. 194. 197. 198. 199.
 202. 207. 208. 210. 211. 212.
 219. 226. 227. 234. 242. 243.
 277. 278. 298. 319. 326. 333.
 362. 362. 366. 371. 384. 388.
 402. 413. 417. 419. 426. 426.
 465. 502.
 Schneeegrube, Agnetendorfer; siehe
 Agnetendorf.
 — — Kleine-, s. kleine Schnee-
 grube.
 Schneeegruben 19. 36. 46. 59. 90.
 93. 106. 109. 112. 114. 121.
 143. 186. 210. 213. 223. 240.
 253. 275. 277. 284. 310. 362.

377. 385. 388. 426. 474. 497.
 507.
 Schönaun 77. 145. 173. 266. 314.
 Schönbrunn bei Jägerndorf 390.
 — — bei Teschen 331. 477.
 Schönbrunner Berg in der Lausiz
 354.
 Schöneiche 284.
 Schönfeld 36. 80. 159. 105. 196.
 375. 375. 399. 405. 413,
 Schönwalde bei Zuckmantel 488.
 Schosniz bei Canth 22. 169. 332.
 363. 378.
 Schottwiz 46. 204. 229.
 Schreckendorf 233. 274.
 Schreibersbau 18. 22. 80. 89. 128.
 237. 242. 254. 277. 384. 441.
 Schriegwiz 195.
 Schüsselbauden 202.
 Schwarzbach 27.
 Schwarzwasser bei Teschen 97. 98.
 118.
 Schweidniz 9. 56. 68. 80. 99. 158.
 188. 258. 262. 292. 314.
 Schweinern 102. 165. 169. 195.
 198. 257. 259. 416.
 Schwibedowe 173. 305. 346. 387.
 394.
 Schwoitsch 8. 12. 13. 24. 34. 36.
 43. 45. 55. 56. 60. 61. 63. 66.
 66. 67. 71. 85. 104. 107. 107.
 112. 114. 123. 129. 138. 150.
 154. 158. 162. 165. 169. 169.
 171. 182. 184. 189. 198. 215.
 219. 229. 251. 256. 257. 260.
 271. 271. 272. 273. 298. 301.
 301. 307. 312. 332. 335. 368.
 371. 372. 379. 386. 414. 418.
 422. 429. 433. 434. 440. 469.
 Seebstetter Busch Pag. 32.
 Seefelder a. d. Heuscheuer 398.
 404. 409.
 — — a. d. hohen Mense 48. 245.
 245. 246. 327. 339. 398. 398.
 404. 409.
 Seidelbusch 76.
 Seifen, s. Kynau.
 Seifenlehne 257. 275.
 Seifersdorf bei Ohlau 21. 96. 170.
 180. 203. 252. 471.
 Seitendorf bei Troppau 315. 365.
 Seppau 233.
 Seyerswaldau bei Reichenbach 138.
 Sibyllenort 18. 35. 68. 92. 118.
 228. 358. 375. 448.
 Siebenhuben 85.
 Silberberg 38. 53. 202. 366. 502.
 Silberränder 12.
 Silsterwiz 20. 68. 109. 145. 150.
 178. 186. 195. 201. 204. 240.
 274. 288. 386. 390. 462. 464.
 Sirckwiz 20. 175.
 Skarsine 3. 13. 14. 17. 22. 37.
 53. 54. 72. 85. 89. 92. 96. 96.
 113. 132. 136. 137. 137. 154.
 161. 162. 165. 166. 166. 179.
 181. 210. 215. 231. 238. 247.
 248. 248. 252. 257. 263. 270.
 285. 296. 306. 326. 335. 360.
 373. 376. 388. 404. 405. 408.
 418. 422. 429. 434. 434. 446.
 469. 497. 498. 501. 502. 509.
 509. 510.
 Skotschau 40. 151.
 Slavenczicz 227. 233. 240. 285.
 368. 374. 382. 383.
 Sonnenkoppe 4. 14. 35. 46. 59.
 68. 96. 212. 226. 307. 333. 360.
 372. 378. 397. 413.

- Spachendorf Pag. 18. 23. 178. 180.
370. 386.
- Spitzberg bei Bunzlau 156. 248.
432.
- — bei Bunzlau a. d. schellen
Deichsel.
- — bei Probsthayn 126. 161.
341. 366. 374. 378.
- — bei Ruppersdorf 375.
- Sprottau 38. 78. 150. 245. 264.
271. 305. 326. 497. 509.
- — Hochwald bei 38. 507.
507.
- Stablowiz 318.
- Stangenberg b. Stohnsdorf 210. 356.
- Stanowiz 136. 398.
- Stechpläne im Gesenke 507.
- Steinau a. d. Oder 63. 165. 288.
441.
- Steinboden im Riesengebirge 47.
364. 406. 407.
- Steine 238.
- Kieselschiefer-Brüche 75. 302.
- Stohnsdorf 110. 209. 247. 248.
- — Prudelberg bei 91. 467.
- Stollenberg 75.
- Stonsdorf 375.
- Stozek, am 53.
- Strachate 34. 126. 171. 184. 257.
285. 373. 461. 476.
- Straupiz bei Hirschberg 329. 347.
469.
- Strehlen 10. 53. 89. 91. 99. 128.
162. 188. 195. 201. 206. 236.
258. 262. 292. 292. 382. 409.
431.
- — Berge bei 240. 244. 248.
- Stremplowitz bei Tr. 184. 228. 255.
271. 358. 374. 375. 381. 381.
400. 428.
- Stremplowitz a. d. Horka Pag. 103.
250.
- Striegau 42. 99. 121. 257. 260.
262. 292. 294. 303.
- Striegauer Berge 137. 140. 154.
165. 186. 243. 271. 358.
- — breite Berg 14. 51. 63.
74. 91. 126. 138. 144. 254.
258. 262.
- — Georgenberg 155. 217. 486.
- — Kreuzberg 103. 109. 138.
161. 217. 225.
- — Streitberg 135. 161. 218.
- Sturmhauben 509.
- Struwiz bei Neisse 447.
- Strzbowiz bei Troppau 96. 101.
145. 178. 285. 318. 395.
- Sucholasez bei Tr. 285. 406.
- Suckowiz 6. 17. 184. 186. 189.
229. 233. 371. 378. 494.
- Süsswinkel 13. 18. 43. 159. 361.
365. 398:
- Sulau 178. 251.
- Tafelfichte 68. 183. 404.
- Tannhausen 255.
- Tarnast 14. 72. 236.
- Tarnau 303.
- Tarnowiz 236. 299. 379.
- Teiche, auf dem Riesengebirge 19.
122. 197. 213. 275. 278. 398.
398. 402.
- Toschanowiz bei Te. 164.
- Teschen 5. 10. 13. 15. 18. 23.
26. 30. 32. 42. 59. 65. 66. 67.
67. 77. 79. 83. 84. 84. 87. 87.
96. 96. 100. 101. 103. 107.
111. 113. 136. 144. 151. 155.
156. 161. 164. 165. 166. 169.
169. 174. 175. 178. 178. 181.
186. 193. 196. 202. 210. 210.

211. 220. 233. 236. 239. 240.
 243. 247. 248. 249. 249. 252.
 253. 254. 254. 255. 258. 262.
 269. 272. 273. 274. 275. 281.
 282. 284. 286. 292. 292. 292.
 296. 297. 297. 298. 298. 299.
 299. 299. 305. 307. 307. 314.
 318. 329. 341. 346. 349. 371.
 375. 382. 385. 388. 390. 395.
 420. 424. 499. 504.
- Teschen, Schlossberg 99. 262.
- Teufelsgärtchen, (Rübezahlgarten)
 7. 11. 12. 23. 64. 69. 88. 93.
 100. 126. 127. 159. 183. 191.
 209. 232. 405. 407. 430. 450.
 467. 501. 510.
- Thomasdorf im Ges. 20. 105. 124.
 137. 248. 292. 362. 387.
- — Ober- 320.
- — bei Bunzlau 315.
- Thomaswaldau 145. 405.
- Thommendorf, im Jwalde 341.
- Tiefenfurth 48. 79. 95. 145. 226.
 246. 246. 249. 315. 352. 353.
 383. 399. 400. 418. 421.
- Tiefhartmannsdorf 359.
- Tillendorf, N.- 11. 14. 82. 160.
 213. 250. 288. 332. 413. 418.
- Totschen 13. 17. 22. 23. 74. 74.
 75. 96. 132. 132. 137. 161. 172.
 240. 262. 272. 299. 376.
- Trachenberg 102. 107. 220. 246.
 262. 287. 290. 327. 347. 382.
 394.
- Trebniz 7. 37. 51. 59. 60. 63. 85.
 103. 116. 118. 121. 123. 150.
 196. 202. 205. 211. 212. 213.
 215. 249. 249. 271. 285. 290.
 292. 296. 297. 326. 347. 360.
363. 366. 366. 372. 381. 388.
 390. 401. 432.
- Trebniz, Hügelkette 13. 17. 22.
 26. 30. 42. 43. 44. 44. 52. 53.
 57. 70. 71. 89. 90. 96. 110.
 115. 132. 132. 156. 158. 166.
 181. 182. 184. 198. 210. 210.
 243. 259. 261. 272. 276. 296.
 298. 320. 325. 333. 358. 362.
 364. 371. 388. 405.
- Treschen 9. 15. 34. 46. 61. 63.
 67. 129. 130. 259. 275. 292.
 298. 301. 313. 323. 330. 341.
 347. 347. 404. 473. 496.
- Troppau 5. 8. 10. 13. 13. 15. 17.
 18. 22. 27. 30. 30. 32. 34. 42.
 53. 59. 60. 61. 61. 65. 66. 67.
 75. 77. 83. 84. 85. 85. 87. 96.
 96. 100. 101. 103. 107. 107.
 113. 115. 128. 129. 130. 136.
 136. 140. 144. 149. 150. 150.
 153. 162. 164. 165. 166. 166.
 166. 169. 172. 174. 179. 181.
 184. 192. 193. 195. 196. 202.
 204. 210. 210. 211. 224. 230.
 230. 231. 233. 236. 239. 240.
 243. 245. 248. 249. 249. 250.
 254. 258. 262. 263. 264. 265.
 269. 272. 273. 282. 283. 283.
 285. 286. 292. 292. 292. 296.
 297. 298. 298. 299. 305. 314.
 318. 332. 347. 352. 368. 369.
 371. 375. 376. 386. 388. 391.
 393. 399. 402. 408. 413. 418.
- Troppau, Gipsbrünnel bei 99.
- Trczenzin bei Oppela 487. 503.
 504.
- Tschechniz 45. 46. 140. 149. 186.
 284. 303. 332. 369. 369. 399.
 404. 420.

- Tschirn bei Tr. Pag. 149.
 Tschirnau a. d. O. 63. 138.
 Tul bei Ustron 12. 13. 17. 32. 38.
 64. 155. 217. 223. 254. 285.
 298. 357. 358. 359. 260. 361.
 366. 369. 443.
 Uhustein im Ges. 36. 76. 262. 507.
 Ulrich im Ges. 356. 447. 507.
 — — Nessel-
 Ustron 22. 23. 36. 59. 61. 65. 96.
 101. 151. 166. 170. 171. 180.
 204. 233. 237. 255. 267. 277.
 361. 365. 376. 499. 509.
 Uttig 260.
 Uttiger Lache bei Bunzlau 51. 450.
 Vielgut 363. 367. 494.
 Vogelgesang bei Nimptsch 195.
 299.
 Volpersdorf 36. 248.
 Vorstädte von Breslau:
 Nikolai-Vorstadt 55. 61. 78. 80.
 86. 87. 283. 375. 376. 424.
 472.
 Oder-Vorstadt 28. 55. 122. 270.
 313. 424.
 Ohlauer-Vorstadt 153. 194.
 Schweidnizer-Vorstadt 20. 60.
 136. 194. 199. 298. 424.
 Vollwark bei Oppeln 511.
 Wachowiz bei Rosenberg 372.
 Wängern bei Oppeln 421.
 Wagstadt 27. 356.
 Waldenburg 226.
 — — im Ges. 59. 76. 105. 121.
 202. 234.
 Waldmühle, s. Kritschen.
 Wanowiz 150.
 Warmbrunn 23. 72. 106. 107. 237.
 255. 269. 274. 307. 336. 346.
 372. 384. 425. 428. 468. 480.
 Warteberg, s. Riemberg.
 Wartha 9. 13. 22. 35. 120. 144.
 180. 292. 297. 422.
 Warthau 7. 53. 91. 94. 361. 420.
 Warthe 32. 100. 183. 230. 250.
 260. 328. 381. 388. 393.
 Wechowiz 23.
 Wehrau 70. 159. 160. 286. 294.
 388. 413. 418.
 Weichsel bei Ustron 80. 120. 125.
 332. 499.
 Weide 122. 196. 299.
 Weidendamm bei Breslau 283.
 Weidenau 213.
 Weinberg, s. Ohlau.
 Weisskirch 375.
 Weisswasser 122.
 Weisse Wiese 253. 275. 306. 394.
 396. 398. 402.
 Weistriz 59.
 — — Thal 154. 155. 505.
 Wendrin bei Teschen 149.
 Wessig 75.
 Wiedergrün 201. 217.
 Wiegenschüzer Sümpfe in O. S. 474.
 Wiegstein 20. 35. 35. 36.
 Wildschüz 8. 22. 64. 92. 100. 102.
 107. 115. 117. 139. 141. 144.
 175. 211. 250. 261. 261. 262.
 296. 351. 372. 372. 374. 375.
 376. 387. 391. 414. 422.
 Wiesa bei Trebniz 175. 318. 400.
 Wilhelmsthal 206. 233. 462.
 — — bei Wohlau 347. 509.
 Wilkau 292.
 Winow bei Oppeln 43. 44. 53. 150.
 295. 296. 372. 404. 405. 449.
 456. 503. 507.
 Wirrwiz 18. 23. 153. 195. 206.
 241. 250. 279. 288. 392.

- Wölfelsdorf Pag.** 37. 51. 59. 129.
 151. 180. 214. 223. 237. 255.
 304. 407.
- Wölfelsgrund** 18. 121. 202. 226.
- Wohlau** 10. 14. 15. 16. 17. 22.
 22. 26. 30. 32. 37. 42. 44. 46.
 47. 53. 56. 58. 61. 63. 65. 66.
 77. 82. 84. 85. 87. 91. 92. 95. 96.
 97. 100. 102. 107. 107. 107. 110.
 112. 113. 116. 118. 119. 121.
 123. 123. 129. 130. 133. 136.
 136. 141. 143. 144. 148. 150.
 151. 159. 160. 162. 164. 164.
 165. 165. 166. 169. 171. 171.
 175. 178. 181. 184. 188. 192.
 194. 195. 196. 198. 199. 201.
 203. 213. 220. 227. 229. 235.
 236. 240. 245. 245. 248. 248.
 248. 250. 251. 252. 254. 256.
 257. 260. 262. 262. 263. 271.
 272. 275. 282. 283. 285. 290.
 292. 294. 296. 297. 298. 299.
 300. 301. 301. 303. 304. 307.
 308. 308. 313. 314. 315. 329.
 341. 347. 347. 348. 349. 351.
 352. 353. 354. 356. 358. 363.
 364. 365. 368. 371. 372. 374.
 375. 375. 376. 383. 386. 387.
 390. 391. 391. 393. 393. 295.
 395. 395. 396. 397. 398. 398.
 400. 400. 401. 404. 408. 408.
 409. 413. 414. 417. 418. 424.
 438. 506. 507. 509.
- Wohlau, im Altteich bei** 305. 474.
- Weiselwiz, s. Nimptsch.**
- Wolfsdorf** 11.
- Wronin** 217. 271. 285. 285. 307. 498.
- Wünschelburg** 144. 156. 428.
- Würbenthal** 20. 120. 242.
- Wyssoka Hora Pag.** 173.
- Xyrowa** 17. 292.
- Zabrzek bei Te.** 359.
- Zackenfall** 38. 94. 175. 179. 219.
 333. 364. 368. 388. 509.
- Zecheaecker** 375.
- Zedliz bei Br.** 46. 70. 97. 230.
 271. 282. 313.
- — bei Ohlau 464.
- Zedlizbusch bei Striegau** 378.
- Zeisburg** 255.
- Zeisigsteine** 32.
- Zeisenberg** 18. 196.
- Zeiskenschloss** 161.
- Zentner, s. Hausdorf.**
- Zimpel** 243. 282.
- Zirlau** 59.
- Zlöniz, bei Oppeln** 161.
- Zobtenberg** 3. 7. 13. 22. 50. 50.
 54. 57. 59. 70. 72. 92. 96. 109.
 122. 132. 132. 134. 149. 151.
 158. 161. 161. 162. 169. 172.
 176. 181. 182. 198. 204. 210.
 213. 230. 234. 236. 240. 248.
 266. 271. 284. 295. 298. 307.
 308. 318. 360. 362. 372. 374.
 389. 405. 426. 429. 430. 468.
 497. 498.
- Zöbelwiz** 140.
- Zor bei Teschen** 11. 356.
- Zossen bei Troppau** 18. 89. 151.
 240. 253. 255. 271. 348. 405.
 409. 421.
- Zottig bei Troppau** 60. 151. 253.
 306. 365. 386. 394. 400. 438.
- Zuckan** 495.
- Zuckmantel** 135. 148. 237. 314.
- Zweibrod** 258.
- Zweikretscham** 318.
- Zyrowa in O. S.** 452.

Index

der

lateinischen Familien- und Sippen-Namen

und der

deutschen Pflanzen-Namen.

Index

der lateinischen Familien- und Sippen-Namen.

	Seite		Seite		Seite
<i>Abies</i>	339	<i>Amarantaceae</i>	81	<i>Armoracia</i>	30
<i>Acer</i>	50	<i>Amarantus</i>	81	<i>Arnica</i>	226
<i>Acerineae</i>	49	<i>Amaryllideae</i>	370	<i>Aroideae</i>	353
<i>Achillea</i>	222	<i>Ambrosiaceae</i>	235	<i>Arrhenatherum</i>	417
<i>Aconitum</i>	18	<i>Amygdaleae</i>	146	<i>Artemisia</i>	221
<i>Acorus</i>	354	<i>Anacamptis</i>	361	<i>Arum</i>	353
<i>Actaea</i>	3	<i>Anagallis</i>	306	<i>Asarum</i>	320
<i>Adenophora</i>	243	<i>Anchusa</i>	264	<i>Asclepiadeae</i>	251
<i>Adenostylium</i>	211	<i>Andromeda</i>	246	<i>Asparagus</i>	371
<i>Adonis</i>	10	<i>Androsace</i>	307	<i>Asperugo</i>	263
<i>Adoxa</i>	115	<i>Anemone</i>	10	<i>Asperula</i>	183
<i>Adoxeae</i>	115	<i>Anethum</i>	108	<i>Aspidium</i>	501
<i>Aegopodium</i>	99	<i>Angelica</i>	106	<i>Asplenium</i>	500
<i>Aesculus</i>	49	<i>Antennaria</i>	220	<i>Aster</i>	214
<i>Aethusa</i>	102	<i>Anthemis</i>	223	<i>Astragalus</i>	158
<i>Agrimonia</i>	142	<i>Anthericum</i>	375	<i>Astrantia</i>	96
<i>Agropyrum</i>	435	<i>Anthoxanthum</i>	440	<i>Atriplex</i>	86
<i>Agrostemma</i>	68	<i>Anthriscus</i>	111	<i>Atropa</i>	266
<i>Agrostis</i>	414	<i>Anthyllis</i>	151	<i>Avena</i>	419
<i>Aira</i>	418	<i>Antirrhinum</i>	281	<i>Baldingera</i>	440
<i>Ajuga</i>	302	<i>Apera</i>	416	<i>Ballota</i>	300
<i>Alchemilla</i>	143	<i>Aphanes</i>	143	<i>Balsaminene</i>	50
<i>Alectorolophus</i>	276	<i>Apium</i>	98	<i>Barbarea</i>	33
<i>Alisma</i>	349	<i>Apocynaceae</i>	251	<i>Barkhausia</i>	200
<i>Alismaceae</i>	349	<i>Aquilegia</i>	17	<i>Bartschia</i>	277
<i>Alliaria</i>	39	<i>Arabis</i>	34	<i>Batrachium</i>	8
<i>Allium</i>	377	<i>Araliaceae</i>	115	<i>Beckmannia</i>	413
<i>Allosorus</i>	497	<i>Archangelica</i>	106	<i>Bellis</i>	214
<i>Alnus</i>	328	<i>Arctostaphylos</i>	245	<i>Berberideae</i>	2
<i>Alopecurus</i>	412	<i>Arenaria</i>	69	<i>Berberis</i>	2
<i>Alsine</i>	69	<i>Aristolochia</i>	320	<i>Berula</i>	100
<i>Alsineae</i>	69	<i>Aristolochieae</i>	320	<i>Beta</i>	86
<i>Alyssum</i>	31	<i>Armeria</i>	310		

	Seite		Seite		Seite
Betonica	299	Chaerophyllum	112	<i>Cucurbitaceae</i>	176
Betula	326	Chaeturus	300	<i>Cupuliferae</i>	323
<i>Betuleae</i>	216	Chamaepitys	302	Cuscuta	257
Bidens	216	Chelidonium	25	Cynanchum	251
Biscutiella	27	<i>Chenopodiaceae</i>	82	Cynoglossum	268
Blechnum	499	Chenopodium	82	Cynosurus	434
Blitum	85	Chondrilla	197	<i>Cyperaceae</i>	389
Blismus	395	Chrysanthemum	224	Cyperus	390
<i>Boragineae</i>	258	Chrysocoma	213	Cyripedium	367
Borago	263	Chrysoplenium	94	Cystopteris	504
Botrychium	507	Cichorium	192	Cytisus	149
Brachypodium	433	Cicuta	97		
Brassica	40	Cineraria	226	Dactylis	427
Briza	424	Circaea	123	Daphne	318
Bromus	431	Cirsium	230	Datura	261
Bryonia	176	<i>Cistineae</i>	41	Daucus	110
Bupleurum	101	Clematis	446	Delphinium	18
<i>Bulmeae</i>	350	Clinopodium	294	Dentaria	37
Batomus	350	Cnidium	104	Dianthus	62
		Coeloglossum	361	Dichostylis	391
Calamagrostis	416	<i>Colehicaceae</i>	381	Dictamnus	49
Calamintha	293	Colchicum	382	Digitalis	284
Calla	354	Comarum	140	Digitalia	438
Callitriche	118	<i>Compositae</i>	91	<i>Dipsaceae</i>	187
Calluna	246	<i>Coniferae</i>	337	Dipsacus	188
Caltha	15	Conioselinum	105	Doronicum	225
Camelina	29	Conium	114	Drosera	47
Campanula	240	Conringia	40	<i>Droseraceae</i>	47
<i>Campanulaceae</i>	239	Convallaria	372	<i>Dryadeae</i>	130
<i>Cannabinae</i>	320	<i>Convolvulaceae</i>	256		
Cannabis	321	Convolvulus	256	Echinochloa	438
<i>Caprifoliaceae</i>	178	Conyza	218	Echinosperrnum	262
Capsella	28	Corallorrhiza	356	Echium	259
Cardamine	35	Coriandrum	114	Elatine	51
Carduus	234	Cornus	116	<i>Elatineae</i>	51
Carex	397	Coronilla	160	Elichrysium	221
Carlina	235	Coronopus	28	Elymus	435
Carpinus	324	Corrigiola	78	<i>Empetreae</i>	168
Carum	99	Corydalis	22	Empetrum	168
Caucalis	111	Corylus	324	Epilobium	120
Caulinia	344	Corynephorus	418	Epipactis	365
<i>Celastraeae</i>	172	Cotoneaster	126	Epipogium	366
Centanrea	236	<i>Crassulaceae</i>	88	<i>Equisetaceae</i>	493
Centunculus	306	Crataegus	125	Equisetum	494
Cephalanthera	365	Crepis	200	Erica	246
Cerastium	73	Crocus	367	<i>Ericineae</i>	244
<i>Ceratophylleae</i>	342	<i>Cruciferae</i>	25	Erigeron	215
Ceratophyllum	342	<i>Cryptogamae</i>	493	Eriophorum	396
Cerinthae	258	Cucubalus	67	Erodium	62

	Seite		Seite		Seite
<i>Erophila</i>	31	<i>Halorrhageae</i>	116	<i>Koeleria</i>	421
<i>Eryngium</i>	97	<i>Hedera</i>	116	<i>Labintae</i>	288
<i>Erysimum</i>	39	<i>Hedysarum</i>	159	<i>Lactuca</i>	198
<i>Erythraea</i>	256	<i>Heleocharis</i>	393	<i>Lamium</i>	295
<i>Eucnymus</i>	172	<i>Helianthemum</i>	41	<i>Lappa</i>	235
<i>Eupatorium</i>	11	<i>Helianthus</i>	216	<i>Lapsana</i>	192
<i>Euphorbia</i>	68	<i>Helleborus</i>	16	<i>Laserpitium</i>	109
<i>Euphorbiaceae</i>	168	<i>Hepatica</i>	13	<i>Lathraea</i>	281
<i>Euphrasia</i>	278	<i>Heracleum</i>	108	<i>Lathyrus</i>	164
		<i>Herminium</i>	363	<i>Lavatera</i>	56
<i>Faba</i>	160	<i>Herniaria</i>	79	<i>Ledum</i>	247
<i>Fagus</i>	326	<i>Hesperis</i>	38	<i>Leersia</i>	414
<i>Falcaria</i>	98	<i>Hieracium</i>	203. 459	<i>Lemna</i>	344
<i>Farselia</i>	31	<i>Hierochloa</i>	441	<i>Lemneae</i>	343
<i>Festuca</i>	428	<i>Hippocastaneae</i>	49	<i>Lens</i>	164
<i>Ficaria</i>	9	<i>Hippuris</i>	118	<i>Lentibulariae</i>	304
<i>Filago</i>	218	<i>Holcus</i>	417	<i>Leontodon</i>	193
<i>Filices</i>	493. 496	<i>Holoschoenus</i>	391	<i>Leonurus</i>	300
<i>Foeniculum</i>	103	<i>Holostenm</i>	74	<i>Lepidium</i>	27
<i>Fragaria</i>	135	<i>Homogyne</i>	212	<i>Lepidogonm</i>	78
<i>Fraxinus</i>	250	<i>Hordeum</i>	436	<i>Leucoium</i>	370
<i>Fumaria</i>	23	<i>Hottonia</i>	309	<i>Levisticum</i>	105
<i>Fumariaceae</i>	22	<i>Humulus</i>	321	<i>Ligustrum</i>	250
		<i>Hydrocharideae</i>	343	<i>Liliaceae</i>	373
<i>Gagea</i>	375	<i>Hydrocharis</i>	349	<i>Lilium</i>	374
<i>Galanthus</i>	370	<i>Hydrocotyle</i>	95	<i>Limnanthemum</i>	253
<i>Galega</i>	151	<i>Hydropterides</i>	493. 510	<i>Limnochloa</i>	394
<i>Galeobdolon</i>	296	<i>Hyocyanus</i>	268	<i>Limosella</i>	269
<i>Galeopsis</i>	296	<i>Hypericineae</i>	52	<i>Linaria</i>	282
<i>Galium</i>	180	<i>Hypericum</i>	52	<i>Lindernia</i>	283
<i>Genista</i>	149	<i>Hypochoeris</i>	196	<i>Lineae</i>	57
<i>Gentiana</i>	253	<i>Jasione</i>	229	<i>Linnaea</i>	179
<i>Gentianeae</i>	252	<i>Illecebrum</i>	79	<i>Linum</i>	57
<i>Geraniaceae</i>	58	<i>Impatiens</i>	51	<i>Listera</i>	363
<i>Geranium</i>	58	<i>Imperatoria</i>	108	<i>Lithospermum</i>	259
<i>Geum</i>	141	<i>Intybus</i>	203. 458	<i>Lolium</i>	436
<i>Gladiolus</i>	368	<i>Inula</i>	217	<i>Lonicera</i>	178
<i>Glaux</i>	309	<i>Irideae</i>	367	<i>Loranthaeae</i>	173
<i>Glechoma</i>	295	<i>Iris</i>	369	<i>Lotus</i>	157
<i>Glycyrria</i>	423	<i>Isatis</i>	28	<i>Lunaria</i>	32
<i>Graphalium</i>	219	<i>Isoplepis</i>	392	<i>Luzula</i>	388
<i>Goodyera</i>	364	<i>Isopyrum</i>	16	<i>Lychnis</i>	68
<i>Gramineae</i>	410	<i>Juncagineae</i>	351	<i>Lycopodinae</i>	493. 506
<i>Gratiola</i>	284	<i>Junceae</i>	383	<i>Lycopodium</i>	508
<i>Glossulariaceae</i>	174	<i>Juncus</i>	383	<i>Lycopus</i>	291
<i>Gymnadenia</i>	361	<i>Juniperus</i>	340	<i>Lysimachia</i>	306
<i>Gypsophila</i>	65			<i>Lythraeae</i>	118
		<i>Knautia</i>	189	<i>Lythrum</i>	119
<i>Hacquetia</i>	96				

	Seite		Seite		Seite
Malachium	72	<i>Ophioglosseae</i>	496. 506	Polygala	81
Malaxis	355	Ophioglossum	506	<i>Polygaleae</i>	81
Malva	55	Oporina	193	Polygonatum	378
<i>Malvaceae</i>	54	<i>Orchideae</i>	354	<i>Polygonaceae</i>	318
Marrubium	300	Orchis	357	Polygonum	315
Matricaria	284	Origanum	292	<i>Polypodiaceae</i>	496. 497
Medicago	152	Ornithogalum	375	Polypodium	497
Melampyrum	275	Ornithopus	160	<i>Pomaceae</i>	125
Melica	422	Orobanchae	279	Populus	336
Melilotus	153	Osmunda	506	Portulaca	79
Melittis	295	<i>Osmundaceae</i>	496. 506	<i>Portulacaceae</i>	79
Mentha	289	<i>Oxalideae</i>	56	Potamogeton	345
Menyanthes	252	Oxalis	56	<i>Potamogetoneae</i>	345
Mercurialis	172			Potentilla	136
Meum	104	Paeonia	3	Poterium	144
Milium	439	<i>Peoniaceae</i>	3	Prenanthes	198
Moenchia	72	Panicum	439	Primula	300
Molinia	423	Papaver	24	<i>Primulaceae</i>	305
Monotropa	249	<i>Papaveraceae</i>	24	<i>Protophyta</i>	493
Montia	80	<i>Papilionaceae</i>	147	Prunella	301
Muscari	381	Parietaria	322	Prunus	146
Myosotis	260	Paris	373	Pteris	498
Myosurus	10	Parnassia	48	Pulicaria	218
Myricaria	124	<i>Paronychiaceae</i>	76	Pulmonaria	259
Myriophyllum	117	Passerina	318	Pyrola	247
Myrrhis	113	Pastinaca	108	Pyrus	126
		Pedicularis	274		
<i>Najadeae</i>	344	Peplis	119	Quercus	325
Narcissus	370	Petasites	212		
Nardus	437	Petroselinum	98	Radiola	58
Nasturtium	32	Pencedanum	107	<i>Ranunculaceae</i>	4
Neottia	363	Phalaris	440	Ranunculus	4
Nepeta	294	Phaseolus	166	Raphanus	29
Neslia	29	Phleum	413	Reseda	20
Nicotiana	267	Phoenicopus	198	<i>Resedaceae</i>	20
Nigella	17	Phragmites	423	<i>Rhamneae</i>	167
Nonnia	264	Phyteuma	240	<i>Rhizocarphae</i>	493
Nymphaea	341	Picris	194	Rhodiola	88
<i>Nymphaeaceae</i>	341	Pimpinella	99	Rhynchospora	395
		Pinguicula	304	Ribes	174
Odontites	278	Pinus	338	Rosa	128
Oenanthe	102	<i>Plantagineae</i>	310	<i>Rosaceae</i>	127
Oenothera	123	Plantago	311	<i>Rubia</i>	185
<i>Oleinae</i>	250	Platanthera	362	<i>Rubiaceae</i>	180
Omphalodes	263	Plourospermum	114	Rubus	130
<i>Onagrarias</i>	120	<i>Plumbagineae</i>	310	Rumex	312
Onobrychis	159	Poa	424	Ruta	48
Ononis	150	Polycarpum	78	<i>Rutaceae</i>	48
Onopordon	235	Polycnemum	82		

	Seite		Seite		Seite
<i>Sagina</i>	75	<i>Solanaceae</i>	265	<i>Trapa</i>	117
<i>Sagittaria</i>	350	<i>Solanum</i>	265	<i>Trientalis</i>	305
<i>Salicinae</i>	328	<i>Soldanella</i>	309	<i>Trifolium</i>	153
<i>Salix</i>	328, 474	<i>Solidago</i>	215	<i>Triglochin</i>	351
<i>Salvia</i>	298	<i>Sonchus</i>	199	<i>Triodon</i>	421
<i>Salvinia</i>	510	<i>Sorbus</i>	127	<i>Triticum</i>	434
<i>Salviniaaceae</i>	510	<i>Sparganium</i>	352	<i>Trollius</i>	15
<i>Sambucus</i>	177	<i>Spergula</i>	77	<i>Tulipa</i>	374
<i>Sanguisorba</i>	144	<i>Spinacia</i>	86	<i>Turritis</i>	34
<i>Sanguisorbeae</i>	143	<i>Spiraea</i>	145	<i>Tussilago</i>	213
<i>Sanicula</i>	96	<i>Spiraeaceae</i>	145	<i>Typha</i>	352
<i>Santaleae</i>	319	<i>Spiranthes</i>	364	<i>Typhaceae</i>	352
<i>Saponaria</i>	64	<i>Stachys</i>	298	<i>Ulmaceae</i>	322
<i>Sarothamnum</i>	148	<i>Staphylea</i>	173	<i>Ulmus</i>	323
<i>Saxifraga</i>	92	<i>Staphyleaceae</i>	173	<i>Umbelliferae</i>	94
<i>Saxifrageae</i>	91	<i>Stellaria</i>	70	<i>Urtica</i>	322
<i>Scabiosa</i>	190	<i>Stratiotes</i>	348	<i>Urticeae</i>	321
<i>Schenchzeria</i>	351	<i>Streptopus</i>	371	<i>Utricularia</i>	304
<i>Scilla</i>	377	<i>Struthiopteris</i>	499	<i>Vaccaria</i>	64
<i>Scirpus</i>	398	<i>Sturmia</i>	356	<i>Vaccinium</i>	244
<i>Scleranthaeae</i>	80	<i>Succisa</i>	190	<i>Valeriana</i>	185
<i>Scleranthus</i>	81	<i>Sweetia</i>	253	<i>Valerianeae</i>	185
<i>Scelopendrium</i>	507	<i>Symphytum</i>	264	<i>Valerianella</i>	187
<i>Scopolina</i>	268	<i>Syringa</i>	250	<i>Veratrum</i>	382
<i>Scorzonera</i>	195	<i>Tamariscineae</i>	124	<i>Verbascum</i>	286
<i>Serophularia</i>	285	<i>Tanacetum</i>	222	<i>Verbena</i>	304
<i>Scrophularinae</i>	268	<i>Taraxacum</i>	197	<i>Verbeneae</i>	303
<i>Scutellaria</i>	301	<i>Taxus</i>	340	<i>Veronica</i>	269
<i>Secale</i>	435	<i>Teesdalia</i>	26	<i>Viburneae</i>	177
<i>Sedum</i>	88	<i>Tetragonolobus</i>	158	<i>Viburnum</i>	177
<i>Selinum</i>	106	<i>Teucrium</i>	303	<i>Vicia</i>	161
<i>Senecio</i>	227	<i>Thalictrum</i>	13	<i>Vinca</i>	251
<i>Serratula</i>	226	<i>Thesium</i>	319	<i>Viola</i>	42
<i>Seseli</i>	103	<i>Thlaspi</i>	26	<i>Violeae</i>	42
<i>Setaria</i>	438	<i>Thymeleae</i>	318	<i>Viscaria</i>	67
<i>Sherardia</i>	184	<i>Thymus</i>	293	<i>Viscum</i>	173
<i>Silaus</i>	104	<i>Thysselinum</i>	107	<i>Woodsia</i>	505
<i>Silene</i>	65	<i>Tilia</i>	54	<i>Xanthium</i>	239
<i>Sileneae</i>	62	<i>Tiliaceae</i>	53	<i>Zea</i>	412
<i>Sinapis</i>	41	<i>Tofieldia</i>	383		
<i>Sisymbrium</i>	38	<i>Torilis</i>	111		
<i>Sium</i>	100	<i>Tozzia</i>	275		
<i>Smilaceae</i>	371	<i>Tragopogon</i>	194		
<i>Smilacina</i>	373				

Blattweiser

der deutschen Pflanzen-Namen.

Bekanntlich sind die deutschen, im Munde des Volkes gangbaren Pflanzenbenennungen theils Art- theils Sippen-Namen, woraus sich die Unmöglichkeit ergibt, die deutschen Benennungen den lateinischen systematischen Namen entsprechend gegenüberzustellen. Der Versuch, den Willdenow damit gemacht, ist, wie er es musste, verunglückt; neuerlich hat E. Meyer nachgewiesen, in wie weit und nach welchen Grundsätzen deutsche Sippenamen festzustellen seien. In gleicher Ansicht sind in der Flora den lateinischen Sippenamen die passendsten deutschen, zum grossen Theile nach Meyers Vorgang, beigelegt worden; ausserdem auch den Arten die im Munde des Volkes wirklich vorhandenen und allgemein gebräuchlichen; solche Arten die das Volk nicht zu unterscheiden pflegt, konnten daher auch keine besonderen Namen erhalten. Auf jene wird in dem hier folgenden Register verwiesen. Ausserdem werden hier noch einige Benennungen nachgetragen, denen der lateinische Name und die Blattseite beigelegt ist, so wie einige andere, gleichfalls gebräuchliche, bei welchen als Synonymen auf einen anderen, im Buche selbst gegebenen Namen verwiesen wird: so dass dies Register dazu dienen mag, über die bekanntesten und allgemein üblichen deutschen Pflanzennamen die nöthigste Auskunft zu verschaffen.

	Seite		Seite		Seite
Abtiss	190	Alant	217	Ampfer	312
Ackelei	17	Alber s. Silberpappel		Andorn, weisser	300
Ackerandorn s. Kornwuth		Allermannsharnisch langer	377	— rother, <i>Stach.</i>	
Ackergille	223	runder s. Siegwurz		— germ.	298.
Ackersenf	41	Alpenglückchen	309	— schwarzer,	
Ackerzwiebel, <i>Gagea</i>	375	Alpkraut s. Kunigundenkraut		<i>Dall nigra</i>	300.
Adermonig	142	Alraun, All. Victor,	377	Anemone	10
Adonis	10	Alsine	69	Anis	100
Ahikirsche	147	Amarant	81	Apfel, <i>Pyrus Malus</i>	126
Ahorn	50			Aram	358
				Aschenpflanze	226

	Seite		Seite		Seite
Aspe s. Espe		Besinge s. Blauß Bee-		Bocksbeere s. Rahm-	
Aster	214	ren.		beere.	
Attich	178	Betonie	299	Bohne	160
Augentrost	278	Bettfuss s. Wirbeldost		Boretisch	263
		Bettlerläuse s. Spitz-		Borstengras	437
		klette.		Brakdistel s. Laufdis-	
Bachbunge	270	Bettlerläuse, <i>Gal Apar.</i>	181	tel.	
Bachweide	331	Biberklee	252	Bramen s. Pflimem.	
Bärenklau	109	Bibernelle	99	Braunelle	301
Bärenlauch	378	welsche <i>Sanguis</i>	154	Braunhell s. Braunelle.	
Bärenschote	158	Bienenhütel, <i>Lam. mac.</i>	296	Braunwurz	285
Bärentraube	245	Bienenkraut	295	Bruchbohne	166
Bärenwurz	104	Bienensaug, <i>Stach. saliv.</i>	298	Brenndolde	104
Bariapp	508	Bienensaug s. Bienen-		Brennessel	322
Bärwinkel s. Stigrün		hütel		Bremen, <i>Rub. frut.</i>	131
Baldreis	227	Bilsenkraut	268	Brillenschote	27
Baldrian	185	Bingelkraut	172	Brombeeren, <i>Drya-</i>	
Balsamine, gelbe	51	Binse	322	<i>deae.</i>	130
Bandgras	440	Binsen, <i>Juncaceae</i>	323	Brombeere	120—135
Bandweide	332	Birke	326	Bruchkraut	79. 88
Barbarakraut	33	Birkhahnenfuss	7	Bruchkrauts. Fetthenne.	
Barkhausie	200	Birne	126	Bruchweide	329
Bartsch	109	Birnbäumchenkraut	248	Bruchwicken, <i>Lath.</i>	
Bartschie	277	Bisamdistel	234	<i>pal.</i>	165
Bathengel	270	Bisamkraut	115	Brunnenkresse	32
Battanie s. Betonie		Bitterklee	252	— schlesische	37
Bauernsenf	26	Bitterig	194	Brunstwurz	106
Bauernschminke	259	Bittersüss	266	Buchampfer s. Saen-	
Becherblume	144	Blaubeeren	244	klee.	
Becherfrüchtige,		Blasensegge, <i>Car. ve-</i>		Buche	324. 326
<i>Cupuliferae</i>	323	<i>sic.</i>	409	Buchlätting	209
Beifuss	221	Blumengras s. Nelken-		Buchweizen	317
Beinwell	264	gras.		Buchwinde, <i>Pol. Con.</i>	317
Belladonna	266	Blumengras s. Grasnel-		Büschelglocken	243
Benedictenwurz	141	ken.		Bulerkraut, <i>Lath. silv.</i>	
Berberitze	2	Blumensrohr s. Schaaf-		Butterblümchen	5
Berghählein	12	hen.		Butterblume	197
Bergholder s. Trauben-		Blutauge	140	Buttergeel, <i>Thal. flav.</i>	14.
holunder		Bluthirse s. Finger-		Butterstiel, <i>Galium</i>	182
Bergklee	154	gras.		Calms	354
Berglätlich	198	Blutkraut	60	Christbeere	174
Bergpetersilie	107	Blutkraut, <i>Lythr. Sal.</i>	119	Christinenkraut	218
Bergquitten	126	Blutkraut o. "Wiesen-		Christophawurzel	3
Berle	100	knopf.		Christusdorn	129
Bertram, <i>Ach. Ptarm.</i>	222	Blutrösel, <i>Geran. sang.</i>	60	Christwurz s. schwarze,	
Berufkraut, <i>St. ann.</i>	299	Blutwurz s. Ruprechts-		Niesowurz	
Berufkraut s. Wund-		kraut.		Cichorien	193
klee		Bockebart	194	Coaringie	40
Besenkraut	39	Bocksbart s. Geisbart.			
Besenstrauch	148				

	Seite		Seite		Seite
Coriander	114	Ehrenpreis	269—74	Ewig s. Ephen	
Cornelle	116	Eibe	340	Färbergille	223
Cypergras	390	Eiche	325	Färberginster	149
Dachwurz	90	Eidernessel, <i>Urt. ur.</i>	322	Färberkraut s. Färber- ginster.	
Darmkraut, <i>Vic. pisi.</i>	161	Einbeere	373	Färberröthe	185
Darrgras, <i>Holc. lan.</i>	417	Einblatt	373	Färberscharte	236
Daun	296	Eisenhut	18	Färberwaid	28
Deckrohr s. Rohr.		— gelber	20	Falkraut s. Wohlver- leih.	
Dill	108	Eisenkraut	304	Farsetie	31
Diptam	49	Eisenwurz	238	Fasolen	166
Distel	234	Elen s. Ahlkirsche		Faulbaum	167
Disteln, <i>Cynareae</i>	230	Elisabethblümchen	42	Faule Grete s. Gleis	
Dolden, <i>Umbelliferae</i>	94	Eller s. Erle		Faule Mäde	396
Doltokke	16	Elsenbeeren s. Ahl- kirsche		Federalke	64
Donnerdistel s. Lauf- distel.		Elsterbaum s. Erle.		Feldahorn	50
Donnerfluchs. Hohlwurz		Engelsüss	497	Feldkosten s. Dost	
Donnergrün, <i>Sed. rub.</i>	90	Engelwurz	106	Feldkresse	27
Donnernelke	62	Entengrün	344	Feldraute	23
Dorant	282	Enzian	253—55	Fellrisswurzel s. Sieg- marskraut.	
— weisser	282	Epheu	116	Femel	321
Dorant s. Katzenmünze		Eppig s. Ephen.		Fenchel	103
Dorant weisser s. w. Andorn.		Erdäpfel	216	Fennich	438
Dost	292	Erdathengel, <i>Ver. la- tif.</i>	271	Ferkelkraut	196
Dosten	211	Erdbeere	135	Fettgewächse, <i>Cras- sulaceae</i>	77
Dotterblume	15	Erdberklee	155	Fethenne	88
Dotterblume s. Troll- blume		Erdbeerspinat	85	Fetikraut	304
Drachenwurz s. Otter- wurz,		Erdeicheln s. Haarstrang		Feuerrüsel s. Adonis.	
Dratschmelen, <i>Av. flex.</i>	420	Erdeicheln s. Erdmandeln		Fichte	340
Dreidistel, <i>Carl. vulg.</i>	236	Erdephew s. Gundelrebe		Fichtenspargel	249
Dreiockerwurz, <i>Dent. bulb.</i>	38	Erdgalle s. Tausendgul- denkraut.		Fieberklee	252
Dreizack	351	Erdgerste s. Scharbock.		Fieberkraut, schwe- disch	301
Dreizahn	421	Erdmandeln	164	Fieberweide s. Bruch- weide.	
Drüswurz	102	Erdnüsse	164	Fingerhut	294
Dürre Henne s. Berg- lattich.		Erdrauch	23	Fingergas	438
Dürrwurz	215	Erdweich, <i>Vaccaria</i>	64	Finkensamen	29
— grosse	218	Erdwinde	282	Flachs	57
Durchwachs	101	Erle	328	Flachseide	257
Eberesche	127	Ervenstrang s. Sommer- wurz		Fladerbaum	50
Eberwurz	235	Esche	250	Flattergras	439
Edeltanne	389	Eselskerbel	112	Fleischblume s. Rind- fleisch.	
Egelkraut	307	Eselsmilch, <i>Euph. Es</i>	170	Flieder	177. 250
		Eselsöhren, <i>Lath. latif.</i>	165		
		Esparsseite	159		
		Espe	337		
		Essigdorn	2		

	Seite		Seite		Seite
Flöhkrant	218	Gelassfuss s. Mädesüß.		Graustilge	105
Flöhkrant, <i>Pol. Pers.</i>	316	Geißlee	149	Grindwurz	313
Flockenblume	236	Geisrante	151	Grindwurz, <i>Sen. vulg.</i>	227
Flügelarn	498	Gelblüchel. <i>Dig. grand.</i>	289	Groschenkraut, <i>Homo-</i>	
Flughafer, <i>Av. fatua.</i>	419	Gemswurz	225	gyne	212
Föhre	228	Gerhardskraut	99	Grundelcheln s. Erdnüsse.	
Frauentistel s. Krebs-		Germer	202	Grundfeste	200
distel.		Gerste	436	Grundheil, <i>Veron. off.</i>	270
Frauenhaar	501	Gesselblume s. Scher-		Guckuck, blauer,	302
Frauenflachs	282	bock		rother	280
Frauenflachs, <i>Lin. vulg.</i>	283	Gichtbeere	174	Guckucksblume	260
Frauenkrieg	259	Gichtrübe	176	Günsel	302
Frauenmantel s. Sinau.		Giersch	99	Gundelröbe	294
Frauensschuh	267	Giftbahnenfuss	8	Gundermann, <i>Glechoma</i>	294
Freyssamkraut s. Schup-		Giftlattich	199	— kleiner, <i>Ver.</i>	
penwurz.		Gille	223	hedertf.	274
Freyssamkraut s. Stief-		Ginster	149	Guter Heinrich	85
mütterchen.		Glanzgras	440		
Froschbiss	249	Glaskraut	222	Haargras	435
Froschoppig s. Frosch-		Gleisse	102	Haarkraut	8
peterlein.		Gleisblume s. Giftbah-		Haarstrang	107. 146
Froschoppig s. Giftbah-		nenfuss.		Nabordistel s. Futter-	
Froschlöffel	249	Gliedweich s. Wolk-		distel.	
Froschlöffel s. Sumpf-		schoten.		Nabermankeln	195
löffel.		Gliedweich s. Wider-		Nackenschär	85
Froschpeterlein	101	stoss.		Nebichtskräut	203
Fuchschwanz	412	Glitscher s. Klapper.		Nägerweide, <i>Sal.</i>	
Fünffingerkraut	136	Glockenblume	17. 240	amygd.	220
Futterdistel	233	Goldhaar	212	Händleinwurz, <i>Orck.</i>	
Futtertrops	432	Goldhähnlein s. gelbe		latif.	360
		Osterblume.		Hafer	419
		Goldnessel	296	Haferkirsche s. Vogel-	
Gänseblümchen	213	Goldregen	150	kirsche.	
Gänsedistel	199	Goldruthe	214	Haferwurzel	194
Gänsefuss	82	Goldstern	275	Haftdolde	111
Gänsekraut	39	Goldwurz s. Türken-		Hagebutte	128
Gänsekresse	34	bund.		Hagedorn s. Weissdorn.	
Gänserich	127	Goodyere	264	Hahnenfuss	4
Galgantgras <i>Car. vulp.</i>	399	Gottesgnade	284	Hahnenfussartige,	
Gamander	303	Gottesvergeß	300	<i>Ranunculaceae</i>	4
Gamanderlein	270	Grabkraut	221	Haide	246
Garaffelwurz. <i>Cusm. riv.</i>	141	Gräse	246	Haidekraut	246
Garbe	222	Gränse	247	Haidekräuter, <i>Eri-</i>	
Gartengleisse	102	Gräser, <i>Gramineae</i>	410	cineae	244
Gartenkerbel	112	Granhich	428	Haidenrettich	29
Gartenkresse	27	Graallilie	275	Hainbuche	324
Gartennelke	63	Graanelken	71. 310	Hanbutte	128
Gauchheil	263	Grauerle	328	Hanf	221
Geissbart	145	Grausen s. Pfiemen,		Hanfnessel	297

	Seite		Seite		Seite
Hartheu	52	Holunder	177	Johanniskraut	51
Hartriegel	116. 52	— türkischer	250	Judenkirschen	116
Hartstrauch, <i>Corn.</i>		Holzbirne s. Birne.			
<i>sang.</i>	116	Holzapfel s. Apfel.		Kälberkrepf	112
Hasel	324	Honiggras	417	Käsepappel	55
Haselwurz	320	Honigklee	156	Kätzekraut	155
Hasenbrodt, <i>Brixamed.</i>	424	Honigwieken, <i>Lath.</i>		Kalbauge s. Johannis-	
Hasenbrodt, <i>Luz. camp.</i>	389	<i>prat.</i>	165	blume.	
Hasenklee s. Sauerklee.		Hopfen	321	Kalinkebeeren	177
Hasenklee s. Wundklee.		Hopfenklee	152	Kalmus	354
Hasenklee s. Katzen-		Hopfenklee, <i>Trif. agrar.</i>	156	— falscher, <i>Iris</i>	
krant.		Hopfenseide s. Flachs-		<i>Pseudac.</i>	
Hasenkohl	192	seide.		Kamille	224
Hasenöhrchen	101	Hornblatt	242	Kammgras	434
Hasenohren	242	Hornklee	157	Kanarienhirse	440
Hauhechel	150	Hornkraut	73	Kannekraut	494
Hauslauch	90	Hottonie	309	Karbe	99
Heckenkirsche	179	Hühnerbiss	67	Karden	188
Hederich	29	Hühnerdarm, <i>Ver. Buxb.</i>	274	Kardenblumige,	
Heidelbeere	244	— gelber, <i>Lysim.</i>		<i>Dipsacae.</i>	187
Heidenwundkraut	215	<i>nem.</i>	307	Karnifellwurz, <i>Ge. mont.</i>	142
Heimkraut s. Schild-		Hühnerraute, <i>Ver. triph.</i>	273	Karthäusernelke	62
träger.		Hülse nfrüchtige,		Kartoffel	266
Heimwurz s. Hohlwurz.		<i>Papilionaceae</i>	147	Kassbeeren s. Vogel-	
Herrgottselöffel	48	Huflattig	212	kirsche.	
Herzblatt	48	Hundsbeerstrauch, <i>Corn.</i>		Kastanie	49
Herzgespann	300	<i>sang.</i>	116	Katzenkorn s. Mäuse-	
Hexenkraut	123	Hundsgras, <i>Dactylis</i>	427	gerste.	
Himbeere	133	Hundsmilch, <i>Euph.</i>		Katzenkraut	294
Himmelschlüssel	308	<i>Cyp.</i>	170	Katzenpfötchen	220
Himmelthau s. Finger-		Hundsribbe	311	Katzenwurz s. Baldrian.	
gras.		Hundssehdel <i>Lin. mta.</i>	283	Katzenzahl s. Tannwe-	
Hirschzunge	501	Hundsveilchen	44	del.	
Hirschmangold, <i>Pulm.</i>		Hundszunge	262	Katzenzahl	495
<i>off.</i>	259	Hungerblume	31	Keilkraut, <i>Sax. gran.</i>	92
Hirschpeterlein, <i>Peuc.</i>		— blane, <i>Ver.</i>		Kellerhals	318
<i>Cerv.</i>	107	<i>triph.</i>	273	Kerbel	111. 112. 113
Hirschwurz	107	Iasione	239	Keulenmohn	24
— weisse	109	Je länger je lieber	178	Kiefer	338
Hirschwurz, <i>Laserp.</i>		Igelkolben	352	Kiefernkelke	63
<i>prat.</i>	110	Igellock	242	Kienporst	247
Hirschzunge	215	Igelsame	222	Kirsche	147. 179
Hirse	439	Ihme s. Roster.		Klapper	276
Hirtentäschel	28	Immenblatt s. Bienen-		Klapperrosen	24
Höswurz	261	krant.		Klatschrosen	24
Hohlheide s. Gimster.		Immerschön	221	Klanenschete	160
Hohlwurz	22	Johannisbeere	174	Klebekraut	181
Hohlzahn s. Haafnes-		Johannisblume	224	Klebenelke	67
sel.					

Seite	Seite	Seite
Kleber, blauer, s. Scharf- kraut.	Kornwuth 297	Läusekraut 274
Klee 151. 152. 159. 153—57	Krähenebere 168	Laserkraut 109
Kleinling 306	Krähenfuss 28	Lattig 198. 309
Kletsch s. Klapper.	Krähenfuss, <i>Ran. rep.</i> 7	Lauch 377
Klette 225	Krakbeere s. Bausch- beere.	Laufdistel 97
Klettenkorb 111	Kranichbeere s. Mees- beere.	Lavatero 56
Klimmop s. Ephed.	Kranichkraut s. Sand- wien.	Leberblume, blau — weisse s. Herablatt.
Knabenkraut 257	Kranichschnabel 58	Lechel 288
Knackweide 329	Krapp 185	Ledichtblume s. Schwarz- kümmel.
Knaul 81	Kratsbeere s. Rahm- beere.	Loerbaum s. Lierbaum.
Knaulgras 427	Kratzdistel 230	Leimkraut 65
Knautie 189	Krebsdistel 235	Lein 57
Kniehelf 329	Krebssechere 248	Zwerg-Lein 58
Knoblauch 378	Kresse 27. 28. 24. 26	Leindotter 29
Knörrich 81	Kreuzblume 21	Leinkraut, <i>Lis. vulg.</i> 285 — golden 212
Knörrich s. Spork.	Kreuzblumige, <i>Cruciferae</i> 25	Lerchentanze 340
Knöterich 315	Kreuzdorn 167	Lichtnelke 68
Knopfaelke 63	Kreuzennian 254	Liebstüchel 105
Knopfwurzel 228	Kreuzkraut 227	Lierbaum 240
Knorpelkraut 79. 82	Krieheln 146	Lieschgras s. Lische
Knorpelkraut, <i>Sed.</i> <i>sezang.</i> 90	Krütenbinde 287	Lieschkolben s. Rohr- kolben.
Knorpelkrauter, <i>Paronychiace</i> 76	Kronenwicke 160	Lilie 374
Knotenblume 270	Kropfwurz 285	Liliengewächse, <i>Liliaceae</i> 274
Knotengras, <i>Poa. triv.</i> 426	Kuckucksblume 302. 360. 362	Linde 54
Knotenwurz s. Braun- wurz	Küchenschelle 11	Lindernie 283
Koelerie 421	— schwarze 12	Linnaea 179
Königsfarn 506	Kümmel 99	Linse 164
Königskerze, <i>Verb. tha-</i> <i>psif.</i> 286	Kündel s. Quendel	Lippenblumige, <i>Labiatae</i> 286
Kohl 24. 40	Kugelranunkel 15	Lische 412
Kohlrübe 40	Kugelriet 391	Löthe, <i>Lol. peren.</i> 426
Kolbenrohr 252	Kuhachelle 11	Löwenfuss s. Sinau
Koradakraut	Kuhschmirgel s. Sumpf- schmirgel.	Löwenfuss 508
Kopfbäumige, <i>Com-</i> <i>positae</i> 190	Kuhweizen <i>Hel. nem.</i> 276	Löwenmaul 281
Kopfsalat 198	Kunigundenkraut 211	Löwenzahn 193. 197
Koralenwurz 356	Labkraut 182	Loch 426
Korbweide 222	Lachenknoblauch 302	Lonitsero 178
Koriander 114	Lämmerehren s. Hacken- schaar.	Lorbeerweide 229
Kornblume 227	Lämmersalat s. Rapun- zel 187	Luich s. Loich.
Kornelle 116	Läuchel 29	Lungenblümel, <i>Genf.</i> <i>Pneum.</i> 254
Kornnelken s. Rathe		Lungenkraut, gelbes 209
Kornrathe 68		— blaues u. rothes 259

	Seite		Seite		Seite
Luzerne	152	Miere	71. 188	<i>naev. oder Caryo-</i>	
Lysimachie	306	Milchglöckel	241	<i>phyllaceae</i>	63
Nüdestüss	145	Milchkraut	309	Nelkengras	74
Mügdchülle	229	Milzkraut	94	Nelkenwurz	141
Märzveilchen	43	Mintc	289	Neslie	29
Mäusegerste	486	Minze	289	Nessel, taube	295
Mäuscholz s. Bitter-		Mispel, Zwerg-	126	Brennessel	322
süss.		Mistel	173	Neunkraft	312
Mäuseschwanz	10	Mistmelde s. Neun-		Neunspitzen	85
Magistrazz, <i>Imp. Ostr.</i>	108	spitzen.		Niesekraut s. Springsauf	
Maiblume	197	Münchie	72	Niesewurz	16
Maioran	292	Möncherhabarber	314	Nixblumen	349
Malve	55	Möre	110	Ochsenzunge	264
Mandelfrüchtige,		Mohn	24	Ochsenzunge, <i>Rum.</i>	
<i>Amygdaleae</i>	146	Mondraute	567	<i>crisp.</i>	314
Mangold	86	Mondviole	32	Odermenig	142
Manngras	423	Montie'	80	Oelsenich	107
Mannschid.	307	Moorkönig	274	Ohmkrant	143
Mannstreu	97	Moorsimae	295	Ohlkirache	147
Marbel	388	Moosebeere	245	Ohnblatt s. Fichten-	
Mariengras	441	Morgenstern	195	spargel.	
Marienrölein. <i>Lych.</i>		Mummel	342	Ohnblatt s. Schuppen-	
<i>vesp.</i>	68			wurz.	
Maskenblumige,		Nabelsamen s. Klebe-		Ohrlöffelinkraut, <i>Sil.</i>	
<i>Scrophularinae</i>	268	kraut.		<i>Otit.</i>	66
Massholder	177	Nachtkerze	123	Osterblume, weisse	13
Masslieben	213	Nachtschatten	265	— gelbe	13
Mastel	321	Nachtschatten, <i>Plat. bl.</i>		Osterluzei	320
Mastkraut	75	<i>fol.</i>	362	Ostritz	98
Mauerpfeffer	90	Nachtviole	38	Otterkopf s. Natter-	
Mauerraute	500	Nackte Jungfer	382	kopf.	
Mausohrlein	203	Nadelkraut s. Ohm-		Otterwurz	315
Maya	412	kraut.			
Meerrettig	80	Näglingras, <i>Cerast.</i>		Papstweide s. Ahlkir-	
Meerzwiebel	327	<i>arv.</i>	74	sche.	
Mehlbeeren	125	Nätsch	427	Palmweide s. Saalweide,	
Meier	71. 182	Nätsch, <i>Carex acuta</i>	408	Pappel	336
— rother, <i>Anag.</i>		Nagelkraut	78	Pastinak	103
<i>arv.</i>	306	Nagelkraut, <i>Hier. Pi-</i>		Pechnelke	67
Meisterwurz	96-108	<i>tos.</i>	202	Peltachen	160
Melde	82-83	Narcisse	370	Peperle, <i>Chaer. bulb.</i>	112
Meldenkräuter,		Natterblümchen	21	Perlgas	422
<i>Chenopodiaceae</i>	82	Natterkopf	259	Pestwurz	211. 212
Merk	100	Nattermilch	195	Petersilie	98. 107
Meyer	183	Natterzunge	506	Peterstab	215
Meyer s. Amarant.		Nelke	63. 67. 68. 71	Pfaffenhütchen	172
Michelblume s. Zeit-		Nelkengewächse,		Pfaffenohrlein	197
lose.		<i>Sileneae und Alsi-</i>		Pfaffenröschen	172

	Seite		Seite		Seite
Pfannnelke s. Feder- nelke.		Raute	48	Ruprechtskraut	61
Pfeunigkraut	207. 26	Raygras, engl., <i>Lol.</i> <i>per.</i>	436	Ruttich	316
Pfeunigsalat s. Schas- bock.		Rebendolde	102	Saalweide	333
Pfalkraut	350	Rechbeere, <i>Rib. alp.</i>	174	Safran	367
Pferdebinsen	392	Rechholder, <i>Samb. nig.</i>	177	Saftgrün, <i>Rh. cath.</i>	167
Pferdesamen	108	Rehkraut s. Pfriemen.		Sagine	75
Pflingstrose	3. 128	Reiherschnabel	62	Salat	198
Pflaume	147	Rosede	28	Salbei	291
Pflaumenelke s. Feder- nelke.		Rottich	29	Salbeiweide	333
Pflöggers s. Hauhe- chel.		Ribbenfarn	499	Salpkräuter, <i>Or-</i> <i>chideae</i>	354
Pfriemen	148	Riete, <i>Cyperaceae</i>	390	Salpewurz, <i>Ochis Mor.</i> etc.	358
Pfunde, <i>Veron. Anag.</i>	270	Rietgras	397	Salomonsiegel s. wurz.	
Pipaa	201	Riemerey	224	Samenkresse	28
Platterboe	104	Risch	205	Samkraut	345
Plumpen s. Mummel.		Rispengras	424	Sandbeere s. Bären- traube.	
Polei, <i>Mentha Puleg.</i>	290	Bittersporn	18	Sandkraut	70
Polirabschachtelhalm	404	Rodel s. Klapper.		Sandlauch <i>All. aren</i>	379
Pompelnuss	173	Rodel s. Läusekraut.		Sandmohn	24
Porrylauch	379	Rüthe	185	Sandnelke	64
Porst	247	Roggen	435	Sandveilchen	43
Postulak	79	Rohr	423	Sandwien	192
Potentille	136	Rohrglanz, <i>Baldingera</i>	440	Sanickel	96
Prenselbeere	245	Rosaceen, <i>Rosa-</i> <i>ecae</i>	127	Saubohne	61
Purgierbeeren s. Faul- baum.		Rose	128—30	Saubohnen s. Bilsen- kraut.	
Quecke	435	Rosenpappel	56	Saudistel	199
Quellgras, <i>Glyc. aquat.</i>	424	Rosenwurz	88	Sauerampfer	314
Quendel	293	Rosmarin, wilder	247	Sauerdorn	2
Quitschbeeren	127	Rossfenchel	102	Sauerkirsche	147
Quitten, Berg-	126	Rosskastanie	49	Sauerklee	56
Rade	68	Rosminze <i>Menth. sylv.</i>	290	Sauknoten s. Braun- wurz.	
Ragwurz	363	Rospappel	55	Saulöffel, <i>Pot. nat.</i>	345
Rahmbeere	133	Rospolei, <i>Stach. germ.</i>	298	Sautod s. Neunspitzen.	
Rainfarn	222	Roth-Buche	326	Schabenkraut	288
Rainweide	250	Roth-Erle	328	Schabenkraut s. Gränze.	
Ramisch	378	Rothlauskraut	61	Schachtelhalm	494
Ramselwurz	39	Rothtaane	340	Schachtelhalm	493
Rapontika	123	Ruchgras	449	Schafampfer, <i>R. aceto-</i> <i>sella</i>	315
Rapa	40	Rübe, weisse	40	Schafgarbe	223
Rapunzel	187. 240	— Kohl-	40	Schafhen	350
Rathe	68	Rübenkerbel	113	Schaflianen	160
Raukensenf	38	Rübs	40	Schafrapunzel	240
Rauschbeeren	244	Rüsche s. Rüster			
		Rüster	323		
		Ruhrbirne	127		
		Ruhrkraut	219		
		Ruhrwurz, <i>Pot. Torm</i>	198		
		Runkelrübe	86		

Seite		Seite		Seite	
Schafthalm s. Tannel.		Schnittlauch	380	Silberblatt	32
Schalotten	380	Schnöte, <i>Car. acuta</i>	403	Silberblatt s. Gänserich.	
Scharbock	9	Schopflyazinthe	381	Silbergras	418
Scharfkraut	263	Schotendotter	89	Silberkraut	133
Scharfkrauter, <i>Bo-</i>		Schotenklee s. Hornklee.		Silberpappel	336
<i>ragineae</i>	258	Schotenweiderich	120	Silge	105
Scharlei, -Wald, <i>Salv.</i>		Schuppenwurz	218	Simse	392
<i>prat.</i>	291	Schwaden	423	Sinau	143
Scharte	236	Schwalbenkraut s. Schell-		Singrün	251
Schaumkraut	35	kraut.		Skabiose	190
Schellenblume	243	Schwalbenwurz	251	Sohlweide	333
Schellkraut	25	Schwalbenwurz, <i>Gent.</i>		Sommerlock, <i>Pol.</i>	
Schellwurz	25	<i>asclep.</i>	254	<i>amph.</i>	315
Scherbenkraut s. Scharte.		Schwarzdorn s. Schle-		Sommerrübenreps	40
Scheuchzerie	351	hen.		Sommerwurz	279
Schierling	97	Schwarzkümmel	17	Sonnenhirse, <i>Lith. of.</i>	259
Schierling	114	Schwarzpappel	337	Sonnenröschen, s. Ed-	
Schildfarn	501	Schwarzwurz s. Bein-		sabetbl.	
Schildträger	301	welt.		Sonnenrose	16
Schildkraut	31	Schwarzwurz s. grüne		Sonnenthau	47
Schilf	416	Niesewurz.		Sonnenwedel s. Weg-	
Schimmelkraut	218	Schwarzwurz	3	warte.	
Schlammling	269	Schweinbrödt s. Erd-		Sonnenwirbel	197
Schlangenmord	195	nüsse,		Sonnenwirbel, <i>Euph.</i>	
Schlangenäugel	263	Schwertbohne	167	<i>Hel.</i>	169
Schlehen	146	Schwertel	369	Sophienkraut	9
Schlinge	177	Schwindelhafer, <i>Lol.</i>		Spargel	371
Schlüsselblume s. Him-		<i>tem.</i>	436	Spargelbohne	158
melsschlüssel.		Schwingel	428	Spatzensunge	318
Schmalzblume	15	Seekandel	341	Speerdistel, <i>Cirs. lanc.</i>	230
Schmeerwurz s. Som-		Seekanne	253	Speerkraut	5
merwurz.		Seekiefer	339	Sperk	77
Schmele, <i>Aira</i>	418	Seelilie, Seerose	341	Spinat	86
Schmiele, <i>Agrostis</i>	414	Segge	397	Spindelbaum	172
Schmiele, blaue, <i>Moli-</i>		Seide s. Flachseide.		Spinneakraut	226
<i>nia</i>	423	Seidelbast	318	Spinnenkraut s. Grass-	
Schminkbohne	166	Seifenkraut	64	lilie	
Schminkwurz s. Bau-		Sellerie	98	Spitzflader	50
ernschminke.		Senden, <i>Scirpus</i>	363	Spitzklee, <i>Trif. mont.</i>	155
Schmirgel, <i>Ran. auric.</i>	5	Senf	34. 38. 39. 41.	Spitzklette, <i>Xanthium</i>	239
Schmirgel	15	Sensfkohl	41	Spitzwegerich, s. Hunds-	
Schneckenklee	152	Sesel	103	ribbe.	
Schneeballen, wilde, s.		Sherardie	184	Springauf	372
Massholder.		Sichelmörs	98	Springkörner	172
Schneegallen s. Schnee-		Siebenstern	305	Springkraut	51
glöckchen	370	Sieglauch	377	Springkresse	36
Schneeglöckchen	370	Siegmarskraut	56	Spurra	74
Schneetropfen s. Schnee-		Siegwurz	368	Spurra, <i>Sperg. arv.</i>	77
glöckchen.		Silau	104	Stabwurz	222

	Seite		Seite		Seite
Stachelbeere	174	Tabak	287	Traubenholunder	178
Stechapfel	287	Täschelkraut	28	Trespe	431
Steinbeeren	135	Tännel	51	Tripmadam	90
Steinbrech	92	Tageluchte s. Augen- trost.		Trollblume	15
Steinklee	153	Tag und Nacht	276	Tropfwurz	102. 146
Steinkresse, s. Bauern- sees.		Tamariske, <i>Myricaria</i>	124	Trunkelbeeren s. Bausch- beeren	
Steinmelke	63	Tanne	339	Türkenbund	374
Steinpeterlein	90	Tannwedel	118	Tugendblumen s. Kaul- gundenkraut.	
Steinpflanze	247	Tarant, blauer	254	Tulpe	374
Steinquendel, <i>Cal. Acta.</i>	294	auch <i>Suaertia</i>	253	Twalch s. Trespe.	
Steinsame	250	Taubenfuss, <i>Ran. bulb.</i>	7	Ulme	323
Stendelwurz, <i>Orch.</i>		Taubenfuss, <i>Geran. col.</i>		Unholdenkraut <i>Epilo- bium</i>	120
<i>Morio</i>	358	und <i>pusill.</i>	60. 61	Urke	50
Stephanskraut, siehe Hexenkraut.		Taubenkopf	23	Urke s. Erie.	
Sternkräuter, <i>Ru- biaceas</i>	180	Taubenkropf, <i>Sil. tauf.</i>	66	Veilchen	42
Sternkraut	70. 71. 180	Taubhafer, <i>Av. fat.</i>	419	Vergissmeinnicht	280
Sternleberkraut, siehe Waldmeister.		Taubnessel	295	Vermekrankraut	319
Stiefmütterchen	46	Taumelkerbel	112	Viehgras, <i>Poa</i>	424
Stinkgille	224	Taumellolch, <i>Lol. tem.</i>	436	Vogelbeere s. Eberesche	
Stinkkresse	27	Taanel	51	Vogelkirsche	147
Sterchochpabel	58-62	Tausendblatt	117	Vogelkraut	70. 71
St. Peters-Blume, <i>Mel. arg.</i>	275	Tausendgudenkraut	256	Vogelmilch	174
St. Peterakraut s. <i>Abbas.</i>		Tausendkorn	79	Vogelmelir	71
St. Petersschlüssel s. Himmelschlüssel.		Tausendschön	21	— blauer, <i>Ver.</i>	
St. Peterstab	215	Teedalie	26	<i>Buxb.</i>	274
Stränze	96	Teichblumen s. Pferde- binsen.		Vogelmiere	71
Strandling	78	Teichfenchel	117	Vogelmilch	375
Strohsarn	490	Teichlilie, <i>Iris Pseudac.</i>	309	Vogelnest	363
Streifenfarn	509	Teichschilf s. Rohr.		Vogelnest s. Möre.	
Stranegras	414	Tennegras	317	Vogelwicke	162
Sturmhut	18	Teufelsabbiss s. Abbas.		Wachholder	340
Sturmie	356	Teufelsbart	12	Wachtelweizen	275
Seesoldat	113	Teufelskirsche, <i>Lon. Xyl.</i>	179	Wachsblume	258
Säsekirsche	147	Teufelskrallen	240	Waid	28
Säsklee	189	Thurmkraut, Thurmsees	34	Waisen	434
Sumpfbaldrian, <i>Val. dioe.</i>	186	Timotheusgras, s. Lische.		Waldbinsen, <i>Scirp. sylv.</i>	393
Sumpflöffel	354	Tobkraut s. Lolch.		Walddostan s. Dost.	
Sumpfpolei, <i>Stach. pal.</i>	208	Tofeldie	333	Waldglöckel	241
Sumpfschmirgel	15	Tolldocke	16	Walddhachen s. Oster- blume.	
Sumpfwurz	365	Tollkirsche	266	Waldirse s. Flatter- gras.	
Swertie	258	Tollkorn, <i>Lol. tem.</i>	136		
		Tollkräuter, <i>Sola- neae</i>	285		
		Torfbeere	136		
		Terfhaide	246		
		Teasie	275		
		Traubenfarn	306		

	Seite		Seite		Seite
Waldhirse, <i>Melamp. crist.</i>	275	Wassersäge	348	Wiesenklee	154
Waldhopfen, <i>Hyper. mont.</i>	53	Wassersalat s. Bachbunze.		Wiesenkнопf	44
Waldkohl	34	Wasserschierling	97	Wiesenkнопfel	89
Waldlattig	138	Wasserstein	118	Wiesenkohl	233
Waldmeier, gelber	307	Wassertulpe s. Sèerose.		Wiesenkresse, <i>Card. praef.</i>	37
Waldmeister	184	Wasserveil s. Hottonie.		Wiesenraute	13
Waldnessel s. Bienenkraut.		Wasserviole s. Schäfchen.		Wiesenröthe, <i>Gal. bor.</i>	182
Waldnessel, <i>Stach. sylv.</i>	298	Wau	20	Wiesenschwertel	309
Waldrapunzel, <i>Camp. persic.</i>	241	Weberdistel s. Karden.		Winde	256
Waldrapunzel, <i>Phyt. spic.</i>	240	Weberkarden	189	Windhalm	416
Waldrebe	446	Wegdistel	234	Wintergrün	247
Waldschmigel	5	Wegdorn s. Kreuzdorn.		Wintergrün s. Singrün.	
Waldtulpe, rothe und blane	11	Wegebrette, Wegerich.	311	Winterkohlraps	40
Waldveilchen	45	Wegsenf	39	Winterkresse	33
Waldveigel s. Mondviole.		Wegtritt	317	Wirbelborsten s. Wirbeldeest.	
Waldwicken, <i>Lath. vern.</i>	166	Wegstroh	182	Wirbeldost	294
Wallwurz	264	Wegwarte	192	Wirteltunnel	51
Wandelbaum s. Traubenholunder.		Weiberkrieg s. Hauhechel.		Witsehen s. Ginster.	
Warzenkraut	192	Weichkraut	365	Wohlverleih	726
Waschkraut s. Seifenkraut.		Weichling	72	Wolf	437
Wasserbetonie, <i>Scroph. ag.</i>	283	Weide	328	Wolfakirsche s. Tollkirsche.	
Wasserdost	16	Weiden, <i>Saltcrnae</i>	323	Wolfmilch	168—171
Wasserdosten	11	Weide, spanische, s. Rainweide.		Wolfschoten	158
Wasserfenchel s. Hottonie.		Weiderich	99. 120	Wolfstrapp	291
Wasserhähnlein s. Haarkraut.		— blauer, <i>Veron. longif.</i>	271	u. s. Herzgespann.	
Wasserhauf s. Kunigundenkraut.		— gelber, <i>Lysim. vulg.</i>	307	Wolfswurz s. Eisenhut.	
Wasserhederich	30	Weierbinse, <i>Scirp. lac.</i>	392	Wollgras	396
Wasserhelm	304	u. <i>Heleochar. pal.</i>	393	Wollkraut	286
Wasserlinse	344	Weissbuche	324	Wucherblume	224
Wassermerk	101	Weissdorn	125	Wütherich	97
Wassernebel	95	Weisstanne	339	Wullich, <i>Verbascum</i>	286
Wassernuss	117	Weisswurz	372	Wunderveilchen	43
Wasserpolei, <i>Menth. ag.</i>	289	Wermuth	221	Wundklee	151
Wasserpfeffer	316	Wetterrosen s. Stegmarkr.		Wurmblume s. Bitterich.	
		Wicke	160. 161	Wurmfarn	222
		Wiederstoss. <i>Sil. Ot.</i>	66	Wurmfarn	501. 503
		u. <i>Sil. tnfl.</i>	66	Wurmkrant	39
		Wiedertodt	500	Wurzelsauger s. Fichtenspargel.	
		Wiepken s. Haabntten.		Zahnrost	278
		Wiesendingel, <i>Epipactis</i>	363	Zahnwurz	37
		Wiesenhafer	417	u. s. Schuppenwurz.	
				Zapfenbäume, <i>Coniferae</i>	337

	Seite		Seite		Seite
Zapfenkraut	371	Ziegen'od s. Eisenhnt.		Zwenke	433
u. <i>Camp. Trach.</i>	242	Ziest	298	Zwergkiefer	339
Zauken s. Springauf.		Zinken	342	Zwerglein	58
Zaunlilie s. Graalilie.		Zipfelkraut	110	Zwergmalpel	126
Zaunrube	176	Zipollen	381	Zwiebel	381
Zaunwinde	256	Zittergras	424	Zymbelblume, <i>Epip.</i>	
Zehrwarz s. <i>Aram.</i>		Zitterpappel	337	<i>lat.</i>	385
Zeiland	318	Zungenpeitsche	181	Zypergras	390
Zeisenkraut, <i>Stach.</i>		Zweckholz s. Spindel-			
<i>an.</i>	299	baum.			
Zeitlose	382	Zweiblatt, <i>List. or.</i>	363		

Karte

des

Proffils der Sudeten und des Teschnischen Gebirges.

Zur Erläuterung und Benutzung des beigefügten Gebirgsprofils.

Der Gebirgszug, welcher zum Theil ganz innerhalb des Gebiets, welches die Flora umfasst, liegt, zum Theil mit seinem höchsten Rücken, oder seinen hervorragendsten Spitzen die Gränze desselben nach Süden oder Südwesten bildet, ist in dem beigefügten Profil zu veranschaulichen versucht worden.

Betrachtet man die ganze Gebirgsmasse, welche die südwestlichen Gränzen und Gebietstheile einnimmt, und im Ganzen ziemlich schroff von den nordöstlich von ihr gelegenen Ebenen sich abschneidet, so wird sogleich bei dem ersten Ueberblick die Vorstellung sich geltend machen, dass jenes Gebirge ein lang hingedehnter *Gebirgszug* bei verhältnissmässig geringer Breite ist, welcher seinen Charakter selten, und nur ausnahmsweise, und auch dann nur durch kleine Ausläufer oder an Umfang nicht sehr erhebliche Gebirgsgruppen einigermassen verlängert. Der erwähnte Gebirgszug beginnt im Westen mit der *Tafelfichte* an der böhmisch-schlesischen und unweit der sächsischen Gränze südlich von Lauban und zieht sich, unterbrochen durch das Oderthal, hin bis zum Berge *Baranio*, an der Gränze von Oesterreichisch-Schlesien (Teschen) und Galizien und unweit der von Ungarn, 4 Meilen südöstlich der Stadt Teschen. Zieht man von dem einem Endpunkte der Tafelfichte eine gerade Linie nach dem anderen, der Baranio, so wird man finden, dass die durch jene Linie angedeutete Richtung von dem ganzen Gebirgszuge mit nur wenigen geringen Abweichungen diess- und jenseits derselben, befolgt wird. Dieser Umstand gab eine natürliche Veranlassung, jene Richtung bei Construction eines Profils zum Grunde zu legen, ja wohl überhaupt ein solches zu entwerfen. Jene, den Hauptgebirgszug repräsentirende Linie, hat ungefähr eine südöstliche Richtung oder genauer:

sie schneidet den Meridian unter einem Winkel von 60 Grad oder die Linie von Ost nach West unter einem Winkel von 30 Grad.

Das Profil stellt nicht die Ansicht des Gebirges von einem einzelnen Punkte, wie z. B. von Breslau aus, gesehen vor, und kann es nicht, weil einerseits dasselbe nur eben einen Prospekt von einem einzelnen Punkte aus geben würde, andererseits aber, was wesentlich ist, von einem Standpunkt aus in der That das ganze Gebirge nicht übersehen, noch weniger aber in der scheinbaren Höhe, wie es sich von einem einzelnen Standpunkt aus betrachtet, dem Auge darbietet, so dargestellt werden kann, dass das richtige Verhältniss der Höhe der Berge zu einander, der Wahrheit gemäss veranschaulicht würde; darum ist dies Profil so entworfen, dass die früher bezeichnete, unter 60 Grad gegen den Meridian geneigte Linie, die den Gebirgszug seiner Haupttrichtung nach darstellt, zum Grunde liegt, und demgemäss der Beschauer des Profils die Gebirgsmassen, welchen besondern Theil davon er auch anschauen möge, so erblickt, als wäre sein Auge gerade senkrecht auf die bezeichnete Linie gerichtet, wenn er sich in hinreichend grosser Entfernung befindet. Eine völlig mit der wirklich stattfindenden congruierende Anschauung kann natürlich auch hier nicht zu erwarten sein, da in der Natur niedere Berge oft höhere verdecken. Um nun die verschiedenen Höhen der Einsenkungen in dem allgemeinen Gebirgszuge ihrer wahren Erhebung über der Ostsee nach in ihrem Profil darzustellen, wurde zu diesem Zweck eine Vertikalebene, welche durch jene öfter gedachte, den Gebirgszug darstellende Linie gelegt ist, angenommen und das ganze Gebirge immer seiner höchsten Erhebung und höchsten Einsenkungen nach durch horizontale Perpendikel darauf projectirt, so dass das Profil, wenn jemand von einer hinreichend grossen Entfernung das Gebirge in südwestlicher Richtung oder streng genommen, so betrachtet, dass sein Blick 30 Grad von Süden nach Westen gerichtet ist, den Saum des Gebirges mit dem Himmel darstellte. Wegen der grossen Ausdehnung des ganzen Bergzuges in Vergleich zu der Beschränkung des Raumes in dem beigegebenen Blatte und wegen Mangel an anderen weit verbreiteten Karten, wurden die Reimannschen Karten Deutschlands, welche in Sectionen erscheinend, bereits alle Theile des Gebirgszuges mit Ausnahme der Gegend um die Baranio und den Malinow enthalten, und der in ihnen enthaltene Längenmaassstab zum Grunde gelegt. Bei diesem kleinen Horizontalmaassstabe würde eine Vergleichung der verschiedenen Höhen in dem Profil nur schwer eine leichte Uebersicht gewähren, wenn man den jenem horizontalen Maassstabe entsprechenden vertikalen hätte beibehalten wollen. Darum sind sämtliche Höhen in $7\frac{1}{2}$ fach vergrössertem Maassstabe aufgetragen. Die

Die Höhen sind nach den zuverlässigsten Messungen aufgeführt und in dem Profil so genau, als sich dies thun liess, eingezeichnet. Zu diesem Zweck sind Parallellinien gezogen, von denen die unterste den Meereshorizont darstellt und die übrigen immer eine von der nächsten andern um 200 Fuss abstehen und mit entsprechenden Höhenzahlen an der Seite versehen, so dass man, auch ohne das Höhenverzeichniss nachzusehen, eine jede der im Profil angegebenen Höhen bis auf etwa 50 Fuss genau ermitteln kann. Da in dem Profil nur eine Hauptrichtung des Gebirgszuges und zwar die oben näher bezeichnete festgehalten werden konnte, so werden manche, von dem Hauptzuge sich abzweigende Ausläufer, wie z. B. der Forst-Kamm oder der Landshuter-Kamm, in der Zeichnung natürlich sehr verkürzt oder zusammengeschoben erscheinen und in demjenigen Gebirgtheile, namentlich zwischen Landshut und Tannhausen, wo das Gebirge den Charakter eines Kammes verliert und sich in eine Gruppe rechts und links von der Hauptrichtung zerstreuter Bergmassen auflöst, Berge neben einander erscheinen, welche ziemlich weit von einander entfernt liegen, wie z. B. der Sattelberg unweit Salzbrunn und der Kutschenberg an der böhmischen Gränze bei Schömberg. Von dem Weistritzthale bei Tannhausen an bis zur Janowizer Haide südsüdöstlich vom Altvater macht sich wieder der Charakter eines Kammes geltend, nur die Gränzgebirge der Grafschaft Glaz bilden ein Viereck nach Südwest, welches zu seiner einen Seite den der Hauptrichtung folgenden Gebirgskamm hat. Die Höhen der Grafschaft Glaz sind daher von der Heuscheuer an in dem Profil besonders, aber immer der angegebenen Projektionsmethode getreu, und so verzeichnet worden, dass sie da, wo sie unter den vorderen den Hauptzug bildenden Eulen- und Reichensteiner-Gebirge bleiben, durch punktirte Linien angedeutet sind. Oestlich vom Schneeberge an den Saalwiesen schliesst sich die Grafschaft Glaz gleich einem, das Innere eines Forts umgebenden Gebirgswall, wieder an den Hauptzug an. Von da zieht sich das eigentliche Gesenke oder das Schlesisch-Mährische Gränzgebirge nach Südost über den Altvater fort bis zur Janowizer Haide als äussersten alpinischen oder subalpinischen Höhenpunkte der Sudeten, nach deren verhältnissmässig steilen Abfall sich das Land allerdings noch mit bedeutenden Thaleinschnitten und nicht unbedeutenden Bergen, welche jedoch eben so wenig durch hervorragende Kuppen, als durch einen entschiedenen Bergkamm bemerklich werden, als Bergland charakterisirt und allmählig zum Oderthal absinkt. Auf ihm liegen die auch in dem Profil bemerkten Quellen der Oder, etwas über 2 Meilen östlich von Ollmütz in einer Höhe von nahe 2000 Fuss. Der durch das Oderthal bezeichnete Einschnitt bei Zauchtel $1\frac{1}{4}$ Meile nordwestlich von Neu-

Titschein ist bezeichnend für die Gränze der Sudeten in südöstlicher Richtung. Jenseits beginnt ein anderes Gebirgssystem, das der Karpaten, welches erst ungefähr 4 Meilen östlich von Neu-Titschein wieder in Schlesien, d. h. in das Fürstenthum Teschen, eintritt und sich darin in manichfachen Verzweigungen ausbreitet. Da dieser Gebirgsthail, obwohl zu dem Gebirgssystem der Karpaten gehörig, doch noch nicht mit Recht mit dem Namen der Karpaten belegt werden kann, der Name der Beskiden, mit welchem man ihn häufig bezeichnet, aber auch noch viel weiter östlich vor und jenseits der Centralkarpaten vorkommt und mithin Missverständnisse veranlassen kann, so ist dieser ganze Gebirgszug mit dem Namen Teschnisches Gebirge belegt worden. Das Profil zerfällt aus Rücksicht für die lithographische Ausführung und für das Format des Werkes in drei unter einander befindliche, gleiche Abschnitte, so dass, wenn man den mittlern an den obersten rechts anlegt und an diesen wieder rechts den untersten, man das ganze Gebirgsprofil von der Baranio (links) bis zur Tafelfichte (rechts) vor sich ausgebreitet hat.

F
r w

F *i* *r* *g* *e*

s *e* *r* - *k* *a* *m* *m*

50
8
6
4
2
40
8
6
4
2
30
8
6
4
2
20
8
6
4
2
10
8
6
4
2

Tempo

Lith. Anst. v. C. Neume. Dres.

Kollmann & Co.

1851

2-46

THIS BOOK READY FOR ISSUE

Science

NOV 25 '64

KS. -

457878

MICHIGAN STATE LIBRARIES

3 1293 02287 0897